



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.





600037270P



E. BIBL. RADCL.


~~H. D. H.~~

C.

16544

e

$\frac{151}{3}$



Friedrich Gilbebrandt's,

Ordentlich der Arzneikunde und Weltweisheit ordentl. öffentl. Lehrer an der Universität zu Erlangen, Königl. preuss. Hofraths, Mitgliedes vieler gelehrter Akademien und Gesellschaften,

H a n d b u c h

der

Anatomie des Menschen.

Vierte

umgearbeitete und sehr vermehrte Ausgabe

beforgt von

Ernst Heinrich Weber,

ordentlichem Professor der Anatomie an der Universität zu Leipzig, der Med. und Philos. Dr., corresp. Mitgliede der königlichen Akademien der Wissenschaften zu Berlin und Turin, so wie auch der naturforschenden und medicinischen Gesellschaften zu Leipzig, Dresden, Halle, Erlangen, Moskau und Stockholm.

Dritter Band.

Das Gefäß- und Nervensystem.

Braunschweig,

Verlag der Schulbuchhandlung.

1831.

Friedrich Hilbrandt's,

Ordentlichem Professor der Arzneikunde und Weltweisheit ordentl. öffentl. Lehrers an der Universität zu Erlangen, Königl. preuß. Hofraths, Mitgliedes vieler gelehrter Akademien und Gesellschaften,

H a n d b u c h

der

Anatomie des Menschen.

V i e r t e

umgearbeitete und sehr vermehrte Ausgabe

beforgt von

Ernst Heinrich Weber,

ordentlichem Professor der Anatomie an der Universität zu Leipzig, der Med. und Philos. Dr., corresp. Mitgliede der königlichen Akademien der Wissenschaften zu Berlin und Turin, so wie auch der naturforschenden und medicinischen Gesellschaften zu Leipzig, Dresden, Halle, Erlangen, Moskau und Stockholm.


D r i t t e r B a n d .

Das Gefäß- und Nervensystem.

B r a u n s c h w e i g ,

Verlag der Schulbuchhandlung.

1 8 3 1 .



V o r r e d e

zum dritten Bande.

Bei genauer Vergleichung wird man finden, daß dieser Band mehr Zusätze und eine vollkommnere Umarbeitung bedurfte und erhalten hat, als der zweite Band. Bei den bis Seite 123 reichenden Betrachtungen über den Bau, die Verbreitung und die Wirkungsart der Arterien, Venen und Lymphgefäße konnte das, was in der älteren Ausgabe des Handbuchs enthalten war, nicht mehr als die in andern Büchern vorkommenden Notizen benutzt werden. Bei der Lehre vom Baue des Herzens mußte eine kritische, durch eigne Untersuchungen unterstützte Vergleichung der von Gerdy neuerlich gegebenen Beschreibung mit den mühevollen Untersuchungen Wolffs und anderer Anatomen angestellt, und der ganzen Darstellung eine andere Form gegeben werden. Bei der Beschreibung des Arteriensystems wurden die Werke von Münz, Liebemann, Langenbeck und von andern benutzt, bei der des Venensystems ist alles das hinzugethan worden, was man Breschet verdankt. Die Abweichungen der Arterien von der Regel sind für den Chirurgen zu wichtig, als daß sie hier übergangen werden durften. Die Zusammenstellung dieser Abweichungen aber, bei welchen vorzüglich Meckel's und Otto's wichtige Werke zum Grunde gelegt, zugleich aber viele einzelne Schriften und Abhandlungen benutzt worden sind, ist Herrn Asmann zuzuschreiben. Die Einleitung zur Beschreibung des Nervensystems ist, wie alle diese Einleitungen, von mir neu ausgearbeitet worden. Das Gehirn und Rückenmark hat, seitdem die letzte Ausgabe dieses

Handbuchs erschienen ist, so viele, zum Theil sehr ausgezeichnete Anatomen beschäftigt, unter andern Wenzel, Gall, Keil, Carus, Döllinger, Meckel, Tiedemann, Burdach, Treviranus, Serres, Rosenthal, Desmoulin, Langenbeck, Laurencet und Rolando, daß diese Lehre eine ganz neue Gestalt erhalten mußte. Dabei konnten nur Rolando's Werke über das Rückenmark und über das verlängerte Mark, nicht aber das kürzlich erschienene Werk desselben über das große Gehirn benutzt werden. Endlich mußte aber auch die Beschreibung der Nerven nach den wichtigen neuen Untersuchungen Boë's über das fünfte Nervenpaar und über die Rückenmarksnerven, ferner nach den Bereicherungen, die diese Lehre durch die Arbeiten von Munnik's, Gall, G. Bell, Lobstein, Jacobson, Baur, Tiedemann, Treviranus, Buzer, Serres, Desmoulin, Rolando, Bellingeri, Götz, Hirzel, Arnold, Langenbeck und J. Müller erhalten hat, berichtigt, und zum Theil umgestaltet werden. Da nun diese Darstellung des Gefäß- und Nervensystems bei so vielen Zusätzen einen größeren Raum einnimmt, als der vorhergehende Band, so ist es nöthig geworden, von dem Plane, die Eingeweidlehre mit dieser Lehre in einem Bande zusammen zu fassen, abzugehen. Die Eingeweidlehre, an welcher fortwährend gedruckt wird, wird vielmehr eben so, wie in der frühern Ausgabe, den vierten Band ausmachen, in welchem außerdem auch die Entwicklungsgeschichte des Menschen abgehandelt werden soll.

Ernst Heinrich Weber.

Inhalt des dritten Bandes.

Viertes Buch. Von dem Gefäßsysteme.

Seite
3

Literatur.

Schriften über das ganze Gefäßsystem S. 3. — Schriften über diejenige Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf geschieht S. 3. — Schriften über mechanische und physiologische Untersuchungen über den Kreislauf S. 3. — Schriften über den Zusammenhang der Arterien und Venen unter einander durch die Haargefäße, und über den Zusammenhang derselben mit den Höhlen und Oberflächen des Körpers durch die Poren S. 4. — Schriften über den Herbeutel, das Herz und die Entwicklung desselben S. 5. — Ueber die Arterien S. 10. — Schriften über allgemeinere Verhältnisse der Arterien, ihre Häute und deren Organe S. 10. — Schriften über die Abweichungen im Verlaufe der Arterien S. 11. — Schriften über die Lebens-eigenschaften der Arterien S. 11. — Beschreibungen des Arterien-systems S. 11. — Abbildungen des Arterien-systems S. 12. — Einige Schriften über die vergleichende Anatomie der Arterien S. 12. — Schriften über die Venen S. 15. — Schriften über die Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf nicht geschieht, oder über die Lymphgefäße S. 14. — Ueber das Lymphgefäßsystem oder über ganze Abtheilungen desselben S. 14. — Einige besondere Schriften über einzelne, die Lehre von den Lymphgefäßen betreffende Gegenstände S. 19. — Ueber die Muskelfasern und Klappen der Lymphgefäße S. 19. — Schriften über die Communication derselben mit den Venen S. 19. — Schriften über die Lymphdrüsen S. 20. — Schriften über den Ductus thoracicus S. 20. — Schriften über die Lymphgefäße einzelner Organe S. 21. — Ueber die vergleichende Anatomie der Lymphgefäße S. 21.

Ueber das Gefäßsystem im Allgemeinen.

Gefäße des Körpers im weiteren Sinne des Wortes S. 22. — Atern, oder Gefäße im engeren Sinne des Wortes. Blutgefäße, oder Gefäße, in welchen der Kreislauf geschieht, und Lymphgefäße, oder Gefäße, in welchen sich Säfte bewegen, die sich auf dem Wege befinden, um in den Kreislauf zu gelangen S. 23. — Gefäße des Kreislaufs S. 25. — Verschiedenheit der Arterien und der Venen S. 26. — Ueber die im Gefäßsysteme vorkommenden Ventile S. 28. — Definition der Arterien und der Venen S. 29. — Beweise für den Kreislauf des Bluts S. 30.

Haargefäße

Bedeutung des Wortes Haargefäß S. 33. — Ihre Wände S. 35. — Verschiedene Menge derselben in verschiedenen Theilen S. 35. — Nutzen der verschiedenen Einrichtung der Haargefäßneße S. 37. — Geschwindigkeit des Bluts in den Haargefäßen S. 39. — Hindernisse der Blutbewegung, welche aus der Reibung an den Wänden entstehen S. 41. — Haargefäße in verschiedenen Geweben S. 42. — Messungen des Durchmessers der Haargefäße S. 44. — Gestalt der Blutgefäßneße, die nicht zu den Arterien gehören. — Verschiedenheit der Haargefäßneße in den verschiedenen Lebensaltern und in Krankheiten S. 47. — Gibt es Gefäße des Kreislaufs, die nur Blutwasser führen? S. 48. — Ueber die Offenungen, durch welche etwas aus den Blutgefäßen heraus, oder in sie eindringen kann S. 50. — Es gibt an den Blutgefäßen keine offenen Enden S. 51. — Die Absonderung scheint durch Poren zu geschehen S. 52. —

33

	Ueber die Kräfte, durch welche etwas aus den Blutgefäßen ausgetrieben der in sie hineingejogen werden kann S. 53. — Durchschwüfung durch die Poren der Haut S. 54.	61
Arterien und Venen		1
Die zwei größten Arterien S. 56. — Communication der Arterien S. 56. — Zahl der Theilungen in kleinere Zweige S. 57. — Lage der Arterien an Stellen, wo sie vor Druck und Dehnung geschützt sind S. 58. — Größe der Höhle des Arteriensystems in den Stämmen und Zweigen S. 58. — Geschwindigkeit des Blutlaufs in den Stämmen und Zweigen der Arterien S. 59. — Festigkeit der Arterienwände S. 60. — Häute der Arterien S. 62. — Äußere Haut derselben S. 62. — Mittlere Haut derselben S. 63. — Innerste Haut der Arterien S. 65. — Verschiedenheit der Meinungen über die Zahl der Häute der Arterien S. 67. — Nutzen der drei Häute der Arterien S. 67. — Puls der Arterien S. 67. — Nutzen der Elasticität der Arterien S. 69. — Druck, welchen die Arterien vom Blute auszuhalten haben S. 70. — Öffnungen und Nerven der Arterien S. 71. — Fähigkeit der Arterien, schmerzhaft zu werden S. 73. — Fähigkeit der Arterien zu Lebensbewegungen S. 74. — Entstehung, Wachstum, Krankheiten und Wiederherstellung verletzter Arterien S. 79.		
Venen		1
Körpervenen im Allgemeinen		1
Communication der Körpervenen unter einander S. 84. — Klappen der Körpervenen S. 84.		1
Lungenvenen im Allgemeinen		1
Häute der Venen S. 88. — Verhältnismäßig geringe Zerreibbarkeit der Venenwände S. 90. — Gefäße und Nerven der Venen. S. 91. — Empfangungsvermögen in den Venen S. 91. — Lebensbewegung der Venen S. 92. — Bildungsvermögen der Venen und Krankheiten derselben S. 93.		1
Lymphgefäße		1
Einrichtung der Lymphgefäße S. 94. — Klappen der Lymphgefäße und Communication der zahlreichen Stämme, in welche sie an den meisten Stellen des Körpers getheilt bleiben S. 96. — Festigkeit und Ausdehnbarkeit der Wände der Lymphgefäße S. 97. — Zahl und Beschaffenheit der Häute der Lymphgefäße S. 98. — Durchmesser aller Lymphgefäße zusammengenommen S. 99. — Mechanismus und Kräfte, wodurch die Einsaugung geschieht S. 99. — Das lebendige Bewegungsvermögen der Lymphgefäße wirkt nicht auf dieselbe Weise wie das der Muskeln S. 100. — Einige Anatomen halten die Einsaugung für die Wirkung einer todtten Haarröhrenkraft S. 101. — Hypothesen, um sich das Vermögen einzusaugen, als ein lebendiges vorzustellen S. 101. — Anfang der Lymphgefäße an den verschiedenen Stellen des Körpers S. 102. — Siebt es sichtbare Oeffnungen, wodurch die Lymphgefäße, namentlich an den Pforten der Gedärme, einsaugen? S. 103. — Siebt es solche Oeffnungen im Zellgewebe, von wo aus eingeblasene Luft und eingetriebenes Quecksilber leicht in die Lymphgefäße übergeht? S. 104. — Zwischen den Blutgefäßen und Lymphgefäßen findet kein solcher Zusammenhang Statt, daß während des Lebens eine Strömung von Blut oder von blutartiger Flüssigkeit aus jenen in diese geschähe S. 104. — Beweise für die durch die Lymphgefäße geschehende Einsaugung S. 106. — Fortgang der Saugadern S. 106. — Größe der Lymphgefäße bei ihrem Fortgange durch verschiedene Theile S. 107. — Verschiedenheit hinsichtlich ihrer Communicationen unter einander S. 107. — Stellen des Körpers, wo die Saugadern in größter Menge, wo sie in geringerer Menge vorkommen, und endlich wo sie gar nicht gefunden werden S. 107.		
Lymphdrüsen		11
Theile des Körpers, an welchen die Lymphdrüsen liegen S. 108. — Zahl und Größe derselben an verschiedenen Stellen des Körpers S. 108. — Hüllen der Lymphdrüsen S. 108. — Befestigung derselben S. 109. — Ihr innerer Bau S. 109. — Verlauf der Lymphgefäße durch die Lymphdrüsen S. 109. — Es giebt in den Lymphdrüsen keine Zellen, welche etwas anders als bloße Erweiterungen der durch sie hindurch gehenden Lymphgefäße, und welche so von den Lymphgefäßen getrennt wären, daß sie mit ihnen in keiner ganz offenen Verbindung ständen S. 111. — Verschiedene Beschaffenheit der Lymphdrüsen bei den Delphinen und Walfischen S. 113. — Die Lymphdrüsen sind bei dem Menschen		

in größter Menge vorhanden, und überhaupt nur bei den Säugethieren sehr ausgebildet, bei den Vögeln fehlen sie fast ganz, und bei den Amphibien und Fischen sind sie gar nicht vorhanden S. 113. — Lymphgefäßnetze scheinen daselbst ihre Stelle zu vertreten S. 113.

Endigung der Lymphgefäße..... 113

Ob es kleine Lymphgefäße gebe, die noch nicht zu größeren Stämmen zusammengetreten sind, und welche die von ihnen eingefangene Flüssigkeit in kleine Venen ergießen, oder, was beinahe dasselbe ist, ob es einsaugende Enden der Venen gebe S. 114. — Es findet keine solche Verbindung von Lymphgefäßen und Venen innerhalb der Lymphdrüsen Statt, daß die Säfte daselbst aus den Lymphgefäßen in die Venen hinüber fließen S. 114. — Bei dem so oft beobachteten Uebergange eingespritzter Flüssigkeiten aus den Lymphgefäßen der Lymphdrüsen in die Venen deuteten mehrere Erscheinungen eine Zerreißung an S. 116. — Die von Fohmann angeführten Gründe widerlegen die Annahme einer Zerreißung nicht S. 118. — Der Uebergang findet vielleicht auch durch erweiterte Poren Statt, die der Lymphge während des Lebens hinreichenden Widerstand leisten, und nur einen Uebergang von Säften aus den Lymphgefäßen in die Venen, und umgekehrt (durch eine Art von Absonderung, nicht durch ein Ueberströmen) gestatten S. 119. — Die Lymphgefäßstämme scheinen sich nicht an andern Stellen als an den hinter den Schlüsselbeinen gelegenen in größere Venen zu öffnen S. 120. Der Ductus thoracicus ist wahrscheinlich deswegen im Verhältnisse zu den großen Durchmessern aller Lymphgefäßstämme zusammengenommen so klein, weil in den Lymphdrüsen assimilirte Säfte durch eine Absonderung in die Blutgefäße übergehen S. 121. — Von den Vögeln, wo nach Fohmann und Lauth eine schätzbare Einmündung großer Lymphgefäße in verschiedene große Venen Statt findet, darf man nicht auf die Säugethiere und auf den Menschen schließen, denn den Vögeln fehlen die Lymphdrüsen fast ganz, und die Einrichtung des Lymphgefäßsystems ist also eine andere S. 121. — Krankheiten der Lymphgefäße S. 121.

Das Herz.

Ort und Lage des Herzens S. 124. — Gewicht desselben S. 125. — Der Herzbeutel S. 127. — Nutzen des Herzbeutels S. 127. — Das Herzbeutelwasser S. 128. — Gefäße und Nerven des Herzbeutels S. 129. — Die vier Abtheilungen des Herzens und die Fortsätze, durch welche dieselben schon von außen unterschieden werden können S. 129. — Zweck der rechten und der linken Herzhälfte S. 131. — Die obere dünnwandige Herzhälfte, oder die zwei Vorhöhlen, atria, und die untere dickwandige Herzhälfte, oder die zwei Herzkammern, ventriculi S. 132. — Fleischfasern der vier Abtheilungen des Herzens S. 133. — Größe der Höhlen des Herzens S. 134. — Die Höhlen der rechten Herzhälfte sind während des Lebens eben so weit als die der linken S. 134. — Oeffnungen an den vier Herzhöhlen und Klappen an einigen dieser Oeffnungen S. 135. — Klappen an der Grenze der Kammern und der Vorhöfe S. 136. — Nutzen der warzenförmigen Muskeln derselben S. 137. — Befestigungspunkte der Fleischfasern des Herzens S. 138. — Die drei halbmondförmigen Klappen an Ausgängen jeder Herzkammer in die mit ihr zusammenhängende Arterie S. 139. — Ueber die Wirkungsart und den Verlauf der Fleischfasern des Herzens im Allgemeinen S. 139. — Fleischfasern der Vorhöfe S. 141. — Allgemeine Beschreibung der Fleischfasern der Kammern S. 143. — Specielle Beschreibung des Verlaufs der Fleischfasern der Herzkammern S. 144. — Resultate dieser specielle Beschreibung. Die Beschreibungen verschiedener Anatomen unter einander verglichen S. 150. — Verlauf der Fleischfasern an der Scheidewand der Kammern S. 150. — Verschiedener Anatomen Beschreibung des Zusammenhangs und der Lagen der Fleischfasern der Herzkammern S. 151.

Beschreibung der vier Abtheilungen des Herzens im Fingelfischen S. 153. — Rechter Vorhof S. 153. — Rechte Herzkammer S. 155. — Linker Vorhof S. 156. — Linke Herzkammer S. 157. — Gefäßstämme, die in das breite Ende des Herzens treten S. 158.

Entwicklung des Herzens und der großen Blutgefäßstämme, S. 159. — Kreislauf des Blutes beim sehr kleinen Embryo S. 161. — Die Lungenarterie ist anfangs nur Körperarterie für die untere Körperhälfte S. 161. — In dem Maße, als die zu den Lungen gehenden Nette anschließen werden, verengt sich ein Stück

des Stammes, und wird zum Ductus arteriosus S. 162. — Entstehung der Valvula foraminis ovalis S. 162. — Die Endastische Klappe S. 163. — Weil die rechte Herzammer bei Embryonen das Blut durch den Körper treiben hilft und mit der Aorta communicirt, mußte sie ziemlich eben so fleischig sein als die linke Kammer S. 163. — Verwachen des Ductus arteriosus und des Foramen ovale nach der Geburt S. 164. — Gefäße des Herzens S. 164. — Beschreibung der Kranzarterien S. 165. — Venen des Herzens S. 166. — Foramina Thebesii S. 167. — Lymphgefäße des Herzens S. 168. — Nerven desselben S. 169.

Beschreibung der Gefäße des kleinen Kreislaufs.

Die Lungenarterie S. 169. — Die vier Lungenvenen S. 170.

Beschreibung der Gefäße des großen Kreislaufs.

Die Schlagader des großen Kreislaufs, die Aorta 17
Ursprung, Verlauf und Nette der Arteria aorta 171. — Varietäten S. 171. — Nette der Aorta im Einzelnen S. 178.

Arteriae carotides 17

A. carotis externa S. 180. — A. thyreoidea superior S. 180. — A. lingualis S. 182. — A. maxillaris externa S. 182. — A. pharyngea S. 184. — A. occipitalis S. 185. — A. auricularis posterior S. 188. — A. temporalis S. 187. — A. maxillaris interna S. 188.
A. carotis interna S. 191. — Ramus communicans S. 193. — A. chorioidea S. 193. — A. fossae Sylvii S. 193. — A. corporis calloai S. 193. — A. ophthalmica S. 194.

Arteriae subclaviae 18

A. vertebralis S. 199. — A. spinalis anterior S. 201. — A. spinalis posterior S. 201. — A. basilaris S. 201. — A. cerebelli inferior S. 201. — A. cerebelli superior S. 202. — A. cerebri profunda S. 202. — A. auditoria interna S. 202. — Circulus Willisii S. 203.
A. mammaria interna S. 203. — Rami thymici S. 204. — A. bronchialis anterior S. 204. — A. pericardiacophrenica S. 204. — Rami intercostales S. 204. — Rami sternales S. 204. — Ramus phrenicopericardiacus S. 205. — Ramus musculo-phrenicus S. 205. — Ramus epigastricus S. 205.
A. thyreoidea inferior S. 207. — A. cervicalis ascendens S. 207. — A. cervicalis superficialis S. 207. — A. transversa colli S. 207. — A. transversa scapulae S. 208. — A. cervicalis profunda S. 208. — A. intercostalis superior S. 208.
A. axillaris S. 209. — A. thoracicae externae S. 210. — A. subscapularis S. 210. — A. circumflexa humeri anterior S. 211. — A. circumflexa humeri posterior S. 211.
A. brachialis S. 211. — A. profunda brachii S. 212. — A. collateralis radialis prima S. 212. — A. collateralis radialis secunda S. 212. — A. collateralis ulnaris prima S. 213. — A. nutritia magna S. 213. — A. collateralis ulnaris secunda S. 213.
A. ulnaris S. 213. — A. recurrens ulnaris S. 214. — Ramus dorsalis S. 214. — Ramus volaris S. 214. — A. interossea S. 215. — A. interossea dorsalis S. 215. — A. interossea volaris S. 216.
A. radialis S. 216. — Ramus volaris S. 218. — Ramus dorsalis S. 218.
Allgemeine Bemerkungen über die aus dem Bogen der Aorta entspringenden Arterien S. 219.

Nette des absteigenden Theils der Brustaorta 22

Vordere Nette der Aorta in der Brusthöhle S. 225. — AA. bronchiales S. 225. — AA. oesophageae S. 225. — AA. pericardiacae S. 226.

Hintere Nette der Aorta in der Brusthöhle S. 227. — AA. intercostales inferiores S. 227.

Nette des im Unterleibe liegenden Theiles der Aorta 22

Arterien für die Seitenwand der Bauchhöhle S. 228. — AA. lumbales S. 228. —

	Seite
Arterien für die in der Unterleibshöhle gelegenen Organe S. 229. — AA. phrenicae inferiores S. 229.	
A. coeliaca S. 231. — A. coronaria ventriculi sinistra S. 231. — Ihre Äste, Ramus hepaticus S. 232. — A. splenica oder lienalis S. 232. — Ihre Äste, scilicet AA. ventriculi breves S. 232. — und die A. gastro-epiploica sinistra et hepatica S. 232. — A. hepatica S. 233. — Ihre Äste, die A. coronaria ventriculi dextra oder pylorica S. 233. — Die A. gastro-duodenalis, welche sich in die A. pancreatica duodenalis und in die A. gastro-epiploica dextra theilt S. 233. — Endlich die Leberäste derselben.	
A. mesenterica superior S. 234. — Ihre Dünndarmäste S. 235. — Ihre Dickdarmäste die A. colica media, die A. colica dextra und die A. ileocolica S. 236.	
A. mesenterica inferior S. 237. — Ihre Äste, die A. colica sinistra S. 237 und die A. haemorrhoidalis interna S. 237.	
A. renalis S. 238. — A. spermatica S. 239. — A. suprarenalis S. 240.	
Endzweige der Aorta.....	241
A. sacra media S. 241. — Arteriae iliacaе S. 241. — A. iliaca interna oder hypogastrica. S. 241. — A. iliaca externa oder cruralis S. 242.	
Äste der A. hypogastrica, namentlich die A. iliolumbalis S. 242. — A. sacra lateralis S. 243. — A. obturatoria S. 243. — A. iliaca posterior S. 244. — A. ischiadica S. 245. — A. pudenda interna und ihre Äste die A. A. haemorrhoidalis media, die AA. haemorrhoidales externae, die A. perinaei und die A. penis S. 245 u. 246. — Die Äste dieser Arterien beim weiblichen Geschlechte S. 247. — Arteria umbilicalis S. 247, ihre Äste, die AA. vesicales und die A. uterina.	
Äste der A. cruralis, namentlich die A. epigastrica S. 249. — A. circumflexa ilei S. 250. — A. pudenda externa S. 251. — A. circumflexa femoris externa S. 252. — A. circumflexa femoris interna S. 252. — A. femoris profunda S. 252.	
A. poplitea S. 253. — Zwei obere und zwei untere Gefäßarterien S. 254.	
A. tibialis antica S. 254. — Ihre Äste, die A. malleolaris anterior interna und die externa, die A. tarsea interna und die externa S. 255. — A. tibialis postica S. 256. — A. peroneae S. 256. — A. plantaris interna und externa S. 257. — AA. digitales plantares S. 258. — AA. digitales dorsales S. 258.	
Von den Venen des großen Kreislaufs.	
Die zwei Hohlvenen und ihre Hauptzweige im Allgemeinen.....	259
Die Vena cava superior begleitet das Bruststück der Aorta an seiner rechten Seite, führt das Blut zurück, welches die Aorta in der oberen, über dem Zwerchfell gelegenen Körperhälfte verbreitet hat, die aus ihr hervorgehenden zwei Venae anonymae oder jugulares communes entsprechen demnach oben aus dem Aortenbogen hervorgehenden großen Arterien, die Vena azygos entspricht der Aorta descendens, krummt sich wie sie über den linken, so über den rechten Luftröhrenast abwärts, und begleitet die Aorta an ihrer rechten Seite S. 260. — Die Vena cava inferior begleitet das Bauchstück der Aorta an ihrer rechten Seite, und führt alles das Blut zurück, welches es unterhalb des Zwerchfells in die untere Körperhälfte vertheilt hat S. 260.	
Venen an den Wänden des Rumpfs.....	260
Vena azygos S. 261. — Untere und mittlere Zwischenrippenvenen S. 264. — Plexus venosi spinales S. 266. — Venae spinales internae anteriores et posteriores S. 267. — Venae spinales externae anteriores S. 268.	
Obere Theil der oberen Hohlvene S. 268. — Venae anonymae oder jugulares communes S. 269. — Kleine Venen, die zuweilen in die Vena cava oder in die Vena jugularis communis oder in ihre Äste gehen S. 270. — V. intercostalis superior S. 270. — VV. bronchiales S. 270. — VV. oesophageae S. 270. — VV. mammae internae S. 270. — VV. thymicae S. 270. — VV. mediastinae — VV. pericardiacae S. 270. — VV. phrenicae superiores S. 271.	

Venen des Halses und Kopfs, namentlich die Vena vertebralis, welche die tiefe Vene des Halses und Kopfs, die Vena jugularis interna, welche die mittlere Vene des Halses und des Kopfs und die Vena jugularis externa, welche die oberflächliche oder die Hautvene des Halses und des Kopfs ist S. 271. Die V. vertebralis ist doppelt eine außerhalb des canalis vertebralis liegende, welche auch V. vertebralis superficialis genannt wird, und eine in den Canalis vertebralis liegende, welche auch V. vertebralis profunda heißt S. 271. — Die größten Aeste der V. jugularis interna sind der aus der Schädelhöhle kommende Ramus cerebralis S. 272, und der vom Gesichte kommende Ramus facialis S. 272. — Dieser Zweig entsetzt selbst wieder durch die Verzweigung der V. facialis anterior und der V. facialis posterior S. 272. — Jeder von ihnen hat oberflächliche Aeste und einen tief liegenden Ast S. 273. und 274. — Die Aeste der V. jugularis externa, namentlich vordere Zweige, der mittlere Zweig, und hintere Zweige S. 276.	En
Venen einiger Theile des Kopfs, welche mit mehreren der beschriebenen Venenstämme in Verbindung stehen S. 277.	
Venen in der Schädelhöhle S. 277. — Sinus der harten Hirnhaut, welche eine Richtung von vorn nach hinten haben S. 277. — Sinus longitudinalis superior S. 278. — Sinus longitudinalis inferior S. 278. — Sinus quartus S. 277. — Zwei sinus occipitales posteriores S. 279. — Sinus, welche eine mehr quere Richtung haben S. 279. — Sinus transversus S. 280. — Sinus petrosus superior S. 280. — Sinus petrosus inferior S. 280. — Sinus occipitalis anterior S. 280. — Sinus circularis S. 281. — Sinus cavernosus S. 281. — Sinus alae parvae S. 281. — emissaria Santorini S. 282. — VV. diploicae S. 283.	
Venen der Augenhöhle S. 284. — V. ophthalmica cerebralis S. 284. — V. ophthalmica facialis S. 285. — Aeste derselben, namentlich VV. ciliares posticae S. 286. — VV. ciliares anticae S. 286. — V. centralis retinae S. 286.	
Venen der unpaaren Organe am Halse S. 286. — V. thyreoidea superior, media und inferior. — V. lingualis S. 286. — VV. pharyngeae S. 287.	
Venen des Arms S. 287. — VV. subclaviae S. 287. — V. axillaris S. 288. — Hautnerven des Arms, namentlich V. cephalica, basilica und mediana S. 288. — Tief sitzende Venen des Arms S. 290.	
Vena cava inferior.....	29
Die V. cava inferior begleitet das Bauchstüd der Aorta an seiner rechten Seite und führt alles das Blut zurück, welches die Aorta unterhalb des Zwerchfells in der unteren Körperhälfte vertheilt hat S. 291. — VV. phrenicae S. 292. — VV. hepaticae S. 293. — VV. renales S. 293. — VV. spermaticae internae S. 294. — VV. suprarenales S. 295. — VV. lumbares S. 295. — VV. iliaca S. 295. — V. iliaca interna oder hypogastrica S. 295. — V. iliaca externa oder cruralis S. 296. — VV. cutaneae pedis S. 297, namentlich V. saphena magna S. 297. — V. saphena parva S. 298. — Tiefe Venen des Fußes S. 298.	
Vena portae.....	29
Vena mesenterica S. 299. — Vena lienalis S. 300.	
Vena umbilicalis.....	30
Ursprung der Vena umbilicalis S. 301. — Aeste derselben in der Leber und Communication mit dem linke Aste der V. portae S. 302. — Ligamentum teres, Ductus venosus S. 303.	

Von den Saugadern.

Ductus thoracicus S. 303. — Die andern Hauptstämme S. 304. — Plexus lumbares et iliaci S. 304. — Saugadern des Dünndarms S. 305. — Saugadern des Dickdarms S. 306. — Saugadern des Magens S. 307. — Saugadern des Hufes S. 307. — Saugadern der Nüß S. 307. — Saugadern des Brustrodes S. 307. — Saugadern der Leber und der Gallenblase S. 307. — Saugadern der Nieren und der Nebennieren S. 308. — Saugadern der

Erste

Speicheldr. S. 308. — Saugadern des Mastdarms S. 308. — Saugadern der
 nämlichen Geschlechtstheile S. 309. — Saugadern der weiblichen Geschlechts-
 theile S. 309. — Saugadern an der Wand des Unterleibs S. 310. — Saug-
 adern der Bauchhaut S. 310. — Saugadern der Bauchglieder S. 310. —
 Saugadern des Zwerchfells S. 312. — Saugadern der Brust S. 312. —
 Saugadern der Brusthaut und des Herzbreits S. 313. — Saugadern des Her-
 zes S. 313. — Saugadern der Lungen S. 313. — Saugadern der Speise-
 röhre S. 313. — Saugadern der Thymusdrüsen S. 314. — Saugadern der Milch-
 drüsen S. 314. — Saugadern der Brustglieder S. 314. — Saugadern der
 Nage S. 315. — Saugadern des Gehirns S. 315.

Fünftes Buch.

Von dem Nervensysteme.

Uebersicht über das Nervensystem..... 319

Schriften über den Begriff und die Geschichte des Nervensystems S. 319. —
 Schriften über den Bau der zum Nervensysteme gehörenden Theile S. 319. —
 Schriften über die Regeneration der zum Nervensysteme gehörenden Theile S. 320.
 — Beschreibung des Nervensystems S. 321. — Vermischte Abhandlungen über
 die Nerven S. 322. — Schriften über die Gehirnhäute S. 323. — Schriften
 über das Gehirn und das Rückenmark S. 324. — Schriften über einzelne Theile
 des Gehirns S. 329. — Schriften über die Entwicklung des Nervensystems S.
 331. — Schriften über einzelne Nervenpaare S. 337.

Ueber das Nervensystem im Allgemeinen..... 339

Eintheilung des Nervensystems in die Centraltheile und in die Nerven S. 339. —
 Verschiedenheit der Einhüllung der Nervenfasern in diesen und in jenen S. 339. —
 Lage der grauen und der weißen Substanz im Nervensysteme S. 341. — Endig-
 ung, Richtung und Verflechtung der Fasern der weißen Substanz S. 342. —
 Doppelt vorhandene und einmal vorhandene Theile des Nervensystems S. 342. —
 Methoden, die Fasern und ihre Richtung sichtbar zu machen S. 344. — Kuh-
 lung der grauen Substanz, in welcher sich die Bündel der Hirnsfasern zertheilen
 und wieder vereinigen, oder Ganglien des Gehirns, nach Gall S. 345. — An-
 fang der Nervenfasern S. 345. — Wachsen sie von ihrem innern oder von ihrem
 äußern Ende aus? S. 346. — Gibt es specifisch verschiedene Nerven? S. 346. —
 Anstomosen, Geslechte und Ganglien S. 347. — Ueber die Structur der Ner-
 venknoten S. 348. — Ueber den Nutzen der Nervenknotten und des mit vorzüglich
 vielen Nervenknotten versehenen sympathischen Nerven S. 350.

In den Nervenknotten werden die Nervenfasern von einander getrennt, in anderer
 Ordnung wieder zusammengefaßt, bequem nach verschiedenen Richtungen vertheilt,
 und dadurch wird bewirkt, daß die zur Erhaltung des Lebens unentbehrlichen Or-
 gane nicht von einem einzelnen Nervenpaare, sondern von vielen zugleich mit Ner-
 ven versehen werden, was zur Folge hat, daß wenn einer der Nerven gelähmt
 wird, nicht die Function eines solchen Organs ganz aufhört S. 350. — Vermuthlich
 findet auch in den Ganglien, vermöge des Zusammenfließens der Nerven
 durch ihr Rückenmark eine Uebertragung von Eindrücken von einem Nerven auf
 die mit ihm zusammenhängenden Nerven statt S. 350. — Nach der Meinung ei-
 niger Anatomen und Physiologen vermehrt sich die Zahl der Nervenfasern in den
 Nervenknotten, oder mit andern Worten, sind sie Mittelpuncte, von welchen Ner-
 venfasern ihren Anfang nehmen S. 351. — Noch andere glauben, daß die Gan-
 lien und vielleicht auch manche Geslechte den Einfluß des Gehirns auf die Theile,
 welche von den Ganglien-Nerven erhalten, beschränken, und daß sie auch ver-
 hindern, daß die Fortpflanzung der Eindrücke von gewissen Stellen des Körpers
 aus zum Siege der Empfindungen durch die aus den Ganglien entspringenden Ner-
 ven geschäde könnte S. 352. — Kein einziger Muskel, der nur vom sympathi-
 schen Nerven Fasern erhält, kann willkürlich bewegt werden S. 354. — Kein
 einziger Muskel, dessen Bewegung ganz willkürlich ist, erhält schmerz Nerven
 vom Nervus sympathicus S. 354. — Einige haben behauptet, daß die Nerven
 des N. sympathicus, gestochen und auf andere Weise gereizt, keinen Schmerz der-

vordrücken, eine Behauptung, die jedoch noch nicht erwiesen ist S. 355. — Andere haben auch geglaubt wahrgenommen zu haben, daß, wenn Nette der Ganglien des N. sympathicus galvanisirt würden, die unwillkürlichen Muskeln, die von daher Fäden erhielten, nicht in Zuckungen geriethen, was doch bei den willkürlichen Muskeln der Fall ist, wenn ihre Nerven galvanisirt werden, eine Behauptung, welche gleichfalls noch nicht bewiesen worden ist S. 356. — Mechanische Reizung des Gehirns und des Rückenmarkes kann, wie es scheint, zwar alle Muskeln in Bewegung setzen, welche vom Gehirne und Rückenmarke Nerven erhalten, nicht aber die unwillkürlich wirkenden Muskeln, die vom N. sympathicus mit Zweigen versehen werden S. 356. — Bei Lähmung und Vernichtung des Gehirns und sogar bei Lähmung und Vernichtung des Rückenmarks dauert die Pulsation des Herzens, das vom N. sympathicus und vom N. vagus seine Nerven erhält bei Säugethieren, Amphibien und Fischen einige Zeit fort S. 357. — Nerven für die Empfindung und Nerven für die Bewegung S. 358.

Ueber das Gehirn und Rückenmark und deren Häute..... 31

Die harte Hirnhaut S. 362. — Die harte Rückenmarkshaut S. 366. — Die Spinwebenhaut S. 367. — Die weiche Hirnhaut S. 369. — Die weiche Rückenmarkshaut S. 370. — Das Ligamentum denticulatum des Rückenmarks S. 371.

Das Rückenmark S. 371. — Gestalt S. 371. — Verschiedene Länge desselben bei Embryonen S. 372. — Die zwei Anschwellungen desselben S. 372. — Ende desselben S. 372. — Die zwei Spalten desselben, in welche die weiche Hirnhaut einbringt S. 373. — Weiße, äußere und graue innere Substanz des Rückenmarks S. 273. — Gestalt der grauen Substanz S. 374. — Graue und weiße Commissur der beiden Seitenhälften S. 374. — Die weiße Substanz wird durch die vorspringenden Theile der grauen Substanz in sechs unter einander continuirlich zusammenhängende Abtheilungen getheilt S. 375. — Entstehung des Rückenmarks S. 376. — Innerer Bau der Markwände des Rückenmarks.

Ursprung der Rückenmarksnerven S. 378. — Ihre Zahl ist 30 bis 31 S. 378. — Vorderer und hintere Rückenmarkswurzeln S. 378. — Spinalnerven an den hinteren Wurzeln S. 378. — Ursprung dieser Wurzeln im Rückenmark S. 379. Das Gehirn S. 379. — Einteilung desselben in das große Gehirn S. 379. — in das kleine Gehirn S. 380. — und in den Verbindungstheil S. 381. — Zusammenhängende Beschreibung des Verbindungstheils S. 382. — Medulla oblongata S. 383. — Pons Varolii S. 383. — Crura cerebri S. 384. — Corpora quadrigemina S. 384. — Tuber cinereum S. 385. — Infundibulum und glandula pituitaria S. 385.

Zusammenhängende Beschreibung des großen Gehirns S. 385. — Die Thalami und die Corpora striata S. 386. — Die dritte Hirnhöhle S. 387. — Die Seitenventrikel S. 387. — Septum pellucidum S. 388. — der Fornix S. 388. — die die Seitenventrikel und den dritten Ventrikel verbindende Monroische Öffnung S. 389. — Commissura anterior S. 389. — Commissura mollis S. 389. — Commissura posterior S. 389. — Pedunculus glandulae pinealis S. 389. — Acervulus S. 389. — Aquaeductus Sylvii S. 389.

Zusammenhängende Beschreibung des kleinen Gehirns S. 390. — Mittelstück desselben oder Wurm S. 390. — Seitenstücke desselben oder Hemisphären S. 390. — Große horizontale Duerfurche S. 390. — Vorderer und hintere Hirnklappe S. 391. — Untere Schenkel des kleinen Gehirns zum verlängerten Marke, mittlere Schenkel desselben zur Brücke, obere Schenkel desselben zu den Vierhügeln S. 391. — Einschnitte im kleinen Gehirn und dadurch entstehende Lappen, Läppchen und Blätterchen S. 392. — Lebensbaum 393.

Begleitung des Gehirns von oben S. 393.

Betrachtung über den Bau der einzelnen Hirnthelle S. 394. — die vorderen Pyramiden des verlängerten Marks S. 394. — die Olivenbündel S. 395. — Corpora restiformia S. 396. — die hinteren Pyramiden S. 396. — Verhalten der grauen Substanz im verlängerten Marke S. 397. — Das verlängerte Mark der Säugethiere S. 398.

Die Brücke S. 398. — Die vierte Hirnhöhle S. 398. — Das kleine Gehirn S. 400. — Entwicklung des kleinen Gehirns beim menschlichen Embryo und bei verschiedenen Thieren S. 401. — Die Hirnschenkel S. 401. — und die Vierhügel

S. 402. — Die Hirnhäute bei Säugethieren S. 404. — Vergleichung des großen Gehirns mit dem kleinen S. 404. — Fasern, welche die Fortsetzung des Hirnstammes und des Rückenmarks sind S. 405. — Die graue Substanz, welche die Windungen überzieht S. 406. — Die Zirkel S. 407. — Corpora caudicantia, Fornix, Taenia, Pes hippocampi S. 408. — Septum pellucidum S. 410. — Quere Hirnhäute, grauer Hügel, Trichter und Hirnanhang S. 410. — Die vordere Commissur S. 411. — Die Plexus choroides S. 411. — Cereum der Gehirnoberfläche S. 412. — Einzelne aus Verdachts Darstellung des Zusammenhangs, in welchem die Theile des Gehirns und des Rückenmarkes unter einander stehen S. 412.

Die Entwicklung des Gehirns S. 415. — Das Gehirn der Säugethiere mit dem des Menschen verglichen S. 425. — Gefäße des Gehirns im Allgemeinen S. 424. — Blutgefäße desselben insbesondere S. 426. — Gefäße des Rückenmarkes S. 426.

Die Gehirnnerven..... 427

Uebersicht der Zahl der Gehirnnerven und über ihre Verschiedenheit im Allgemeinen S. 427. — Drei Classen von Gehirnnerven, Nerven, die nur der Empfindung, andere, die nur der Bewegung, noch andere, die beiden Verrichtungen dienen S. 428. — Gehirnnerven nach der Größe des Querschnitts aufgezählt S. 431. — Uebersicht über den Ort, wo die Gehirnnerven an der Oberfläche des Gehirns zum Vorschein kommen und wo sie zum Schädel hinaustrreten S. 431. — Besondere Beschreibung des Ursprungs und Verlaufs der einzelnen Hirnnerven S. 434. — 1) Nervus olfactorius S. 434. — 2) N. opticus S. 436. — Des chiasma S. 437. — 3) N. oculi motorius S. 442. — 4) N. trochlearis oder patheticus S. 443. — 5) N. trigeminus S. 444. — 6) N. abducens S. 465. — 7) N. facialis S. 465. — 8) N. acusticus S. 470. — 9) N. glossopharyngeus S. 472. — 10) N. vagus S. 476. — 11) N. accessorius S. 481. — 12) N. hypoglossus S. 483.

Die Rückenmarksnerven..... 484

Uebersicht der Zahl der Rückenmarksnerven S. 484. — Die acht Halsnerven S. 485.

Die vier oberen Halsnerven zusammengenommen betrachtet S. 486. — Die von den vorderen Aesten derselben entspringenden Hautnerven S. 486. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den vorderen Aesten der vier oberen Halsnerven Zweige bekommen S. 487. — Die von den hinteren Aesten derselben entspringenden Hautnerven S. 488. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den hinteren Aesten der vier oberen Halsnerven Zweige bekommen S. 488. — Die vier oberen Halsnerven einzeln beschrieben S. 488. — Die vier unteren Halsnerven zusammengenommen betrachtet S. 491. — Vordere Aeste S. 491. — Hinterer Aest S. 491. — Nervus phrenicus, der Zwerchfellnerv S. 492. — N. dorsalis scapulae S. 493. — N. thoracicus posterior S. 493. — Plexus brachialis S. 494. — Nervi thoracici anteriores S. 494. — N. suprascapularis S. 495. — Nervi subscapulares S. 495. — Nervenstämme des Arms S. 495. — N. cutaneus internus minor S. 496. — N. cutaneus internus major oder cutaneus medius S. 496. — N. musculo-cutaneus S. 496. — N. axillaris S. 497. — N. medianus S. 497. — N. radialis S. 498. — N. ulnaris S. 500. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den vier unteren Halsnerven Zweige erhalten S. 502. — Uebersicht über die Schulter- und Armmuskeln, welche von dem plexus brachialis Nerven bekommen S. 502. — Uebersicht über die Muskeln des Oberarms, Unterarms und der Hand, welche von den Stämmen der Armnerven Zweige erhalten S. 502. — Uebersicht über die Hautnerven am Halse S. 502. — Uebersicht über die Hautnerven des Arms S. 503.

Die Brust- oder Rückenerven S. 503. — Vordere Aeste der Brustnerven, oder die Nervi intercostales S. 504. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den vorderen Aesten der Brustnerven Zweige erhalten S. 506. — Hinterer Aest der Brustnerven S. 506. — Besondere Beschreibung einzelner Brustnerven S. 507. — Uebersicht der von den Brustnerven entspringenden Hautzweige S. 508. — Uebersicht über die Muskeln, welche von den Brustnerven Zweige erhalten S. 509.

Die 6 Lendennerven S. 509. — Die vorderen Nette S. 509. — Die hinteren Nette S. 510. — Einige kleinere Zweige der vorderen Nette der Lendennerven S. 510. — Vom ersten Lendennerven S. 510. — N. ileo-hypogastricus S. 510. — N. ileo-inguinalis S. 511. — Vom ersten und zweiten Lendennerven: N. spermaticus externus S. 511. — N. cutaneus externus S. 511. — Uebersicht über die Muskeln am Bauche, welche von dem vorderen Nette der Lendennerven Zweige erhalten S. 512.	
Die fünf bis sechs Kreuznerven S. 512. — Die vorderen Nette S. 512. — N. pudendus S. 513. — Die hinteren Nette S. 514.	
Nerven des Schenkels S. 514. — N. cruralis S. 514. — N. obturatorius S. 516. — Kleinere Nerven des plexus ischiadicus S. 516. — N. glutaeus superior S. 516. — Der große hintere Hautnerv* S. 517. — N. ischiadicus S. 517. — N. peronaeus S. 518. — Der Schienbeinnerv S. 519. — Uebersicht über die Hautnerven des Schenkels S. 521.	
Der sympathische Nerv	521
Vom sympathischen Nerven und seinen Knoten im Allgemeinen S. 523. — Der am Kopfe gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 527. — Der am Halse gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 531. — Der in der Brusthöhle gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 535. — Der an den Lendenwirbeln gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 537. — Der am Kreuzbein gelegene Theil des sympathischen Nerven S. 537. — Uebersicht des sympathischen Nerven in der Brust und Unterleibshöhle S. 539.	

Viertes Buch.

Von dem

Gefäßsystem.



Literatur der Lehre von dem Gefäßsysteme.

Die Schriften, welche die Literatur über das Gefäßsystem ausmachen, sollen nach folgendem Plane aufgeführt werden:

- I. Schriften über das ganze Gefäßsystem. S. 3.
- II. Schriften über diejenige Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf geschieht, oder über die Blutgefäße. S. 3.
 1. Mechanische und physiologische Untersuchungen über den Kreislauf. S. 3.
 2. Ueber den Zusammenhang der Arterien und Venen unter einander durch die Haargefäße, und über den Zusammenhang derselben mit den Höhlen und Oberflächen des Körpers durch die Poren. S. 4.
 3. Ueber den Herzbeutel, das Herz und die Entwicklung desselben. S. 5.
 4. Ueber die Arterien. S. 10.
 - a. Ueber allgemeinere Verhältnisse d. Arterien, ihre Häute u. deren Organe. S. 10.
 - b. Ueber die Abweichungen im Verlaufe der Arterien. S. 11.
 - c. Ueber die Lebenseigenschaften der Arterien. S. 11.
 - d. Beschreibungen des Arteriensystems. S. 12.
 - e. Abbildungen des Arterienystems. S. 12.
 - f. Einige Schriften über die vergleichende Anatomie der Arterien. S. 12.
 5. Ueber die Venen. S. 13.
- III. Schriften über die Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf nicht geschieht; oder über die Lymphgefäße. S. 14.
 1. Ueber das Lymphgefäßsystem oder über ganze Abtheilungen desselben. S. 14.
 2. Einige besondere Schriften über einzelne, die Lehre von den Lymphgefäßen betreffende Gegenstände. S. 19.
 - a. Ueber die Muskelfasern und Klappen der Lymphgefäße. S. 19.
 - b. Ueber die Communication derselben mit den Venen. S. 19.
 - c. Ueber die Lymphdrüsen. S. 20.
 - d. Ueber den Ductus thoracicus. S. 20.
 - e. Ueber die Lymphgefäße einzelner Organe. S. 21.
 - f. Ueber die vergleichende Anatomie der Lymphgefäße. S. 21.

Schriften über alle Classen von Athern.

Hierher gehören diejenigen Abtheilungen der anatomischen Handbücher und Kupferwerke (S. Th. I. S. 14 bis 31.), die die Gefäßlehre zugleich mit allen andern Theilen der Anatomie abhandeln. Mehrere von ihnen sind auch mit einem besonderen Titel versehen, den aber speciell anzuführen nicht nöthig scheint. Wir heben hier nur die besseren der Handbücher aus; wie: *Schaarschmidt* (S. No. 269 anqiologische Tabellen); *Schmerring* (S. No. 296. Th. IV. der deutsch. und Th. V. der lat. Ausg.); *Bichat* (No. 303.); *Mérel* (No. 317. Th. III.) Von Kupferwerken gehören hierher: *Foder* (No. 80.); *Mascagni* (No. 86.); *Antonmarchi* (No. 86 (3.)); *J. Cloquet* (No. 89 und 90.)

Schriften über die Blutgefäße oder Gefäße des Kreislaufes.

1. Mechanische und physiologische Untersuchungen über den Kreislauf.

1180. * *Guilielm. Harvaei* exercitationes anatomicae de motu cordis et sanguinis circulatione in animalibus. Francof. 1628. 4. Roterodam. 1671. 12 et alibi.

1181. *C. G. Rose, Diss. de motu sanguinis naturali et praeternatu Helmstad. 1668. 4.

1182. *Jean Claude Adrien Helvetius, observation sur l'inégalité de ca cité qui se trouve entre les organes destinés à la circulation du sang dans le corps de l'homme; et sur les changements qui arrivent au sang en passant le poumon. Mém. de Paris 1718. 4. hist. p. 17. Mém. p. 222. éd. in 8. l. p. mém. p. 281.

1183. *Henr. Alb. Nicolai, Diss. de directione vasorum pro modifica sanguinis circulo. Argentor. 1725. 4. Recus. in Halleri coll. diss. a Vol. II. p. 481.

1184. *Joh. Alph. Borelli, de motu animalium (siehe Th. II. S. 320. l. 984 dieser Sitter.) à la Haye 1743. 4. Part. II. prop. 70 — 73.

*1185. *Jae. Keill, tentamina medico-physica ad quasdam quaestioes quae oeconomiam animaleam spectant, accommodata. Quibus acced. medic statica britannica. Lond. 1718. 8.

1186. Jurin, De potentia cordis. Philosophical Transactions 1718, n. 358. 1719 n. 362.

1187. C. F. Maertens, Diss. de circulatione sanguinis. Helmst. 1739. 4.

1188. *Jo. Gottl. Krüger, resp. Sam. Hambacher, Diss. de theoriae p sicae tubulorum capillarum ad corpus humanum applicatione. Halae 1742. 4.

1189. Passavant (Bernoulli), de vi cordis. Bâles 1748.

1190. *Steph. Hales, statical essays etc. Vol. I. II. Lond. 1731 — 33. Ueberfest ins Franz. und mit vielen Anmerk. bereichert von Sauvages, u dem Titel: Haemastatique ou la statique des animaux, expériences hydrauliques faites sur des animaux vivans, avec un recueil de quelques expériences les pierres que l'on trouve dans les reins et dans la vessie, et des recherches sur la nature de ces concrétions irrégulières, par Etienne Hales. Ouvr très-utile aux médecins. Traduit de l'anglois et augmenté de plusieurs remarques et de deux dissertations de médecine sur la théorie de l'inflammation sur la cause de la fièvre. A Genev. 1744. 4. Deutsch. Halle 1748. 4.

1191. *Alb. Haller, de partium corporis humani praecipuarum fabrica functionibus. Tom. I. Lib. II.

1192. A. Braun, Diss. sist. meletemata quaedam circa doctrinam de sanguinis. Jenae 1792. 4.

1193. *G. Prochaska, controversae physiologicae, quae vires cordis et tum sanguinis per vasa animalium concernunt. In Opp. min. anat. arg. Vienn. 1800. p. 1 sq.

1194. Araldi, della forza e dell' influo del cuore sul circolo del sangue. In mem. della società italiana in Modena. 1804. Vol. XI. p. 342. Vol. 1810. p. 166.

1195. Thom. Young, The croonian lecture on the function of the heart and arteries. Philos. transact. 1809. Prt. I.

1196. *J. Heinr. Oesterreicher, Versuch einer Darstellung der Eigenschaften vom Kreislaufe des Blutes. Nürnberg. 1826. 4.

1197. *Grg. Wedemeyer, Untersuchungen über den Kreislauf des Blutes und insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und Capillaren; mit erklärenden Hindeutungen auf pathologische Erscheinungen. Halle 1828. 8.

1198. *J. L. M. Poiseuille, recherches sur la force du coeur aorte. In Breschet répert. génér. d'anat. et de physiol. pathol. Tom. VI. à Paris 1828. p. 60 — 87.

2. Ueber den Zusammenhang der Arterien und Venen unter einander durch die Haargefäße, und über den Zusammenhang derselben mit den Höhlen und Oberflächen des Körpers durch die Poren.

1199. Raym. Vieussens, novum vasorum corporis humani systema. Amd. 1705. 8.

1200. J. F. Fasel, de arteriis non sanguiferis. Jenae 1763. 4.

Literatur über den Zusammenhang der Arterien u. Venen. 5

1201. * *Abrah. Kaau*, perspiratio dicta Hippocrati (f. d. Vit. s. Haut, Th. II. S. 511. No. 1069.)

Hierher gehört auch *Fanke's*, unten bei den Venen, unter No. 1392. angeführte Schrift.

1202. * *John Evelyn*, an account of divers schemes of arteries and veins, dissected from adult human bodies and given to the repository of the Roy. Soc. to which are subjoined a description of the extremities of those vessels, and the manner the blood is seen by the microscope, to pass from the arteries to the veins in quadrupeds when living; with some chyrurgical observations and figures after the life, by Will. Cowper. Philos. transact. 1702. p. 1177.

1203. *Ferrein*, sur de nouvelles artères et veines lymphatiques, in Mém. de l'acad. des sc. de Paris 1741. 4. p. 371.

1204. * *Jan. Bleuland*, experimentum anatomicum, quo arteriolarum lymphaticarum existentia probabiliter adstruitur et icone illustratur. Lgd. Bat. 1784. 4.

1205. * *H. van den Bosch*, theoretische und praktische Bemerkungen über das Ausbreitungsvermögen der Haargefäße. Münster 1786. 4.

1206. * *Jo. Gottl. Haase*, Progr. de sine arteriarum, earumque cum venis anastomosi. Lips. 1792. 4.

1207. * *H. J. Hecker*, über die Verrichtungen der kleinsten Schlagadern, und einiger aus einem Gewebe der feinsten Gefäße bestehenden Eingeweide, der Schilddrüse, der Brustdrüse, der Milz, der Nebennieren und der Nachgeburt. Erst 1790. 8.

1208. * *B. N. G. Schreger de Cruikshankii decreto*, non esse pervias in vivi corporis partes nisi vasorum osculis. In ejusd. fragment. anat. Soc. I. No. 6.

1209. * *Org. Prochaska*, Bemerk. über den Organismus des menschlichen Körpers und die denselben betreffenden arteriösen und venösen Haargefäße, nebst darauf gegründeten Theorie der Ernährung. Wien 1810. 8.

1210. * *Idem*, de vasis sanguineis capillaribus, illorum copia et proportione substantiam solidam non vasculosam etc. In ej. disquis. anat. phys. organismi corp. hum. Vienn. 1812. 4. cap. 9.

1211. * *K. Burdach*, über die Haargefäße, mit Hinsicht auf die Lieberkühn'schen Präparate in St. Petersburg. In der russ. Samml. für Naturw. und Heilk. Herausg. von *Ehrichson*, *Rehmann* und *Burdach*. Bd. 2. 1817. 8. Stk. 3.

1212. * *S. Th. Sämmering*, über das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Uterus. In Denkschriften der Münchner Akad. d. Wiss. 1818 — 1820. S. 3. ff.

1213. *Broussais*, mémoire sur la circulation capillaire, tendant à faire mieux connoître les fonctions du foie, de la rate et des glandes lymphatiques. Mém. de la soc. méd. d'émul. de Par. Vol. VII. p. 1.

— faits relatifs à la circulation capillaire. In Annal. de la soc. de méd. de Montpellier. Vol. XX. p. 195.

1214. *Gardien*, rapport sur un mémoire manuscrit du Dr. *Broussais*, relatif à la circulation capillaire, tendant à déterminer d'une manière plus précise les fonctions du foie, de la rate et des glandes lymphatiques. In *Tartra*, bullet. des sc. méd. Vol. IV. 31.

Hierher gehört auch *P. Mascagni* in seinem Prodomo. Siehe No. 86. Th. I. S. 51. und in seinen auf die Lehre von den Lymphgefäßen Bezug habenden Schriften. (Siehe die Literatur der Lymphgefäße.)

3. Ueber den Herzbeutel, das Herz und die Entwicklung desselben.

1215. *Jul. Jasinoli*, de aqua pericardii et cordis pinguedine quaestiones anatomicae. Neapol. 1573. 8. Hanau 1654. Frcf. 1668. 4.

1216. *Marc. Aurel. Severinus*, de aqua pericardii, cordis adipe, poris hydrochis. Hanau 1654. 4.

1217. * *Joh. Maur. Hoffmann*, resp. *Grg. Frid. Francus de Franckenau*, Diss. de pericardio, atque experimentis et observationibus novissimis circa id habitus. Altorf 1690. 4.

1218. * *Gunth. Christoph. Schelhammer*, resp. *Joh. Christoph. Wentzel*, de aqua pericardii. Jenae 1694. 4.

1219. * *Alexis Littere*, observation sur l'eau, qui est dans le péricarde et

dans le ventricule du cerveau. Mém. de Paris 1711. 4. hist. p. 29. éd. in 8. hist. p. 37.

1220. * *Gottwald Schuster*, (vide etiam Acta Acad. Nat. Curiosor. Vol. VI. p. 180.) Hydrocardiologia, sive Diss. med. theolog. legalis de liquore pericardii, qua binæ quaestiones, altera: ob die Feuchtigkeit, so zwischen dem Herz und dessen Behältniß befindlich, ein Kennzeichen geschehener Erstickung abgiebt? altera: ob das Wasser, so aus der eröffneten Seiten des Herrn Jesu am Creuze geflossen, aqua pericardii gewesen? Chemnicii 1740. 4.

1221. *Jos. Buteus*, observatio, unde pericardii lymphä proveniat? Commentar. Bononiense. Tom. II. P. 1. C. p. 151.

1222. *Andr. Bernh. Heimann*, Diss. de pericardio sano et morbo. Lgd. Bat. 1729. 8. ibid 1753. 4.

1223. *Jos. Lanzoni*, de pericardio. Ferrariae (?) recus. in Bibliotheca anat. Mangeti, et in ej. opp. omn. Lausannae 1738. 4.

1224. * *Chr. Gottl. Ludwig*, resp. *J. G. Friderici*, an liquor pericardii per auriculas cordis transsudet? Lipsiae 1740. 4.

1225. * *Henr. Kyper*, Diss. de humore pericardii. Lgd. Bat. 1741. 4.

1226. *G. Eisenmann*, resp. *J. J. Roth*, Diss. de liquore pericardii. Argentor. 1748. 4.

1227. * *Chrst. de Jonge*, Diss. phys. med. de pericardio et liquore eo contento. Traj. ad Rhen. 1754. 4.

1228. *J. Klefeker*, Diss. de halitu pericardii. Lgd. Bat. 1758. 4.

1229. * *Hippocrates*, περί καρδίας (de corde) Exstat in ed. Lindeniana. Tom. I. p. 289. — in ed. Frobeniana gr. p. 54. — in ed. Mercuriali, sect. IV. p. 48. — in ed. Foesii, sect. III. p. 50. — in ed. Charter. Vol. IV. p. 269. — in ed. Kühnii. Lips. 1825. Vol. I. p. 485. cum commentariis Jacobi Horstii. Frcf. ad Viadr. 1563. 4.

1230. *Avicennae*, liber de corde. Venet. 1495. Fol. 1507. 8. Lgd. 1557. 8. et alibi, et in operibus Avicennae.

1231. *Jac. Milich*, oratio de cordis partibus et motibus. Viteberg 1551. 4.

1232. *Nic. Taurelli* et *Grg. Sytschii*, de cordis natura et viribus theses. Alorf 1585. 4.

1233. *Eustach. Rudii* de naturali et morbosa cordis constitutione. Venet. 1600. 4.

1234. *Jo. Nic. Stupanus*, resp. *E. Vestifio*, de corde et organis ei famulantibus.

1235. *Jac. Cocus*, de corde, arteriis et pulmonibus. Viteberg. 1604. 4.

1236. *Valentin Hartung*, resp. *D. Winkler*, Diss. de corde. Lipsiae 1619. 4.

1237. *Theod. Illing*, resp. *J. H. Grosch*, καρδιολογία h. e. de cordis natura et essentia. Lipsiae 1626. 4.

1238. *Petri Lauremberg*, exercitatio de pericardio, de corde, de pulmonibus, de aspera arteria. Rostoch. 1635. 4. recus. in ejus collegio anatom. Rostoch. 1636. 4. et in ej. anat. corp. hum. Francof. 1665. 12.

1239. *Conr. Vict. Schneider*, de corde disputatio. Viteberg. 1642. 12.

1240. *Petr. Oelhafen*, resp. *B. Blank*, Diss. de corde. Gedani 1643. 4.

1241. * *Jac. Back*, de corde dissertatio, in qua agitur de nullitate spiritaum, de haematosi, de viventium calore. Roterod. (1648. 12. 1659. 12. 1660. 12.) 1671. 12. (Lgd. Bat. 1664. 12.) English. London 1653. 8.

1242. *Thom. Bartholini*, Diss. de corde apud veteres. Hafniae 1648.

1243. * *Eccard Lechner*, resp. *Jo. Jac. Wittig*, diasepsis anatomico-medica de cordis constitutione et usu. Erfurti 1657. 4.

1244. *Wern. Rolfsnk*, resp. *J. Rhetio*, de corde ex veterum et recentiorum propriisque observationibus concinnata et ad circulationem sanguinis accommodata dissertatio. Jenae 1654. 4.

1245. *Chr. Loesnitzer*, Diss. de corde humano. Lipsiae 1654. 4.

Sieher gehört auch * *Nicolaus Stenonis* de musculis et glandulis etc. p. 22. Siehe Zh. II. S. 317. No. 914.

1246. *Mich. Sennert*, resp. *G. A. Merclin*, Diss. de corde. Viteberg. 1664. 4.

1247. *J. Chr. Hippius*, resp. *C. Engelhaupt*, Diss. de corde. Lipsiae 1667. 4.

1. *Grg. Wosegin*, resp. *Nitzschke*, Diss. de cordis structura ejusdem-
2. Regionis. 1667. 4.
1. *Richardi Lower*, tractatus de corde. Item de motu, colore et
ione sanguinis: ut et de venae sectione. His accedit Diss. de origine
; in qua ostenditur, illum non provenire a cerebro. (London 1669. 8.
Amstel. et Lgd. 1708. 8. 1722. 8. 1728. 8.) Editio septima, prioribus
or et indice auctior, cum figuris aeneis. Lgd. Bat. 1740. 8. 1749. 8.
1. (f): Traité du coeur, du mouvement et de la couleur du sang et du
du chyle dans le sang. à Paris 1679. 8.
1. *J. Nicol. Pechlin*, resp. *Ad. Conr. Langelott*, Diss. de fabrica et
ndis. Kiloni 1676. 4. recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p.
358.
1. *Casp. Bartholin* (filius), resp. *G. Serup*, Diss. de cordis structura
Hafniae 1678. 4.
1. *Petr. Hoffvenii*, (s. *Houfwenii*) resp. *D. Lindenio*, Diss. de
jusque structura et usu. Upsal. 1681. 8. c. fig.
1. *C. Morton*, Diss. de corde. Lgd. Bat. 1683. 12.
1. *Jo. Godofr. de Berger*, Progr. de corde. Viteberg. 1688. 4.
1. *Frid. Schrader*, resp. *R. Hake*, de corde et pulmonibus, ad *Vestim-*
tagma anat. c. 10. Helmstad. 1688. 4.
1. *Grg. Alb. Hamberger*, Diss. de Deo ex conformatione cordis de-
cto. Jenae 1692. 4. (1708. 4.)
1. *Raym. Vieussens*, nouvelles découvertes sur le coeur dans une
M. Budin à Paris 1706. 12.
1. *Jacq. Benig. Winslow*, observations sur les fibres du coeur et
valvules, avec la manière de les préparer pour les démontrer. Mém.
s 1711. hist. p. 21. mém. p. 151. éd. in 8. hist. p. 26. mém. p. 196.
1. *Alex. Stuart*, on the muscular structure of the heart. Philos.
741. p. 675.
1. *Jos. Lieutaud*, observations anatomiques sur le coeur. Mém. de
758. hist. p. 26. mém. p. 244. 308. éd. in 8. hist. p. 38. mém. p. 362.
lém. 3., contenant la description particulière des oreillettes, du trou
t du canal artériel. Ibid 1754. hist. p. 55. mém. p. 369. éd. in 8. hist.
mém. p. 560.
1. *Ejusd.* traité nouveau de la structure et des causes du mouvement
ur. à Toulouse 1715. 4.
1. *Martin Martínez*, observatio rara de corde. Madrid 1723. 4. in
coll. Diss. anat. Vol. II. p. 973.
1. *Aug. Fr. Walther*, Pr. de structura cordis auricularum. Lipsiae
et in *Halleri* coll. diss. an. II. p. 163.
1. *Petri Gerike*, Pr. de cordis et vasorum proxime cum eo connexo-
vero in homine, hujusque rationibus. Helmstad. 1741. 4.
1. *Grg. Lud. de Monge*, de corde in genere. Basil. 1745. 4.
1. *Grg. Fr. Sigwart*, resp. *Joh. Henr. Sulzer*, antagonismus fibrar-
dis humani musculosarum controversiosus. Tubingae 1755. 4.
1. *Jo. Fr. Fasellii* Pr. de vero adipis ad basin cordis circumfusi usu.
763. 4.
1. *Joh. Nicol. Weise*, resp. *Gül. Joh. Grg. Wilt. Gmelin*, Diss.
ro cordis ventriculo post mortem ampliore. Altorf. 1767. 4.
1. *M. de Senac*, traité de la structure du coeur, de son action et de
adies. à Paris 1749. 4. 2 voll. Seconde édit. avec fig. Tom. I. II. à
774. 4.
1. *Jo. Gül. Petzold*, de corde et ejus motu epistola. Lipsiae 1750. 4.
1. *Chr. Lueber*, Diss. de cordis fabrica et functione, atque de san-
per cor et vasa sanguinea circulatione. Erford. 1767. 4.
2. *Arnold. Anthon. Stook*, Diss. de fabrica et motu, causisque mo-
cordis. Lgd. Bat. 1775. 4.
3. *Jo. Lud. Fr. Dietz*, Pr. observatio anatomica de corde. in ac-
2. 1781. 4.
1. *V. Bocalosi*, del cuore e delle azioni, che dipendono de quest or-
leid. 1789. 8.
5. *Gaspar. Frid. Wolff*, de ordine fibrarum muscularium cordis.

Diss. 1. de regionibus et partibus quibusdam in corde, tunica exuto, notabilibus. Acta acad. sc. imp. Petropol. ann. 1780. P. II. p. 197. Diss. 2. de textu cartilagineo cordis; sive de filis cartilagineo-osseis eorumque in basi cordis distributione. Ibid. ann. 1781. P. I. p. 211. Diss. 3. de fibris externis ventriculi dextri. Ibid. 1781. P. 2. p. 221. Diss. 4. de fibris externis ventriculi sinistri. Ibid. 1782. P. 2. p. 214. Diss. 5. de actione fibrarum externarum ventriculi sinistri. Nova acta acad. Petrop. Tom. I. p. 231. Diss. 6. quae repetitas et novas observationes de fibris ventriculorum externis continet. P. 1. ventriculus dexter. Ibid. Vol. II. p. 181. P. 2. ventriculus sinister. Ibid. Vol. III. p. 185. Diss. 7. de stratis fibrarum in universum. Ibid. Vol. III. p. 227. Diss. 8. P. 1. 2. de fibris mediis ventriculi dextri. Ibid. Vol. IV. p. 217 und 242. Diss. 9. de actione fibrarum mediarum ventriculi dextri. Vol. V. p. 223. Diss. 10. de strato secundo fibrarum ventriculi sinistri P. I. Ibid. Vol. VI. p. 217. P. II. Vol. VIII. p. 347. P. III. Vol. IX. p. 271. P. IV. Ibid. Vol. X. 175. ad ann. 1792.

1276. *J. Bern. Jac. Behrends, Diss. qua demonstratur, cor nervis careere. Moguntiae 1792. 4.

1277. *Adam. Theoph. Nicol. Zerener, an cor nervis careat et iis carere possit. Erford. 1794. 4.

1278. *Eoerard Home, über die Muskelbewegung, aus den Philosophical Transactions of the royal Society of London for the Year 1795. P. I. p. 202. sq. Uebersetzt in Reils Archiv für die Physiologie. B. II. Halle 1797, wo S. 102 bis 106 vom Bau des Herzens gehandelt wird.

1279. Faust, Recherches sur la structure et les mouvemens du coeur. Liège 1821.

1280. *P. N. Gerdy, Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de physiologie, de pathologie. 1^o. sur la langue, le coeur et l'anatomie des régions etc. avec 13 figures. Thèse soutenu à la faculté de Méd. de Paris. à Paris 1823. 4. p. 24. Siehe auch Journ. compl. du dict. d. sc. méd. Vol. X. p. 97.

Entwicklung des Herzens.

1281. Just. Gottfr. Güns, Bemerkungen an Herz und Leber bei einer achtmonatlichen Frucht. Abhandlung. der schwedischen Academie der Wissenschaft. 1751. S. 35.

1282. *Danz, Grundriß der Bergliederungskunde des ungeborenen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft. Gießen 1793. Bd. 2. S. 185—188.

1283. *Joh. Fr. Meckel, Beiträge zur Bildungsgeschichte des Herzens und der Lungen der Säugethiere. In Meckels Archiv., Bd. II. S. 402. übersetzt: Mémoire sur l'histoire du développement du coeur et des poumons dans les mammifères. In Journal compl. du Dict. d. sc. méd. I. 1818. p. 259.

1284. *L. Rolando, sur la formation du coeur et des vaisseaux artériels, veineux et capillaires. In Journal compl. du Dict. des sc. méd. XV. 1823. p. 323. et XVI. p. 34.

1285. *Prévost et Dumas, observations sur le développement du coeur dans le foetus. In Bullet. des sc. de la soc. philomat. Oct. 1824. p. 145. et Nov. p. 161.

1286. H. Fr. Kilian, über den Kreislauf des Blutes im Kinde, welches noch nicht geathmet hat. Mit 10 Steintaf. Karlsruhe 1827. 4.

Wichtig sind für diese Entwicklungsgeschichte besonders auch die Schriften über die Entwicklung des Nühnchens im Eie, des Malpighi, Gasp. Fr. Wolff, Vander, Döllinger und d'Altou, und über die der Vögel und der Säugethiere des von Bar.

Valvula Eustachii, foramen ovale, ductus arteriosus Botalli, ductus venosus.

1287. *Petri Gassendi, de septo cordis pervio libellus. (Lgd. Bat. 1639. 12.) cum Pinaeo de virginitatis notis et aliis. (Lgd. Bat. 1641. 12.) Francof. et Lips. 1689. 12. p. 304 sq.

Die beiden hierher gehörigen Schriften von Caecil. Folius siehe bei der Lit. der Lymphgefäße unter No. 1401.

1288. De nupero Botallianorum invento, quo viam sanguinis a dextro in

sinistrum cordis ventriculum adserunt, *Claudii Galeni* sententia abhinc 1500 annis monumentis literarum publicata. Patav. 1640. 4.

1289. *Galeni et Botalli*, placida de via sanguinis in corde. Venet. 1640. 4.

1290. *Guichard Joseph Duverney*, observation sur la circulation du sang dans le foetus. *Mém. de Paris* 1699. hist. p. 25. 34. mém. p. 227. éd. in 8. hist. p. 35. 39. mém. p. 283.

1291. *Jean Mery*, de la manière dont la circulation du sang se fait dans le foetus. *Mém. de Paris*. Vol. II. p. 175. Vol. X. p. 65. ann. 1703. hist. p. 32. éd. in 8. hist. p. 39.

1292. — *Idem*. Réponse à *G. J. Duverney*, critique du nouveau système de la circulation du sang par le trou ovale du coeur de foetus humain. *Mém. de Paris* 1703. mém. p. 403. éd. in 8. mém. p. 490.

1293. — *Idem*. Observation sur l'usage du trou ovale et du canal de communication dans le foetus. *Mém. de Paris*. Vol. II. p. 238.

1294. — *Idem*. Observation sur le canal de communication, qui se trouve dans le foie du foetus, entre la veine-porte et la veine-cave. *Mém. de Paris*. Vol. II. p. 299.

1295. * *Jean Mery*, Nouveau système de la circulation du sang par le trou ovale dans le fœtus humain, avec les réponses aux objections faites contre cette hypothèse. Paris 1700. 12.

1296. *Paul Bussière*, lettre pour servir de réponse à *M. Mery*. Paris 1698. 12.

1297. — Lettre ——— sur le trou ovale dans le foetus. Paris 1703. 12.

1298. *Alexis Litre*, observations sur la circulation du sang dans le foetus, observations qui appuient le système de *J. Mery*. *Mém. de Paris* 1701. hist. p. 36. éd. in 8. hist. p. 45.

1299. *Pierre Simon Rouhault*, observation sur la force, qui pousse le sang dans le foetus. *Mém. de Paris* 1718. hist. p. 11. éd. in 8. hist. p. 13.

1300. *Jacques Benigne Winslow*, description d'une valvule singulière de la veine-cave inférieure, à l'occasion de laquelle on a proposé un sentiment nouveau sur la fameuse question du trou ovale, qui semble également appuyé par les preuves favorables aux deux opinions contraires. *Mém. de Paris* 1717. hist. p. 17. mém. p. 211. éd. in 8. hist. p. 20. mém. p. 272.

1301. — *Idem*: Eclaircissement sur le mémoire a. 1717. qui traite de la circulation du sang dans le foetus; et quelques remarques sur un système particulier de *Vieussens*, et sur un écrit de *Rouhault* sur cette même matière. *Mém. de Paris* 1725. mém. p. 23. 260. éd. in 8. mém. p. 34. 371.

1302. *Jo. Henr. Croeser*, Diss. qua sanguinis per foramen ovale tractatus indicatur, et membranae ejus foraminis ante partum nullum esse usum, post natiuitatem vero claudere id foramen. Groening. 1735. 4.

1303. * *Nicolas Lemery*, sur le trou ovale. *Mém. de Paris* 1739. hist. p. 4. mém. p. 31. 97. éd. in 8. hist. p. 4. mém. p. 39. 128.

1304. *François Jos. Hunauld*, observation anatomique sur la valvule du trou ovale, qui, dans le foetus, laisse passer le sang d'une oreillette du coeur dans l'autre. *Mém. de Paris* 1735. hist. p. 19. 1740. p. 51. éd. in 8. hist. p. 26. et 71.

1305. * *Jo. Frid. Crell*, resp. *Chr. Gothofr. Leissnerus*, de valvula venae caeae Eustachiana. Vitemberg. 1737. 4.

1306. * *Jo. Gothofr. Brendelius*, Pr. de valvula Eustachiana inter venam cavam inferiorem dextramque cordis auriculam consita schediasmation, quo novam illius, reticulo suo, cornuque altero duplici, instructae, tabulam proponit. Vitemberg. 1738. 4. recus. in ejusd. opusc. math. et med. argumenti cura *Wrisberg*, Gotting. 1769. 4. I. p. 71. et in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 171.

1307. *Leander Peaget* et *Julian. Busson*, ergo sanguis in foetu a dextra in sinistram cordis auriculam per foramen ovale transit? non secus. Paris. 1741. 4.

1308. *Pietro Tabarrani*, Lettera, in cui vengono esaminate due figure di quelle lasciateci, delineate dal Cel. *Eustachio*, cioè a dire la III. et la VI. della tavola XVI. nella prima delle quali si crede che l'*Eustachio* in cambio della sua cotanto celebrata valvula abbia rappresentata quella del forame ovale, ragionandosi con tale occasione non solo di esse valvule, ma eziandio del fo-

rame ovale medesimo, del suo usu stato cotanto controverso nel feto, e del canale pure arterioso comunemente chiamato del Botallo, ed eziandio di quello, che appellano venoso. Atti di Siena. Tom. III. Append. p. 41.

1309. *Laurentius Heister*, venae umbilicalis in foetu vera insertio, et canalis venosi accuratior descriptio, errorumque, quos autores circa haec commiserunt, emendatio. Ephemer. nat. cur. Cent. V. et VI. p. 236.

1310. *Jo. Jac. Huber*, de foramine ovali. Cassel 1745. 4.

1311. *Alb. Haller*, Pr. de valvula Eustachii. Gotting. 1737. 4. Lips. 1738. 4. 1749. 4. in opp. min. I. p. 24. et coll. Diss. anat. II. p. 189.

1312. — *Idem*, de foramine ovali et valvula Eustachii. Gott. 1748. Fol. et in Fasc. IV. icon. anat. et in opp. min. Vol. I. p. 33.

1313. *Exupère Jos. Bertin*, sur le cours du sang dans le foie du foetus humain. Mém. de Paris 1753. 4. hist. p. 117. mém. p. 323. 1765. hist. p. 28. mém. p. 35. 106.

1314. *Jo. Mich. Dioboldt*, Diss. de foramine ovali. Argentor. 1771. 4.

1315. **Jo. Fr. Lobstein*, resp. *Mich. Dioboldt*, Diss. de valvula Eustachii. Argentor. 1771. 4.

1316. *Gasp. Frid. Wolff*, de foramine ovali ejusque usu in dirigendo motu sanguinis, observationes novae. Novi commentar. Acad. Petropol. Vol. XX. 1775. hist. p. 49. Mem. p. 357.

1317. **Franc. Xaver. de Buglioni*, (Henrici Palmatii Leveling) observationes anatomicae rariores de valvula Eustachii et foramine ovali. Anglipoli 1780. 4. (et in *Levelingii* obs. anat. rar. Anglipoli 1787.)

1318. *Raphael Bienvenu Sabatier*, mémoire sur les organes de la circulation du sang du foetus. Mém. de Paris 1774. hist. p. 7. mém. p. 198. — Mémoire sur les changemens qui arrivent aux organes de la circulation du foetus, lorsqu'il a commencé à respirer. Mém. de l'instit. de Paris. Sc. math. et phys. Tom. 3. p. 337.

1319. **Guil. Ed. Biel*, de foraminis ovalis et ductus arteriosi mutationibus. Berolini 1827. 4. Cum II. tabb. aen.

4. Schriften über die Arterien.

a. Ueber allgemeinere Verhältnisse der Arterien, ihre Häute und deren Organe.

1320. **Joh. Ern. Hebenstreit*, Progr. de arteriarum corporis humani conformationibus. Lips. 1739. 4. recus. in Halleri collect. Diss. Vol. II. p. 35.

1321. **Idem*. Progr. de vaginis vasorum. Lipsiae 1740. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 27.

1322. **Idem*. Progr. de flexu arteriarum. Lipsiae 1741. 4. recus. in *Halleri* coll. Diss. Vol. I. p. 555.

1323. *J. C. Hörmann*, de arteriarum flexuoso progressu. Lips. 1763. 4.

1324. **Jo. Traug. Adolph*, Diss. arteriologiae recte concinnandae leges; cum specimine carotidis externae. Helmstad. 1764. 4.

1325. **J. C. Pohl*, Progr. de arteriis. Lipsiae 1773. 4.

1326. **Joh. Fr. Meckel*, über den Verlauf der Arterien und Venen. In *bes. Arch.* Bd. 1. S. 285. — Ueber die Verschiedenheit der rechten und linken Körperhälfte in Hinsicht auf die verhältnismäßige Größe der Arterien und Venen. *Archiv.*, Bd. 1. S. 450.

1327. **Charl. Henr. Ehrmann*, structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions et leurs altérations organiques. Strasbourg 1822. 4.

1328. **D. Belmas*, derselbe Titel *ibid.* eod. 4.

1329. *W. Vrolik*, Diss. anat. path. de mutato vasorum sanguiferorum decursu in scoliosi et cyphosi. Amstel. 1823. 4. c. tabb. aen. II.

1330. **Chr. Gut. Ludwig*, resp. *Grg. Chr. Hahn*, Diss. de tunicis arteriarum. Lips. 1739. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. Vol. II. p. 1. sq.

1331. **Her. Monro*, über die Häute der Arterien und ihre Krankheiten. In *f. Werken*. Leipzig 1762. 4. p. 95.

1332. **De la Sône*, recherches sur la structure des artères. Mém. de l'Ac. roy. des sc. 1756. Paris 1762. 4. p. 107. sq.

1333. *Ger. van Swieten*, de arteriae fabrica et efficacia in corpore humano. Lgd. Bat. 1725. 4.

Literatur über den Bau und die Varietäten der Arterien. 11

1334. *B. S. Albin, de arteriae membranis et vasia. In ej. annot. acad. Lib. IV. cap. 8. p. 30.

1335. *Alb. Haller, de arteriarum et venarum fabrica. In oper. min. Vol. I. p. 173.

1336. *John Hunter, a treatise on the blood, inflammation and gunshot-wounds. To which is prefixed a short account of the authors life by his brother-in-law, Everard Home. Lond. 1794. 4. Versuche über das Blut, die Entzündung, die Schußwunden. Nebst einer Nachricht von dem Leben des Verfassers v. Eberh. Home. Aus dem Engl. überf. v. E. W. G. Hebenstreit. 1797. 8. 2 Bde.

1337. *C. Ed. Letierce, essai sur quelques points d'anatomie et de physiologie méd. et chirurg. de la membrane interne des artères. Thes. inaug. Paris 1829. Arch. gén. de méd. 1829. Nov. p. 424.

1338. *Alb. de Haller, resp. Math. Lud. Rud. Berkelmann, Diss. de nervorum in arterias imperio. Götting. 1744. 4. et in Halleri opp. min. Vol. I. p. 513.

1339. *Henr. Aug. Wrisberg, observat. anat. phys. de nervis arterias venasque comitantibus. In ej. comment. Vol. I. Götting. 1800. 8. p. 363, et in Ludwig script. nevrol. min. Vol. III. p. 24.

1340. *S. C. Lucae, quaedam observationes anatomicae circa nervos arterias adeuntes et comitantes. c. fig. annexae sunt anotationes circa telam cellulosam. Fref. a. M. 1810. 4. Deutsch: anatomische Beobachtungen über die Nerven, die zu den Arterien gehen und sie begleiten; nebst einem Anhange über des Zellgewebe. Reils Archiv, Bd. IX. S. 551 ff.

1341. *G. Ribes, kurze Darstellung einiger anatomischen, physiologischen und patholog. Untersuchungen. Aus den mém. de la soc. méd. d'émulat. Tom. VIII. 1817. p. 604 — 631. in Reils Arch. Bd. V. p. 442 ff.

b. Ueber die Abweichungen im Verlaufe der Arterien.

Die Schriften über die Varietäten einzelner Arterien werden bei der Beschreibung der einzelnen Gefäße selbst angegeben werden. Außerdem verleihe man hierbei die meisten angiolog. Schriften, besonders Haller, Mayer, Sömmerring, Meckel, so wie die Werke über pathol. Anat. von Voigtel, Meckel und Otto.

1342. *Franç. Jos. Hunauld, sur les causes de la structure singulière qu'on rencontre quelquefois dans différentes parties du corps humain. Sur la variété qui se trouve dans la distribution des vaisseaux. Mém. de Paris 1740. mém. p. 382. éd. in 8. p. 525.

1343. *Cas. Chstph. Schmiedel, de varietatibus vasorum plerumque magni momenti. Erlang. 1745. 4.

1344. *C. G. Ludwig, observationes quaedam angiologiae. Lips. 1764. 4.

1345. Th. H. Timmermann, Diss. de notandis circa naturae in humana machina lusus. Rintel. 1765. 4. p. 50. sq.

1346. *J. C. Loder, Pr. de nonnullis arteriarum varietatibus. Jenae 1781. 4.

1347. *Sandisfort, de notabilioribus vasorum aberrationibus. In obs. anat. path. Lib. IV. VIII. L. B. 1774. 4. p. 91.

1348. Koberwein, de vasorum decursu abnormi ejusque vi in omnem valetudinem varia. Viteb. 1810. 4.

1349. Ryan, de quarundam arteriarum in corpore humano distributione. Edinb. 1810. (1812?) 8.

1350. *Joh. Fr. Meckel, über einige merkwürdige Gefäßabweichungen. Meckels Arch. VI. S. 453.

1351. Schoen, Diss. de nonnullarum arteriarum ortu et decursu 'abnormi. Halae 1823. 8.

c. Ueber die Lebens-Eigenschaften der Arterien.

1352. Guil. Verschuir, de arteriarum et venarum vi irritabili ejusque in vis excessu et inde oriunda sanguinis directione abnormi. Groning. 1766. 4.

1353. Chr. Kramp, de vi vitali arteriarum. Argentor. 1786. 8.

1354. Caleb Hillier Parry, an experimental inquiry into the nature, cause and varieties of the pulse, and certain other properties of the larger arteries

12 Literatur über die Lebens Eigenschaften der Arterien.

in animals with warm blood. Illustr. by engrav. Lond. 1816. 8. Deutsch:
* *Experimentaluntersuchung über die Natur, Ursache und Verschiedenheit des arteriösen Pulses und noch gewisse andere Eigenschaften der großen Arterien in warmblütigen Thieren.* Mit 1 Kpft. Aus dem Engl. v. E. v. Embden. Hannover 1817. 8.

1355. *Chr. Henry Parry*, additional experiments on the arteries of warm blooded animals. Lond. 1819. 8.

1356. * *Mich. Jaeger*, tractatus anatomico-physiologicus de arteriarum pulsu. Virceb. 1820. 8.

1357. *Car. Hastings*, Disp. phys. inaug. de vi contractili vasorum. Edinb. 1818. 8. und in *Reckels Arch.* Bd. 6. — Abhandl. über die Entzündung der Schleimhaut der Lungen, nebst einer auf Versuche sich gründenden Untersuchung über die Contractilität der Blutgefäße und die Natur der Entzündung. Aus d. Engl. v. G. v. d. Busch. Bremen 1822. 8.

1358. * *Fr. Guil. Oppenheim*, Diss. sist. experimenta nonnulla circa vitam arteriarum et circulationem sanguinis per vasa collateralia. Manhemii 1822. 4. c. tab. aen.

1359. *Maunoir*, mémoires physiologiques et pratiques sur aneurysme et la ligature. à Genev. 1802. 8. p. 106.

1360. *Jones*, a treatise on the process employed by nature in suppressing the hemorrhage from divided and punctured arteries, and on the use of the ligature. Lond. 1806. ed. 2. 1810. m. 15 Kpft. Deutsch mit Anmerk. v. Spangenberg. Hannover 1813. 8.

1361. * *A. F. J. C. Mayer*, Progr. disquisitio de arteriarum regeneratione. Bonnae 1823. 4.

1362. * *Theoph. Edel*, Diss. de natura medicatrice sicubi arteriae vulneratae et ligatae fuerint. Giessae 1826. 4. m. 6 Kpft.

1363. v. *Schönberg*, memorie sul ristabilimento della circolazione nella legatura o anche recisione dei tronchi delle arterie, con le conclusioni immediate, illustrate da esperimenti e disegni. Napol. 1826.

1364. * *Anton Huber*, neue Versuche an Thieren und deren Resultate über die Wiedererzeugung der Arterien, mit beigefügten Bemerkungen darüber. Mit 3 lith. Tafeln. Wien 1827. 8.

d. Beschreibung des Arteriensystems.

1365. *J. E. Wreden*, arteriologische Tabellen. Hannover 1721. Fol.

1366. *Chirol*, tableau de toutes les artères du corps humain. à Paris 1762. Fol.

1367. * *Adolph Murray*, descriptio arteriarum corporis humani, in tabulis redacta. Diss. I. resp. *Jo. Theoph. Nathhorst*. Upsal 1780. Diss. II. resp. *Eric. Odhelius*. Ibid. 1781. Diss. III. resp. *Andr. Hesselius*. Ibid. 1782. Diss. IV. resp. *Jo. Gust. Hallmann*. Ibid. 1783. 4. Zusammen Lipsiae 1794. 8. Upsal. 1798. 4.

1368. * *Joh. Fr. Siegm. Wosewiz*, Physiologie der Pulsadern des menschlichen Körpers. Nebst einer vorausgeschickten Beschreibung des Herzens und einer tabellarischen Uebersicht der beiden arteriösen Systeme. Erster Theil. Leipzig 1795. 8. (Mehr ist nie erschienen.)

1369. *J. Barclay*, a description of the arteries of the human body. Edinb. 1812. 8.

1370. *Rob. Harrison*, surgical anatomy of the arteries of the human body, designed for the use of students. Dublin 1824. 8. 2 voll.

e. Abbildungen des Arteriensystems.

Wichtig sind besonders die oft citirten: Iconum anat. Fasc. v. *Alb. Haller*. Fasc. II. icon. et descriptio arteriae maxillaris internae, thyreoideae, coeliacae. Fasc. III. arter. capitis, mesenterii, thoracis, rum. Fasc. IV. arter. pelvis. Fasc. V. arter. pedis. Fasc. VI. arter. pectoris et brachii. Fasc. VII. arter. cerebri, medullae spinalis, oculi.

1371. * *Ant. Scarpa*, sull' aneurisma riflessioni ed osservazioni anatomico-chirurgiche. Pavia 1804. Fol. — Ueber die Pulsadergeschwülste. Aus d. Ital. mit Anm. u. Zus. v. *Ch. F. Harless*. Zürich 1808. 4.

1372. * *Charl. Bell*, (engravings of the arteries of the human body. Lond.

1811. 8. fourth edit. 1824. 8.), Darstellung der Arterien, bearbeitet und mit 11 Tafeln. Nummerk. begleitet. v. Heinr. Kobbi, mit einer Vorrede v. J. Ch. Kosemüller (auch lat.) Leipzig 1819. 8. Mit 14 Kpft.

1373. *Fr. Tiedemann, tabulae arteriarum corporis humani. Carlsruhe 1822. Fol. Der erklärende Text lat. und deutsch, in 4.

1374. G. D. Dermott, illustrations of the arteries, connected with aneurism, and surgical operations. Lond. 1825. Fol.

1375. — *Idem*: a concise description of the locality and distribution of the arteries in the human body. London 1827. 12. w. copp. plat.

1376. *R. Froriep, chirurgische Anatomie der Ligaturstellen am menschlichen Körper. — Auch unter d. Tit. Anatomia chirurgica locorum corporis humani ligandis arteriis peritoneorum. Mit 18 Kpft. Weimar 1830. Fol.

f. Einige Schriften über die vergleichende Anatomie der Arterien.

Außer den Handbüchern über die vergleichende Anatomie und Zoologie von Cuvier, Tiedemann und Carus sind hier zu berücksichtigen:

1377. *Rapp, Ueber das Wundernetz, in *Meckels Archiv*, Jahrgang 1827. p. 1.

1378. *Jo. Car. Leop. Barkow, Ueber einige Eigenthümlichkeiten im Verlaufe der Schlagadern der Fischotter. *Meckels Archiv*, 1829. p. 30.

1379. **Idem*: Disquisitiones circa originem et decursum arteriarum mammalium. Acc. tabb. aen. IV. Lipsiae 1829. 4. Ueber die Arterien der Vögel siehe Fr. Bauer. *Zh. I. S. 46. No. 636.*

1380. *J. K. Meckel, in dem Archive für die Physiol. Jahrgang 1826. S. 19. 1829. S. 221.

1381. *Chr. L. Nitzsch, Observationes de avium arteria carotide communi. Halae 1829.

1382. *Hans Barkow, anatomisch-physiologische Untersuchungen, vorzüglich über das Schlagader-system der Vögel. Siehe *Meckels Archiv*. Jahrg. 1829. Hft. 4. Mit Kpft.

Ueber Arterien der Amphibien, Bojanus. Siehe *Zh. I. S. 46. No. 635.* Rusconi, *Zh. I. S. 46. No. 631 — 633.* Ueber die der Fische, Monro. Siehe *Zh. I. S. 45. No. 606.*

1383. *Fr. Schlemm, anatomische Beschreibung des Blutgefäßsystems der Schlangen. In *Treviran. Zeitschr. f. die Physol.* 2 Bd. 1 Hft. S. 101.

1384. Fr. Tiedemann, Anatomie des Fischeherzens. Landshut 1809. 4.

1385. *Rathke, über die Herzkammer der Fische, in *Meckels Archiv für d. Physiol.* 1826. 152.

1386. *Cuvier et Valenciennes*, histoire naturelle des poissons. Tom. I. Paris 1828. 8. (Tafeln in Fol.)

5. Ueber die Venen.

1387. *Hieron. Fabricii, ab Aquapendente, de venarum ostioliis. Patavii 1603. Fol. et in ej. opp. omn. (Das erste Werk über die Klappen der Venen, die jedoch schon über ein halbes Jahrhundert früher *Cananus* aufgefunden hatte. Siehe *Rudolphi*, Grundriss d. Physiol. B. II. Abth. 2. S. 284.)

1388. *Heinr. Meibom, resp. Joh. Gabr. Schmiedt, Diss. de valvulis seu membranulis vasorum, eorumque structura et usu. Helmst. 1682. 4. Recus. in *Halleri coll. Diss. anat.* Vol. II. p. 49.

1389. *Theodul. Kemper, resp. Jo. Ern. Richelmann, Diss. de valvularum in corporibus hominis et brutorum natura, fabrica et usu mechanico. Jenae 1683. 4. Recus. in *Halleri coll. Diss. anat.* II. p. 79.

1390. Petr. Gerike, de valvulis venarum et earum usu. Helmstad. 1723. 4.

1391. *Jo. Ern. Hebenstreit, Progr. de venis communicantibus. Lipsiae 1744. 4. In *Halleri coll. Diss. anat.* Vol. II. p. 41.

1392. *Jo. Godofr. Janke, de ratione, venas corporis humani angustiores, imprimis cutaneas ostendendi. Lipsiae 1762. 4. Recus. in *Sandifortii Thesaur. Diss.* Vol. II. p. 235.

1393. J. C. Pohl, Progr. de venis. Lipsiae 1773. 4.

1394. *H. Marx, diatribe anat. phys. de structura et vita venarum. Carlsruhe 1819. 8. c. fig. color.

1395. *E. F. Gurk, Diss. de venarum deformitatibus. Vratislaviae 1819. 4.

1396. *Car. Frid. Weigel, praeside E. H. Weber, Diss. de strato musculo tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus indagato. c. tab. aen. Lipsiae 1823. 4.

1397. *M. J. Weber, über Varietäten der Venen, in *Meckels Archiv*. Jahrg. 1829, S. 1.

Abbildungen und systematische Beschreibungen des Venensystems.

1398. *Aug. Carl. Voß, Darstellung der Venen des menschlichen Körpers nach ihrer Structur, Vertheilung und Verlauf. Zum Unterricht für Ärzte, Wundärzte und zum Studium für angehende Anatomen. Mit 20 Kpft. Leipzig 1823. 8.

1399. *M. G. Breschet, Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur le système veineux, et spécialement sur les canaux veineux des os. Paris. Mit vielen Steindrucktafeln; ohne Jahrzahl. Ist noch nicht vollendet.

Vergleichende Anatomie der Venen.

Außer den oben bei den Arterien angeführten Werken von Montro, Cuvier, Ziedemann, Rusconi, Bojanus, sind hier zu erwähnen: Bojanus, Abhandlung über die Pfortader der Schildkröten, in der *Zis*, Jahrg. 1818. S. 1428. und Rathke, über die Leber und das Pfortadersystem der Fische, in *Meckels Archiv f. d. Physiol.* 1826. S. 126.

III. Schriften über die Abtheilung des Gefäßsystems, in welcher der Kreislauf nicht geschieht, oder über die Lymphgefäße.

1. Schriften über das Lymphgefäßsystem, oder über ganze Abtheilungen desselben.

1400. *Casp. Asellii de lactibus seu lacteis venis, quarto vasorum mesaricorum genere, novo invento, dissertatio, qua sententiae anatomicae multae vel perperam receptae convelluntur, vel parum perceptae illustrantur. Mediolan. 1627. 4. (Basil. 1628. 4. Lgd. Bat. 1640. 4.) Recus. in coll. oper. *Spigelii* ed. van der Linden. Amstel. 1645. Fol. et in *Mangeti* theatro anat.

1401. *Caecilii Folii, sanguinis e dextro in sinistrum cordis ventriculum defluentis facile reperta via, cui non vulgaris in lacteas nuper patefactas venas animadversio proponitur. Venet. 1639. 4. Frcf. 1641. 12. Lgd. Bat. 1723. 8.

1402. *Jo. Pecqueti experimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli receptaculum, et ab eo per thoracem in ramos usque subclavios vasa lactea deteguntur; Diss. anat. de circulatione sanguinis et chyli motu. Huic secundae editioni quae emendata est, illustrata, aucta, accessit *de thoracis lacteis* Diss., in qua *Jo. Riolani* responsio ad eadem experimenta nova anatomica refutatur, et inventis recentibus canalis Virsungici demonstratur usus; et lacteum ad mammas a receptaculo iter indigitatur. (Paris 1651. 4. Harderovici 1651. 12. Amstel. 1661. 12.) Paris 1654. 4. et in *Mangeti* Bibl. anat.

1403. *Joann. Mart. Brendel (*Maur. Hoffmann*), Theses medicae de venis lacteis oculatoris aevi anatomicis decantatis. Altorf. 1650. 4.

1404. *Thom. Bartholini*, de lacteis thoracis in homine brutisque nuper rime observatis historia anatomica. Hafniae 1652. 4. Londin. 1652. 8. Paris. 1653. 8. Lgd. Bat. 1654. 12. Genevae 1654. 8. Ultraj. 1654. 12. Amstelod. 1661. 8. Recus. in ejusd. opusc. nov. anatom. de lacteis thoracis et lymphaticis vasis. Hafniae et Francof. 1670. 8. p. 1. in *Siboldi Hemsterhuys* messis aurea. Heidelberg. 1659. 8. in *Munieri* sylloge. Genuae 1654. 8. et in *Bibl. anat. Mangeti*. Vol. II. p. 657.

1405. — *Ejusd.* vasa lymphatica nuper Hafniae in animantibus inventa et hepatis exsequiae. Hafniae 1653. 4. Paris. 1653. 8. In ej. opusc. nov. anat. de lacteis thoracis etc. p. 73. in *Hemsterhuys* messis aurea, in *Munieri* sylloge et in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 692.

1406. — *Ejusd.* dubia anatomica de lacteis thoracis et an hepatis fumus

immutat medendi methodum. Hafniae 1653. 4. Paris 1653. 8. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. etc. p. 113. in *Hemsterhuys* messis aurea et in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 673.

1407. — *Ejusd.* vasa lymphatica in homine nuper inventa. Hafniae 1654. 4. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thoracicis etc. p. 149.

1408. — *Ejusd.* defensio vasorum lacteorum et lymphaticorum adversus *Jo. Riolanum*, celeberrimum Lutetiae anatomicum. Hafniae 1655. 4. In ej. opusc. nov. an. de lacteis thorac. p. 185.

1409. — *Ejusd.* examen lacteorum contra *Riolanum* et *Harcvium*. Hafniae 1655. 4. Frkf. 1656. 4.

1410. — *Ejusd.* Spicilegium primum ex vasis lymphaticis, ubi cl. V. *Glissonii* et *Pevqueti* sententiae expenduntur. Hafniae 1655. 4. Ibid. 1657 (1658) 4. Rostoch. 1660. 4. Amstel. 1661. 12. in opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 413.

1411. — *Ejusd.* spicilegium secundum ex vasis lymphaticis, ubi clar. vir. *Backii*, *Cattierii*, *Le Noble*, *Tardii*, *Whartoni*, *Charletoni*, *Bilsii* etc. sententiae examinantur. Hafn. 1660. 4. Amstel. 1661. 12. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 463.

1412. — *Ejusd.* responsio de experimentis anatomicis Bilsianis et difficili hepatis resurrectione ad *Nicol. Zas.* Hafniae 1661. 8. Belgice veritate *Gerardo Blaes.* Amstelod. 1661. 12. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 519.

1413. — *Ejusd.* (sub nomine *Nicolai Stephani*) castigatio epistolae maleficae *Bilsii*, ubi Bilsianae artes deteguntur, et professoris dignitas vindicatur. Hafniae 1661. 8. Amstel. 1661. 12. in *Th. Bartholini* orationibus. Hafniae 1668. 8.

1414. — *Ejusd.* Diss. anatomica de hepate defuncto, novis Bilsianorum observationibus opposita. Hafniae 1661. 8. In ej. opusc. nov. anat. de lacteis thor. p. 549.

1415. — *Ejusd.* de hepatis exatorati desperata causa, cum praecipuis eruditae Europae medicis concertatio. Hafniae 1666. 8. In ej. opusc. anat. de lacteis thor. p. 615.

1416. — *Ejusd.* opuscula nova anatomica de lacteis thoracicis et lymphaticis vasis, uno volumine comprehensa, ab auctore aucta et recognita. Hafn. et Frkf. 1670. 8. (eine von Bartholin selbst veranstaltete Sammlung aller bis her genannten Schriften desselben).

1417. * *Thom. Bartholin*, insidiae structae *Olai Rudbeckii* ductibus hepaticis aquosis, et vasis glandularum serosis Arosiae editis. Lgd. Bat. 1654. 8.

1418. *Olai Rudbeck*, nova exercitatio anatomica, exhibens ductus hepatis aquosos et vasa glandularum serosa. Arosae 1653. 4. recus. in *Hemsterhuys* messis aurea.

1419. — *Ejusd.* insidiae structae aquosis ductibus *Olai Rudbeck a Thoma Bartholino.* Lgd. Bat. 1654. 8.

1420. — *Ejusd.* epistola ad *Thom. Bartholinum* de vasis serosis. Upsal. 1657. 12.

1421. * *Ejusd.* de sero ejusque vasis. c. fig. Upsal. 1661. 4. Recus. in *Holleri* coll. Diss. anat. Vol. VII. P. I. p. 235.

1422. *Jo. Riolani*, opuscula nova anatomica. 1) Indicium novum de venis lacteis, tam mesentericis, quam thoracicis, adversus *Thom. Bartholinum*; 2) Lymphatica vasa *Bartholini* refutata; 3) Animadversiones secundae ad anatomiam reformatam *Bartholini*; 4) Ejusdem dubia anatomica de lacteis thoracicis resoluta; 5) Hepatis funerali et resuscitati vindictae. Paris 1653. 8.

1423. *Martin Bogdan*, insidiae structae *Bartholini* vasis lymphaticis ab *Olao Rudbeckio* Sueco in suis ductibus hepaticis, et detectae. Hafn. et Frkf. 1654. 4.

1424. — *Ejusd.* apologia pro vasis lymphaticis *Thomae Bartholini* contra insidias secundo scriptas ab *Olao Rudbeckio.* Hafniae 1654. 12.

1425. * *Sibold. Hemsterhuys*, messis aurea exhibens anatomica novissima et utilissima experimenta. Lgd. Bat. 1654. 12. Huic editioni access. de vasis lymphaticis tabulae *Rudbeckianae*, fig. aen. illustratae. Heidelberg 1659. 8.

1426. *Jo. Alcid. Munier*, de venis tam lacteis thoracicis, quam lymphaticis novissime repertis sylloge anatomica. Genuae 1654. 8.

1427. *Franc. Glisson*, anatomia hepatis. Ad calcem operis subijci nonnulla de lymphae ductibus nuper repertis. London 1654. 8. Amstel. 12. Hag. 1681. 12.
1428. *Carol. le Noble*, observationes rarae et novae de vasis lacteis mtericis et thoracicis. Paris 1655. 8. Rothomag. 1655. 8.
1429. *Guil. de Henault*, clypeus, quo tela in *Pecqueti* cor a *C. le I* conjecta infringuntur et eluduntur. Rothomag. 1655. 12.
1430. * *Adrien Ausout (Ausotius)*, Epistola ad *Pecquetum* de vasis l. et receptaculo chyli. Paris. 1657. 4.
1431. * *Georg. Segeri*, Diss. anat. de quidditate et materia lym Bartholinianae, cui accessere epistolae doctorum virorum de eadem lym Hafn. 1658. 4.
1432. * *Ludov. de Bils*, (waaragtig gebruik der tot noch too gemeylyhuys benefiens de verryzenis der lever. Rotterd. 1658. 4.)
1433. Epistolica Dissertatio qua verus hepatis circa chylum, et pariter ctus chyli ferri hactenus dicti usus docetur. Roterodami 1659. 4. Ibid. 1661.
1434. — *Ejusd.* Kort berigt van de waarschouwingen van *Jo. van Hoen* en de aanmerkingen van *P. Barbette*. Rotterd. 1660. 4.
1435. — *Ejusd.* responsio ad epistolam *Tob. Andreae*, qua ostenditur verus usus vasorum hactenus pro lymphaticis habitorum et historia men bilis, quae auctori occasione balsamationis potissimum Lovanii evenit Roterod. 1659. 4.
1436. — *Idem*, responsio ad admonitiones *Jo. ab Horne* et ad animationes *Pauli Barbette* in anatomica Bilsiana, interprete *G. Buenio*. Rot 1661. 4. (Alle zusammen in ej. specimina anatomica. Interprete *G. Buisson*. Roterod. 1661. 4.)
1437. * *Louys de Bills*, letter, touching the true use of the lymph vessels. Philos. transact. 1668. p. 791.
1438. *Paul. Barbette*, aanmerkingen op d'anatomische schriften van *de Bils*. Amstel. 1660. 8.
1439. * *Anton Deusing*, de nutrimenti in corpore elaboratione, ul chylicatione et chyli motu, sanguificatione, depuratione alimenti, iter spiritibus, quibus adjecta appendix de chyli motu et de admiranda anat Bilsii. Groning. 1660. 12. Roterod. 1661. 4.
1440. — * *Ejusd.* resurrectio hepatis adserta contra Socium larv Vincent. *Siegelium*, sub personati *Blottesandaei* cohorte furiosa signifi Accedit disquisitio ulterior de chyli motu atq. officio hepatis ad *Thom. I tholin*. Groning. 1662. 12.
1441. * *Ejusd.* examen anatomies anatomiae Bilsianae, s. epistola de motu. Groning. 1665. 12.
1442. * *Gunth. Chrstph. Schelhammer*, de lymphae ortu et lympharum vasorum causis. Helmstad. 1683. 4. In *Mangeti* Bibl. anat. Vol p. 717.
1443. * *Jo. Zeller*, resp. *Joh. Sam. Kniselio*, Diss. de vasorum lympharum administratione observatis et observandis in hac illorum phoenon n. et p. n. eorumque causis. Tubingae 1687. 4. In *Halleri* coll. Diss. : Vol. I. p. 809.
1444. * *Martin Lister*, letter concerning powder'd blues passing the la veins. Philos. transact. 1701. p. 819.
1445. * *William Musgrave*, letter, concerning some experiments made transmitting a blue coloured liquor into the lacteals. Philos. trans. 1 p. 996.
1446. * *Richard Hale*, an account of the external maxillar and other linary glands; also of the insertions of all the lymphaticks (as well above below the subclavians) into the veins; which glands and insertions have hitherto been mention'd, or not truly described by any authors. Phil. tr 1720. p. 5.
1447. *Abrah. Vater*, vasa lactea in cadavere feminae visa. Wvittel 1722. 4.
1448. * *Jo. Chrstph. Bohlü* Diss. epistolica ad *Fred. Ruyschium* de novarum cavae propaginum in systemate chylopoeto, ut et de corticis cer textura. Amstel. 1727. 4. *Ruyschii* responsio. Cum fig. aen. Amstel. 1727

1449. * *Joh. Grg. Duvernoy*, descriptio vasorum chyli ferorum. Commentar. acad. Petropolitanae. Vol. I. 1728. p. 262.
1450. De vasis lacteis in homine inventis. Commentarii Bononienses. Vol. I. C. p. 123.
1451. * *Sam. Theod. Quellmalz*, resp. *Car. Frid. Schwertner*, Diss. de venis absorbentibus. Lipsiae 1732. 4.
1452. * *Jo. Gothofr. Brendelius*, Pr. de chyli ad sanguinem publico privatoque potissimum commeatu per venas mesaraicas non improbabili. Gotting. 1738. 4.
1453. * *Grg. Chr. Hahn*, de transitu chyli ex ventriculo ad sanguinem. Lipsiae 1740. 4.
1454. * *Antoine Ferrein*, observation sur les vaisseaux lymphatiques. Mém. de Paris 1738. hist. p. 46. Ed. in 8. p. 64. — Observation sur les nouvelles artères et veines lymphatiques. Ibid. 1741. 4. hist. p. 47. mém. p. 371. éd. in 8. hist. p. 64. mém. p. 495.
1455. * *Joh. Christoph. Pohl*, resp. *Jo. Chr. Laubmeyer*, viae lacteae corporis humani per extispicia animalium olim detectae historia naturalis, cum notis criticis necessariusque commentariis in placita *Ruyschiana* et *Boerhaaveana*. Regiom. 1741. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. I. p. 605.
1456. * *Herm. Pauli Juchii*, resp. *Chr. Ern. Lossius*, Diss. de viis et motu chyli. Erford. 1744. 4.
1457. * *Car. Frid. Kaltschmied*, resp. *Leber. Chr. Dan. Mittelhäuser*, Diss. sist. viam chyli ab intestinis ad sanguinem. Jenae 1752. 4.
1458. * *Mark Akenstide*, observations on the origin and use of the lymphatic vessels, being an extract from Gulstonian lectures, read in the theatre of the coll. of physic. of London in June 1755. In Philosoph. transact. Vol. 50. P. 1757. p. 322.
1459. * *Joh. Jac. van Es*, Diss. de vasis chyli feris. Lgd. Bat. 1762. 4.
1460. *Jo. Sographi libellus*, in quo theoria lymphaeductuum *Monroi* et *Hunteri* exponitur et ad praxin chirurgicam adaptatur. Patavii 1766. 8.
1461. * *Car. a Linne*, resp. *Chr. Petr. Thunberg*, Diss. de venis resorbentibus. Upsaliae 1767. 4.
1462. * *Alex. Monro*, de venis lymphaticis valvulosis et de earum imprimis origine. Berol. 1757. 8. Edit. 2. Edinburgi 1770. 8.
1463. — Observations anatomical and physiological, wherein *D. Hunter* claim to some discoveries is examined. Edinburgh 1758. 8.
1464. * Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. I. de venis lymphaticis valvulosis et de earum imprimis origine, auctore *Alex. Monro*. — II. Diss. optat. de vasis lymphaticis glandulisque conglobatis ad *Alb. de Haller* a *Jo. Fr. Meckel*. Praemittitur brevis de novo horum vasorum invento historia. Lipsiae 1760. 8. (V. Fr. Meckel's 2te Schrift über die Lymphgefäße. Siehe unten No. 1499.)
1465. *William Hewson*, account of the use of the spleen, thymus, lymphatic glands and lymphatic vessels. In med. and philos. comment. by a Soc. in Edinburgh. Vol. I. p. 99.
1466. * *Will. Hewson*, experimental inquiries into the properties of the blood. Lond. 1771. 8. (Deutsch: Nürnberg 1780. 8.) Part. II. containing a description of the lymphatic system. Lond. 1774. 8. (Lat. vert. *van de Wynperse*. Ultraj. 1783. 8. Part. III. posthum. ed. *Falconer*. London 1777. 8.)
1467. * *Paul Chr. Fr. Werner* et *Chr. Gul. Feller*, vasorum lacteorum atque lymphaticorum anatomico-physiologica descriptio. Fascic. I. Lipsiae 1784. 4. c. tabb. aen. IV.
1468. *Jo. Sheldon*, the history of the absorbent system. Part I. containing the chylography or description of the human lacteal vessels. London 1784. fol. min.
1469. * *Lambertus Lucas van Meurs*, collectanea medica inauguralia sive systematis vasorum absorbentium succincta descriptio. Hardervici 1786. 4.
1470. *Pietro Assalini*, (saggio medico sui vasi linfatici. Turin. 1787. 8.) — essai médical sur les vaisseaux lymphatiques. Avec les moyens de prévenir les effets des substances vénimeuses comme la salive du chien enragé, le venin de la vipère, le virus vénérien etc. Turin, 1787. 8. übersetzt in der Samml. auserlef. Abhhd. für pr. Aertzte. Bd. 15. S. 93. und Dresden 1793. 8.

1471. *Blizard*, physiological observations on the absorbent system of the vessels. London 1787. 8.
1472. **Gül. Emanuel Lindner*, specim. inaug. de lymphaticorum systemate. Halae 1787. 8.
1473. **Floriano Caldani*, riflessioni sopra alcuni punti di un nuovo sistema de' vasi assorbenti ed esperienze sulla elettricità animale. In Padov 1792. 8.
1474. **Car. Guil. de Mueller*, Praesid. *Ern. Platner*, Physiologia systematis vasorum absorbentium. Lipsiae 1793. 4.
1475. **Eduard Holme*, Diss. de structura et usu vasorum absorbentium. Lgd. Bat. 1793. 8.
1476. **Jo. Conr. Frey*, Diss. de illustrationibus, quas cognitio absorptionis in corpore humano, atque inventio systematis vasorum absorbentium universae medicinae atque chirurgiae praebent. Erford. 1795. 4.
1477. **Gisb. Jac. Wolff*, (Geneeskundige verhandeling over het nut der watervaten. Harlem 1794. 8.) Arzneikundige Abhandlung über den Nutzen der Wasser- oder Lymphgefäße, nebst einem Brief von *S. Th. Sömmerring*. Aus dem Holl. übersetzt v. *L. F. Finke*. Lingen 1795. 8.
1478. **Bernh. Nath. Gtl. Schreger*, theoretische und praktische Beiträge zur Kultur der Saugaderlehre. Erster Bd. Leipzig 1793. 8. Mit 2 Kpft.
1479. **William Cruikshank*, the anatomy of the absorbing vessels of the human body. London 1786. gr. 4. ed. nova 1791. 4. Ejusd. versio gallica auct. *Phil. Petit-Radel*. Paris 1787. 8.
1480. **William Cr.*, Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Saugadern des menschlichen Körpers. Aus d. Engl. Mit einigen Anmerk. und Kpft. vermehrt, herausgegeben von *Chr. Fr. Ludwig*. Leipzig 1789. 4.
1481. **William Cruikshank's* und anderer neuere Beiträge zur Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Saugadern des menschlichen Körpers. Mit Kpft. Mit einigen Anmerk. und einer Uebersicht der Literatur der Saugaderlehre vermehrt, herausgegeben von *Chr. Fr. Ludwig*. Leipzig 1794. 4.
1482. *René Nicol. Dufriche Desgenettes*, analyse du système absorbant ou lymphatique. Montpellier 1791. 8.
1483. **Gregor. Basilevitch*, systematis resorbentis physiologico-medice descriptio. Argentorati 1792. 4.
1484. **Paul Mascagni*, Prodomo d'un' opera sul sistema de vasi linfatici. Siena 1784. 4. Prodrome d'un ouvrage sur le système des vaisseaux lymphatiques, contenant 24 planches in Folio. à Sienne 1784. 4.
1485. **Ejusd.* vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia. Senis 1787. Fol. max.
1486. **Paul Mascagni's* Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße oder Saugadern des menschlichen Körpers. Aus d. Lat. mit Kpftn. Mit einigen Anmerk. und Zusätzen vermehrt, herausg. von *Chr. Fr. Ludwig*. Leipzig 1789. 4.
1487. **Vasorum lymphaticorum historia seu totius operis pars I. a Paul Mascagni* denuo edita. Adjectis ex parte secunda seu ichnographia annotationibus, praeparationum catalogis et tribus tabulis. Accedit diatribe de vasorum sanguineorum finibus et structura, qua auctoris sententia novis experimentis asseritur et a nonnullorum difficultatibus vindicatur. Tom. I. Sen 1795. 8.
1488. **Paul Mascagni's* neue Theorie der Absonderungen durch unorganische Poren, und dessen Geschichte der Lymphgefäße. Aufs neue herausgegeben und mit einem zweiten Theile, worin das Daseyn der Gefäße der zweiten behauptet, und die Absonderung durch unorganische Poren widerlegt wird, vermehrt von *Peter Lupi*. Aus d. Lat. übers. 2 The. Leipzig 1799. 8.
1489. **Fragmens de la traduction de l'ouvrage de Mascagni sur les vaisseaux lymphatiques*, par *P. F. Bretonneau* et *Saclier*. In Mémoires de soc. méd. d'émulat. Vol. I. 1798. p. 311 — 381.
1490. **Henr. Car. Becker*, doctrinae de vasis chyliiferis et lymphaticis primordia. Halae 1797. 8.

1491. * *Giuseppe Jacopi*, esame della dottrina di *Darwin* sul moto retrogrado dei liquidi nei vasi linfatici. Pavia 1804. 8.

1492. * *Heinr. Ludw. Uttenhoffer* Lymphatologia, oder Abhandlung über das lymphatische System und dessen Leiden. Wien 1808. 8.

1493. * *C. A. Delaenay*, quelques idées sur les vaisseaux lymphatiques et les hydropisies en général. Présentées et soutenues à l'école de médecine de Montpellier, le 10. Août 1808. à Montpellier 1808. 8.

1494. * *Ern. Alex. Lauth*, essai sur les vaisseaux lymphatiques. Diss. Strasbourg 1824. 4.

1495. * *Aug. Cri. Boek*, Darstellung der Saugadern des menschlichen Körpers nach ihrer Structur, Vertheilung und Verlauf u. s. w. Mit 15 Kpft. 4. Leipzig 1828. 8.

2. Einige besondere Schriften über einzelne, die Lymphgefäße betreffende Gegenstände.

a. Ueber die Muskelfasern und die Klappen der Lymphgefäße.

1496. * *Bernh. Gtl. Schreger*, de irritabilitate vasorum lymphaticorum. Lipsiae 1789. 8.

1497. * *Frid. Ruysch*, dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis. (Hagae 1665. 12). c. fig. aen. access. quaedam observationes rariores. Igd. Bat. 1687. 12. in *Mangelt* Bibl. anat. Vol. II. p. 712. sq. et in *Ruyschii operibus*.

1798. * *Jo. Jac. Doebel*, valvularum vasorum lacteorum, lymphaticorum et sanguiferorum dilucidatio. Rostochii 1694. 4.

b. Ueber die Communication der Lymphgefäße mit den Venen.

1499. * *Jo. Frid. Meckel*, nova experimenta et observationes de finibus venarum ac vasorum lymphaticorum in ductus viscerae excretoria corporis humani, ejusdemque structurae utilitate. Berolini 1772. 8. (Für die Communication der Lymphgefäße und Venen in den Lymphdrüsen.)

1500. *Nic. Oudemans*, de venarum praecipue meseraicarum fabrica et sectione (ohne Namen des Orts). 1794. 8. (gegen das Einsaugungsvermögen der Venen und gegen die Communication der Venen mit den Lymphgefäßen an andern, als an den bekannten Stellen hinter dem Schlüsselbeine.)

1501. *Wroloff's* Abhandlung (Ueber die Communication der Lymphgefäße mit den Venen an andern als an den gewöhnlichen Stellen) im Journal für die neue holländische Literatur, St. 1. Siehe auch allgemeine med. Annalen, 1803.

1502. * *Vincenz Fohmann*, anatomische Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen. Mit einer Vorrede v. Fr. Tiedemann. Heilberg 1821. 8. (Für die Communication der kleinen Venen und Lymphgefäße in den Lymphdrüsen.)

1503. * *Regolo Lippi*, illustrazioni fisiologiche e patologiche del sistema laticifero-chilifero, mediante la scoperta di un gran numero di comunicazioni in caso col venoso. Firenze 1825. 4. Mit 9 Kpft. in queer Folio. (Für die Communication der Lymphgefäße mit den großen Venen im Unterleibe und an andern Stellen.)

1504. *Giovanni Rossi* hat einen Aufsatz gegen *Lippi* in *Annali universali* bekannt gemacht. Siehe *Froriep*, Notizen. Mai 1826. p. 17.

1505. *Autommarchi*, Mém. sur la non-communication des veines avec les vaisseaux lymphatiques des glandes conglobées, in *Férussac* Bullet. des sc. méd. Tome XVIII. 1829. p. 8. et p. 161. (Gegen *Lippi* und *Fohmann*.)

1506. *Portal*, Note sur la communication des vaisseaux lymphatiques et des veines, in *Férussac* Bullet. des sciences med. Sept. 1829. p. 327. (Für die vollständige Communication der Lymphgefäße und der Venen. Siehe auch daselbst eine ältere, aus den Mém. des Savans étrangers, Vol. III. p. 155. citirte Abhandlung *Mertrud's*, in welcher derselbe die Communication der Lymphgefäße mit den Venen zu beweisen suchte, angeführt.)

1507. *D. Dubbled*, Lettre sur la communication des veines et des vaisseaux lymphatiques, in *Férussac*, Bullet. des sc. méd. 1829. p. 329. (Für die Communication der Venen und Lymphgefäße in den Lymphdrüsen.)

c. Ueber die Säugaderdrüsen.

1508. *Jo. Bapt. Fels*, de glandulis conglobatis. Argentor. 1774. 4.
 1509. **Joh. Gtll. Haase*, resp. *Car. Gtll. Krause*, Diss. de motu chyli lymphae glandulisque conglobatis. Lipsiae 1778. 4.
 1510. *Chr. Fr. Nürnberger*, de glandulis conglobatis. Viteberg. 1780.
 1511. **Anton. Pacchioni*, Diss. de glandulis conglobatis durae mening humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam meningem productis. *Ephem. acad. nat. cur. Cent. 1 et 2. append.* p. 139.
 1512. **B. N. G. Schreger*, von den Nerven der Säugaderdrüsen. In *Beitr. z. Kult. d. Säugaderlehre*, p. 248.
 1513. *John Charles Ogilvie*, observations on the interior structure and conomy of the conglobate glands. In *London medical and phys. Journ.* Febr. 1827.

d. Ueber den Ductus thoracicus.

1514. **Jo. van Horne*, novus ductus chyliferus, nunc primum delineatus descriptus et eruditorum examini expositus. *Lgd. Bat.* 1652. 4. (ibid. 166 4. recus. in ejusd. opusc. ed. *Pauli*. Lipsiae 1707. 8. p. 273.)
 1515. *An extract of a letter of *M. Pecquet* to *M. Carcavi*, concernin a new discovery of the communication of the ductus thoracicus with the emu gent vein. *Phil. transact.* Vol. II. 1667. p. 461.
 1516. **Jean Pecquet*, lettre touchant une nouvelle découverte de la communication du canal thoracique avec la veine émulgente. *Mém. de Paris* Tom. I. p. 37. Tom. X. p. 462. avec la veine cave inférieure. *Ibid.* p. 501.
 1517. **Joh. Grg. Grubelius*, resp. *Jo. Hadr. Stevogt*, Diss. de duct chyliifero Pecquetiano. Jenae 1674. 4.
 1518. **Walter Nædham*, some annotations upon a discovery pretend to have been made by *Pecquet*, of a communication between the ductus thoracicus and inferior vena cava. *Philos. transact.* 1672. p. 5007.
 1519. **Joh. Dan. Dorstenius*, resp. *Casp. Chr. Schella*, galaxiae exhibitio s. Diss. anat. de ductu thoracico chyliifero. *Marburgi Cattorum.* 1678.
 1520. **Joh. Henr. Schultze*, de ductu thoracico, nova facillique encheire inveniend. *Acta acad. nat. curios.* Vol. I. p. 500.
 1521. **Johannes Sigismund. Henninger*, de vasis lacteis et modus nov inveniendi ductum thoracicum in corpore humano. *Ephemer. acad. nat. curios.* Centur. 3. 4. append. p. 120.
 1522. **Jo. Saltzmann*, resp. *Jerem. Adam Leitersperger*, Diss. exhibe encheireisin novam, qua ductus thoracicus una cum receptaculo chyli in qu vis subjecto humano demonstrari potest. *Argentor.* 1711. 4. Recus. in *Halleri coll.* Diss. anat. Vol. I. p. 685.
 1523. **Jo. Adolph Wedel*, Diss. de valvula venae subclaviae ductui thoracico imposita. Jenae 1714. 4. Recus. in *Halleri coll.* diss. anat. Vol. I. p. 80.
 1524. **Arent Cant*, Diss. de receptaculo et ductu chyli. *Lgd. Bat.* 172 4. c. tab. aen. et in ejus impetus primi anatomici.
 1525. **Louis Gayant*, *Claude Perrault* et *Jean Pecquet*, observati sur la communication de la veine emulgente avec le canal thorachique. *Mé de Paris.* Vol. I. 1733. p. 37.
 1526. **Aug. Fr. Walther*, observationes anatomicae selectae tres ductu thoracico bipartito, vena bronchiali sinistra, et inferiore arteria hepatis superioris mesaraicae sobole. Lipsiae 1731. 4. In *Halleri coll.* Diss. anat. Vol. I. p. 757.
 1527. **B. S. Albinus*, de insertione ductus chyliiferi in vena azygos. ejus annot. acad. Lib. IV. cap. 9.
 1528. **H. V. Queitsch*, Nachrichten von der großen Speisefasttröhre der Brust, ober der Brustmilchader. *Frkf. a. d. Oder* 1740. 4. Mit Kupf.
 1529. **Alb. de Haller*, resp. *Conr. Maur. Chr. Bussmann*, observati nes de ductu thoracico. *Götting.* 1741. 4. In ej. coll. Diss. anat. Vol. I. 793. et in oper. min. Vol. I. p. 586.
 1530. **Franc. Jac. Narcissus*, Diss. de generatione et receptaculis chy *Lgd. Bat.* 1742. 4. Recus. in *Halleri coll.* Diss. anat. Vol. I. p. 769.
 1531. **Bern. Stegfr. Albini* tabula vasis chyliiferi cum vena azyga, t teriis intercostalibus, aliisque vicinis partibus. *Lgd. Bat.* 1757. Fol. max.

1532. *Alex. Monro, Beschreibung des menschlichen Milchsaftbehälters und der Milchsafttröhre. In dessen Knochenlehre v. Krause überfegt. Leipz. 1761. 8. S. 645.

1533. *Antoine Portal, remarques sur la structure du canal thorachique et celle du reservoir du chyle. Mém. de Paris 1770. hist. p. 37. mém. p. 393.

1534. *Janus Bang, de variationibus in ductu thoracico visis. Soc. med. Hafniensis collectanea. Vol. I. 1774. p. 82. sq.

1535. *Raphael Bienvenu Sabatier, remarques sur le canal thorachique de l'homme. Mém. de Paris 1780. hist. p. 15. mém. p. 603.

1536. *Sam. Thom. Soemmerring, de trunco vertebrali vasorum absorbentium corporis humani commentatio, juncta icone. In comment. soc. reg. scient. Gotting. Vol. XIII. 1795 — 98. p. 111.

1537. *Alfred Cooper, drei Fälle von Verstopfung des ductus thoracicus, nebst einigen Versuchen über die Wirkungen der Unterbindung dieses Gefäßes. In Jenseflam und Rosenmüllers Beiträgen, 1r Bd. 16 Hft. S. 47. in Keils Arch. Bd. 5.

Lymphgefäße in einzelnen Organen.

1538. *Rudolph Jac. Camerer, de nova vasorum seminiferorum et lymphaticorum in testibus communicatione. Miscell. acad. nat. curios. Dec. 2. ann. 7. 1688. p. 432.

1539. *Güntherus Chrsth. Schelhammer, de vase chylifero lymphatico coli nunc demum reperto. Miscell. acad. nat. curiosior, Dec. 3. ann. 3. 1695. et 1696. p. 176.

1540. Paolo Geron. Biumi, esame di alcuni canaletti chiliferi, che del fondo del ventricolo per le toniche del omento sembrano penetrare nel fegato. Mediolan. 1728. 8.

1541. *François Joseph Hunauld, observation sur des vaisseaux lymphatiques dans le poulmon de l'homme qu'on n'avoit encore vus que dans les animaux. Mém. de Paris. 1734. 4. hist. p. 44. ed. in 8. hist. p. 61.

1542. *Henry Watson, a description of the lymphatics of the urethra and neck of the bladder. Philos. transact. 1769. p. 392.

1543. Casim. Chrsth. Schmiedel, de habitu naturali venarum lymphaticarum in hepate. Erlang. 1747. 4. c. fig.

1544. *Jo. Gottl. Haase, de vasis cutis et intestinorum absorbentibus, plebibusque lymphaticis pelvis humanae annotationes anatomicae. Cum iconibus. Lipsiae 1786. Fol.

1545. *Ch. N. Schreger, von den Saugadern der Conjunctiva des Auges. In f. Beitr. 3. Kuff. der Saugadern. 1r Bd. S. 244.

1546. Gaetano Uttini, dei vasi linfatici della placenta. Mem. dell' istituto nazionale italiano. Fisica e matem. Vol. I. P. 2. p. 309.

Vergleichende Anatomie.

1547. Franç. Magendie, mém. sur les organes de l'absorption chez les mammifères. à Paris 1809. 8.

Ueber die Lymphgefäßdrüsen der Walfische haben Abernethy, Phil. Transact. 1796. und Knox in Edinb. Med. and surg. Journ. Jul. 1824. p. 23. überf. in Frorieps Notizen, 1824. Aug. p. 51. sq. Untersuchungen gemacht.

1548. A. Monro, State of facts concerning the paracentesis of the thorax an account of air effused, and lymphatic vessels in oviparous animals. Edinb. 1770.

Ueber die Lymphgefäße der Vögel haben auch Hunter et Hewson, Phil. Tr. 1768. T. 58. 217. 1769. T. 59. p. 204. Beobachtungen gemacht.

1549. Lauth, Mém. sur les vaisseaux lymphatiques des oiseaux, in Annales des sc. naturelles. Paris 1825.

Ueber die der Amphibien, namentlich über die der Schildkröten, findet man bei Hewson, Kreuzshant und neuerlich bei Bojanus (siehe Th. I. S. 46. No. 635.) Beobachtungen. Hinsichtlich d. Fische ist das vorzüglichste Werk:

1550. *Vinenz Fohmann, das Saugadernsystem der Wirbelthiere. Erste 6 Hefen; das Saugadernsystem der Fische. Mit XIII. Steindrucktafeln. Heidelberg a. Leipz. 1827. Fol. Außerdem haben auch Hunter, Hewson und Monro Untersuchungen über die Saugadern der Fische angestellt.

Ueber das Gefäßsystem im Allgemeinen.

Gefäße des Körpers im weiteren Sinne des Wortes.

Gefäße, vasa, des menschlichen Körpers im weiteren Sinne des Wortes, nennt man häutige Röhren, in welchen sich Flüssigkeiten, mit einem andern Worte, Säfte, humores, des menschlichen Körpers bewegen. In diesem Sinne des Wortes unterscheidet man die Gefäße, welche Säfte zusammenleiten und sie dann aus dem Körper herausführen, vasa secernentia, oder auch vasa excernentia, ductus excertorii, Ausführungsgänge, von den Gefäßen, bei welchen es nicht der Fall ist, und welche Blut oder eine dem Blute ähnliche Flüssigkeit im Körper führen. Die Ausführungsgänge, ductus excertorii, machen einen Theil der offenen Höhlen aus (S. Th. S. 53), sie führen eine von dem Blute verschiedene, aus dem Blute abgesonderte Flüssigkeit, und ergießen dieselbe entweder in andere Stellen der offenen Höhlen, in die Nasenhöhlen, in die Luftröhre, in den Speisecanal, in die Harnwege und in die Höhle der Geschlechtstheile, oder sie führen sie an die äußere Oberfläche des Körpers und lassen sie durch Oeffnungen, die sich an der Haut befinden, abfließen. Die Werkzeuge, welche besonders dazu eingerichtet sind, diese Säfte aus dem Blute bereitet und abgesondert werden, und in die Ausführungsgänge übergehen, und in welchen daher die Ausführungsgänge in einem kleinen Raume mit unzähligen blutführenden Röhren in Berührung kommen, gehören zu den Drüsen, die man Drüsen, glandulae, oder drüsenartige Theile (S. Th. S. 432) nennt. Die Ausführungsgänge leiten also die Säfte, die von den Drüsen aus den blutführenden Röhren in sie hinübergetreten sind, zu weiteren, nach außen geöffneten, Behältern oder Canälen, oder zu der Oberfläche des Körpers selbst. So führen die Ausführungsgänge der Thränen-drüsen, ductus lacrimales, die Thränen an die Oberfläche der Augen, die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, ductus salivales, den Speichel in die Höhle des Mundes, die Ausführungsgänge der Schleimdrüsen, ductus excertorii glandularum mucosarum, den Schleim in sehr viele, mit Schleim überzogene Höhlen, der Ausführungsgang der Leber, ductus hepaticus oder bilialis, die Galle aus der Leber in das Mittelstück des Zwölffingerdarmes, der Ausführungsgang des Pankreas, ductus pancreaticus, den pankreatischen Saft aus dem Pankreas zu dem nämlichen Theile des Darmkanals, die Ausführungsgänge der Nieren, ductus uriniferi, den Harn in die Harnblase, die Ausführungsgänge der Hoden, ductus seminales, den Samen und die andern, zu den Geschlechtstheilen gehörenden Drüsen, ihre Säfte in die Höhlen der Geschlechtstheile, die Ausführungsgänge der Milchdrüsen, ductus lactei

die Milch bei den Frauen an die Oberfläche des Körpers, wohin auch alle Ausführungsgänge der Hautdrüsen, *folliculi sebacei*, die Hautsalbe bringen. Allein weil sich die Wände der blutführenden Canäle nicht auf eine sichtbare Weise in die der Ausführungsgänge fortsetzen, und mit ihnen also in keinem noch erkennbaren, ununterbrochenen Zusammenhange stehen, weil ferner die Häute, aus denen sie bestehen, sehr verschieden von denen der Ausführungsgänge sind, weil endlich im Gegentheile die Wände des Speisecanals, die der Canäle in den Geschlechtstheilen und die Haut selbst, in einem ununterbrochenen Zusammenhange mit den Wänden der Ausführungsgänge stehen, die sich an ihnen öffnen, und auch in vieler Rücksicht aus ähnlichen Häuten gebildet sind, so rechnet man, wenn man das Wort Gefäß im engeren Sinne gebraucht, die Ausführungsgänge nicht zu dem Gefäßsysteme, sondern man sieht diese baumsförmig verzweigten, mit verschlossenen Enden anfangenden, in den Luftwegen, im Speisecanale, in den Geschlechtstheilen und auf der Haut sich öffnenden Canäle als Fortsetzungen und Anhänge der Luftwege des Speisecanals, und der Canäle in den Geschlechtstheilen und der Haut an.

Adern oder Gefäße im engeren Sinne des Wortes.

Dagegen stehen die Wände aller Canäle, welche Blut oder blutähnliche Flüssigkeiten führen, und welche man mit einem Worte Adern nennt, in einem ununterbrochenen Zusammenhange untereinander, haben eine und dieselbe innere Haut, und bilden also ein einziges Ganzes, das man das Gefäßsystem, *systema vasorum*, nennt. Alle zu dem Gefäßsysteme zu rechnenden Canäle bilden zusammengenommen die Classe der mittleren Höhlen des Körpers (S. Th. 1. S. 54).

Blutgefäße und Lymphgefäße.

Das Gefäßsystem besteht aus 2 Classen von häutigen Röhren.

In der einen bewegen sich Säfte im Kreise herum, indem sie aus einem Netze sehr enger Röhren, von denen fast alle Theile des Körpers durchzogen sind, in größere und immer größere und weniger zahlreiche zusammengeleitet, und durch die 2 Höhlen in der rechten Hälfte des Herzens hindurch zu den Lungen geführt, daselbst in kleinere und immer kleinere Röhren vertheilt, und zu einem Netze sehr enger Röhren, das alle Abtheilungen der Lungen durchdringt, gebracht werden, von da aber wieder in größere und immer größere und weniger zahlreiche Röhren zusammengeleitet, dann durch die in der linken Hälfte des Herzens befindlichen 2 Höhlen hindurch geführt, von da in kleinere und immer kleinere Röhren zu fast allen Theilen des Körpers vertheilt und in das Netz der kleinsten Röhren, das fast alle Theile des Körpers durchdringt,

zurückgebracht werden. Die Säfte vollenden in diesem Röhrensysteme eine Bewegung, durch welche sie immer wieder an die nämlichen Stellen zurückgebracht werden, in denen sie schon mehrmals flossen, und die man daher den Kreislauf des Bluts nennt. Die erste Classe von Adern ist also die, in welchen der Kreislauf des Bluts geschieht.

In der 2ten Classe der Adern, d. h. der häutigen, zu dem Gefäßsysteme zu rechnenden Röhren, in den Lymphgefäßen, *vasa lymphatica*, bewegen sich Säfte, die sich auf dem Wege befinden, um in den Kreislauf zu gelangen, und welche also den Gefäßen des Kreislaufs zugeführt werden. Diese Röhren haben auf der einen Seite unzählige enge, nicht mit sichtbaren Oeffnungen versehene Enden, mittels deren sie Flüssigkeiten einsaugen, d. h. Flüssigkeiten aus der Umgebung in ihre Höhle hereinziehen, sich damit füllen, auch dieselbe fortbewegen, sie endlich in kleinere Röhren sammeln und in gewisse Gefäße des Kreislaufs ergießen. Diese Gefäße stehen daher nur mittels ihrer dickeren Enden, nicht aber mittels ihrer dünneren Anfänge mit den Gefäßen des Kreislaufs in Verbindung. Die dünneren Anfänge derselben liegen vielmehr theils an der Oberfläche der Haut und der offenen Höhlen an, und nehmen daselbst durch ihre unsichtbaren Poren Substanzen auf und führen sie in die Gefäße des Kreislaufs, und also mehr in das Innere des Körpers hinein, theils fangen sie an den geschlossenen Höhlen, die die innersten Höhlen des Körpers sind, an, nehmen also aus dem Innern des Körpers Substanzen auf und führen sie in die Gefäße des Kreislaufs, und also mehr nach außen.

Die Lymphgefäße bilden also einen Anhang an den Gefäßen des Kreislaufs, und die Säfte werden, so lange sie in ihnen befindlich sind, nicht in einem Kreisläufe herumgeführt. Weil diese Gefäße die Eigenschaft besitzen, auch wenn sie leer sind, Säfte von den benachbarten Stellen des Körpers in ihre Höhle hereinzuziehen und sich damit zu füllen, so nennt man sie auch Saugadern, *vasa resorbentia*. Denn die Gefäße des Kreislaufs können, wenn sie leer sind, sich nicht durch Einsaugung mit Flüssigkeit füllen, obwohl ihre Wände so durchdringlich sind, daß manche Substanzen, von dem in ihnen befindlichen Säfte angezogen, in sie eindringen können.

Gefäße des Kreislaufs im Allgemeinen.

Nimmt man auf die Beschaffenheit des Bluts Rücksicht, so kann man, wie bereits erklärt worden, im menschlichen Körper 2 Gefäßnehe unterscheiden. Beide bestehen aus sehr engen, durchsichtigen Röhren. In

in einen Neße wird das hellroth ankommende Blut in dunkelrothes, im andern das dunkelroth ankommende Blut in hellrothes verwandelt. Das erste Gefäß macht einen Bestandtheil fast aller Theile des Körpers aus, denn fast alle Theile des Körpers sind davon durchzogen. Das Blut ändert in ihm seine Farbe und wird dunkelroth, während es zur Ernährung aller dieser Theile beiträgt, das andere liegt in den Lungen, welche davon ganz durchzogen sind. Das Blut ändert in ihm seine Farbe, weil es daselbst beim Athmen der Luft ausgesetzt wird, und wird heller roth. Diese beiden sehr dichten Gefäßneße, die aus so engen Röhrchen bestehen, daß dieselben 5 mal dünner als manchen Stellen sogar 10 mal dünner als Kopshaare von mittlerer Dicke sind, stehen mit einander durch 2 aus größeren Röhren bestehende Röhrenleitungen in Verbindung. Jede von ihnen fängt, wie schon gesagt worden, in dem einen feinsten Neße mit wurzelförmig zertheilten Enden an, und hört, nachdem sich alle diese Röhren in eine einzige Röhre vereinigt haben, und diese hierauf von neuem in kleinere immer kleinere Röhren zertheilt worden ist, in dem andern Neße baumsförmig zertheilten Enden auf. Beide Röhrenleitungen stehen bei dem Erwachsenen nur mittels jener 2 feinsten Gefäßneße an ihren Enden mit einander in Verbindung. Man hat die Röhrchen jener feinsten Neße, weil sie so eng sind, Haargefäße, *vasa capillaria*, nennt, nicht als ob sie eine besondere Classe von Gefäßen ausmachten, sondern ihren eigenthümlichen Bau hätten, denn sie sind vielmehr die ununterbrochene Fortsetzung der größeren Röhren jener 2 Röhrenleitungen, die baumsförmig in Zweige getheilte Anfänge und Enden ohne eine deutliche Grenzlinie in einander übergehen.

Von den erwähnten, aus größeren Röhren bestehenden 2 Röhrenleitungen führt die eine dunkelrothes Blut aus dem Haargefäßneße aller Theile des Körpers in das Haargefäßneße der Lungen, die andere hellrothes Blut aus dem Haargefäßneße der Lungen in das Haargefäßneße des Körpers. Diese 2 Röhrenleitungen liegen in einer großen Strecke des Körpers neben einander, ohne jedoch bei Erwachsenen wechselseitig in eine andere Gemeinschaft als durch jene sehr engen Haargefäße zu stehen, beide haben an der nämlichen Stelle, und zwar da, wo die Wurzel jeder von diesen 2 Röhrenleitungen in eine einzige Hauptröhre zusammenzutreten, eine erweiterte, von Fleischfasern umgebene Stelle. Diese beiden neben einander liegenden erweiterten Stellen, von denen jede für sich von Fleischfasern umgeben ist, sind auch noch dadurch mit einander verbunden, daß sie auch von Fleischfasern, die ihnen gemeinschaftlich angehören, und die von einer Erweiterung auf die andere übergehen, umgeben werden, und daß sie in einem ihnen gemeinschaft-

lichen Sack eingeschlagen liegen. Diese erweiterte, von Fleischfasern umgebene, von einem häutigen Sack eingehüllte Stelle der 2 Röhrenleitungen nennt man das Herz, cor ¹⁾). Durch das Herz gehen daher 2 Röhren hindurch, durch die rechte Hälfte desselben die eine, die das dunkelrothe Blut aus allen Theilen des Körpers zu den Lungen führt durch die linke Hälfte desselben die andere, die das hellroth gewordene Blut aus den Lungen zu allen Theilen des Körpers führt. Das Herz leistet, weil es durch seine Fleischfasern mit großer Kraft zusammengebrückt werden kann, die Dienste eines Pumpwerks, durch welches das in den 2 Hauptröhren befindliche Blut fortgetrieben wird.

Nimmt man nicht sowohl auf die Farbe des Bluts, das in den Gefäßen, die zum Kreislaufe dienen, enthalten ist, als auf die Beschaffenheit der Wände derselben und darauf, ob sie das Blut dem Herzen zuführen, oder ob sie dasselbe vom Herzen wegführen, an, also, ob sie dem Drucke einer vom Herzen fortgestoßenen Flüssigkeit ausgesetzt sind oder nicht, Rücksicht; so theilt man die Blutgefäße in Arterien, arteriae, und Venen, venae, ein.

Jede von den beiden früher beschriebenen Röhrenleitungen besteht zum Theil aus Arterien, zum Theil aus Venen. Da wo die zu einer Röhrenleitung gehörenden Arterien und Venen sich vereinigen, liegt das Herz. Es giebt daher zweierlei Arterien und zweierlei Venen, die, welche hellrothes, und die, welche dunkelrothes Blut führen. Die Venen, welche das Blut nach dem Herzen hinführen, haben nicht den Druck, bei diesem fleischigen Pumpwerk durch das Fortstoßen von Blut hervorbringend auszuhalten, denn nur die Röhren, in welche das Blut aus den Pumpwerken eingetrieben wird, nicht aber die, welche dem Pumpwerk das Blut zufließen lassen und also vor ihm liegen, sind einem solchen Drucke ausgesetzt. Das Blut bewegt sich daher in den Venen mit keiner großen Gewalt vorwärts, und sie leisten ihm daher, ob sie gleich nur dünne Wände haben, doch den nöthigen Widerstand. Anders verhält sich mit den Arterien. Sie führen das Blut aus dem Herzen fort. In diese schon vom Blute vollen elastischen Röhren treibt das Herz während des Lebens wie ein Pumpwerk immer von neuem das seine mit großer Kraft geschehende Verengerung Blut ein, und bringt dadurch einen großen Druck in dem sie erfüllenden Blute, das sich schnell genug einen Ausweg findet, hervor. Dieses stark gedrückte Blut strebt, wie jede gedrückte Flüssigkeit, nach allen Richtungen auszuweichen

¹⁾ Die Fleischfasern, welche jeder Abtheilung des Herzens allein angehören, und welche von der einen Herzhälfte auf die 2te fortgehen und beiden Herzhälften gemeinschaftlich sind, bilden nicht 2 getrennte Lagen, sondern sind unter einander untrennlich verflochten.

und drückt daher auch heftig auf die Wände der Arterien und strebt sie auszubehnen. Diese aber sind dick und sehr elastisch, und geben zwar etwas nach, indem sie sich ein wenig, jedoch in kaum sichtbarem Grade der Quere nach, sehr beträchtlich aber der Länge nach, ausdehnen und dadurch dem vorwärts gedrückten Blute Platz verschaffen. Sie widerstehen aber der übermäßigen Ausdehnung durch ihre dicken und steifen Wände hinreichend. In dieser Dicke der Wände, durch welche sich die Arterien, ganz vorzüglich die größern, vor den Venen und Lymphgefäßen auszeichnen, liegt auch der Grund zu einer andern Verschiedenheit dieser 2 Classen von Gefäßen. Die Arterien nämlich, wenigstens die größeren, stehen wegen ihrer dicken steifen Wände immer offen, und werden, wenn sie von außen gedrückt werden, nicht so leicht völlig zusammengedrückt. Dagegen fallen die Venen, wenn sie leer sind, und wenn sie nicht durch die benachbarten Theile, an welchen sie angeheftet sind, auseinander gehalten werden, zusammen, d. h. ihre dünnen Wände legen sich an einander, auch werden sie durch eine äußere Kraft leicht zusammengedrückt und dadurch für das Blut ungangbar gemacht. Einer Störung des Blutlaufs durch einen äußern Druck auf die Venen ist indessen an denjenigen Stellen, wo sie einer Zusammendrückung ausgesetzt sind, dadurch vorgebeugt, daß in ihnen an vielen Stellen Klappen, die man auch Taschenventile nennen könnte, angebracht sind (eine Vorrichtung, die sich an den Arterien nur an einer Stelle, da wo sie vom Herzen das Blut empfangen, findet), daß ferner dasselbe Blut, welches zu einem Theile des Körpers durch eine Arterie hinfließt, von da durch mehrere zusammengenommen weitere und unter einander verbundene Venen zurückfließt, wodurch bewirkt wird, daß dem Blute, wenn ihm der Weg aus jenen Theilen in einer Vene versperrt wird, immer noch ein Weg durch eine andere Vene offen bleibt. Eine Folge davon, daß mehrere zusammengenommen weitere Venen das Blut zurückführen, welches eine einzige engere Arterie in einen Theil hingeführt hatte, und daß die Venen nicht offen stehen, sondern zusammensinken, ist, daß sie während des Lebens nicht alle in dem Grade angefüllt sind, als es ihr Durchmesser erlaubt, und daß die in ihnen vorhandene Blutsäule durch leere oder wenig erfüllte Stellen unterbrochen ist, während die Arterien im Leben immer voll, und daher von einer continuirlichen Blutsäule erfüllt sind. Dieser Umstand aber, daß die Venen nicht ohne Unterbrechung mit Blut angefüllt sind, macht selbst wieder die Gegenwart der Klappen nöthig. Denn in den Arterien, welche mit einer continuirlichen Blutsäule angefüllt sind, drängt das nachfolgende Blut das vorhergehende fort und hindert es zurückzuweichen. In den Venen ist dieses nicht der Fall. Hier müssen also Klappen dieses Zurückweichen

an den Orten hindern, wo sie vollkommen mit Blute erfüllt sind. Ein Ventil oder eine Klappe nennt man bekanntlich eine solche in Röhren angebrachte Vorrichtung, vermöge welcher eine in ihnen bewegte Flüssigkeit nicht gehindert wird, sich in der einen Richtung fort zu bewegen, durch welche sie aber, wenn sie in der entgegengesetzten Richtung zurück zu fließen anfängt, sich selbst den Weg versperrt. Dergleichen Ventile bringt man z. B. an den Pumpen der Brunnen und in den Luftpumpen an. In diesen Instrumenten sind Klappenventile und Regelventile im Gebrauche. Im Körper des Menschen und vieler Thiere befindet sich nun zu dem nämlichen Zwecke eine neue Vorrichtung dieser Art, auf die man in der Mechanik bisher nicht gefallen war, die der Taschenventile. In den Arterien liegen sie, wie gesagt, nur an einer einzigen Stelle, an der Oeffnung nämlich, durch welche das Blut aus dem Herzen in die Arterien eingetrieben wird, und sind daselbst so gestellt, daß sie das Blut hindern, in das Herz zurückzufließen; in den Venen kommen sie an vielen Stellen vor, und sind so gestellt, daß sie das Blut nicht hindern, nach dem Herzen hin zu fließen, sondern im Gegentheile ihm den Weg verschließen, wenn es sich nach den Theilen des Körpers, aus dem es herkommt, zurückzubewegen anfängt.

Diese Taschenventile am Anfange der Arterien und in den Röhren der Venen bestehen aus Falten der innersten Haut dieser Gefäße, welche in der Höhle derselben einen halbmondförmigen Vorsprung bilden. Jeder solche halbmondförmige Vorsprung stellt eine Tasche dar, welche mit den Taschen einigermaßen verglichen werden kann, die man in Kuttschen seitwärts anzubringen pflegt. Jede solche halbmondförmige Falte hat nämlich einen convergen parabolischen Rand, welcher inwendig an der Wand der Gefäße angeheftet ist, wodurch daselbst ein kleiner Wulst agger, entsteht, und einen concaven halbmondförmigen Rand, der an der Wand der Röhre nicht angeheftet ist, sondern davon absteht und also frei ist. An den beiden Spitzen, cornua, der halbmondförmigen Falte kommen diese 2 Ränder zusammen. Man sieht hieraus leicht von selbst, daß zwischen der halbmondförmigen Falte und der Wand der Röhre ein Zwischenraum befindlich ist, welcher nach der einen Seite an angehefteten Rande verschlossen, nach der andern Seite am freien Rande offen ist. Diese offene Seite ist in allen Röhren dahin gerichtet, wohin das Blut fließen soll, in den Venen nämlich ist sie nach dem Herzen zu, in den Arterien vom Herzen abgekehrt. Weil nun die offene Seite jeder solchen Tasche dahin, wohin das Blut fließen soll, die verschlossene Seite derselben aber dahin, wo es herkommen soll, gerichtet ist, so wird diese Bewegung des Blutes in der von der Natur bezweckten Richtung

durch die Klappen nicht gehindert. Denn das Blut drückt, wenn es in die Arterien aus dem Herzen einströmt, und in den Venen, wenn es nach dem Herzen hinströmt, diese Taschen an die Wand an, die daher vom Blute unerfüllt bleiben, und erhält sich dadurch den Weg offen; dagegen versperrt es sich selbst den Weg, wenn es aus den Arterien ins Herz, oder wenn es in den Venen nach den kleinen Zweigen zurückströmen anfängt, weil es dann in die Höhlen jener Taschen eindringt, sie anfüllt und aufblähet, wo dann die Falten aneinandergedrückt werden und die Höhle der Röhre verschließen. Das Blut wird folglich durch diese Vorrichtung gehindert, in einer andern Richtung als in der von der Natur bestimmten zu fließen. Die Arterien bedürften nur an einer Stelle, nicht an vielen Stellen der Klappen. Denn da sie immer von einer ununterbrochenen Blutsäule ganz und gar ausgefüllt sind, so kann das Blut in keinem ihrer Zweige rückwärts fließen, sobald es an ihrem Anfange, wo sie mit Klappen versehen sind, nicht zurückfließen kann. Die Venen dagegen sind an vielen Stellen, nicht vollkommen erfüllt, oder ganz unerfüllt; nach diesen Stellen zu würde daher das Blut leicht durch seine eigene Schwere zurücksinken, oder wenn ein Druck auf die Venen stattfindet, zurückweichen, würde dieses nicht durch die Klappen verhindert. Diese bewirken daher nicht nur, daß ein äußerer, auf die Venen wirkender Druck keine Störung im Laufe des Venenbluts hervorbringt, sondern sogar, daß ein solcher Druck die Vorwärtsbewegung des Bluts befördert. Faßt man nun also den Unterschied, der zwischen den Arterien und Venen stattfindet, kurz zusammen, und bezeichnet ihn zugleich möglichst genau, so ergiebt sich folgendes:

Die Arterien, Schlagadern oder Pulsadern, *arteriae*, sind runde, häutige, mit einer äußerst glatten innern Oberfläche versehene, elastische Röhren, welche dickere Wände als die andern Gefäße besitzen, sich namentlich durch eine mittlere, in gelbliche Cirkelfasern theilbare elastische Haut auszeichnen, vermöge deren sie auch dann, wenn sie leer sind, nicht zusammensinken, sondern offen stehen, der Zusammendrückung von außen her, so wie auch der Ausdehnung, die sie von innen her durch das in ihnen enthaltene Blut erleiden könnten, mehr als andere Gefäße widerstehen, und dabei eher zerreißen, als sehr ausgedehnt werden. In sie wird das Blut von den fleischigsten Abtheilungen des Herzens eingetrieben, und in Gestalt einer ununterbrochenen Blutsäule aus wenigeren größeren Röhren in immer zahlreichere und kleinere bewegt.

Venen, Blutadern, *venae*, sind runde, häutige, mit einer äußerst glatten innern Oberfläche versehene Röhren, welche dünnere Wände als die Arterien, aber dickere Wände als die Lymphgefäße besitzen, einer deutlich darstellbaren, mittleren, faserigen Haut entbehren, und niemals

deutliche Cirkelfasern, sondern, wenn überhaupt Fasern, die eine bestimmte Richtung haben, an ihnen unterscheidbar sind, Längenfasern besitzen, wegen ihrer dünneren Wände, wenn sie leer sind, zusammenfallen, wenn sie voll sind, ihr Blut durchschimmern lassen, wenn sie mit Gewalt gefüllt werden, sich leichter übermäßig ausdehnen, als zerreißen, durch Druck von außen her leicht zusammengedrückt werden, und an solchen Stellen, wo sie einem solchen äußern Drucke unterworfen sind, im Innern Klappen besitzen, welche die rückgängige Bewegung des Bluts hindern. Uebrigens sind die meisten vielfach untereinander verbunden, so daß dem Blute, wenn ihm ein Weg versperrt wird, noch mehrere andere Wege offen stehen. In ihnen wird endlich das mit geringerer Gewalt bewegte Blut den von dünnen Wänden umgebenen Abtheilungen des Herzens so zugeführt, daß es sich dabei aus vielen kleineren Röhren in weniger großen bewegt, und keineswegs eine ununterbrochene Blutssäule bildet, sondern oft unerfüllte Stellen, oder solche, die an vielen Stellen, nicht so, wie es ihr Durchmesser erlaubt, angefüllt sind, zwischen sich hat.

Beweise für den Kreislauf des Bluts.

Daß ein großer Theil des Bluts, der durch die Arterien vom Herzen aus in einen Theil des menschlichen Körpers geführt wird, durch die Venen nach dem Herzen zurückkehre, und daß es folglich keineswegs durch die nämlichen Blutgefäße zu ihm zurückkehre, durch welche es vom Herzen aus zu den Theilen hingebracht worden war, beweisen bekanntlich die schon vorhin erwähnten Ventile in den Venen, am Anfange der Arterien und im Herzen, welche dem Blute in einem jeden Gefäße nur nach einer Richtung sich zu bewegen gestatten, in den Arterien vom Herzen aus nach den Theilen des Körpers hin, in den Venen von den Theilen des Körpers aus, nach dem Herzen hin; ferner Beobachtungen am lebenden Menschen: denn wenn ein Glied durch ein umgelegtes Band stark genug zusammengeschnürt wird, häuft sich das Blut, welches durch das Band zu dem Herzen zurückzufließen gehindert wird, in den Venen an, und es schwellen daher die Venen in demjenigen Theile des Gliedes an, welcher entfernter vom Herzen liegt, als das Band, während die Venen in dem andern Theile des Gliedes zusammenfallen, welcher dem Herzen näher ist als das Band, und wohin es von dem entfernteren Theile des Gliedes aus zu fließen durch das Band gehindert ist; endlich Beobachtungen an lebendig geöffneten Thieren: denn verhindert man das Blut, indem man den Stamm der Körperarterie im Unterleibe eines lebendigen Thiers durch ein Band zusammenschnürt, vom Herzen aus in die Hinterfüße zu gelangen, ohne dem im Gliede befindlichen Blute den Rückweg nach

dem Herzen zu versperren, so wird das Glied schnell vom Blute entleert; verhindert man dagegen das Blut, indem man den Stamm der Aepervoene im Unterleibe durch ein Band zusammenschnürt, von den Hinterfüßen aus nach dem Herzen zurückzufließen, ohne daß dem in diese Glieder vom Herzen aus einströmenden Blute der Weg versperret wird, so häuft sich das Blut in den Hinterfüßen an, sie schwellen davon auf, und es entsteht die zuerst von Lower beobachtete Ansammlung von Blutwasser im Zellgewebe und in der Unterleibshöhle, welche der ähnlich ist, die man bei Wasserfüchtigen findet.

Daß nun aber der größere Theil des durch die Arterien in ein Organ des Körpers geführten Blutes in einem ununterbrochenen Ströme in die Venen gelange, und durch dieselben zum Herzen zurückkehre, und daß also nur ein geringerer Theil der in den Blutgefäßen enthaltenen Flüssigkeit aus ihnen austrete und Behufs der Ernährung in die Substanz der Theile gelange, beweisen folgende Umstände. Bei lebenden Menschen kann in äußerst kurzer Zeit ein großer Theil alles Bluts durch eine einzige geöffnete Vene ausfließen. In durchsichtigen Theilen lebender Thiere sieht man mit dem Vergrößerungsglase die Blutkügelchen sich in den Höhlen der durchsichtigen kleinsten Adern fortbewegen, die Ströme der Blut zuführenden Arterien bringen das Blut in ein Netz von kleinen Canälen, in welchem es, ohne eine sichtbare Unterbrechung der Strömung zu erleiden, bis zu den Venen hinläuft, die es wieder nach dem Herzen hinführen. *Malpighi*¹⁾ hat diese Bewegung des Bluts zuerst an der Urinblase, am Gekröse und an den Lungen eines Frosches, *Leeuwenhoek*²⁾ am Schwanz der Froschlurven und der Fische gesehen, worauf sie von *Spallanzani*³⁾, *Haller*⁴⁾ und von einer großen Menge neuerer Naturforscher genau untersucht und auch von *W. Cowper* an durchsichtigen Theilen warmblütiger Thiere, namentlich am Gekröse eines Hundes und im Omentum einer Katze gesehen worden ist. Ungeachtet diese Beobachtung des Durchgangs des Bluts durch die Haargefäße bei warmblütigen Thieren große Schwierigkeiten hat, weil der Blutlauf bei ihnen nach beträchtlichen Verletzungen schnell stillsteht, und das Blut schnell gerinnt, haben doch *Reichel*, *Harless* und *Oesterreicher*⁵⁾ denselben gleichfalls wiederholt gesehen, und viele von denjenigen, welche sich neuerlich mit der Beobachtung des Hühnchens im bebrüteten Ei beschäftigten, haben sich von diesem Uebergange bei dem Vogel *castris* überzeugt.

¹⁾ *Malpighi*, siehe *Haller*, *Elementa physiol.* Lib. III. Sect. 3. §. 20.

²⁾ *Leeuwenhoek*, *Epist.* 59. p. 15, und bei *Haller* a. a. O.

³⁾ *Spallanzani*, Dell' azione del cuore ne vasi sanguini, in Modena 1768. 8. übers. in den mathematisch phys. Abhandlungen. Leipzig 1769, und *Dei risulti de fenomeni della circolazione osservata nel giro universale de' vasi etc.* Modena 1773. übers. ins Franz. v. *Tourdes*. Siehe *Oesterreicher*, Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislaufe des Bluts. Nürnberg 1826. 4. p. 13.

⁴⁾ *Haller*, *Opera minora.* Tom. I. p. 1.

⁵⁾ *Oesterreicher*, a. a. O. S. 15, hat den Durchgang des Bluts durch die Haargefäße an mehreren und verschiedenen Säugethieren mit eben der Deutlichkeit, als an kaltblütigen Thieren gesehen. Man findet in seiner Schrift auch die Beobachtungen

Da man nun, wie ich selbst bezeugen kann, den Durchgang Bluts durch die Haargefäße bei Kaltblütigen Thieren schon mit gut gerichteten Lupen zu beobachten im Stande ist, die (von ihrem Mittel aus gerechnet) 2 bis 3 Linien Brennweite haben, und folglich 32 bis 48 mal im Durchmesser vergrößern, so ist bei diesen Beobachtungen keine Gefahr der mikroskopischen Täuschung vorhanden.

Aber auch durch andere Versuche an lebenden und todten Thieren so wie am Leichname des Menschen, läßt sich ein ununterbrochener Bergang von Flüssigkeiten aus den Arterien durch die Haargefäße hindurch in die Venen sichtbar machen.

Denn man kann Wasser, Quecksilber und gefärbte Flüssigkeiten welche einen aufgelösten Farbstoff enthalten, bei lebenden Thieren bei todten Menschen aus den Arterien durch die Haargefäße in die Venen hinüberdrücken, ohne einen stärkeren Druck anzuwenden, als jenige ist, welchem das Blut während des Lebens in den Arterien gesetzt ist.

Hales¹⁾ brachte eine $4\frac{1}{2}$ Fuß lange, senkrechte Glasröhre mit ihrem gekrümmten kupfernen Ende in die Halsschlagader eines lebenden Hundes: in Richtung nach den Venen derselben, und band sie fest, durch das andere trichterförmige Ende derselben füllte er die Röhre voll Wasser, welches die Temp. des Bluts hatte, und erhielt sie durch Nachgießen desselben voll. Das welches er gleichzeitig aus der geöffneten Jugularvene ausfließen ließ, wurde desto mehr mit warmen Wasser verdünnt, je länger er diesen Versuch fortsetzte. Von der Zeit an, da das Thier starb, floß aus der Vene weniger Blut Wasser aus, als zuvor; indessen reichte es schon hin, um die Menge der aus der Vene ausfließenden Flüssigkeit wieder zu vermehren, daß Hales eine 10 Fuß lange Röhre (von $9\frac{1}{2}$ Fuß) in die Arterie einbrachte und füllte. Da nun das Wasser in einer leeren Röhre, die in die carotis eines ähnlichen Hundes in der Nähe nach dem Herzen zu eingebracht wird, nach den Versuchen von Hales fast so hoch, und bei manchen Hunden noch höher emporsteigt als $4\frac{1}{2}$ Fuß, und eine $4\frac{1}{2}$ Fuß hohe Blutsäule dem in den Arterien vorwärts gedrückten Blut das Gleichgewicht hält, so sieht man aus dem von Hales angestellten Versuche ein, daß ein mäßiger Druck, der dem gleichkommt, unter welchem das Blut in den Arterien lebender Thiere steht, schon hinreicht, um bei lebenden Thieren Wasser aus den Arterien in die Venen überzutreiben.

Magendie²⁾ schnürte nahe am Unterleibe den Schenkel eines Hundes durch ein Band zusammen, ohne jedoch die Schenkelarterie und die Schenkelvene einzubegreifen. Wenn er nun die Schenkelvene am Hüftgelenke durch ein sonderes Band zuband, so schwoll sie von dem Blute, welches aus dem Schenkel zurück und weiter nach dem Herzen fortzukießen gehindert war, auf, und ihr Blut, wenn eine kleine Oeffnung in dieselbe gemacht wurde, mit einem kräftigen hohen Strahle herausspringen. Während dieses geschah, drückte nun Magendie die Schenkelarterie zwischen den Fingern zusammen, und verhinderte

¹⁾ Anderer aufgeführt, z. B. die von Reichel, de sanguine ejusque motu. 1767. Exp. 5. 14. 15. und Hales Untersuchungen über den Blutlauf in warmblütigen Thieren. Rheinische Jahrbücher, B. VII. St. 2. 1823.

²⁾ Hales, Haemastatique ou la statique des animaux, expériences hydrauliques faites sur des animaux vivans, traduit par Mr. de Sauvages, à Geneve 1744. p. 95.

³⁾ Magendie, Grundriss der Physiologie. übersetzt von C. F. Heusinger. Wien 1820. 8. B. II. S. 314.

dadurch das Blut vom Herzen aus zu dem Schenkel zu gelangen. Der Strahl des aus der Schenkelvene ausströmenden Blutes dauerte nun zwar noch einige Augenblicke fort, so lange nämlich, bis sich die Schenkelarterie ihres Blutes entleert und sich zusammengezogen hatte. Wenn er nun aber aufhörte, die Schenkelarterie mit den Fingern zusammenzudrücken, so daß also das vom Herzen kommende Blut wieder in die Schenkelarterie eintreten konnte, so fing das Blut, so bald es wieder in die kleinsten Zweige gelangt war, von neuem an aus der Schenkelvene auszufließen, und der Blutstrahl stellte sich wieder her. Wendete er nun den Versuch so ab, daß er, anstatt das vom Herzen kommende Blut in die Schenkelarterie eintreten zu lassen, lauwarmes Wasser in die Schenkelarterie einspritzte, so drang Wasser aus der Schenkelvene hervor, und mit je größerer Kraft er diese Einspritzung machte, um so schneller strömte es aus der Vene heraus. Gleiche Versuche mit demselben Erfolge haben *Cross*¹⁾ an der Arteria carotis und Vena jugularis eines lebenden Hundes, und *Wedemeyer*²⁾ und *Günther* an der Arteria und Vena brachialis lebender Pferde angestellt. Das Wasser drang bei *Wedemeyer*'s Versuchen, nachdem sich die Vene damit gefüllt hatte, so stark mit einem Sprunge aus der Vene, als der Stempel niedergedrückt wurde, und das Ausfließen ließ nach, so wie nicht mehr eingespritzt wurde. Eßig ging anfangs fast mit derselben Leichtigkeit als Wasser aus den Arterien in die Venen über. Wenn aber mehrere Spritzen voll eingespritzt worden waren, ging er schwerer über, und rieselte nur in einem schwachen Strome aus den Venen. Brandwein ging sogleich anfangs schwerer in die Venen über, als Wasser, und so nur in einem Strome, aber nicht sprungweise aus.

*Hales*³⁾ trieb bei einem Hunde 100 Minuten lang Wasser durch den Druck einer $\frac{1}{2}$ Fuß hohen Wasserfäule aus den Arterien in die Venen, und reinigte dadurch die Blutkanäle vom Blute. Hierauf spritzte er eine Flüssigkeit, welche aus gelbem Fette, Harze, Terpentinöl und Sannoer bereitet worden, in die Arterien, durch eine $4\frac{1}{2}$ Fuß hohe erwärmte Röhre vermöge des Drucks ein, den die die Röhre anfüllende Flüssigkeit hervorbrachte. Die Flüssigkeit ging mit einer beträchtlichen Menge Sannoer gefärbt in die Venen der Gallenblase über, und noch viel mehr Sannoer wurde in den Arterien zurückgehalten. Auf ähnliche Weise trieb er eine solche Flüssigkeit aus den Arterien in die Venen des Magens, der Gedärme und der Harnblase hinüber. *Janke*⁴⁾ endlich füllte die Venen der Haut des Menschen durch flüssig gemachtes Wachs, das er in die Arterien eintrieb, sehr vollkommen an.

Alle diese Erfahrungen lassen keinen Zweifel übrig, daß das Blut in einem Strome aus den Arterien in die Venen übergehe.

Haargefäße.

Bedeutung des Wortes Haargefäß.

Die Haargefäße⁵⁾ sind die engsten, fast alle Teile des Körpers durchdringenden Röhren, welche den Uebergang des Blutes aus den

¹⁾ *J. C. Cross*, An essay on the circulation of the blood; in the medical recorder. Philadelphia 1827. April p. 298.

²⁾ *Wedemeyer*, Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und Capillargefäßen, mit erklärenden Hindeutungen auf pathologische Erscheinungen. Hannover 1828. S. S. 180.

³⁾ *Hales*, Haemastatique, traduit par *Sauvages*. Geneve 1764. 4. p. 132.

⁴⁾ *J. G. Janke*, de ratione venas c. h. angustiores imprimis cutaneas ostendendi. 1762. 4.

⁵⁾ Ein Werk, welches eine genaue Abbildung der Haargefäßneze des menschlichen Körpers an allen Stellen liefert, an welchen es eine verschiedene Form hat, giebt es nicht.

Arterien in die Venen vermitteln, und auch hinsichtlich des Baues und der Dichte ihrer Wände, der Richtung ihrer Zweige und der Farbe des Bluts, daß sie führen, zwischen den Arterien und Venen in der Mitte liegen, so daß man oft nicht bestimmt angeben kann, von wo an sie Venen oder Arterien genannt zu werden verdienen. Ihre Wände sind äußerst dünn und durchsichtig, so daß man nicht mehrere Häute und keine Faserlagen, die eine bestimmte Richtung hätten, an ihnen unterscheiden kann. Ihre Vertheilung in Zweige geschieht an vielen Stellen auf eine solche Weise, daß von den vielen Röhren, die aus einer Röhre abgehen, oder die in eine Röhre zusammentreten, dieser an Größe ganz oder ziemlich gleich sind, und

und selbst gute naturgetreue Abbildungen derselben an einzelnen Stellen sind selten. Die beste ist die von *Soemmerring* gegebene, welche *Opusc. I. Tafel a. Fig. 3* copirt ist. Sie stellt das feinste Blutgefäßnetz an der Aderhaut des Menschen dar.

S. Th. Soemmerring, Ueber das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Aepfel, vorgelesen den 9ten Mai 1818. Denkschriften der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München für das Jahr 1818.

Außerdem findet man Abbildungen von Haargefäßen in folgenden, zum Theil von *Soemmerring* a. a. O. schon angeführten Schriften: *Ruyssch*, Opera omnia. Amstelodami 1710 — 1722. Tomi III. 4. enthalten viele, aber nicht vorzügliche Abbildungen der Haargefäße.

Möller, Diss. exhibens observationes circa tunicam retinam et nervum opticum. Magdeb. 1749. recens. in *Haller select. diss. anat. Vol. VII.* — *Lieberkühn*, de fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis. Lugd. Batav. 1745 (mit Kupfertafeln, die *Lyonet* gearbeitet). — *Zinn*, descriptio anatomica oculi humani. Göttingen 1753. ed. altera edita ab *H. A. Wriese*. 1780. — *Wrisberg*, Novi Commentarii soc. reg. Götting. 1772. Tab. I. — *Jo. Gottl. Walter*, De venis oculi summatim. Berolini 1778. — *Fr. Aug. Walter*, Annotationes academicae. Berolini 1786, de hepate tabula H. — *Bleuland*, Obs. de sana et morbosa oesophagi structura. Lugd. Bat. 1783. — *Ejusd.* Experimentum anatomicum de arteriolarum lymphaticarum existerentia. Lugd. Bat. 1784. — *Ejusd.* Vasculorum in intestinorum tenuium tunicis et villis anatomes opera detegendorum descriptio iconibus ad naturae fidem pictis illustrata. Lugd. Batav. 1797. — *Ejusd.* icones anatomico-physiologicae partium corporis humani et animalium, quae in descriptione methodico - trajectani inveniuntur. Fascic. I. c. tabb. VI. Trajecti ad Rhenum 1826. 4. — *Mascagni*, Vasorum lymphaticorum corporis humani historico-ichnographia. Senis 1787. fol. Tab. III. fig. 22. — *Ejusd.* Prodomo ad grande anatomia. Firenze 1819. fol. (auf den Figuren, welche insicirte Haargefäße darstellen). — *S. Th. Soemmerring*, Icones oculi humani. Francofurti 1804. Tab. VI. — *Ejusd.* Icones organi auditus. Francofurti 1806. c. Tab. III. — *Ejusd.* Icones organorum gustus et vocis. Francofurti 1808. Tab. I. — *Ejusd.* Icones organi olfactus. Francofurti 1810. c. Tab. II. und in den Denkschriften d. Königl. Acad. d. Wiss. in München. B. I. (Gefäße des Gehirns.) — *Reissisen*, Ueber den Bau der Lungen. Berlin 1822. Fol. Tab. III. — *B. W. Seiler*, Naturlehre des Menschen, mit Bemerkungen aus der vergleichenden Anatomie für Künstler und Kunstfreunde, 1. Heft mit 4 Kupf. Tab. I. — *Döllinger*, de vasis sanguiferis, quae villis intestinorum hominum utriusque insunt. Monachii 1828. 4. — *R. Köle*, Ueber den Bau und die Krankheiten der Bindehaut des Auges, mit besonderem Bezuge auf die contagiöse Augenentzündung, nebst einem Anhang über den Verlauf und die Eigenthümlichkeiten der letzteren unter der Garnison von Wien. Mit 3 illum. Kupf. Wien 1828. 8. — *C. E. v. Baer*, Untersuchungen über die Gattungsverbindung zwischen Mutter und Frucht in den Säugethieren. Ein Glückwunsch zur Jubelfeier *Sam. Thom. v. Soemmerring's*, mit einer hundertgedruckten und illum. Tafel. Leipzig 1828. Fol.

Es sie sich so häufig unter einander vereinigen, daß man diese Zertheilung der Röhren mehr mit der Zertheilung und Vereinigung der Fäden des Netzes, als mit der der Zweige eines Baums vergleichen kann. Das Blut, das die Arterien in die Haargefäße des Körpers bringen, verwandelt nur sehr allmählig seine hellrothe Farbe in eine dunkelrothe, und eben so verwandelt das in den Haargefäßen der Lungen bewegte Blut nur sehr allmählig seine dunkelrothe Farbe in eine hellrothe, und giebt daher kleine Röhren, in welchen es weder hellroth noch dunkelroth ist, und welche man daher auch nicht wegen ihrer hellen oder dunkeln rothen Farbe für Arterien oder Venen erklären kann. Außerdem wird es noch dadurch schwerer, sehr kleine Arterien an der hellrothen Farbe ihres Blutes von sehr kleinen Venen zu unterscheiden, weil das Blut in den kleinsten Blutgefäßen wegen der starken Vergrößerung, die man anwenden muß, um diese kleinen Gefäße zu sehen, nur eine sehr blasse, kaum erkennbare rothe Farbe hat.

Die Wand der Haargefäße.

Die Wände der kleinsten Haargefäße, z. B. die an den durchsichtigen Theilen lebender Thiere, sind so durchsichtig, daß man sie selbst mittels des Mikroskops nicht, sondern nur die Körnchen in der Flüssigkeit, die sie enthalten, sehen kann, die man aber oft bei lebenden Thieren in den Haargefäßen so deutlich sieht, daß man sehr genau ihre Gestalt erkennt. Nicht selten wird man zu beiden Seiten der Blutströmchen eine helle oder eine dunkle Grenzlinie gewahr, welche die im Blutströme vorbeitreibenden Blutkörnchen nicht überschreiten. Man muß daher eine Begrenzung der Höhle dieser kleinen Blutgefäße annehmen, ob man sie gleich wegen ihrer Durchsichtigkeit nicht immer sehen kann. Hätten die Haargefäße keine häutige Begrenzung, wären sie nur ausgehöhlte Wege, welche sich das Blut in dem weichen Thierstoffe selbst gebahnt hätte, so würde jeder geringfügige Druck diese Canäle ihrer Form, Zahl und Lage nach verändern, indem er bewirken würde, daß der weiche Thierstoff an den Stellen, an denen er gedrückt wurde, zusammenflüchte, wodurch das Blut genöthigt werden müßte, sich in ihm, anstatt der verschlossenen, neue Wege zu bahnen.

Menge der Haargefäße in verschiedenen Theilen.

Die Haargefäße sind der Sammelplatz und das Ziel des Blutes. Denn in ihnen ist die größte Menge desselben enthalten, in ihnen fließt es am langsamsten, in ihnen kommt das in die kleinsten Strömchen zertheilte Blut in eine sehr innige Berührung mit den Wänden der Blutgefäße, und ist daselbst unstreitig dem Einflusse der Nerven aus-

36 Menge der Haargefäße in verschiedenen Theilen.

gesetzt, in ihnen erleidet daher auch das Blut die sichtbarsten Veränderungen seiner Farbe und chemischen Beschaffenheit, und leistet Körper die wesentlichen Dienste, zu denen es bestimmt ist. Die groβ Blutgefäße dagegen sind nur die Wege, durch welche das Blut den Haargefäßen des Körpers in die Haargefäße der Lungen und gekehrt gelangt.

Nach Hales ¹⁾, welcher die Haargefäße der Gedärme durch gefärbt starrende Flüssigkeiten anfüllte, hat der Theil des Haargefäßnetzes, welcher den Venen in der nächsten Verbindung steht, engere rundlichere Zwischen (Maschen), als der, welcher mit den Arterien näher zusammenhängt, der sich eckige und oft rechrwinklische Zwischenräume auszeichnet. Die Röhren, aus sie bestehen, scheinen auch beträchtlich dicker zu sein.

Nicht in allen Theilen des Körpers aber sind die Haargefäße groβ und ihre Neze gleich dicht, d. h. nicht in allen Theilen die baumsförmig getheilten Arterien in die wurzelsförmig zusammen den Venen so über, daß ein Netz von gleichförmig dicken Gefäßen dazwischen liegt, und nicht in allen Theilen endlich machen Haargefäße einen gleich groβen Theil der Substanz der Organe sondern in manchen Theilen liegt in den groβen Zwischenräumen Haargefäßneze viel Substanz, welche nicht aus blutführenden Röhren besteht, in andern liegt zwischen den engeren Netzen derselben solche Substanz. Von diesem Verhältnisse der Zahl der Blutgefäße den Organen zu der Menge der Substanz in denselben, die weiter blutführenden Röhren enthält, hängen, wie Th. I. S. 175 g worden ist, viele sehr wichtige physikalische Eigenschaften und Eigenschaften der Theile ab. Man kann dieses Verhältniß in durchsichtigen Theilen lebender Thiere durch die Beobachtung des Blutlaufs mittels des Mikroskops erkennen, in undurchsichtigen Theilen aber durch eine sehr vollkommene Anfüllung der Haargefäßneze mittels einer festwerdenden, undurchsichtigen, zusammentrocknenden Materie sichtbar machen; denn indem man diese trocknet, wird ihre Substanz, wenn sie nicht zu dick ist, durchsichtig, vor wenn man sie, bevor man sie betrachtet, in Terpentinöl einweicht und dann einem durchsichtigen Lacke überzieht, wo man dann die angefüllten Gefäße ihnen erkennen kann. Auch sieht man es den Theilen schon während des Lebens an, ob sie sehr dichte Blutgefäßneze einschließen oder nicht. Denn da das Blut oder eine rothgefärbte eingespritzte Flüssigkeit durch die durchsichtigen Theile durchschimmert, so sehen Organe, welche sehr dichte Blutgefäßneze einschließen, roth oder röthlich, diejenigen aber, welche keine, oder Blutgefäßneze mit groβen Zwischenräumen einschließen, nicht roth, sondern weiß oder gelblich aus, und sind durchsichtig, selbst wenn sie dick sind. Daß nun diese gleichförmige rote Farbe, wie wir sie an den Rippen, an der ihrer Oberhaut beraubten Leber am Fleische und an vielen Theilen bemerken, wirklich von dem durch die durchsichtigen blutführenden Röhren schimmernden Blute herrühre, kann man beweisen, daß solche im Tode blaß gewordene Theile dadurch, daß man die Gefäße mit einer rothen Materie sehr vollkommen anfüllt, wieder roth werden und daß man dennoch, wenn man sie hierauf mit Hilfe des Mikroskops in trockeneten Zustande betrachtet, nur die Neze der Haargefäße, nicht aber die Zwischenräume der Substanz der Theile mit der eingespritzten Materie erfüllt

¹⁾ Hales, Haemastatique, traduit par Sauvages. GENEVE 1744. 4. p. 131

Dagegen verändern die Theile, welche keine sehr dichten Blutgefäßnetze enthalten, ihre Farbe auch nach dem Tode nicht, wenn ihre Blutgefäße mit einer getrübten Flüssigkeit angefüllt werden. Von dem durchschimmernden Blute rührt es auch her, daß z. B. die Fingerspitze röther aussieht, wenn man das Blut, indem man einen Finger umfaßt und drückt, nöthigt, sich daselbst anzuhäufen, daß aber die Röthe desselben sogleich verschwindet, wenn der Druck nachläßt, und umgekehrt, daß eine sehr rothe Stelle der Haut, auf die man mit der Fingerspitze einen Druck ausübt, unter der Fingerspitze und im nächsten Umkreise derselben blaß wird, augenblicklich aber ihre rothe Farbe wieder annimmt, wenn der Druck aufhört.

Auf dem Mangel aller Blutgefäße in gewissen Theilen beruht zum Theil die Bd. I. S. 170 vorgetragene Unterscheidung der einfachen und zusammengesetzten Gewebe, auf der geringeren Zahl der Haargefäße der zusammengesetzten Gewebe die zwei in Bd. I. S. 173 und 175 bezeichneten Unterabtheilungen.

Unter den von einem sehr dichten Haargefäßnetze durchdrungenen Theilen des Körpers zeichnen sich wieder diejenigen aus, welche Blut in größerer Menge aufnehmen, weil es nicht bloß zu ihrer Ernährung, sondern auch zur Bereitung und Absonderung gewisser Säfte dient. Dieses ist nämlich an der inneren Oberfläche der von einer Schleimhaut überzogenen Canäle, der Luftwege, des Darmcanals, der Harn- und Geschlechtswege, der Ausführungsgänge der Drüsen und an der äußeren Oberfläche der Lederhaut der Fall. An allen diesen Stellen haben die durch das Mikroskop erkennbaren Haargefäßnetze eine andere Gestalt, als in den Theilen, in welchen das Blut nur zur Ernährung der Substanz der Organe dient, und sowie alle diese Theile einen ähnlichen Zweck, den der Bereitung und Ausscheidung von Säften auf eine Oberfläche haben, so haben auch die Haargefäßnetze in denselben eine gewisse Aehnlichkeit. Ganz an der Oberfläche dieser Säfte-absondernden Häute nämlich liegt das engste Netz, welches diese Organe enthalten, so ausgebreitet, daß die untereinander zusammenhängenden Röhrchen längs der Oberfläche hinlaufen und in einer möglichst großen Berührung mit der Oberfläche sind.

Die Röhrchen, aus denen die Haargefäßnetze bestehen, sind ziemlich von einem und demselben Durchmesser, und daher sehen sie sehr gleichförmig und gitterartig aus, so daß Stämme und Zweige nicht unterschieden werden können. Dabei sind die Zwischenräume der Netze im Verhältnisse zu dem Durchmesser der Röhrchen, aus welchen sie zusammengesetzt sind, sehr eng. Die Röhrchen selbst aber sind nicht so eng, als die feinsten Blutgefäße, welche sich im Gehirn, in den Nerven und in den Muskeln zum Zwecke der Ernährung dieser Theile befinden.

Nutzen der verschiedenen Einrichtung der Haargefäßnetze.

Die so eben beschriebene Einrichtung dieser Netze hat den Nutzen, daß ein jeder Blutstropfen recht lange dicht an derjenigen Oberfläche hingeführt werde, auf welche die aus ihm abzusondernden Säfte austre-

gesetzt, in ihnen erleidet daher auch das Blut die sichtbarsten Veränderungen seiner Farbe und chemischen Beschaffenheit, und leistet Körper die wesentlichen Dienste, zu denen es bestimmt ist. Die großen Blutgefäße dagegen sind nur die Wege, durch welche das Blut den Haargefäßen des Körpers in die Haargefäße der Lungen und gekehrt gelangt.

Nach Hales¹⁾, welcher die Haargefäße der Gebärmere durch gefärbte starrende Flüssigkeiten anfüllte, hat der Theil des Haargefäßnetzes, welchen die Venen in der nächsten Verbindung sieht, engere runderere Zwischenräume (Maschen), als der, welcher mit den Arterien näher zusammenhängt, der sich eckige und oft rechtwinkliche Zwischenräume auszeichnet. Die Röhren, aus sie bestehen, scheinen auch beträchtlich dicker zu sein.

Nicht in allen Theilen des Körpers aber sind die Haargefäße groß und ihre Neze gleich dicht, d. h. nicht in allen Theilen die baumförmig getheilten Arterien in die wurzelsförmig zusammen den Venen so über, daß ein Netz von gleichförmig dicken Gefäßen dazwischen liegt, und nicht in allen Theilen endlich machen Haargefäße einen gleich großen Theil der Substanz der Organe sondern in manchen Theilen liegt in den großen Zwischenräumen Haargefäßneze viel Substanz, welche nicht aus blutführenden Röhren besteht, in andern liegt zwischen den engeren Nezen derselben solche Substanz. Von diesem Verhältnisse der Zahl der Blutgefäße den Organen zu der Menge der Substanz in denselben, die weiter blutführenden Röhren enthält, hängen, wie Th. I. S. 175 geworden ist, viele sehr wichtige physikalische Eigenschaften und Lebensgeschaffen der Theile ab. Man kann dieses Verhältniß in durchsichtigen Theilen lebender Thiere durch die Beobachtung des Blutlaufs mittels des Mikroskops erkennen, in undurchsichtigen Theilen aber durch eine sehr vollkommene Anfüllung der Haargefäßneze mittels einer festwerdenden, undurchsichtigen, zusammentrocknenden Materie sichtbar machen; denn indem man diese trocknet, wird ihre Substanz, wenn sie nicht zu dick ist, durchsichtig, vor wenn man sie, bevor man sie betrachtet, in Terpentinhaut einweicht und da einem durchsichtigen Lacke überzieht, wo man dann die angefüllten Gefäße ihnen erkennen kann. Auch sieht man es den Theilen schon während des Lebens an, ob sie sehr dichte Blutgefäßneze einschließen oder nicht. Denn da das Blut oder eine rothgefärbte eingespritzte Flüssigkeit durch die durchsichtigen Gefäßen durchschimmert, so sehen Organe, welche sehr dichte Blutgefäßneze einschließen, roth oder röthlich, diejenigen aber, welche keine, oder Blutgefäßneze mit Zwischenräumen einschließen, nicht roth, sondern weiß oder gelblich aus, sind durchsichtig, selbst wenn sie dick sind. Daß nun diese gleichförmige rothe Farbe, wie wir sie an den Lippen, an der ihrer Oberhaut beraubten Leber am Fleische und an vielen Theilen bemerken, wirklich von dem durch die durchsichtigen blutführenden Röhren schimmernden Blute herrühre, kann man durch folgende Beweise im Tode blas gewordene Theile dadurch, daß man die Gefäße mit einer rothen Materie sehr vollkommen anfüllt, wieder roth machen und daß man dennoch, wenn man sie hierauf mit Hülfe des Mikroskops trockeneten Zustande betrachtet, nur die Neze der Haargefäße, nicht aber die Zwischenräume der Substanz der Theile mit der eingespritzten Materie erfüllt

¹⁾ Hales, Haemastatique, traduit par Sauvages. Geneve 1744. 4. p. 131

Dagegen verändern die Theile, welche keine sehr dichten Blutgefäßnetze enthalten, ihre Farbe auch nach dem Tode nicht, wenn ihre Blutgefäße mit einer gekrümmten Flüssigkeit angefüllt werden. Von dem durchschimmernden Blute rührt es auch her, daß z. B. die Fingerspize röther aussieht, wenn man das Blut, indem man den Finger umfaßt und drückt, nöthigt, sich daselbst anzuhäufen, daß aber die Röthe desselben sogleich verschwindet, wenn der Druck nachläßt, und umgekehrt, daß eine sehr rothe Stelle der Haut, auf die man mit der Fingerspize einen Druck ausübt, unter der Fingerspize und im nächsten Umkreise derselben blaß wird, augenblicklich aber ihre rothe Farbe wieder annimmt, wenn der Druck aufhört.

Auf dem Mangel aller Blutgefäße in gewissen Theilen beruhet zum Theil die Bd. I. S. 170 vorgetragene Unterscheidung der einfachen und zusammengesetzten Gewebe, auf der geringeren Zahl der Haargefäße der zusammengesetzten Gewebe die zwei in Bd. I. S. 173 und 175 betrachteten Unterabtheilungen.

Unter den von einem sehr dichten Haargefäßnetze durchdrungenen Theilen des Körpers zeichnen sich wieder diejenigen aus, welche Blut in größerer Menge aufnehmen, weil es nicht bloß zu ihrer Ernährung, sondern auch zur Bereitung und Absonderung gewisser Säfte dient. Dieses ist nämlich an der inneren Oberfläche der von einer Schleimhaut überzogenen Canäle, der Luftwege, des Darmcanals, der Harn- und Geschlechtswege, der Ausführungsgänge der Drüsen und an der äußeren Oberfläche der Pederhaut der Fall. An allen diesen Stellen haben die durch das Mikroskop erkennbaren Haargefäßnetze eine andere Gestalt, als in den Theilen, in welchen das Blut nur zur Ernährung der Substanz der Organe dient, und sowie alle diese Theile einen ähnlichen Zweck, den der Bereitung und Ausscheidung von Säften auf eine Oberfläche haben, so haben auch die Haargefäßnetze in denselben eine gewisse Ähnlichkeit. Ganz an der Oberfläche dieser Säfte-absondernden Häute nämlich liegt das engste Netz, welches diese Organe enthalten, so ausgebreitet, daß die untereinander zusammenhängenden Röhrchen längs der Oberfläche hinlaufen und in einer möglichst großen Berührung mit der Oberfläche sind.

Die Röhrchen, aus denen die Haargefäßnetze bestehen, sind ziemlich von einem und demselben Durchmesser, und daher sehen sie sehr gleichförmig und gitterartig aus, so daß Stämme und Zweige nicht unterschieden werden können. Dabei sind die Zwischenräume der Netze im Verhältnisse zu dem Durchmesser der Röhrchen, aus welchen sie zusammengesetzt sind, sehr eng. Die Röhrchen selbst aber sind nicht so eng, als die feinsten Blutgefäße, welche sich im Gehirn, in den Nerven und in den Muskeln zum Zwecke der Ernährung dieser Theile befinden.

Nutzen der verschiedenen Einrichtung der Haargefäßnetze.

Die so eben beschriebene Einrichtung dieser Netze hat den Nutzen, ein jeder Blutstropfen recht lange dicht an derjenigen Oberfläche hingeführt werde, auf welche die aus ihm abzusendernden Säfte austre-

ten sollen. Hätten die Röhrchen, welche dieses Netz bilden, eine solche Lage gehabt, daß sie nicht längs der Oberfläche dieser Häute verliefen sondern mehr senkrecht in dieselben eindringen, so würde jeder in die Theile eingeführte Bluttröpfchen nur sehr kurze Zeit an der Oberfläche haben verweilen können, und es würden sehr viele Blut zuführende Gefäßstämme nöthig gewesen sein, um so große Häute in allen Punkten mit Blut zu versehen. Wären hier ferner die Blutgefäße so eingerichtet gewesen, daß die baumsförmig sich theilenden kleinen Arterien unmittelbar in wurzelförmig sich vereinigende Venen übergegangen wären ohne daß zwischen dieser beiden Gefäßarten ein großes, sehr gleichförmiges Netz in der Mitte gelegen hätte; so würde das Blut, so bald es in die kleinen Arterien eingedrungen gewesen, alsbald durch die Venen zurückgeführt worden sein, und es würde daher nicht lange in den kleinsten Gefäßen an den Oberflächen der absondernden Häute verweilt haben. Dieser schnelle Durchgang des Bluts durch die Substanz eines Organs scheint bei dem Gehirne Statt zu finden. Denn in die Gehirns substanz treten sehr weit und sehr zahlreiche Blutgefäßstämme ein und aus, und dennoch enthält sie, wie schon ihre Farbe beweist, nicht viel Blut. Hier scheint aber auch die entgegen gesetzte Einrichtung erforderlich zu sein, denn unstreitig enthält das Blut nicht viel von dem Principe, welches zur Ernährung der Gehirns substanz brauchbar ist und jeder Tropfen Blut kann nicht lange im Gehirne umher geleitet werden, an ernährende Theile abzugeben, sondern wird schnell derselben beraubt und zur Ernährung des Gehirns unbrauchbar. Wenn daher die Blutgefäße im Gehirne schnell in die kleinsten Zweige zertheilt werden, und diese selbst nicht sehr lang und sehr vielfach hin und her gewunden und in ein sehr dichtes und sehr ausgedehntes Netz verflochten sind, so erklärt sich hieraus, wie das Gehirn so große und wegführende Gefäße haben und so arm an Blute sein könne. Unstreitig ist die Proportion der Zahl und Dike der Blut zu- und wegführenden Gefäße zu den Haargefäßnezen in jedem Theile von anderer Beschaffenheit. Eine andere also in dem Gehirne, als in den Muskeln und als in den Knochen und Knorpeln. So wie Feiche, die durch große und zahlreiche Bäche Zufluß und Abfluß haben, in Wasser schnell wechseln, eben so bestimmt die Zahl und Weite der Blut zu- und wegführenden Gefäße im Verhältnisse der größeren und kleineren Gefäßnezen die Schnelligkeit, mit welcher das zugeführte Blut einen Theil wieder verläßt und die Menge des Bluts, welches in einer gegebenen Zeit durch das Organ durchfließt, nicht aber die Menge, die in jedem Zeitmomente in ihm vorhanden ist.

In den sich baumsförmig zertheilenden Arterien und Venen läuft das Blut, wie später gezeigt werden wird, verschieden geschwind; in den Stämmen nämlich geschwinde, in den Zweigen dagegen desto langsamer, je öfter sich ein Arterienstamm in kleinere Zweige getheilt hat, und je weniger schon kleine Venen zu größeren zusammengetreten sind. In diesen sehr gleichförmigen Haargefäßnezen dagegen kann das Blut an den verschiedenen Punkten desselben Netzes und also auch an den verschiedenen Stellen der Oberfläche derselben Haut mit ziemlich gleicher Geschwindigkeit fließen. Denn weil sich der von den Blutgefäßen eingenommene geschlossene Raum nicht erweitert, wenn sich die Zahl der Gefäße durch eine Theilung in Zweige vermehrt, zugleich aber durch eine Vereinigung von Zweigen um eben so viel vermindert, so kann jeder Bluttröpfchen

während er durch ein so gleichförmiges Netz hindurchgeht, mit ungleichartiger Geschwindigkeit fortfließen, was unstreitig für die Veranlassung der Absonderung wichtig ist.

Geschwindigkeit des Bluts in den Haargefäßen.

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Blut in den Haargefäßen bewegt, ist sehr gering. Man muß sich schon die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Blut in den größeren Gefäßen während des Lebens bewegt, viel geringer denken, als die ist, mit welcher das Blut aus größeren verletzten Gefäßen ausfließt. Denn aus einem verletzten Gefäße fließt das Blut ganz mit der Geschwindigkeit aus, welche der Druck hervorbringen kann, unter welchem sich das Blut im Gefäße befindet, denn hier fällt das Hinderniß weg, welches das weiter vorn befindliche Blut dem nachfolgenden entgegensetzt, und das zur Deffnung hinsrömende Blut wird daher auf seinem Wege nach der Deffnung hin allmählig beschleunigt. Dessen ungeachtet weiß Jeder, wie langsam das Blut aus kleinen Schnittwunden selbst in sehr gefäßreichen Theilen, in welchen unzählige kleine Gefäße durch einen Schnitt durchschnitten werden, ausfließt. Gates hat hierüber an den Gedärmen eines Hundes Messungen gemacht. Er hatte durch eine Reihe von Versuchen den Druck kennen gelernt, welchen das in den Arterien befindliche Blut während des Lebens bei gesunden Thieren, namentlich bei Hunden und Pferden, erleidet, indem er eine leere senkrechte Glasröhre in verschiedene große Arterien mit ihrem gekrümmten Ende einbrachte und festband, so daß das in den Arterien vorwärts bewegte Blut in dieser Röhre in die Höhe steigen mußte. Die Höhe, bis zu welcher es stieg, gab das Maas ab für den Druck, unter welchem das Blut in den Aderu sich befand; denn das Blut fließt, wenn es die Gerinnung desselben nicht verhinderte, so lange in der Röhre in die Höhe, bis der Druck der in der Röhre befindlichen Blutsäule dem Drucke, den das Blut in den Arterien erfährt, gleich war. Da er auf diese Weise die Kraft kennen gelernt hatte, mit welcher das Blut in den Arterien vorwärts gedrückt wird, so konnte er auch Flüssigkeit in die Arterien mit der nämlichen Kraft eintreiben. Zu diesem Zwecke band er eine an ihrem einen Ende getrennte 4 bis 5 Fuß hohe Röhre in den Anfang der Körperarterie bei ihrem Ubergange in den Bauch dicht über dem Ursprunge der Arteria mesenterica superior ein, erhielt sie in senkrechter Lage und mit lauwarmen Wasser gefüllt, und schnitt die Gedärme der Stelle gegenüber, wo sie am Gekröse befestigt sind, ihrer ganzen Länge nach auf. Ungeachtet das Wasser auf diese Weise durch den nämlichen Druck vorwärts getrieben wurde, welchen das Blut während des Lebens in den Arterien dieser Thiere erleidet, und auch unzählige Gefäße, die etwa doppelt so dick als ein Haar waren, durchschnitten worden waren, so floß doch das Wasser nicht in einem Strome aus, sondern schwitzte nur hervor, so daß nur 42 Kubitzoll Wasser in 400 Secunden ausliefen, was, da eine große Zahl von Blutgefäßen durchschnitten war, auf eine sehr langsame Fortbewegung des Wassers schließen läßt. Noch mehr habe ich mich von der Langsamkeit des Blutlaufs in den Haargefäßen durch das Mikroskop an durchsichtigen Theilen kaltblütiger Thiere überzeugt. Jeder, welcher das Mikroskop öfter zur Hand genommen hat, weiß, mit welcher überraschenden Geschwindigkeit kleine im Wasser sichtbare Theilchen durch das Sehfeld zu steigen scheinen, wenn der Objectträger, auf welchem sich ein wenig Flüssigkeit befindet, nur sehr wenig geneigt wird, und während daher die wahre Bewegung der Flüssigkeit nur äußerst gering ist. Dieses kommt daher, weil die Geschwindigkeit eines betrachteten Theilchens auch 100 mal vergrößert erscheint, wenn der Durchmesser desselben 100 mal größer gesehen

38 Nutzen der verschiedenen Einrichtung der Haargefäßneze.

ten sollen. Hätten die Röhren, welche dieses Netz bilden, eine solche Lage gehabt, daß sie nicht längs der Oberfläche dieser Häute verliefen sondern mehr senkrecht in dieselben eindringen, so würde jeder in diese Theile eingeführte Bluttröpfchen nur sehr kurze Zeit an der Oberfläche haben verweilen können, und es würden sehr viele Blut zuführende Gefäßstämme nöthig gewesen sein, um so große Häute in allen Punkten mit Blut zu versehen. Wären hier ferner die Blutgefäße so eingerichtet gewesen, daß die baumsförmig sich theilenden kleinen Arterien unmittelbar in wurzelsförmig sich vereinigende Venen übergegangen wären ohne daß zwischen dieser beiden Gefäßarten ein großes, sehr gleichförmiges Netz in der Mitte gelegen hätte; so würde das Blut, so bald es in die kleinen Arterien eingebracht gewesen, alsbald durch die Venen zurückgeführt worden sein, und es würde daher nicht lange in den kleinsten Gefäßen an den Oberflächen der absondernden Häute verweilt haben. Dieser schnelle Durchgang des Bluts durch die Substanz eines Organs scheint bei dem Gehirne Statt zu finden. Denn in die Gehirns substanz treten sehr weit und sehr zahlreiche Blutgefäßstämme ein und aus, und dennoch enthält sie, wie schon ihre Farbe beweist, nicht viel Blut. Hier scheint aber auch die entgegen gesetzte Einrichtung erforderlich zu sein, denn unstreitig enthält das Blut nicht viel von dem Principe, welches zur Ernährung der Gehirns substanz brauchbar ist und jeder Tropfen Blut kann nicht lange im Gehirne umher geleitet werden, um ernährende Theile abzusetzen, sondern wird schnell derselben beraubt und zur Ernährung des Gehirns unbrauchbar. Wenn daher die Blutgefäße im Gehirn schnell in die kleinsten Zweige zertheilt werden, und diese selbst nicht sehr lang und sehr vielfach hin und her gewunden und in ein sehr dichtes und sehr ausgedehntes Netz verflochten sind, so erklärt sich hieraus, wie das Gehirn so große zu- und wegführende Gefäße haben und so arm an Blute sein könne. Unstreitig ist die Proportion der Zahl und Dicke der Blut zu- und wegführenden Gefäße zu den Haargefäßnezen in jedem Theile von anderer Beschaffenheit. Eine andere also in dem Gehirne, als in den Muskeln und als in den Knochen und Knorpeln. So wie Feiche, die durch große und zahlreiche Nähe Zufluß und Abfluß haben, ihr Wasser schnell wechseln, eben so bestimmt die Zahl und Weite der Blut zu- und wegführenden Gefäße im Verhältniß der größeren und kleineren Gefäßneze die Schnelligkeit, mit welcher das zugeführte Blut einen Theil wieder verläßt, und die Menge des Bluts, welches in einer gegebenen Zeit durch das Organ durchfließt, nicht aber die Menge, die in jedem Zeitmomente in ihm vorhanden ist.

In den sich baumsförmig zertheilenden Arterien und Venen läuft das Blut, wie später gezeigt werden wird, verschieden geschwind; in den Stämmen nämlich geschwinde, in den Zweigen dagegen desto langsamer, je öfter sich ein Arterienstamm in kleinere Zweige getheilt hat, und je weniger schon kleine Venen zu größeren zusammengetreten sind. In diesen sehr gleichförmigen Haargefäßnezen dagegen kann das Blut an den verschiedenen Punkten desselben Netzes und also auch an den verschiedenen Stellen der Oberfläche derselben Haut mit ziemlich gleicher Geschwindigkeit fließen. Denn weil sich der von den Blutgefäßen eingeschlossene Raum nicht erweitert, wenn sich die Zahl der Gefäße durch eine Theilung in Zweige vermehrt, zugleich aber durch eine Vereinigung von Zweigen um eben so viel vermindert, so kann jeder Bluttröpfchen

während er durch ein so gleichförmiges Netz hindurchgeht, mit ungleichender Geschwindigkeit fortfließen, was unstreitig für die Verichtung der Absonderung wichtig ist.

Geschwindigkeit des Bluts in den Haargefäßen.

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Blut in den Haargefäßen bewegt, ist sehr gering. Man muß sich schon die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Blut in den größeren Gefäßen während des Lebens bewegt, viel geringer denken, als die ist, mit welcher das Blut aus größeren verletzten Gefäßen ausfließt. Denn aus einem verletzten Gefäße fließt das Blut ganz mit der Geschwindigkeit aus, welche der Druck hervorbringen kann, unter welchem sich das Blut im Gefäße befindet, denn hier fällt das Hinderniß weg, welches das weiter vorn befindliche Blut dem nachfolgenden entgegensetzt, und das zur Oeffnung hinströmende Blut wird daher auf seinem Wege nach der Oeffnung hin allmählig beschleunigt. Dessen ungeachtet weiß Jeder, wie langsam das Blut aus kleinen Schnittwunden selbst in sehr gefährlichen Theilen, in welchen unzählige kleine Gefäße durch einen Schnitt durchschnitten werden, ausfließt. Hales hat hierüber an den Gedärmen eines Hundes Messungen gemacht. Er hatte durch eine Reihe von Versuchen den Druck kennen gelernt, welchen das in den Arterien befindliche Blut während des Lebens bei gesunden Thieren, namentlich bei Hunden und Pferden, erleidet, indem er eine leere senkrechte Glasröhre in verschiedene große Arterien mit ihrem gekrümmten Ende einbrachte und festband, so daß das in den Arterien vorwärts bewegte Blut in dieser Röhre in die Höhe steigen mußte. Die Höhe, bis zu welcher es stieg, gab das Maas ab für den Druck, unter welchem das Blut in den Adern sich befand; denn das Blut stieg, wenn es die Gerinnung desselben nicht verhinderte, so lange in der Röhre in die Höhe, bis der Druck der in der Röhre befindlichen Blutsäule dem Drucke, den das Blut in den Arterien erfuhr, gleich war. Da er auf diese Weise die Kraft kennen gelernt hatte, mit welcher das Blut in den Arterien vorwärts gedrückt wird, so konnte er auch Flüssigkeit in die Arterien mit der nämlichen Kraft eintreiben. Zu diesem Zwecke band er eine an ihrem einen Ende gekrümmte 4 bis 5 Fuß hohe Röhre in den Anfang der Körperarterie bei ihrem Uebergange in den Bauch dicht über dem Ursprunge der Arteria mesenterica superior ein, erhielt sie in senkrechter Lage und mit lauwarmen Wasser gefüllt, und schnitt die Gedärme der Stelle gegenüber, wo sie am Gekröse befestigt sind, ihrer ganzen Länge nach auf. Ungeachtet das Wasser auf diese Weise durch den nämlichen Druck vorwärts getrieben wurde, welchen das Blut während des Lebens in den Arterien dieser Thiere erleidet, und auch unzählige Gefäße, die etwa doppelt so dick als ein Haar waren, durchschnitten worden waren, so floß doch das Wasser nicht in einem Strome aus, sondern schwappte nur hervor, so daß nur 3/2 Kubitzoll Wasser in 400 Secunden ausliefen, was, da eine große Zahl von Blutgefäßen durchschnitten war, auf eine sehr langsame Fortbewegung des Wassers schließen läßt. Noch mehr habe ich mich von der Langsamkeit des Blutlaufs in den Haargefäßen durch das Mikroskop an durchsichtigen Theilen kaltblütiger Thiere überzeugt. Jeder, welcher das Mikroskop öfter zur Hand genommen hat, weiß, mit welcher überraschenden Geschwindigkeit kleine im Wasser sichtbare Theilchen durch das Sehsfeld zu fliegen scheinen, wenn der Objectträger, auf welchem sich ein wenig Flüssigkeit befindet, nur sehr wenig geneigt wird, und während der Flüssigkeit nur äußerst gering ist. Dieses kommt daher, weil die Geschwindigkeit eines betrachteten Theilchens auch 100 mal vergrößert erscheint, wenn der Durchmesser desselben 100 mal größer gesehen

40 Geschwindigkeit des Bluts in den Haargefäßen.

wird. Da man nun dessen ungeachtet die Blutkörnchen in den kleinsten Gefäßen kaltblütiger Thiere nicht so schnell vorwärts sieht, daß man dadurch gehindert wäre, die Blutkörnchen einzeln zu unterscheiden und sogar ihre Gestalt zu beurtheilen, so muß die Bewegung derselben äußerst langsam sein. Hiermit stimmen auch die Messungen und Berechnungen, welche Keil und Hales gemacht haben, gut überein. Nach Hales durchlief das Blut in den Haargefäßen des geraden Bauchmuskels eines Frosches in 1 Secunde ungefähr $\frac{1}{2}$ Linie, in den der Lungen aber, wo es geschwinder als in irgend einem andern Haargefäßneze fortgetrieben wird, ungefähr in 1 Secunde $\frac{1}{2}$ Zoll = 6 Linien. Die Bewegung des Bluts war in den Haargefäßen der Lungen ungefähr 40 mal, oder wenn ich auf die hier weggelassenen Bruchtheile Rücksicht nehme, 43 mal geschwinder als in den Haargefäßen der Muskeln ¹⁾. Unstreitig fließt es in dem Haargefäßneze jeder andern Classe von Organen mit einer andern Geschwindigkeit, und diese bestimmte Geschwindigkeit hat gewiß auf die Verrichtung der Theile einen wesentlichen Einfluß.

Die Geschwindigkeit, die das Blut in den Haargefäßen hat, hängt, wenn die Kräfte, die es vorwärts treiben, gleich groß sind, sehr von der minderen Engigkeit der Haargefäße, die den Uebergang aus den Arterien in die Venen vermitteln, ab. Denn je enger die Haargefäße sind, desto mehr hängt sich das klebrige Blut an den Wänden derselben an; und desto größer ist die Reibung. Keil ²⁾ hat den Widerstand, den das Blut in den kleinen Adern bei seinem Uebergange in die Venen erfährt, auf eine scharfe Weise gemessen. Keil ließ nämlich aus der quer durchschnittenen Schenkelvene, und nachher auch aus der quer durchschnittenen Schenkelarterie eines lebenden Hundes Blut ausfließen, und verglich die Mengen Blut, die in einer gleich großen Zeit aufgefangen werden. Während aus der Schenkelvene 3 Theile Blut ausfloßen, strömten aus der Schenkelarterie $7\frac{1}{2}$ Theile aus. Obgleich die kleinen Arterien durch ihre eigne lebendige Kraft etwas zur Ueberwindung der Reibung des Bluts an den Wänden der Haargefäße beitragen, so verhielt sich hier dennoch der Verlust der Geschwindigkeit, den das Blut durch seine Reibung in den kleinen Gefäßen erleidet, wie $\frac{1}{15}$. Denn wenn die Gefäße unverletzt sind, fließt durch die Schenkelvene alles das Blut zurück, welches durch die Schenkelarterie in den Schenkel einströmt, und folglich hätte, wenn es die Reibung des Bluts in den Gefäßen nicht verhindert hätte, in derselben Zeit eben so viel Blut durch die quer durchschnittenen Vene, als durch die quer durchschnittenen Arterie ausfließen müssen. Der oben erwähnte, von Hales ³⁾ an todtten Hunden angestellte Versuch, wo er die Dünndärme und Dickdärme eines Hundes ihrer ganzen Länge nach, an der Stelle, welche der Befestigung des Mesenterium gegenüber liegt, aufschnitt (weil er auf dieser Stelle die Därme aufschneiden konnte, ohne andere als sehr kleine Blutgefäße zu durchschneiden) und hierauf eine $4\frac{1}{2}$ Fuß lange senkrechte Röhre mit ihrem gekrümmten Ende in die Aorta an der Stelle, wo die Arteria mesenterica entspringt, einband und mit Wasser gefüllt erhielt, giebt auch eine ungefähre Vorstellung von dem Hindernisse, den das Wasser auf seinem

¹⁾ Thomson, in seiner Schrift über die Entzündung, hält es für unmöglich, daß man die Geschwindigkeit der Blutkugeln in den durchsichtigen Haargefäßen kaltblütiger Thiere messen könne, und in der That hat er Recht, rücksichtlich der Mikroskope, die sehr stark vergrößern und ein kleines Sehfeld haben. Wenn man aber ein Mikroskop anwendet, welches nur so stark vergrößert, um die Blutkörnchen noch eben sehen zu können, dagegen aber ein sehr großes Sehfeld besitzt, so kann man die Geschwindigkeit der Blutkörnchen allerdings messen. Indessen ist die von Hales gemachte Messung noch sehr unvollkommen und daher nur ungefahr gültig, denn er hat sich keiner Tertienuhr, sondern einer gewöhnlichen Taschenuhr dabei bedient.

²⁾ Keil, Tentamina medico-physica. London 1718. Tent. 3. p. 50.

³⁾ Hales, Haemastatique, traduit par Sauvages, S. 39. sq.

Wege aus der Aorta bis zu den durchschnittenen Gefäßen erfuhr, die etwa noch einmal so dick als ein Haar waren. Denn das Wasser trat bei diesem Versuche aus der Durchschnittsfläche der Gedärme so langsam aus, daß durch die kleinen durchschnittenen Gefäße in 400 Secunden nur 340 Kubitzoll Wasser ausflossen. Dagegen floß, wenn er das Experiment so abänderte, daß er die Stämme, aus welchen alle diese kleinen Gefäße entspringen, kurz vor ihrem Uebergange zu den Gedärmen durchschnitt, dieselbe Menge Wasser in 140 Secunden, d. h. in $\frac{1}{3}$ der Zeit aus, die es vorher zum Ausfließen brauchte. Nimmt man also an, daß bei diesem Versuche kein Wasser durch die Haargefäße der aufgeschnittenen Därme in die Venen übergegangen, sondern daß alles Wasser zur Schnittfläche der aufgeschnittenen Därme ausgeflossen sei; so kann man folgern, daß bei dem ersten Versuche $\frac{2}{5}$ der Kraft durch die Reibung des Wassers in den kleinen Gefäßen verloren gegangen sei. Man sieht aus allen diesen Versuchen, daß zwar das Hinderniß, welches das circulirende Blut in den Haargefäßen erleidet, sehr beträchtlich ist. Allein es ist keineswegs so groß, als Bichat es sich gedacht hat, welcher glaubte, der Druck, welchen das Herz auf das Blut hervorbringe, erstrecke seine Wirkungen nur bis in die Haargefäße, aber nicht bis in die Venen. Die oben angeführten Versuche beweisen das Gegentheil.

Bichat hat sich aber unstreitig das Hinderniß, welches der Fortbewegung des Bluts in den Haargefäßen entgegensteht, zu groß gedacht, indem er annahm, daß die Kraft des Herzens das Blut nicht durch sie hindurchtreiben könne. Denn da Galeß mit Blut vermishtes Wasser durch den Druck einer $9\frac{1}{2}$ Fuß hohen Wassersäule bei todten Thieren aus den Arterien in die Venen übergetrieben hat (siehe S. 32 und 33), so darf man wohl nicht daran zweifeln, daß während des Lebens auch das Herz dieses vermöge. Außer der Engigkeit der Haargefäße aber, welche in verschiedenen Classen von Organen verschieden zu sein scheint, giebt es noch zwei andere Umstände, die auf die Geschwindigkeit des Blutlaufs in den einzelnen Abtheilungen des Gefäßsystems einen Einfluß haben. Diese sind theils die Länge der Canäle, vorzüglich der engen, durch welche das Blut vorwärts gedrängt werden muß, (denn je länger die kleinen Canäle sind, in denen die Reibung sehr groß ist, desto größer wird das Hinderniß, das dem Blute entgegensteht), theils das Gewicht der Blutmasse, die durch das nachkommende Blut vorwärts gedrängt werden muß. Indessen scheint dieser letztere Umstand nicht sehr in Betracht zu kommen.

Ehemals glaubten viele Physiologen, daß auch die stumpferen oder spizigeren Winkel, unter welchen die Aeste aus den Röhren abgehen, einen Einfluß auf die Geschwindigkeit des Bluts hätten. Durch den Ursprung der Aeste unter einem spizigeren Winkel nämlich würde der Fortgang des Bluts weniger gehemmt, als durch den Ursprung der Aeste unter einem minder spizigen. Allein dieser Umstand hat nur dann einen Einfluß auf die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit, wenn sie bei ihrer Fortbewegung so wenig Widerstand erleidet, daß ihr Lauf durch

42 Einfluß der Winkel der Gefäße auf die Blutbewegung.

Summirung der Stöße, die sie empfängt, nach einer bestimmten Richtung hin beschleunigt wird. Wenn dagegen der Widerstand, den die Flüssigkeit bei ihrer Bewegung erfährt, so groß ist, daß die Stöße in jedem Momente dadurch aufgehoben werden und sich also nicht summiren können, so daß vielmehr diese Flüssigkeit, im Falle die Druckkräfte plötzlich zu wirken aufhörten, auch sogleich stillstehen würde; so haben die spitzigeren oder weniger spitzigen Winkel keinen merklichen Einfluß auf die Geschwindigkeit. Die Flüssigkeit in den Röhren befindet sich unter diesen Umständen überall unter dem nämlichen Drucke und strebt mit gleicher Kraft nach allen Richtungen hin auszuweichen, und sie tritt daher, die Winkel mögen spitzer oder weniger spitz sein, in alle abgehenden Röhren mit gleicher Gewalt ein.

Haargefäße in verschiedenen Geweben.

Da, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, von der verschiedenen Einrichtung der Haargefäßneze in verschiedenen Theilen so viel abhängt, so macht die Untersuchung derselben einen vorzüglich wichtigen Theil der Anatomie aus. Indessen bewirkt die große Schwierigkeit, die mit einer solchen Untersuchung verknüpft ist, daß man bis jetzt nur noch eine sehr unvollkommene Kenntniß der Haargefäße in verschiedenen Theilen besitzt.

Die Theile, welche mit sehr dichten Blutgefäßen durchzogen sind, nehmen, wie schon gesagt worden, eine röthliche Farbe an, wenn ihre Blutgefäße sehr vollkommen mit einer rothgefärbten Materie angefüllt werden. Im frischen Zustande ist indessen die rothe Farbe nicht so lebhaft, als im getrockneten, theils, weil die Theile oft von undurchsichtigen oder unvollkommen durchsichtigen, weniger gefäßerreichen Substanzen bedeckt sind, welche, wenn man sie austrocknet, an Umfang sehr abnehmen und zugleich durchsichtig werden, theils, weil die Röhren, sobald sie mit gefärbten, durch Trocknen an Umfang nicht abnehmenden Materien angefüllt sind, selbst durch Trocknen an Umfang nicht abnehmen, während doch die zwischen ihnen befindliche thierische Materie zusammentrocknet, die die Röhren zuvor auseinander hielt. Man darf sich daher auch die Blutgefäßneze nicht als so dicht vorstellen, als sie an getrockneten Theilen des menschlichen Körpers zu sein scheinen. Ob man nun gleich aus der Ansicht, welche die sehr vollkommen angefüllten Blutgefäße im getrockneten Zustande darbieten, keine ganz richtige Vorstellung davon, wie sie im ungetrockneten Zustande beschaffen sind, erhält; so kann man doch die Verschiedenheit der Theile unter einander hinsichtlich der Kleinheit und Zahl ihrer kleinen Blutgefäße dadurch erkennen. Burdach ²⁾, Deckerreicher ³⁾ und ich selbst haben daher gesehen, daß die Einrichtung des Haargefäßnetzes an den nämlichen Theilen des Körpers dieselbe war, wenn auch die Theile von verschiedenen Menschen genommen, oder von verschiedenen Anatomen sehr vollkommen angefüllt waren. Prochaska ⁴⁾, welcher nächst Lieber-

²⁾ Burdach, Ueber die Haargefäße, mit Hinsicht auf die Lieberkühn'schen Präparate in Petersburg, in d. russischen Sammlung herausgegeben von D. Christian, Neumann und Burdach. 1817. B. II. Heft 5.

³⁾ Deckerreicher, Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislaufe des Blutes. Nürnberg 1826. S. 13.

⁴⁾ Disquisitio anatomico-physiologica organismi humani ejusque processus vitalis, auct. Georgio Prochaska. c. Tab. aen. Viennae 1812. 4. 96. sq.

tähen durch die Kunst, die feinsten Haargefäße sehr vollkommen mit gefärbten erstarrenden Flüssigkeiten anzufüllen, vorzüglich berühmt ist, eine Kunst, welche er von Hartz in Wien gelernt hatte, und mit welcher sich auch Sömmerring, Meunier und Döllinger in München, Seiler in Dresden und Vockel in Braunschweig mit vorzüglichem Erfolge beschäftigt haben, hat über diesen Gegenstand ausführlich gehandelt, und ist durch seine Betrachtungen der künstlich gefüllten Haargefäße der frischen und getrockneten Theile zu folgenden, von mir ins Kurze zusammengezogenen Resultaten geführt worden:

In die Nägel, Haare und in die Oberhaut dringt niemals die eingespritzte Flüssigkeit ein, und sie werden daher niemals roth. Die zweifache Substanz der Zähne erhält keine Gefäße, die Zähne haben nämlich nur an der Oberfläche ihrer Höhle Gefäße. In dem Glaskörper werden, nach Prochaska, niemals Blutgefäße sichtbar, zur Linse gehören nur wenige, und diese scheinen viel mehr der Kapfel der Linse anzugehören.

Die die Knochenenden überziehenden Knorpel behalten, wenn gefärbte Flüssigkeiten in die feinsten Blutgefäße eingespritzt werden, ihre Farbe ungeändert, die Sehnen und Bänder der Knochen werden dabei gar nicht roth, sondern behalten auch die ihnen eigenthümliche Farbe, denn sie haben, wenn man die wenigen Gefäße abrechnet, welche das sie einhüllende Zellgewebe durchziehen, gar keine Gefäße. Die vielen Gefäße, welche den Muskelfasern zukommen, treten daher an der Stelle, die Muskelfasern in die Sehnenfasern übergehen, nicht zu den Sehnenfasern über, sondern endigen sich meistens blind, oder sie beugen sich zuweilen um und laufen zu den Muskeln zurück. Die Knochenhaut sieht unter diesen Umständen frisch und mäßig roth aus, getrocknet röther, weil sie nicht wenig Blutgefäße enthält, die größtentheils nicht ihr angehören, sondern in die Knochen übergehen. In den Knochen machen die Blutgefäße nur einen sehr kleinen Theil aus, indessen enthalten sie bei Kindern weit mehr Blutgefäße, als bei Erwachsenen. Die harte Hirnhaut verhält sich wie die Knochenhaut. Die Spinnwebhaut des Gehirns wird niemals roth; die weiße Gehirnsubstanz wird niemals, auch bei der vollkommensten Anfüllung der Blutgefäße, sehr roth, eben so die Nerven, und namentlich zeigt auch die Nezhaut wenig Blutgefäße. Die graue Gehirnsubstanz ist viel reicher an Blutgefäßen und röthet sich daher bei der Einspritzung weit mehr. Der nicht mit den Gelenkknorpeln verwachsene Theil der Synovialhäute, der Gelenksäcke und vorzüglich auch die mit Fett erfüllten Falten derselben röthen sich an ihrer innern Oberfläche sehr, keineswegs aber der Theil derselben, der die Gelenkknorpel überzieht, vielmehr beugen sich die Gefäßröhrchen an der Grenze, wo die Gelenkhaut auf die Gelenkknorpel übergeht, plötzlich um und kehren zum nicht angewachsenen Theile dieser Haut zurück. Die Wände der Fettzellchen an der äußeren Oberfläche der Haut sind von einem Netze sehr dünner, unstreitig zur Abänderung des Fetts bestimmter, Blutgefäße umgeben. Die von ihren zelligen Scheiden entblößten Muskeln werden stark roth, weil der Farbestoff die sehr zahlreichen engen, der Länge der Fleischfasern nach verlaufenden, unter einander vielfach communicirenden, Haargefäße erfüllt. Im Ganzen sieht die innere Oberfläche der Haut, so lange sie nicht getrocknet, in Folge der Einspritzung wenig roth aus, denn sie besteht aus Lamellen, welche nicht nur selbst sehr wenig Blutgefäße besitzen, sondern auch die zahlreicheren Blutgefäße der oberflächlichen Lage der Haut verdecken. Daher kommt es denn, daß die Haut im getrockneten Zustande auch an ihrer inneren Oberfläche sehr roth wird, denn beim Trocknen nehmen diese Lamellen der inneren Oberfläche der Haut sehr am Umfange ab, und lassen vermöge ihrer Durchsichtigkeit die Gefäße der sehr gefäßreichen oberflächlichen Lage der Haut durchschimmern.

Die äußere Lage der Haut sieht, wenn gefärbte Flüssigkeit eingespritzt und die Oberhaut entfernt worden ist, sehr stark roth aus, ganz vorzüglich in der Hand und im Fuß. Durch das Mikroskop sieht man ein Netz sehr enger und nicht bei ihrer Zertheilung in ihrem Durchmesser noch ferner abnehmender Röhrchen, in deren äußerst kleinen Zwischenräumen sich eine nicht aus Röhrchen bestehende Substanz befindet, die ungefähr der Menge nach nur eben so viel abtragen scheint, als die aus Gefäßen bestehende Substanz. Aus diesem Netze gehen die allerfeinsten Gefäße zu den Hautwärtchen empor, von denen sich manche blind zu endigen scheinen, die meisten jedoch wieder in das Gefäßnetz der Haut zurückgehen. Die Hautdrüsen des Ohrs stellen sich als kleine Höhlen dar, die

44 Prochaska's u. Lieberkühn's Arbeiten üb. d. Haargefäße.

von einem Netze von derselben Beschaffenheit, wie das an der Oberfläche der Linderhaut befindliche, überzogen sind. Die ganze innere Oberfläche des Mundes, die der Haupthöhlen der Nase (jedoch nicht die der Nebenhöhlen) und der an denselben befindlichen Höhlen der einfachen Schleimdrüsen, die des Magens und der in dessen Wänden befindlichen kleinen dicht neben einander stehenden Zellen, die der dünnen Gedärme und ihrer Zellen, die der dicken Gedärme und ihrer kleinen, sehr zahlreichen Zellen, sind gleichfalls von einem so dichten Netze von derselben Beschaffenheit bedeckt, und dasselbe gilt von der innern Oberfläche der Harnleiter, der Harnblase, der Harnröhre, der Muttertrompeten, des Uterus und der Scheide. Von einem auf dieselbe Weise gebildeten, an der Oberfläche ausgebreiteten Netze sind die Zellen und Luftröhrenäste der Lungen und die Ausführungsgänge der Drüsen, namentlich die der Speicheldrüsen und der Leber überzogen, und auch die Aderhaut des Auges ist mit einem sehr dichten Netze an ihrer inneren, die schwarze Farbe absondernden, Oberfläche bedeckt ¹⁾.

Messungen an Haargefäßen, die an Lieberkühn'schen Präparaten sichtbar sind.

Auf diese Beobachtungen von Prochaska lasse ich nun einige von mir gemachte Untersuchungen über den Durchmesser der Röhren, aus welchen die Haargefäßnetze in verschiedenen Theilen des Körpers bestehen, folgen. Ich wählte zu diesem Zwecke auf der reichen anatomischen Sammlung in Berlin getrocknete, mit durchsichtigem Lack überzogene und dadurch auf Glas befestigte Stücke menschlicher Theile aus, in welchen die Blutgefäße von dem berühmten Lieberkühn so vollkommen mit gefärbter Materie angefüllt worden waren, als es irgend möglich ist. Ohne daß der mindeste Erguß solcher Materie ins Zellgewebe Statt gefunden hatte, waren die Röhren frogend erfüllt und bildeten sehr gleichförmige Netze, an welchen nur selten Gefäßenden, welche nicht mit andern Gefäßen verbunden gewesen wären, sichtbar waren. Die engsten Röhren kamen in der Gehirns- und in der Nervensubstanz vor, und auch in den Muskeln waren sie sehr eng; aber die Zwischenräume zwischen ihnen waren weiter und unregelmäßiger als an den an der Oberfläche der Haut und der Schleimhäute gelegenen Ge-

¹⁾ Diese von Prochaska gemachten Untersuchungen, welche die einzigen sind, wo die Haargefäßnetze, welche so fein mit erstarrenden Flüssigkeiten angefüllt worden waren, in nicht getrockneten und in getrockneten Theilen des menschlichen Körpers verglichen wurden, enthalten zum Theil Beweise für die allgemeinen Betrachtungen, welche ich oben über die Haargefäße angestellt habe. Ich bedauere, daß ich, als ich im Jahre 1822 in Wien eine schöne Reihe Prochaska'scher Präparate betrachtete, welche Hr. von Leenhoffet besaß, und mir zu zeigen die Güte hatte, noch nicht darauf eingerichtet war, die Durchmesser der Gefäße undurchsichtiger Theile durch das Mikrometer zu messen. Dieses würde mich in den Stand gesetzt haben, die Prochaska'schen Präparate genauer mit den Lieberkühn'schen zu vergleichen.

gefäßchen, welche zur Absonderung eines Saftes und nicht allein zur Ernährung dienten. An einem mit No. 36 bezeichneten Stücke der Rindensubstanz des Gehirns, ferner an einem mit 64 bezeichneten Stücke der Medullarsubstanz des Gehirns, und endlich an einem mit No. 74 bezeichneten quer durchschnittenen Nerven, hatten die Röhren des kleinsten Gefäßnetzes im Mittel einen Durchmesser von wenigstens 0,003 Par. Lin., oder ungefähr von ein wenig mehr als $\frac{1}{555}$ V. Lin. = $\frac{1}{5996}$ V. Zoll; es gab aber viel Röhren, welche viel enger waren, und einzelne Röhren und einzelne Stellen an den Röhren, welche sogar enger als $\frac{1}{5000}$ Zoll waren. Die sehr unregelmäßigen Zwischenräume in diesem Gefäßnetze in der Medullarsubstanz waren etwa $\frac{1}{77}$ V. L. oder $\frac{1}{514}$ V. Zoll breit und $\frac{1}{90}$ Linien = $\frac{1}{590}$ Zoll lang, manche derselben waren auch noch kleiner. Die Zwischenräume waren demnach etwa ihrer Länge nach 8 bis 10 mal, und ihrer Breite nach 4 bis 6 mal größer als der Durchmesser der Röhren. Eben so verhielten sich die kleinen Gefäßnetze und ihre Zwischenräume an dem Querschnitte des Nerven. Dagegen waren die Röhren, welche das feinste Gefäßnetz an der Oberfläche der Schleimhäute, namentlich an der Schleimhaut der Nase, der Lippen, an der inneren Haut der Augenlider, an der inneren Haut des Magens, des Dünndarms, des Dickdarms und an der der Lederhaut ausmachten, viel dicker, denn Röhren, welche im Mittel $\frac{1}{525}$ Par. Lin. = $\frac{1}{5996}$ Pariser Zoll im Durchmesser hatten, gehörten zu den feineren, und häufig war der Durchmesser der Gefäße, welche den Haupttheil des sehr gleichförmigen Haargefäßnetzes dieser Oberflächen ausmachten, nicht viel von $\frac{1}{5000}$ Zoll entfernt. Auch waren die Zwischenräume zwischen den Röhren mager, oft nur von einem 3 bis 4 mal so großen Durchmesser, oder gar so schmal, daß ihr Durchmesser nicht größer oder kaum so groß als der der Röhren war. Zugleich hatte das Netz eine regelmäßigere Form, und lag so an der Oberfläche ausgespannt, daß die Blutgefäße in einer möglichst großen Berührung mit derselben waren. An den das Fett absondernden Bläschen des Zellgewebes bildeten noch dickere Röhren ein sehr gleichförmiges Netz; aber außer ihnen gab es engere Röhren, welche den an der Oberfläche der Schleimhäute und der Lederhaut gleichkamen. Aber der Durchmesser der Zwischenräume zwischen ihnen war 8 bis 12 mal größer, als der der engeren Gefäße an den Schleimhäuten. Auch an der Knochenhaut, wo die Röhren des feinsten Gefäßnetzes gleichfalls ungefähr den Durchmesser hatten als an den der Oberflächen der Schleimhäute und der Lederhaut, waren die Zwischenräume zwischen ihnen viel größer und unregelmäßiger, als die an den Netzen jener Häute.

Um auch den Durchmesser der kleinsten Blutgefäße zu bestimmen, wenn sie vom Blute, nicht aber von künstlich eingespritzten Flüssigkeiten ausgedehnt wären, maß ich sie an einem sehr stark mit Blut angefüllten Hodensacke eines neugeborenen Kindes, an welchem sich die Oberhaut leicht abziehen ließ. Ich fand den Durchmesser der engsten Haargefäße, die ich sah, $\frac{1}{525}$ Par. Zoll. In den röhrenartigen Zwischenräumen, die sich in dem in der Verknöcherung begriffenen Theile des Knorpels der Kniescheibe dieses Kindes gebildet hatten, befanden sich Netze rother Blutgefäße, deren Durchmesser $\frac{1}{194}$ Pariser Zoll groß war.

Gestalt der Blutgefäßnetze, die nicht zu den allerkleinsten gehören.

Wenn man nicht bloß die kleinsten, sondern auch andere kleine nur durch das Mikroskop erkennbare, jedoch baumförmig in Zweige getheilte Arterien in verschiedenen Theilen unter einander vergleicht; so findet man, daß sehr viele Theile des Körpers durch die verschiedene Menge und

46 Gestalt der Blutgefäßneze von einem größeren Durchmesser.

Dicke der von einem Arterienstämmchen nach einander abgehenden Aeste, durch die Verschiedenheit der Winkel, unter welchen sie abgehen, und durch die Verschiedenheit der Krümmungen, der Vereinigungen, und Zusammenmündungen dieser Zweige in den verschiedenen Theilen ein verschiedenes, sich gleich bleibendes Ansehn besitzen, so daß man im Stande ist, ein Stückchen getrocknete Leber, Niere und Schilddrüse an den durch das Mikroskop betrachteten angefüllten kleinen Gefäßen zu unterscheiden. *Schmerring* ¹⁾, von welchem diese Bemerkung gemacht worden, sagt, daß die Verzweigung der Arterien in den dünnen Därmen einem unblauben Bäumchen, im Mutterkuchen einem Quastchen, in der Milz einem Sprengewel, in den Muskeln einem Reiserbündel, in der Zunge einem Pinsel, in der Leber einem Sterne, an den Hoden und im Geflechte des Hirns einer Haarlocke, in der Blendung vorn einem Kranz, hinten ringsum die Blendung einem Fältchen; in der Linse einem Federbusche, in der Gefäßhaut des Gehirns einer Franze, in der Riechhaut einem Sitter ähnlich sei. *Döllinger* ²⁾ hat die Vertheilungsart der sehr kleinen Arterien in den Bewegung hervorbringenden Theilen des thierischen Körpers verglichen. Er findet, daß sie in den Muskeln, sei es nun Muskeln eines Menschen, oder eines Vogelmagens, oder eines Fisches, ganz eigenthümlich und sich gleichbleibend ist, daß man an allen diesen Stellen Muskeln, deren Blutgefäße vollkommen mit einer gefärbten Materie erfüllt worden, schon durch die Vertheilung der kleinen Blutgefäße als Muskeln erkennen und von der Substanz des Uterus, der Arterien der Regenbogenhaut des Auges unterscheiden könne. Vieles hängt unstreitig hierbei von der Gestalt der kleinen Theile, aus welchen ein Organ besteht und welches die kleinen Gefäße umschlingen, und von der größern oder geringern Zahl der kleinen Blutgefäße, welche in einem kleinen Raume Platz finden müssen, ab. Daher ist die Vertheilungsart der kleinen Blutgefäße eine ganz andere in der Nebullarsubstanz der Nieren, welche aus convergirenden, dicht nebeneinander liegenden Fasern besteht, als in der Rindensubstanz derselben, die größtentheils aus kleinen Körnchen zusammengesetzt ist. An den meisten Theilen bilden schon Arterien, die noch ziemlich groß sind, durch ihre Vereinigung Neze, in den Zwischenräumen dieser Neze zertheilen sich die Aeste dieser Arterien, und so entsteht daselbst ein aus noch engeren Röhren bestehendes Netz, in dessen Zwischenräumen sich abermals noch dünnere Zweige verbreiten. Ende

¹⁾ S. E. Schmerring, Vom Baue des menschlichen Körpers. Th. IV. Frankfurt a. M. 1801. S. 93. 94.

²⁾ Döllinger, Bemerkungen über die Vertheilung der feinsten Blutgefäße in den beweglichsten Theilen des thierischen Körpers. Meckels Archiv, VI. 186. 1820.

ich geben, wie Gale¹⁾ beobachtete, diese kleinen Arterien in die Venen über, deren kleinste Neße dadurch von den kleinsten Arterienneßen unterschieden waren, daß ihre Zwischenräume nicht so eckig als die der Arterienneße, und nicht so groß, sondern runder und kleiner waren.

Verschiedenheit der Haargefäßneße in verschiedenen Lebensaltern und in Krankheiten.

Die Zahl der Haargefäße in einem Theile, und also auch die Dichtigkeit der Neße derselben ist während der verschiedenen Lebensperioden eines Thieres oder eines Menschen wahrscheinlich sehr verschieden. Bei der jungen Froschlarve ist, wie ich mich durch eigne Beobachtungen überzeugt habe, die Zahl der Blutströmchen im durchsichtigen Schwanz kleiner als bei größeren, die Neße derselben werden, während die Froschlarve wächst, eine Zeit lang dichter, und die Gefäßbogen, durch welche Arterien und Venen zusammenhängen, vermehren sich. Nach Döllinger²⁾ vermehren sich die Haargefäßbogen am Schwanz und am Körper sehr kleiner, noch durchsichtiger, im Wachstume begriffener Fische. Man kann, nach ihm, ein solches Thierchen nicht 5 Minuten lang beobachten, ohne die Entfaltung neuer Strömchen und die Bildung neuer Zwischenbogen wahrzunehmen. Die knorpeligen Grundlagen der Knochen des Menschen sind zur Zeit der Bildung der Knochen an den Stellen, wo sie im Begriffe sind zu verknöchern, weit gefäßreicher als nachdem sie verknöchert sind, und der Gefäßreichtum der Knochen und anderer Theile nimmt mit den Jahren auch bei dem Menschen sehr ab. Aber nicht nur in den verschiedenen Lebensaltern vermehrt und vermindert sich die Zahl der kleinen Blut führenden Röhrchen, sondern dasselbe scheint oft und in viel kürzerer Zeit in Krankheiten zu geschehen. An Orten, wo zuvor keine Blutgefäße vorhanden waren, z. B. in der von manchen entzündeten Theilen abgesonderten geronnenen Lymphe, bilden sich Blutgefäße, namentlich in der von der Brusthaut und von der Bauchhaut unter solchen Umständen ausgeschwitzten Lymphe, werden, wie ich mich durch Injectionen selbst überzeugt habe, häufig durch die Anfüllung der Blutgefäße mit gefärbten Materien, nach dem Tode Blutgefäße sichtbar³⁾. Es ist daher theils an sich nicht unwahrscheinlich, daß sich auch in Theilen, welche schon Blutgefäße enthalten, während sie entzündet sind, die Zahl der kleinen Blutgefäße vermehren könne, theils

¹⁾ Gale, Haemastatique, p. 132.

²⁾ Döllinger in Meckels Archiv für die Physiologie. B. VI. Halle 1820. p. 108.

³⁾ Ueber diese neuerzeugten Gefäße hat auch kürzlich J. L. C. Schröder van der Kolk Observaciones anatomico-pathologicae et practicae argumenti. c. 3 tabb. Amstelodami 1826. p. 41. Beobachtungen mitgetheilt.

lehren dieses die mikroskopischen Beobachtungen **Gruijthuisens** ²⁾ und **Kaltenbrunners** ³⁾ an durchsichtigen entzündeten Theilen lebender Thiere geradezu. Alle diese Schriftsteller so sowohl, daß, während ein Theil entzündet ist, viele Wege, in denen zu Blut floß, ungangbar werden, als auch daß neue Wege entstehen, sich mit den schon vorhandenen Blutgefäßen in Verbindung zu setzen. Ich besitze ein Stückchen eines sehr glücklich von **Dr. Pockels** in Braunschweig injicirten kranken Knochens, in welchem die knorpeligen und häutigen Theile welchen der Proceß der Heilung und Wiederverzeugung vor sich ging, von einer so dichten Neze sehr enger Blutgefäße erfüllt ist, daß diese anderwärts mit gefäßreichen Theile in dem krankhaften Zustande mit zu den gefäßreicheren Theilen des Körpers gezählt werden müssen.

Giebt es Gefäße des Kreislaufs, die nur Blutwasser führen:

Ehemals nahmen **Boerhaave** ⁴⁾, **Vieussens** ⁵⁾, **Ferreir** ⁶⁾, **Haller** ⁷⁾, **Sömmerring** ⁸⁾, **Bleuland** ⁹⁾, **Bichat** und andere Anatomen, Gefäße an, welche den Uebergang der Säfte aus den Arterien in die Venen vermitteln hülfsen, sich aber dadurch von den zu demselben Zwecke dienenden Blutgefäßen unterscheiden, daß sie zu eng wären um rothes Blut aufnehmen zu können, und daher nur Serum führen und seröse Gefäße, *vasa serosa*, hießen. **Leeuwenhoek** glaubte gar dergleichen Gefäße, die viel enger als die wären, welche die Körnchen nur in einer einfachen Reihe durchlassen, häufig genug gefunden zu haben, was aber, wie Theil I. S. 132, 133 gezeigt worden auf einer mikroskopischen Täuschung beruhete. **Vieussens** nannte diese hypothetisch angenommenen Gefäße *Ductus lymphatico-nervi*. Daß es seröse Gefäße gebe, schlossen einige von jenen Anatomen a

¹⁾ **Gruijthuisen** in der Medicinisch-chirurgischen Zeitung, B. II. Salzburg 1811 1822. S. 312. Derselben *Organozoonomie*. München 1811. Berrede, VI, enthält dessen Beiträge zur Physiognosie und Eautognosie. München 1812. S.

²⁾ **Hastings**, A treatise on inflammation of the mucous membranes of the larynx. London 1820. *Horns Archiv* 1821. Sept. 467 sq.

³⁾ **Kaltenbrunner**, experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione, cum IX Tab. Monachii 1826. 4. S. 23 sq.

⁴⁾ **Boerhaave**, Oratio de usu ratiocinii mechanici in medicina habita, 11 L. B. 1703. Ed. nova 1730. p. 11.

⁵⁾ **Vieussens**, Novum vasorum corporis humani systema. Amstelodami 1705.

⁶⁾ **Ferreir**, in *Mém. de Paris* 1741. in 8. S. 506. 1749 in 8. S. 721 u. S. 497.

⁷⁾ **Alberti Halleri** de partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus Lib. II. §. 31.

⁸⁾ **S. Th. Sömmerring**, vom Baue des menschlichen Körpers. Th. 4. §. 72.

⁹⁾ **J. Bleuland**, Experimentum anatomicum, quo arteriarum lymphaticarum contentia probabiliter adstruitur institutum, descriptum et icone illustratum. Lugd. Batav. 1784. 4.

daraus, daß manche Theile des menschlichen Körpers, die im gesunden Zustande weiß oder durchsichtig wären, und kein oder wenige rothes Blut führende Gefäße hätten, in Krankheiten, und namentlich im entzündeten Zustande, sehr roth würden, und dann eine zahllose Menge von neuen Blutgefäßen zeigten, die dadurch sichtbar würden, daß die zuvor unsichtbaren, durchsichtigen Blutwasser führenden, serösen Gefäße vom rothen Blute oder von eingespritzten gefärbten Flüssigkeiten ausgedehnt würden. Dieses ist z. B. an dem an den Augapfel angelegten Theile der Bindehaut des Auges und an der Kapfel der Krysallinse der Fall. Indessen beweisen diese Thatsachen keineswegs, daß es seröse Gefäße gebe. Denn Blutgefäße, welche so eng sind, daß sie nur eine einfache Reihe von Blutkörnchen (welche bekanntlich selbst durchsichtig sind) durchlassen, sehen auch durchsichtig aus, und geben im Theilen, in denen sie sich befinden, wenn sie nicht sehr dicht liegen, kein rothes Ansehn. Wenn diese kleinen Gefäße nun vom Blute oder von gefärbten Flüssigkeiten sehr ausgedehnt werden, so erscheinen die Theile so roth, wie das bei entzündeten Theilen der Fall ist. Mascagni¹⁾ führte in die Blutgefäße entzündeter Theile Leimauflösung, die mit Zinnober gefärbt war, und fand die kleinen Blutgefäße um das Doppelte und sogar um das Vierfache weiter, als sie in denselben Theilen zu sein pflegen, wenn sie nicht entzündet sind. Uebrigens scheint sich auch, wie oben gesagt worden, die Menge der kleinen Blutgefäße, wenn sich Theile heftig entzündeten, dadurch vermehren zu können, daß zum Theil neue Gefäße dieser Art entstehen.

In durchsichtigen Theilen lebender Thiere sieht man wohl zahlreiche Blutgefäße, die so eng sind, daß sie nur eine einfache Reihe von Blutkörnchen durchgehen lassen, aber keine solche Gefäßneze, welche zu eng wären, als daß sie Blutkörnchen aufnehmen könnten. Man sieht nur, daß zuweilen in den kleinsten Gefäßen, zumal wenn der Blutlauf im Begriff ist ins Stocken zu kommen, einzelne Blutkugeln in großen Zwischenräumen geschwommen kommen, und hat daher Ursache zu vermuten, daß diese Gefäße dann fast nichts als Serum führen. Schon B. S. Albin meinte keinen hinreichenden Grund zur Annahme seröser Gefäße zu haben. Mascagni²⁾ und Prochaska³⁾ läugnen aber geradezu, daß es seröse Gefäße gebe, und Sömmerring⁴⁾ hat in seiner letzten Schrift über diesen Gegenstand dieselbe Ansicht angenommen.

¹⁾ Mascagni, Vasorum lymphaticorum hist. Senis 1787. fol. C. 8.

²⁾ Mascagni, Vasorum lymph. hist. et ichnogr. C. 7—8.

³⁾ Prochaska, Disquisitio anat. physiol. organismi c. h. ejusque processus vitalis. S. 110.

⁴⁾ Sömmerring, über das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Augapfel. Denkschriften d. Königl. Akad. d. Wiss. zu München für d. J. 1818, letzte Seite der Abhandlung.

Bleuland¹⁾ suchte zwar die Existenz der serbsen Gefäße durch die Einspritzung gefärbter Flüssigkeiten in dieselben zu beweisen. Er erfüllte nämlich zuerst die Venen eines Theils des Darmkanals mit einer groben blaugefärbten Masse, und spritzte dann in die Arterien desselben 2 untereinander gemengte Flüssigkeiten, eine rothe, in welcher der rothe Farbestoff nur fein zertheilt war, und eine weiße Flüssigkeit, in welcher der weiße Farbestoff aufgelöst war, etc. Er zog nun ein Stückchen von der Bauchhaut des Darms ab, und sah, daß die Haargefäße, welche Blut zu führen bestimmt sind, alle mit der rothen Masse erfüllt waren, welche sie, weil sie nur fein zertheilt, nicht aber aufgelöst war, durchgelassen, sondern zurückgehalten hatten, daß aber die weiße Flüssigkeit noch feinere, an der Oberfläche der Bauchhaut gelegene Gefäße gedrungen war, die aus den rothen Haargefäßen hervorgingen und von den rothen ganz verschieden waren. Da sich indessen auch die sehr kleinen Gefäße, welche rothes Blut führen, wiederholt in noch kleinere theilen, so konnte Bleuland nur durch seinen Versuch gewiß werden, daß er Gefäße angefüllt habe, welche zu etwas wären, um rothes Blut aufzunehmen, wenn er den Durchmesser der von ihm mit rother und weißer Farbe erfüllten Gefäße mittels des Mikrometers gemessen hätte.

Es bleibt daher immer noch zweifelhaft, ob es serbse Gefäße gebe, oder nicht, und noch viel weniger läßt sich darthun, ob diese serbsen Gefäße sich wie Arterien in Zweige und Reiser theilen, und ob es auch serbse Venen gebe, oder ob die serbsen Gefäße nur Bogen und Netze bilden, die auf der einen Seite mit rothes Blut führenden Arterien, auf der andern mit rothes Blut führenden Venen zusammenhängen.

Ueber die Oeffnungen, durch welche etwas aus den Blutgefäßen heraus oder in sie eindringen kann.

Durch die dünnen durchsichtigen Haargefäße bringen während des Lebens und nach dem Tode, wenn die Abern gefüllt werden, dünne Flüssigkeiten wie ein Thau an den Oberflächen der Häute, an denen sie sich befinden, und in die Zellen des Zellgewebes hervor, und umgekehrt bringen auch während des Lebens an manchen Stellen in die Haargefäße, in welchen das Blut fließt, Substanzen von außen ein, z. B. in die Haargefäße der Lungen, Sauerstoffgas. Die Anatomen haben sich aber bis jetzt vergebens Mühe gegeben, die Wege, durch welche etwas in diese kleinen Blutgefäße eindringen, oder aus ihnen austreten kann, sichtbar zu machen. Es ist daher zweifelhaft, ob die kleinen Gefäßnetze sehr enge Seitenzweige besitzen, die mit offenen Enden aufhören, und die man ausshauchende Gefäße, vasa exhalantia, nennen kann, oder ob alle kleinen Röhrchen ununterbrochen in die der Venen übergehen, und also nur in den Wänden jener kleinen Röhrchen Zwischenräume oder Oeffnungen befindlich sind, durch welche etwas in sie eindringen oder aus ihnen austreten kann. Hewson, Haller, Cruikshank, Bichat und andere Anatomen haben eine Endigung der kleinen Arterien in ausshauchende Gefäße angenommen, ohne sie je-

¹⁾ Bleuland, a. a. O.

doch gesehen zu haben, denn sie schlossen nur auf das Vorhandensein offener Gefäßenden, weil während des Lebens und nach dem Tode Feuchtigkeiten, die sich in den Blutgefäßen befinden und vorwärts getrieben werden, aus den Gefäßen hervordringen. Dieser Schluß ist aber nicht richtig. Auch darf man daraus, daß man an getrockneten Theilen, deren Blutgefäße sehr vollkommen mit erstarrenden Flüssigkeiten angefüllt worden sind, hier und da Gefäßenden sieht, nicht schließen, daß diese während des Lebens vorhanden gewesen wären und die Dienste aushauchender Gefäße verrichtet hätten. Denn solche Gefäßnetze finden sich auch dann, wenn die Anfüllung der Blutgefäße an manchen Stellen unvollkommen von Statten gegangen ist. Die nicht erfüllten Stellen der Gefäße trocknen dann nämlich zusammen und werden unsichtbar. Daher findet man an den Stücken menschlicher Theile, an welchen die Anfüllung der kleinen Blutgefäße Nieberkühnen am vollkommensten gelungen war, fast gar keine Gefäßenden, sondern Gefäßschlingen, und zwar an Häuten, wo sehr viel Säfte abgefordert werden, und wo es unzählige Gefäßenden geben müßte, wenn die Absonderung durch solche offene Gefäßenden geschähe. Aus diesen und ähnlichen Gründen haben auch B. Hunter, Prochaska¹⁾, Mascagni²⁾ und Sömmerring³⁾, nach ihren eignen hierüber angestellten Beobachtungen, die Existenz aushauchender Gefäßenden geläugnet, und nur Poren in den Wänden der Blutgefäße angenommen. Ist man aber schon darüber nicht völlig gewiß, ob die Absonderung nur durch solche Poren geschehe, so ist man noch viel weniger zu entscheiden im Stande, ob diese kleinen Oeffnungen in den Wänden der Gefäße mit einer besondern Vorrichtung versehen sind, vermöge deren sie sich erweitern und verengern, und dadurch einen lebendigen Einfluß auf die Art haben können, wie und welche Substanzen durch sie hindurchgelassen werden. In jedem Falle müssen die Oeffnungen, durch welche etwas aus den Blutgefäßen austritt, sehr eng sein, weil während des Lebens im gesunden Zustande mit den abgeforderten Flüssigkeiten keine Blutkörnchen aus den Blutgefäßen austreten, und weil nach Mascagni's⁴⁾ Erfahrungen eine in die Arterien eines Todten eingespritzte, mit Zinnoberpulver gefärbte Leimauflösung ungefärbt und wie ein Thau auf der Oberfläche der Häute, namentlich auf der innern Oberfläche der Schleimhäute und der von ihnen

¹⁾ Prochaska, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani ejusque processus vitalis, c. Tab. aenn. Viennae 1812. 4. S. 106, 107.

²⁾ Mascagni, a. a. O. Tab. III. Fig. 22. S. 14. 15.

³⁾ Sömmerring, Denkschriften der Königl. Acad. d. Wissenschaften zu München für das Jahr 1818. 4. Ueber das feinste Gefäßnetz der Aderhaut im Augapfel, vorgelesen den 9. Mai. Besonderer Abdruck, S. 15. 16.

⁴⁾ Mascagni, Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia. Senis 1787. Fol. S. 7, 8.

überzogenen Ausführungsgänge der Drüsen, auf der der Bl auf der der serösen Häute und endlich auf der der Fettzellen andern Zellen des Zellgewebes hervorkommt, ohne daß die Theil Binnobers (welche unter dem Mikroskope untersucht, ein Wenig g Blutkörnchen erschienen) mit hindurchgelassen wurden. Die Oberfl dieser Theile waren nach dem Erkalten der Eismauflösung mit einem geronn tertartigen ungefärbten Eimüberzuge bedeckt. Sogar wenn saurarme mit noch feiner zertheilten Farbestoffen, z. B. mit Zinthe oder Indigo v verschiedene Arterien oder Venen lebender Thiere oder auch todter z Menschen eingespritzt wurde, kam es nur schwach gefärbt auf der Ober Theile, zu welchen die Gefäße gingen, zum Vorschein. Aehnliche Beob hat schon vor Mascagni, Hales gemacht, und aus ihnen scheint herv daß diese Poren nicht überall gleich weit sind. Denn in das Zellgeweb Fettbläschen und in die Lymphgefäße ging der Zinnober mit der von i Arterien eingespritzten Flüssigkeit nicht zugleich über, wohl aber, ohne Zerreißung stattfand, immer in die Zellen der Lungen und in die Höhl darme. Hales¹⁾ trieb die Flüssigkeit nur mit der Kraft, mit welcher in den Arterien der lebenden Thiere vorwärts gedrückt wird, ein, u den in die Höhle der Gedärme übergangenen Zinnober mit Hilfe des erkennen, und sah, daß er sich daselbst in Gestalt sehr dünner Fäden Vielleicht war das von ihm angewendete Zinnoberpulver etwas feiner von Mascagni gebrauchte. Die Poren, die aus den Negen der Lung in die Höhlen der Lungenzellen führen, scheinen selbst wieder noch weit als die, welche auf der innern Oberfläche der Gedärme ausgehen. A Kaau und Hales Erfahrungen geht bei Säugethieren Wasser, welche die Lungenarterien oder in die Lungenvenen stießen läßt, sogar leichter Haargefäßen in die Höhlen der Lungenzellen und in die Luftröhrenäste, den Arterien in die Venen, oder von den Venen in die Arterien über, nach Hales, bei einem Drucke, der viel zu gering ist, als daß er eine d der Gefäße hervorbringen könnte, nämlich selbst bei einem Drucke, der l weniger als 1 Fuß hohe Wassersäule verursacht wurde, dahingegen be von derselben Art Blut, welches durch eine beigemischte Salpeterauflösl erhalten wurde, aus der Lungenarterie weder in die Lungenzellen drang die Venen übergang, selbst wenn es durch eine 2 Fuß hohe Flüssigkeit wärts gedrückt wurde; woraus man sieht, daß die Blutgefäße in jene Falle, wo der Druck viel geringer war, durch den angewendeten Druck rissen sein können. In den Haargefäßnehen der Lungen sind die Poren sog daß Wasser, welches Hales²⁾ in die Luftröhre eines Schweins stießen diesen bei einem Drucke einer 5 Fuß hohen Wassersäule in die Lungenart ging und aus ihr ausfloß (wiewohl ungefähr 5 mal langsamer, als umgekehrt durch den nämlichen Druck aus der Lungenarterie in die L getrieben worden wäre). In andern Theilen geschah dieser Uebergang in gefäße nicht, z. B. wenn der Magen und die Gedärme damit angefüll Wegen dieser größeren Poren scheint auch während des Lebens Luft in gefäßnehe der Lungen aus den Lungenzellen dringen zu können.

An welcher Stelle der Gefäße die Häute derselben am leicht den abzusondernden oder aufzusaugenden Säften durchdrungen d. h., ob die Absonderung in den größeren oder kleineren Arter in den Venen am lebhaftesten vor sich geht, läßt sich durch z tungen nicht zeigen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß die dünnsten und durchsichtigsten Röhrchen, d. h. die, welche d gefäßnehe ausmachen und weder für Arterien noch für Venen

¹⁾ Hales, Haemastatique, traduit par Sauvage, p. 133.

²⁾ Hales, a. a. O., p. 64.

werden dürfen, hierzu am geschicktesten sind. Man darf daher nicht behaupten, daß die Arterien die absondernden Gefäße wären, die Venen aber nicht. Vielmehr ist es wahrscheinlich, daß die Haargefäße, welche den Uebergang von den Arterien zu den Venen bilden, das meiste hierzu beitragen. Wenn Wasser bei einem todten oder auch bei einem lebenden Thiere in die Haargefäße eines Theils getrieben wird, so tritt etwas davon durch die Poren aus, es mag nun durch die Arterien oder durch die Venen hereingebracht werden sein, denn durch beide gelangt es in die Haargefäße.

Hales¹⁾ band das gekrümmte Ende einer 9½ Fuß hohen Röhre in die *vena portae* eines Hundes so ein, daß das Wasser, womit er sie gefüllt erhielt, nach den Gedärmen hinfließen mußte. Auf der innern Oberfläche eines Stückes des Darms, den er geöffnet hatte, konnte er nun sehen, wie die Flüssigkeit eben in durchschwippte und in die Höhle des Darms überging, als das bei einem andern Versuche der Fall gewesen war, als er Wasser in die Arterien der Därme durch den nämlichen Druck eingetrieben hatte. Viehat hat an den Gedärmen, Reisseisen²⁾ an den Lungen ähnliche Beobachtungen gemacht.

Ueber die Kräfte, durch welche etwas aus den Blutgefäßen ausgetrieben oder in sie hineingezogen werden kann.

Daß die Häute der Blutgefäße und andere thierische Häute mit unorganischen Poren versehen sind, und daß durch diese Poren sowohl während des Lebens als nach dem Tode eine Durchdringung und Durchsättigung von gewissen Flüssigkeiten, und dadurch auch eine Trennung gemengter Flüssigkeiten geschehen könne, ist nicht zu bezweifeln³⁾. Auch können getrocknete und wieder aufgeweichte Häute, durch welche 2 Flüssigkeiten, die sich gegenseitig anziehen, getrennt werden, eine dieser Flüssigkeiten zur andern herüberleiten, indem die eine der beiden Flüssigkeiten die andere durch chemische Kraft an sich zieht, oder indem vielleicht auch electrische Strömungen eine Hinüberführung bewirken. Auf diese Weise läßt eine mit dunkelrothem Blute erfüllte Blase das Sauerstoffgas der atmosphärischen Luft, das vom Blute angezogen wird, hindurchtreten, wodurch das mit der Oberfläche der Blase in Berührung stehende Blut hellet roth wird⁴⁾. In der That kann die Kraft, mit welcher eine Flüssigkeit eine andere Flüssigkeit durch eine feuchte Blase hindurch an sich, und in ein

¹⁾ *Rules*, a. a. O. S. 97. No. 16. und S. 96. No. 12.

²⁾ *Francisci Danielis Reisseisen de fabrica pulmonum commentatio*, a regia academia scientiarum Berolinensi praemio ornata cum Tabb. Berolini 1822. Fol. p. 16.

³⁾ Man ermäge hierbei *Magendie's*, *Fodera's* und *Lebkuchner's*, unter *Emmert's* Leitung angestellte Versuche in *Magendie Journal de Physiologie exp.* T. I. St. 3. *Fodera Recherches expérimentales sur l'exhalation et l'absorbition.* Paris 1823. *Lebkuchner Diss.*, qua experimentis eruitur, utrum per viventium adhuc animalium membranas atque vasorum parietes materiae ponderabiles illis applicatae permeare queant, nec ne. *Tubingae* 1819. 8.

⁴⁾ *Girtanner*, *Antiphlogistische Chemie* 1795. S. 214.

Gefäß hereinzieht, oder aus demselben herauszieht, bedeutend groß sein. Nach Parrot's ¹⁾ Entdeckung wird von einer mit lauwarmen Urin gefüllten verschlossenen Blase, die man in lauwarmes Wasser bringt, so viel Wasser an sich kommen, daß sich das Gewicht der in ihr enthaltenen Flüssigkeit in 24 Stunden um 0,142 vermehrt, dagegen wird aus einer solchen mit Wasser gefüllten Blase, wenn sie in Urin gebracht wird, so viel herausgezogen, daß sich die Flüssigkeit an Gewichte in derselben Zeit um 0,09 vermindert. Aber eine mit Wasser gefüllte und in Wasser gebrachte Blase nimmt weder Flüssigkeit auf, noch verliert sie davon. Ein mit Weingeist gefülltes, mit Blase völlig verschlossenes Gefäß in Wasser gesetzt, zog so viel Wasser herein, daß die Blase nach 3 Stunden zu einer Halbkugel ausgespannt emporragte, war dagegen in dem verschlossenen Gefäße Wasser, und wurde nun dasselbe in Weingeist gesetzt, so verminderte sich die Menge des Wassers im Gefäße so sehr, daß die Blase in das Gefäß eingedrückt und äußerlich concav wurde. Als im ersten Falle in die nach außen gebrachte Blase hineingestochen wurde, sprang der Weingeist in einem Strahle mehrere Fuß weit heraus. Porret ²⁾, welcher ähnliche Versuche angestellt hat, war der Meinung, daß eine Erregung elektrischer Strömungen die Ursache der Ueberführung von Flüssigkeit sei, was aber durch seine Versuche nicht bewiesen wird. Andere von Sömmerring, C. H. Müller, Fischer, Dütrochet, Magnus und Wach angestellte, gleichfalls hierher gehörige Versuche kann man in Wach's ³⁾ Abhandlung nachsehen. Dütrochet ⁴⁾ beobachtete, daß, wenn man bei einem Huhne die Blinddärme wegschnitt, sie an ihrem offenen Ende zuckten und sie dann in Wasser legte, sie sich damit füllten, oder wenn sie offen gelassen würden sie sich nicht nur füllten, sondern auch überfließen. Dieses dauerte lange, bis die Fäulniß eintrat, dann aber erfolgte das Entgegengesetzte, das den Blinddärmen enthaltene Wasser drang nach außen heraus. Wurden die Blinddärme mit einer Auflösung von Gummi in Wasser angefüllt, so brachte diese Flüssigkeit eine ähnliche Wirkung hervor. Die Blinddärme füllten sich mit Wasser, und die Flüssigkeit stieg in die Höhe. Dütrochet benennt diese Erscheinung mit dem nicht eben brauchbaren Namen Endosmosis und Exosmosis. Sie unterscheidet sich von der gewöhnlicher Haarröhrchenanziehung, und von dem Einsaugungsvermögen der Schwämme und des Fliesspapiers dadurch, daß bei der Haarröhrchenanziehung Flüssigkeiten von festen Körpern angezogen werden, die ein größeres Anziehungsvermögen zu einer Flüssigkeit, als die Flüssigkeitstheilchen unter einander haben. Bei jenen Erscheinungen dagegen ziehen sich verschiedene Flüssigkeiten einander gegenseitig an, und die Blase läßt nur eine leichter als die andere hindurchtreten. Eine so beträchtliche Anziehung auf einander durch eine feuchte Blase hindurch nicht nur tropfbare, sondern auch luftförmige Flüssigkeiten aus. Denn nach Graham's ⁵⁾ Entdeckung saugt eine feuchte, zusammengefallene, nur ein Wenig atmosphärische Luft enthaltende gebundene Blase, wenn man sie in eine mit kohlensaurem Gas gefüllte Glasblase bringt, so viel kohlensaures Gas ein, daß sie sich strohend damit füllt. Die in der Blase befindliche atmosphärische Luft und das kohlensaure Gas üben hierbei

¹⁾ Parrot, in seiner Inauguraldisputation: Ueber den Einfluss der Physik und Chemie in der Arzneykunde. Siehe Prochaska Disquisitio anat. physiol. organismi corporis humani ejusque processus vitalis. Viennae 1812. 4. p. 80 und in Schweiggers Journ. d. Chemie u. Physik LVIII. 1830. S. 20 sq.

²⁾ Porret, in Thomson's Ann. of philosophy, B. VIII. p. 74, und in Schweiggers Journ. d. Ch. LVIII. 1830.

³⁾ Wach, in Schweiggers Journal, LVIII. 1830. S. 20 sq.

⁴⁾ Dütrochet, L'agent immédiate du mouvement vital dévoilé dans sa nature dans son mode d'action chez les végétaux et les animaux. Paris 1826, in dessen Nouvelles recherches sur l'endosmose, suivies de l'application expérimentale de ces actions physiques à la solution du problème de l'irritabilité végétale etc. Paris 1828. Siehe auch Poggendorf, Annalen d. Physik XI 138. Poisson, ebendasselbst p. 134. Fischer, ebendasselbst 126. Magnus, ebendasselbst X. 153.

⁵⁾ Schweigger, Jahrbuch der Chemie u. Physik. 1829. III. 227.

bereitig eine Anziehung auf einander aus, und weil die Blase die Kohlen säure leichter als die atmosphärische Luft durch sich hindurchläßt, so dringt mehr Kohlen säure herein, als atmosphärische Luft hinaus.

Indessen ist durch alle diese Versuche keineswegs bewiesen, daß, wie *B. Hunter*, *Mascagni*, *Prochaska*, *Sömmerring* und *Dütrochet* behaupten, auch während des Lebens eine ähnliche Durchgänglichkeit der Häute, wie nach dem Tode, Statt finde, und daß die erwähnte Kraft die Absonderungen bewirke.

Bekanntlich dringt der Farbestoff der Galle nach dem Tode durch die Häute der Gallenblase und färbt die benachbarten Gedärme. Dieses findet, sagt *Cruikshank* ¹⁾ im lebenden Körper nicht Statt. Oeffnet man bei einem lebenden Thiere den Unterleib, so wird man diese benachbarten Theile ungefärbt finden. Die Erfahrungen dagegen, daß die Absonderung der Milch, der Galle, des Speichels und anderer Säfte durch Gemüthsbewegungen der Menge und Beschaffenheit nach schnell verändert werden können, lassen uns bei dem Absonderungs geschäfte eine Einrichtung vermuthen, vermöge welcher das Nervensystem einen beachtlichen und schnellen Einfluß auf dasselbe haben kann. Außerdem hat *Hewson* ²⁾ gegen die Erklärung des Absonderungs geschäfts durch die Durchschwizgen durch unorganische Poren den Einwurf gemacht, daß, wenn die Wände der absondernden Blutgefäße ringsum mit solchen Poren versehen wären, die sich nicht durch eine lebendige Bewegung verengen könnten, die abgefonderten Säfte nicht nur an der einer Stelle (z. B. dem Magen) zugewendeten Oberfläche eines Gefäßes, sondern auch da hervortreten würden, wo das absondernde Gefäß an das benachbarte Zellgewebe stößt. Hierdurch würde z. B. der Darm saft eine Art innerer Wasser sucht des Zellgewebes der Gedärme hervorbringen müssen, was doch keineswegs der Fall ist, und woraus also erhelle, daß die Absonderung nicht durch unorganische Poren geschehe.

Arterien und Venen.

Es giebt 2 große Arterien im menschlichen Körper, von welchen die eine das von der rechten, die andere das von der linken Kammer des Herzens fortgestoßene Blut empfängt.

¹⁾ *S. Cruikshank*, Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße, überf. von *Ludwig*, Leipzig 1798. 4. S. 10.

²⁾ *B. Hunter's* Gründe für, und *Hewson's* Gründe gegen die Erklärung der Absonderung durch Poren, findet man einander kurz gegenübergestellt, in *Mascagni Vasorum lymphaticorum hist. et ichnogr.* S. 14. Auch mag man das nachsehen, was *Cruikshank* Gesch. d. einf. Gef. S. 10, und *B. N. G. Schreger de Cruikshankii decreto non esse pervias ullas corporis humani partes, nisi vasorum oculis, in dessen Fragment. anat. et physiol. Fasc. I, Lips. 1791. 4.* gesagt haben.

Die eine, die Körperarterie, arteria aorta, leitet das von der linken Kammer des Herzens fortgestoßene Blut zu den Haargefäßen, die in allen Theilen des Körpers befindlich sind. Manche von den Theilen, welchen diese große Arterie Blut hinleitet, liegen ganz nahe am Ursprunge derselben, z. B. die Fleischfasern des Herzens. Zu ihnen gehen daher auch nur sehr kurze Röhren. Die meisten aber liegen weit davon entfernt, z. B. die Hände und die Füße; zu ihnen fließen daher das Blut in sehr langen Röhren.

Die zweite, die Lungenarterie, arteria pulmonalis, führt das von der rechten Kammer des Herzens fortgestoßene Blut zu den Lungen und vertheilt es in dem Haargefäßnetze, welches die in den ungelungen Lappchen der Lungen befindlichen Zellen überzieht. Da die Lungen nicht weit von dem Herzen entfernt und die Lappchen derselben nahe bei einander liegen, so sind auch alle Röhren, der Lungenarterie kurz.

Ungeachtet nun die Aorta das Blut zu allen, und also auch zu den entferntesten Theilen des Körpers hinführt, die Lungenarterie dagegen nur zu den Lungen leitet, so ist doch die Lungenarterie an ihrem Anfange fast eben so weit (von einem fast eben so großen Durchmesser als die Aorta; denn die Aorta hat nach den Messungen der Anatomisten an ihrem Anfange meistens über einen Zoll, die Arteria pulmonalis etwas weniger als einen Zoll im Durchmesser, so daß der letzteren ungefähr nur um $\frac{1}{7}$ bis $\frac{1}{12}$ oder nicht einmal so viel kleiner ist, als der der Aorta ¹⁾). Der Durchmesser dieser zwei großen Arterien steht demnach in keinem gleichen Verhältnisse zur Länge derselben.

Von der großen Röhre der Aorta gehen zu den verschiedenen Abtheilungen des Körpers kleinere Röhren ab, in welchen das Blut hinfließt, und von ihnen gehen noch kleinere Röhren ab, durch welche zu den einzelnen Theilen dieser Abtheilungen hingeleitet wird, wo durch noch kleinere Röhren zu den Abschnitten jedes Theils verbreitet wird, u. s. w. Daher haben alle diese unter einander zusammenhängenden Röhren das Ansehen eines Baums, von welchem die aus der linken Kammer des Herzens hervortretende Aorta der Stamm ist, die kleineren Röhren aber die Äste, Zweige, Reiser des Baums darstellen.

Communication der Arterien.

Von der Form der Bäume weicht indessen die Form der Arterien dadurch ab, daß sich nicht selten 2 Äste unter einander verbinden, ein

¹⁾ Siehe verschiedene Messungen dieser 2 Arterien angeführt in *Hallers Elementa physiologiae*. Lib. VIII. Sect. 2. §. 19.

weder durch eine quer aus dem einen in den andern hinübergehende Verbindungsröhre, oder indem 2 benachbarte Aeste in einem Bogen zusammenstoßen, oder endlich dadurch, daß 2 Röhren sich in eine größere Röhre unter einem spitzen Winkel vereinigen. Eine solche Verbindung der Zweige kommt bei den Bäumen niemals vor. Diese Anastomose oder Einmündung, Communication, Anastomosis oder Communication, hat bei den Arterien den großen Nutzen, daß das Blut durch einen Druck auf einen Arterienast, oder durch andere Hindernisse nicht einzüglich gehindert wird, in die Zweige dieses Astes zu gelangen, sondern vielmehr auf Seitenwegen durch solche untereinander verbundene Canäle zu denselben hinfließen kann. Die Anastomosen kommen in den kleineren Zweigen der Arterien häufiger vor als in den größeren, in dem feinsten Haargefäßnetze sind sie so häufig, daß es ganz aus anastomosirenden Gefäßen besteht. An Stellen, wo bei der Bewegung der Theile des Körpers ein Hinderniß für den Blutlauf in den Arterien entstehen kann, findet man aber, daß auch ziemlich große Röhren anastomosiren, was jedoch bei den Venen viel häufiger der Fall ist, als bei den Arterien. Nirgends sind so viele und so große anastomosirende Arterien vorhanden, als am Gehirne, im Gefäße der Gedärme, am Magen, in der Hohlhand und im Hohlfuße. Kleiner sind schon die zahlreichen anastomosirenden Gefäße, welche sich am Rückenmarke, ferner in der Nähe alter Gelenke an den Finger- und Zehenspitzen, an vielen Stellen des Gesichts und an der behaarten Haut des Kopfs, hinter dem Brustbeine, hinter den Rippen, in der Schilddrüse und im Uterus befinden. In jedem Punkte des Gehirns und Rückenmarkes, deren Thätigkeit nie unterbrochen werden darf, und die zu ihrer für das Leben so wichtigen Verrichtung eines immer fortgesetzten Blutzuflusses bedürfen, tritt daher Blut genug hinzu, wenn auch eine oder 2 von den Blut zuführenden Arterien gedrückt, oder, wie das bei Verletzungen zuweilen geschieht, zugebunden werden. Bei dem Rückenmarke lebender Säugethiere kann man, wenn man sich auch große Mühe giebt, nicht dahin gelangen, durch das Zuhinden von Arterien den Blutzufluß zu irgend einer Abtheilung desselben zu verhindern. Im Magen und in den verschiedenen Abschnitten der Gedärme, welche bald viel, bald wenig Blut zugeführt bekommen (viel Blut, während die Verdauung in einem Abschnitte vor sich geht, weniger, wenn die Nahrungsmittel in die darauf folgende Abtheilung übergegangen sind), scheinen diese Verbindungen dazu zu dienen, das Blut zu derjenigen Stelle, wo die Verdauung gerade geschieht, hin, und von den benachbarten Theilen, wo sie schon geschehen ist, abzuleiten, und außerdem das Hinderniß zu beseitigen, welches die Last der in den Gedärmen befindlichen Nahrungsmittel dem Blute hier und da in den Weg legen könnte. In der Hohlhand und im Hohlfuße, so wie auch an vielen Gelenken sind auch die Arterien leicht einem Drucke, welcher einen störenden Einfluß haben könnte, ausgesetzt.

Zahl der Theilungen in kleinere Zweige.

Wie viel mal kleinere Gefäße aus größeren, nämlich ein Ast aus dem Stamme, ein kleinerer Ast oder Zweig aus dem Aste, ein noch kleinerer Zweig oder ein Reis aus dem Zweige, ein noch kleineres Reis aus dem größeren Reize u. s. w. hervorgehen, bis endlich in dem Haargefäßnetze Aeste und Zweige wegen ihrer netzförmigen Verbindung nicht mehr unterschieden werden können, läßt sich nicht bestimmen. Haller behauptete auf dem Wege, auf welchem das Blut aus der Aorta bis in die dem

58 Zahl der Theilungen, Lage und Größe der Arterien.

Unge verschwindenden kleinen Arterien der Gedärme reißt, nie über 20 Theilungen gezählt zu haben. Keill nahm nach der Zählung der Theilungen der Arterien an menschlichen Körpern, die Cowper künstlich angefüllt hatte, 40 bis 50 Theilungen an.

Lage der Arterien.

Die größeren Stämme und Zweige der Körperarterien liegen unter Muskeln, Knochen und unter andern Theilen geschützt, was bei vielen Venenstämmen nicht der Fall ist. Diese Einrichtung verhindert die Lebensgefahr, die aus der Steifheit der Arterien, vermöge deren sie immer offen stehen und ihre Wunden klaffen, entspringen würde. Denn aus einer verletzten großen Arterie fährt das Blut so lange fort auszuströmen, bis der Tod eingetreten ist; dagegen schließen sich selbst sehr große Venenstämmen durch einen geringen Druck, etwas kleinere auch von selbst, und der Ausfluß des Bluts läßt meistens aus den Venen nach, wenn Dhnmacht eintritt. Während es demnach von keinem Nachtheile ist, daß viele große Venenstämmen dicht unter der Haut liegen, würde diese Lage, wenn sie bei den Arterien Statt fände, sehr gefährlich gewesen sein. An den Gelenken, die sich nur nach einer Seite zu stark beugen, liegen die Arterien an der Beugeseite, an den, welche sich nach 2 entgegengesetzten Seiten beträchtlich beugen, laufen die Arterien neben den Beugeseiten hin und sind dadurch vor einer nachtheiligen Dehnung geschützt.

An Theilen, welche sich zuweilen vergrößern, oder ihre Lage so verändern, daß ihre Arterien, wenn sie gerade wären, gedehnt werden müßten, sind die Arterien schlangenförmig gekrümmt. S. B. die Arterien des Nabelstrangs, des Uterus, die in der Nähe des Kopfes in den Schädel tretenden Arterien, die der Lippen, der Zunge, der Iris u. s. w. Man darf aber diese schlangenförmigen Krümmungen nicht mit denjenigen verwechseln, welche überall entstehen können, wenn die Arterien durch eine mit großer Gewalt eingespritzte Flüssigkeit ihrer Länge nach übermäßig ausgedehnt werden.

Größe der Höhle des Arteriensystems in den Stämmen und Zweigen.

So lange eine Arterie keinen Ast abgiebt, bleibt ihre Höhle gleich weit, oder, mit andern Worten, bleibt der Querschnitt ihrer Höhle gleich groß. Rechnet man dagegen an jeder Stelle, wo eine Arterie einen Ast abgiebt, die Höhle des abgegebenen Astes und die Höhle der Fortsetzung des Stammes zusammen, und vergleicht den Querschnitt der Fortsetzung des Stammes und des Astes zusammengenommen mit dem Querschnitte des Stammes oberhalb der Theilung; so findet man, daß der erstere immer größer als der letztere ist. Denkt man sich also die Röhren aller Aeste, die aus der Aorta ihren Ursprung nehmen, in eine einzige Röhre vereinigt, und vergleicht den Querschnitt dieser Röhre mit dem Querschnitte des Anfangs der Aorta, so findet man jenen

Querschnitt viel größer, als diesen. Denkt man nun ferner auf eine ähnliche Weise sich alle Röhren der 2ten Ordnung, welche aus jedem Aste der Aorta entspringen, an ihrer Ursprungsstelle in eine Röhre vereinigt, und vergleicht den Querschnitt dieser Röhre mit dem Querschnitte jedes Astes der Aorta, so findet man, daß die Summe der Querschnitte aller Röhren der 2ten Ordnung, den einer Röhre der 2ten Ordnung, aus der sie hervorgegangen sind, noch mehr an Größe übertrifft, als die Summe der Querschnitte aller Röhren der 2ten Ordnung den Querschnitt der Aorta. Nimmt man nun an, daß dasselbe auch bei allen den kleinen Ordnungen von Gefäßen, welche Keil und Haller noch unterschieden haben, auf gleiche Weise der Fall sei, so sieht man ein, daß der Raum, welcher in allen den vereinigt gedachten Röhren, die zu jeder Ordnung von Arterien gehören, enthalten ist, in der Nähe des Herzens in den großen Stämmen enger, in den kleinen Zweigen, entfernter vom Herzen, weiter sein müsse, und daß folglich dieser Raum einen Kegel, dessen Spitze am Herzen, dessen Basis in den Haargefäßen liegt, darstelle. Eben so verhält sich's bei den Venen, die das Blut zum Herzen zurückführen. Auch diese schließen in ihren kleineren Zweigen, wenn diese zusammengerechnet werden, eine größere Höhle ein, als in ihren größten Zweigen und in den Stämmen, und der Raum, der im Venensystem eingeschlossen ist, stellt also einen Kegel dar, dessen Spitze gleichfalls am Herzen und dessen Basis in den kleinsten Zweigen liegt.

Die Messungen, durch welche man die Zunahme der Höhle des Arteriensystems bei jeder neuen Ordnung von Zweigen zu bestimmen gesucht hat, sind bei verschiedenen Anatomen sehr verschieden ausgefallen. Es bedarf dieser wichtige Gegenstand noch einer neuen, sehr sorgfältig wiederholten Untersuchung. Indessen scheint es, als ob die Zunahme nicht bei allen Arterientheilungen gleich sei, und als ob im Allgemeinen die Zunahme bei der 2ten Ordnung von Röhren geringer als bei der 3ten sei. Es versteht sich von selbst, daß, wenn sich die Aeste einer sich theilenden Arterie mit benachbarten Aesten vereinigen, an diesen Theilungen keine Erweiterung der Höhle des Arteriensystems Statt zu finden brauche, weil die Erweiterung, die bei der Theilung geschieht, durch die Verengung des Raums, die bei der Vereinigung von Aesten entsteht, aufgehoben werden kann. Aus diesem Grunde erweitert sich das Gefäßsystem in den Haargefäßnetzen nicht in dem Grade, als es außerdem der Fall sein würde.

Geschwindigkeit des Blutlaufs in den Stämmen und Zweigen der Arterien.

Die Einrichtung, daß das Arteriensystem sich in seiner Höhle nach den Aesten zu erweitert, hat die wichtige Folge, daß das Blut in der 2ten Ordnung von Röhren langsamer als in der 1ten, in der 3ten Ordnung von Röhren wieder langsamer als in der 2ten fließen muß,

60 Geschwindigkeit des Blutlaufs in den Stämmen u. Zweigen.

u. s. w. Man sieht dieses offenbar an den Atern durchsichtiger Theile lebender Thiere mit dem Mikroskope, man begreift es aber auch schon durch Ueberlegung. Denn denkt man sich z. B., daß eine gleichzeitig viereckige Röhre, die im Durchmesser 1 Zoll mißt, und deren Querschnitt daher 1 Quadrat Zoll beträgt, vollkommen mit Flüssigkeit erfüllt sei, und plötzlich in eine Röhre übergehe, die 2 Zoll im Durchmesser hat und deren Querschnitt folglich 4 Quadrat Zoll beträgt, so wird man einsehen, daß die Flüssigkeit, wenn sie fortbewegt wird, in dieser 2ten Röhre 4 mal langsamer fließen müsse, als in jener kleinen Röhre, aus Gründen, die im organischen Körper durch keine organische Kraft beseitigt werden können. Denn die nämliche Menge Flüssigkeit, welche in der engeren Röhre ein 4 Zoll langes Stück der Röhre erfüllte, reicht, wenn sie in die weitere Röhre gelangt ist, nur hin, um ein 1 Zoll langes Stück derselben zu erfüllen.

Wie oben S. 40 schon erwähnt worden, so fließt das Blut in den Atern verschiedener Theile mit verschiedener Geschwindigkeit, z. B. in den Lungen mit größerer Geschwindigkeit, als in anderen Theilen. Vielleicht fließt es sogar in jedem absondernden Organe und in jedem zu ernährenden Theile mit einer andern Geschwindigkeit. Zwei einfache Mittel nun, welche die zwei Ursachen, welche bewirken, daß das Blut, ob es gleich von dem nämlichen Pumpwerke, dem Herzen, fortgetrieben wird, doch in verschiedenen Organen mit verschiedener Geschwindigkeit laufe, liegen in dieser Zunahme der gemeinschaftlichen Höhle der Röhren, in welchen es fließt, und in der größeren oder geringeren Engigkeit der feinsten Haargefäße, durch welche es hindurch muß, ehe es in die Venen gelangt, und in denen es wegen der Adhäsion des Bluts an den Wänden ein desto größeres Hinderniß erleidet, je enger sie sind.

Die Methode, die Röhren hinsichtlich ihres Rauminhalts unter einander zu vergleichen, besteht darin, daß man, wie Keil und Haller, den Durchmesser der Höhle der Arterien, nachdem sie mit einer festen Masse sehr gleichförmig ausgefüllt worden sind, an sehr vielen Stellen genau mißt, auf den, diese Durchmesser darstellenden Linien ein gleichseitiges Quadrat errichtet, und diese Quadrate der Durchmesser der Aeste in Gedanken zusammensetzt, um sie mit dem Quadrate des Durchmessers des Stammes zu vergleichen. Da indessen nicht alle Arterien durch Flüssigkeit, die man in sie einspricht, in gleichem Grade ausgedehnt werden, und da sie beim Trocknen an manchen Stellen mehr, an andern weniger davon durchschwitzen lassen; so ist dabei einige Vorsicht anzuwenden, und in gewisser Rücksicht eine 2te Methode, um eine Bestätigung zu erhalten, zu empfehlen, nach welcher man große frische Arterien der Länge nach aufschneidet, den Abstand der Ränder derselben, nachdem sie, jedoch ohne Dehnung, ausgebreitet worden, mißt, und daraus den Durchmesser der Gefäße und deren Quadrate berechnet. Endlich kommt man auch allenfalls zu seinem Zwecke, wenn man, wie John Hunter, gleich lange Stücke aller Aeste, die ein Stamm abgiebt, nachdem sie mit einer gleichförmigen erstarrenden Flüssigkeit angefüllt worden, wägt, und ihr gemeinschaftliches Gewicht mit dem Gewichte eines gleich großen Stückes des Stammes vergleicht. Hunter that dieses z. B. mit den beiden Endästen der Aorta, von denen er in der Nähe ihres Ursprungs ein gleich langes Stück abschchnitt, und diese 2 Stücke durch Wägung mit einem gleich langen Stück der Aorta, das kurz oberhalb ihrer Theilung in diese Aeste abgeschnitten worden, verglich, wobei man indessen ähnlichen Irrungen unterworfen ist, als bei der ersten Methode.

Festigkeit der Arterien.

Die Stämme der Arterien sind im Allgemeinen fester, und schwerer zerreißbar, als ihre Aeste, was daher rührt, daß ihre Wände absolut

bider sind. Die Anatomen finden daher, daß, wenn man, wie Wintringham, in die Arterien so lange mittels einer Compressionsmaschine Luft, oder wie Viele gethan haben, mittels einer Spritze tropfbare Flüssigkeit eintreibt, bis sie zerplatzen, die Aorta weniger ger leicht als ihre Zweige zerreißt. Ein anderer Erfolg kann freilich eintreten, wenn sich die Anatomen zum Einspritzen, wie sie meistens thun, schnell gerinnender Flüssigkeiten bedienen, die in den Blutgefäßen von mittlerer Größe länger als in den sehr kleinen flüssig bleiben, und daher zu den kleinen Gefäßen den von der Spritze hervorgebrachten Druck nicht mehr fortpflanzen, wenn die mittleren demselben immer noch ausgesetzt sind. Die Aorta eines jungen Mannes riß bei Wintringham's Versuchen in der Nähe des Herzens durch einen Druck der Luft, der 119 Pfunden und 5 Unzen, ein Stück tiefer von einem Drucke, der 131 Pfunden 10 Unzen gleich kam. Die Milzarterie eines Mannes ertrug einen Druck der Luft, der 41 Pfunden gleich kam. Eine ganz andere Frage ist die, ob die großen Arterien verhältnißmäßig zur Dicke ihrer häutigen Wand an der Aorta fester als an den kleineren Arterien seien. Hier hat Wintringham nach seinen Versuchen das Gegentheil gefunden, so daß z. B. jene Milzarterie, ob sie gleich absolut leichter zerriß als die Aorta, doch verhältnißmäßig aus einer festeren Substanz als die Aorta bestehen mußte, weil sie außerdem, da ihre Wand sehr viel dünner als die der Aorta war, noch viel leichter hätte zerreißen müssen.

Die Dicke der Wände und also auch die Festigkeit der Arterien entspricht dem Drucke, den sie von Seiten des vom Herzen in sie eingetriebenen Bluts auszuhalten haben. Da nun ein dickes, sehr muskulöses Herz das Blut mit größerer Gewalt vorwärts treibt als ein dünnes, weniger muskulöses, so entspricht auch die Dicke der Wände der Arterien und ihre Festigkeit, der Muskelstärke eines jeden von diesen beiden Ventrikeln des Herzens. Diesen Satz bestätigt die Erfahrung sowohl bei dem Menschen, als bei den Säugethieren und Vögeln. Die linke Herzkammer hat viel dickere, fleischigere Wände, und folglich viel mehr Muskelkraft als die rechte. Darter hat auch die Aorta, in welche das Blut von ihr eingetrieben wird, viel dickere Wände als die Arteria pulmonalis. Unstreitig war auch ein größerer Kraftaufwand nöthig, um das Blut durch das zum Theil engere und viel ausgedehntere und längere Haargefäßes des Körpers, welches zur Ernährung und zur Absonderung von Säften dient, zu treiben, als dasselbe durch das weit kürzere und kleinere Haargefäßes der überdies sehr nahe liegenden Lungen hindurch zu bewegen. Denn in dem Haargefäßes des Körpers muß wegen seiner größeren Länge und zum Theil wegen seiner Engigkeit das Blut durch Reibung und Klebrigkeit weit mehr Hindernisse in seiner Bewegung finden, als in dem Haargefäßes der Lungen. Nach den von Wintringham an verschiedenen Stellen des Hauptstammes der Körperarterien gemachten Messungen, scheint indessen die Dicke der Wand nicht in dem nämlichen Verhältnisse in kleineren Arterien abzunehmen, als der Querschnitt der Höhle, so daß die Wände der kleineren Arterien in Vergleich zu dem kleineren Querschnitt ihrer Höhle ein wenig dicker sind, als die Wände der Aorta in Vergleich zu dem größeren Querschnitt ihrer Höhle. Indessen erstrecken sich Wintringham's Versuche nur auf einige Stellen der Aorta, nicht auf kleinere Arterien, und reichen deswegen noch nicht hin, einen solchen Satz zu beweisen.

¹⁾ Wintringham, Experimental inquiry on some parts of the animal structure. Siehe Haller, de partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I. Lib. II. S. I. §. 14.

Häute der Arterien.

So weit die Kleinheit der Arterien eine Untersuchung ihrer Bau gestattet, findet man, daß sie aus folgenden 3 concentrisch in einander eingeschlossenen Häuten, die untereinander fest zusammenhängen, bestehen. Zwei derselben, die innerste und die äußerste Haut, kommen zu gewissen Abänderungen auch den Venen zu, die mittlere ist dagegen ein den Arterien eigenthümliche Haut, welche mit ihrer Bestimmung Puls abern zu sein, d. h. den Druck des vom Herzen vorwärtsgetriebenen Blutes auszuhalten, zusammenhängt.

1) Die erste derselben, die äußere Haut, tunica externa, ist eine weiße, verhältnißmäßig für ihre Dicke schwer zerreißbare, zugleich aber leicht ausdehnbare Haut, welche aus einem Gewirr sich nach allen Richtungen durchkreuzender kleiner feiner Fäden und außerordentlich vielen kleinen Blutgefäße besteht, welche äußerlich locker, inwendig dicht übereinander liegen und enger untereinander verbunden sind. Man nennt sie die Zellgewebshaut, tunica cellulosa, ohne jedoch nachgewiesen zu haben, daß die feinen Fasern, aus denen sie besteht, und zwischen welchen kein Fett eingeschlossen ist, von derselben Natur als das gewöhnlich mit diesem Namen benannte Zellgewebe sei. Vielmehr unterscheidet sich die Substanz der äußeren Haut der Arterien unter andern dadurch wesentlich vom Zellgewebe, daß sie viel mehr Blutgefäße besitzt. Durch Einweichen in Wasser lockert sich auch der innerste dichte Theil dieser Haut auf. Äußerlich steht sie mit einem lockern, weichen, in Blättern und Zellen ausdehnbaren Zellgewebe in Verbindung, mittels dessen die Arterien in den zwischen den Organen des Körpers befindlichen Zwischenräumen locker aufgehängt sind, so daß sie sich verschieben und ausdehnen können. Nach innen zu hängt diese äußere Haut mit der mittleren Haut so innig zusammen, daß man beide nicht leicht von einander trennen kann, ohne entweder eine dünne Lage der Zellgewebshaut an der mittlern Haut zurückzulassen, oder Fasern der letzteren mit loszureißen.

2) Die mittlere Haut ist gelb, in der Richtung der Durchmesser der Arterien wenig ausdehnbar, aber sehr elastisch, und verhältnißmäßig zu ihrer beträchtlichen Dicke leicht zerreißbar. Sie läßt sich sehr leicht in beliebig viele concentrische Lagen zertheilen, von denen jede sich in der Richtung des Querschnitts der Arterien viel leichter, als in der Richtung ihrer Länge zerreißen und in Circelfasern zertheilen läßt, so daß man von der mittleren Haut der Arterien mit leichter Mühe ein Menge platter, bandartiger, concentrisch liegender Bündel abziehen kann. Weder diese concentrisch übereinander liegenden Lagen, noch die Fasern

die sich jede Lage zerreißen läßt, sind durch Zellgewebe von einander abgesondert, wie das bei den Muskelfasern und Sehnenfasern der Fall ist. Vielmehr haften sie unmittelbar an einander, und lassen sich auf mit einem sehr scharfen Messer gemachten Durchschnittsflächen weder mit dem Gesicht allein, noch mit Hülfe des Mikroskops durch wahrnehmbare Grenzlinien unterscheiden. Zerreißt man die Haut, so sieht man zwar zwischen den sich von einander trennenden Blättchen und Fasern feine Fädchen und Blättchen befindlich, welche indessen nicht für Zellgewebe, sondern für kleine Theilchen der mittleren Haut selbst, welche beim Zerreißen ausgedehnt werden, zu halten sind, und daher weder durch Einweichen in Wasser, noch durch andere künstliche Hülfsmittel das Aussehen des Zellgewebes erhalten. Der Umstand, daß die Lagen und Fasern, in die sich diese Haut zerreißen läßt, nicht wie die Muskelfasern durch Zellgewebe von einander abgesondert werden, ist für ihre Bestimmung sehr wesentlich. Denn so wie das zwischen den Muskelfasern und Sehnenfasern liegende nachgiebige Zellgewebe das Mittel ist, durch welches sich jede Faser und jedes Bündel in einem gewissen Grade ausdehnen und sich an den benachbarten Fasern etwas verschieben können, so bewirkt der Mangel eines solchen Zellgewebes in der mittleren Arterienhaut, daß ihre Lagen und Fasern nur einer gemeinschaftlichen Bewegung fähig sind. Weil die Fasern nicht getheilt und einzeln beweglich neben einander liegen, so war es auch nicht erforderlich, daß jede Faser von einem besonderen Netze von Blutgefäßen umgeben werde, was bei den Fleischfasern der Fall ist ¹⁾.

Die Fasern, die man von dieser Haut abziehen kann, liegen übrigens nicht immer parallel, sondern zuweilen etwas seitwärts gebogen. Wo ein Ast aus einem Stamme abgeht, hat dieser seine eigenthümlichen Circelfasern, über welche sich die Fasern des Stamms hinwegziehen. An der gewölbten Seite des Bogens der Aorta ist die Fasermasse dicker als an der concaven. An den Arterien im Innern des Gehirns und der Milz ist sie sehr dünn, fehlt aber doch nicht ganz. Die Substanz, aus welcher diese mittlere Arterienhaut besteht, und von welcher schon Theil I. S. 365 gehandelt worden, ist eine eigenthümliche, die weder der Substanz des Fleisches, noch der der Sehnen ähnlich. Man hat diese Haut daher ehemals nur mit Unrecht tunica muscu-

^{1) Doellinger}, Bemerkungen über die Vertheilung der feinsten Blutgefäße in den beweglichen Theilen des thierischen Körpers in *Meckels Archive für die Physiologie*, B. VI. 1820. S. 191, 192, wo er sagt, daß die Fleischfasern sich dadurch auszeichnen, daß sie von sehr vielen kleinen Haargefäßen begleitet werden, die ihnen parallel laufen und unter einander im Fortgehen anastomosiren; daß sich dagegen die kleinsten Gefäße in der mittleren Haut der Arterien ganz anders vertheilen, indem sie sich baumförmig theilen und nie neben den Fasern parallel laufen.

laris genannt ¹⁾. Auch muß man, wenn man sie neuerlich brosa nennt, dabei nur an ihre Eigenschaft, sich leicht in zerreißen zu lassen, nicht aber an die Gegenwart von Sel ihr denken. Sie ist härter, trockner und weniger blutreich fault schwer, und riecht dabei nicht so übel, giebt, wie *Berzelius* angegeben haben, durch Kochen im Wasser und kein Ösmazom her, durch langes Faulen im Wasser v sich zwar in einen Brei, aber nicht in Zellgewebe, und be auch nicht das Vermögen, durch eine ihr bewohnende leb schnelle sichtbare Bewegungen zu machen.

Essigsäure, welche bekanntlich den Faserstoff erweicht, durchsicht auflöst, verändert die Farbe der Arterien nach den von *Belma* angestellten Versuchen wenig, und macht sie vielmehr dichter. *Ver dasselbe*. Nach ihm wird diese Haut, wenn sie mit concentrirter Gossen wird, weder erweicht, noch aufgelöst, und sogar in kochend Essigsäure ist sie unauf löslich; dagegen ist sie in Schwefelsäure, oder Salzsäure, die man mit so viel Wasser verdünnt hat, daß sie die setzen, sehr leicht, zumal in Digestionswärme, auflöslich. Die da Flüssigkeit wird weder von Alkali, noch von Cyaneisenkalium gefe *Berzelius* geschehen müßte, wenn sie aus Faserstoff bestände. *Kali* wird sie zu einer ungefärbten, aber etwas unklaren, durch fällbaren Flüssigkeit aufgelöst.

Durch mehrere der erwähnten Eigenschaften, namentlich daß sie gekocht keinen Leim hergiebt, ferner durch ihre gelb lerne Farbe, so wie durch ihre viel größere Ausdehnbarkeit i Festigkeit unterscheidet sich die Substanz der mittlern Arter hinlänglich von der der Sehnen.

Nach *John Hunter* ⁴⁾ Versuchen waren die Arter Verblutung gestorbenen Pferdes so ausdehnbar, daß die a Wand der Aorta, der Quere nach ausgedehnt, fast noch ei gezogen wurde, als sie zuvor war. Ließ man mit der Ausd so zog sie sich durch ihre Elasticität wieder zusammen, jedoc auf ihre vorige Größe, denn sie hatte um $\frac{1}{11}$ bis um $\frac{1}{17}$ Breite zugenommen. Kleinere Arterien besaßen dieses Be durch ihre Elasticität wieder zusammen zu ziehen, in ein Grade als größere.

¹⁾ *De la Söne*, Recherches sur la structure des artères. Mém. de sc. 1756. Paris 1762. 4. S. 119. betrachtete die Fasern der m Arterien als Muskelfasern von eigenthümlicher Art.

²⁾ *Belmas*, Structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions rations organiques. Strasbourg 1821. 4. p. 26.

³⁾ *Berzelius*, Lehrbuch der Thierchemie, a. d. Schw. übers. v Dresden 1831. 8. p. 80.

⁴⁾ *John Hunter*, Versuch über das Blut, die Entzündung und die Schuß Leipzig 1800. 8. Bd. 1.

nach den Versuchen von Belmas¹⁾ ließen sich einzelne Fasern, die er von der inneren Haut der Aorta des Menschen abzog, nur um $\frac{1}{2}$ ihrer Länge auseinander ziehen, ehe sie zerrißen. Waren daher die abgezogenen Fasern lang, so war nach diesem Stück größer, als wenn sie kurz waren.

Die innerste, äußerst dünne, glatte, sehr dichte und durchsichtige Haut, tunica intima²⁾, welche nicht faserig ist, kommt allen Theilen des Gefäßsystems zu, denn sie dringt in die Höhlen des Herzens ein, und erstreckt sich von da aus ohne Unterbrechung in die Venen. Der Embryo setzt sie sich sogar aus dem hellrothen Blut enthaltenden Gefäßwänden in die dunkelrothen Blut führenden fort. Am Anfang der Arterien bildet sie die Falten, aus welchen die halbmondsförmigen Falten bestehen. Uebrigens zeichnet sie sich in den Arterien dadurch aus, daß sie sich daselbst leichter als in den Venen zerreißen und durch zusammengezogenen Faden durchschneiden läßt, auch im Alter öfters eine Ablagerung von erdiger Substanz an ihrer äußeren Oberfläche zeigt. Sie hängt der mittlern Haut sehr fest an, läßt sich jedoch von derselben in immer erneuertem Wasser zu faulen anfangen, stückweise abziehen. B. S. Albin³⁾ und Bichat⁴⁾ konnten dabei keine Lage Zellgewebe zwischen ihr und der mittlern Haut der Arterien entdecken, obgleich Alexander von Linné⁵⁾ eine dünne Lage desselben beschrieben, und vermuthet hat, daß dieses Zellgewebe der Sitz der Verknöcherung sei, dem die Arterien so sehr unterworfen sind⁶⁾. Albin und Bichat konnten auch die Längensfasern nicht

Belmas a. a. O. p. 28.

Geber die innerste Haut der Gefäße, namentlich über die Frage, ob sie als eine Art Oberhaut derselben, welche keine Gefäße und Nerven besitzt, zu betrachten sei, über die Röthung dieser Haut durch zersetztes Blut, das von ihr nach dem Tode eingesogen wird, ist Theil I. S. 245 — 253 nachzusehen.

Albini Academicarum annotationum Lib. IV. c. 8. p. 36.

Bichat a. a. O. S. 57.

Alexander Monro, die medicinischen Versuche und Bemerkungen, welche von einer Gesellschaft in Edinburgh durchgesehen und herausgegeben worden, a. d. E. übersetzt. Edinburgh 1750. B. II. S. 351, 352.

Die neuesten Schriftsteller über die Häute der Arterien sind Michaelis Jäger Tractatus anatomico-physiologicus de arteriarum pulsu. Wirceburgi 1820. p. 3. C. Mondini in Opuscolo scientifico di Bologna. T. I. 1817. Charles Henri Ehrmann, Structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions et leurs altérations organiques etc. Strasbourg 1822. 4., und Belmas unter demselben Titel und in demselben Jahre zu Straßburg erschienene Schrift in Christian Gottlieb Ludwig, De arteriarum tunicis. Lipsiae 1739. 4. und in Halleters Disp. anat. select. Vol. II, p. 1. sq. und Jäger a. a. O. haben die Meinungen verschiedener Schriftsteller über die Zahl der Häute der Arterien gesammelt. Douglas (Descriptio peritonaei et membranae cellularis etc. ex anglo latine versa ab El. Fried. Heistero. Helmstadii 1733. p. 54, 55) nimmt nur 1 Haut an, glaubt aber, daß sie aus Zirkel- und Längensfasern besteht. Helernus nimmt 2 Häute an (De anatomicis administrationibus VII. §. 5.) Al. Monro, Sommering, Bichat, Meckel und viele andre Anatomen zählen 3 Häute. Willis (Pharmacologia rationalis sect. V. cap. 3.) Vieussens (Novum anatomiae c. h. systema. Amst. 1705. p. 88), Verheyen (Anat. c. h. Lib. I. Tract. 1 c. 4.), Lancisi (De motu cordis et aneurysmatibus, Romae 1728. lib. p. 95) nehmen 4 Häute der Arterien an. Endlich zählen Laurentius Heister (Compendium anatomicum, Altorf. 1727 p. 302, Nota.) De Gorter (Compendium Anatomie, III.

finden, welche Alexander Monro an ihr wahrgenommen zu haben meint, w wohl neuerlich auch Gerlach ¹⁾ solche Fasern gesehen zu haben behauptet. D sehe übrigens über diese innerste Haut das nach, was Th. I. S. 245 gesagt w den ist.

Der Streit über die Zahl der Häute der Arterien ist mehr ein Streit w cher die gebrauchten Worte, als die Wahrnehmungen betrifft ²⁾. Betrachtet m nämlich die benachbarten Häute, an welche die Arterien an manchen Stee von einer oder von mehreren Seiten angrenzen, z. B. die Brusthaut, die Bau häute und den Herzbeutel, als Häute der Arterien, nennt man das lockere Ge gewebe, durch welches die Arterien äußerlich an benachbarte Theile befestigt su mit Haller *Tunica cellulosa adscitia*, oder die nicht sichtbare Lage Zellgewe zwischen der mittlern und inneren Haut, *Tunica cellulosa interior*, so hat m 5 Häute, ohne von andern Anatomen, die nur 3 annehmen, in seiner Behauptu im Wesentlichen abzuweichen; nennt man dagegen die dicke äußere Zellhaut e Zellgewebe, das man nicht für eine Haut anerkennt, oder trägt man Bedenke die innerste Haut der Arterien als eine besondere Haut zu betrachten, weil m sie nur mit Mühe und in kleinen Stücken ablösen kann, so kann man nur 2 ob fogar nur 1 Arterienhaut zählen, ohne jedoch eine wesentlich verschiedene Ni nung vorzutragen. Von anderer Art ist freilich die Annahme einer Drüsenha unter der Zellgewebshaut der Arterien. Allein dieser Punkt ist nicht mehr str tig. Genaue Untersuchungen haben gelehrt, daß die von Willis, Vieussens Verhejen und De Gorter angenommenen, von Bidloo sogar abgebildete Drüsen in der Wand der Arterien nicht vorhanden sind.

Bemerkenswerth ist es, daß mehrere Anatomen an der mittleren Haut 2 v schiedene Lagen unterschieden haben. John Hunter ³⁾ glaubte z. B. an d mittleren Haut der Arterien, wenn er Arterien von mäßiger Größe untersucht eine innere, dunklere und etwas durchsichtigere Lage, die nach seiner Vermuthu muskulos ist, und eine äußere mehr elastische zu unterscheiden. Er beobachte den Unterschied der Farbe dieser 2 Lagen auf der Durchschnittsfläche der mit eine scharfen Messer quer durchgeschnittenen Arterien, und meinte, daß in der mäl leren Haut sehr großer Arterien die äußere elastische Lage, an der der sehr klei Arterien die innere Lage das Uebergewicht habe. Hierbei kann sich Hunti freilich getäuscht haben. Denn da die Haut der Arterien nach dem Tode nie selten Blutfarbe einfaugt und sich von innen her rötzet, so kann hierin der U terchied der Farbe jener 2 Lagen gelegen haben. Indessen führt er noch ein 2ten Unterschied dieser 2 Lagen an, der diesem Einwurfe nicht ausgesetzt ist; er l hauptet nämlich, daß, wenn man eine aufgeschnittene Arterie der Quere nach an dehne, so ziehe sich nachher die äußere elastische Lage der mittleren Haut stärf zusammen, als die innere dunklere, und diese letztere rage daher auf der Dur schnittsfläche hervor, und beuge sogar die Wand nach der entgegengesetzten Sei so daß die convexe Oberfläche zur concaven werde. Die Richtung der Fasa konnte er an dieser Lage nicht unterscheiden.

Auch Mascagni ⁴⁾ unterscheidet auf jener Haut, die wir die mittl ge nannt haben, 2 Lagen, die äußere Lage, die er *elastica*, und die innere, die *nervea* nennt. Die 2te ist nach ihm viel dünner, aus viel feineren Filament zusammengefest, aber dennoch fester und *compacte* als die erstere. Nach ihm die elastische Lage, ob sie gleich aus Firkelfasern zu bestehen scheint, bei genaue Untersuchung mit dem Mikroskope, dem Gewebe einer Strohmatte ähnlich.

An den größten Arterienstämmen ist die mittlere Arterienhaut d

medicinae Tract. XIX. §. 40.) und Haller (*De partium c. h. praecipuaru fabrica et functionibus*. Lib. II. Sect. 1. §. 5 — 9.) 5 Häute der Arterien.

¹⁾ Gerlach, anatomisch-physiologische Inauguralabhandlung über das System d Gefäße. Würzburg 1816. p. 20.

²⁾ Albin sagt daher mit Recht »ut omittam numerum tunicarum, quibus de reb non libenter disputo«.

³⁾ Hunter, über das Blut, die Entzündung und die Schußwunden, a. d. E. Erst 1800. B. 1. 8.

⁴⁾ Mascagni, *Prodromo della grande anatomia; opera postuma etc.* Firenze 181 S. 61.

die dickste unter allen. Je kleiner der Durchmesser der Arterien wird, desto mehr verliert sich diese hervorstechende Dicke der mittleren Haut. Da nun die sehr kleinen Arterien durchsichtig sind, wenn sie gefocht werden, nicht hart und unverdaulich bleiben, wie die großen Stämme, so muß man wohl schließen, daß die elastische Substanz in ihnen sehr dünn ist, oder fast ganz fehlt.

Nuzen der drei Häute der Arterien.

Die äußere Haut hält die Arterien noch zusammen, wenn auch die innere und mittlere an einer Stelle durchbrochen oder durchschnitten worden. Dieses geschieht z. B. durch einen Faden, womit die Arterien eines lebenden Menschen zugebunden worden, oder wenn das Blut die krankhaft veränderte innere und mittlere Haut durchbricht. In dem letzteren Falle wird oft die äußere nachgiebige Haut durch den Druck des Bluts sackförmig ausgedehnt und verdickt, sie bildet dann eine Geschwulst, die man aneurisma, Pulsabergeschwulst, nennt.

Die innerste Haut hat den Nuzen, durch ihre große Glätte die Reibung des Bluts an den Wänden der Arterien, und das hieraus entspringende Hinderniß für die Bewegung des Bluts möglichst zu vermindern, zugleich aber durch ihre große Dichtigkeit zu verhüten, daß das Blut nicht zwecklos in die schwammige Substanz der Arterienwände ein- und durch sie hindurchbringe. Unstreitig ist es auch diese Haut, welche in den kleinen Arterien vermöge besonderer, noch nicht gehörig bekannter, Einrichtungen einen wesentlichen Nuzen bei der Absonderung der Säfte hat.

Die mittlere, den Arterien eigenthümliche Haut endlich verhindert, daß die Arterien auf der einen Seite nicht so leicht von außen her zusammengedrückt werden, sondern immer offen stehen, und daher mit einer ununterbrochenen Blutsäule gefüllt sind, auf der andern, daß sie von innen her durch das Blut nicht übermäßig, aber doch in einigem Grade ausgedehnt werden, und sich wieder, mit fast eben so großer Kraft zu verengen und zu verkürzen streben, und dadurch das Blut vorwärts treiben.

Puls der Arterien.

Die größeren Arterien und die von mittlerer Größe zeichnen sich während des Lebens durch den an ihnen fühlbaren Puls aus, der zu dem Namen Pulsadern, Schlagadern, womit man die Arterien bezeichnet, Veranlassung gegeben hat. Dieser Puls entsteht dadurch, daß die Herzkammern in die mit ihnen zusammenhängenden großen, vom Blute vollen Arterien wiederholt eine gewisse Menge Blut eintreiben. Das Blut, womit die Arterien angefüllt sind, erleidet, da es durch die engen Haar-

gefäße nicht schnell genug vorwärts geschoben werden kann, einen Damm vermöge dessen es wie jede gedrückte Flüssigkeit nach allen Richtungen auszuweichen strebt. Eine ausdehnbare, elastische, volle Röhre, in welche durch eine weite Oeffnung Flüssigkeit mit Gewalt eingetrieben wird, die an das andere Ende der Röhre aus irgend einem Grunde nicht schnell genug ausfließen kann (z. B. weil die Flüssigkeit an der Röhre daselbst durch ihre Zähigkeit haftet, oder weil jenes Ende sehr eng ist), wird durch den Druck der Flüssigkeit sowohl in der Richtung ihrer Durchmesser, als in der ihrer Länge gedehnt und durch beide Arten der Ausdehnung in ihrer Höhle erweitert. Eine solche Röhre überall verschiebbar, so werden sich die Enden der verlängerten Röhre von einander entfernen. Sind dagegen die Enden oder mehrere an Stellen der Röhre befestigt, so muß sich die Röhre dabei schlängeln. Das geschieht nun bei den Arterien. Sie verschieben und schlängeln sich, während durch das vom Herzen in sie eingedrückte Blut verlängert werden, und dehnen sich zugleich dabei in ihren Durchmessern etwas aus¹⁾. Die Ausdehnung der Arterien kann aber in der Richtung der Durchmesser aus 2 Ursachen nicht merklich sein als in der Richtung ihrer Länge, erstens, weil eine in gleichem Grade ausdehnbare Materie von einer und derselben Kraft um ein desto größeres Stück ausgedehnt wird, je länger die Materie ist. Ist z. B. ein aus dieser Materie bestehender Faden noch einmal so lang als ein zweiter Faden, so wird auch durch die nämliche Kraft um ein noch einmal so großes Stück ausgedehnt werden, als dieser. Nun sind aber die elastischen Fasern, welche die Peripherie der Arterienhöhle umgeben, sehr kurz, und zwar desto kürzer, je enger die Arterien sind; dagegen bildet die elastische Materie der Arterienwände ihrer Länge eine sehr lange Strecke. Folglich muß die Ausdehnung, welche die Arterien durch den Druck des Bluts in der Richtung ihrer Durchmesser erleiden, um so weniger merklich sein, je enger die Arterien sind, und jeder Zeit sehr gering gefunden werden, verglichen mit der Ausdehnung, die sie ihrer Länge nach erfahren. Es kommt noch ein zweiter Umstand, welcher bewirkt, daß die Ausdehnung, die die Arterien in der Richtung ihrer Durchmesser erleiden, noch geringer erscheint, als sie wirklich ist, der nämlich, daß man, indem man diese Erweiterung beobachtet, nur auf einen Durchmesser der Arterie Rücksicht nimmt. Da sich die Länge eines Durchmessers einer Röhre zur Länge der Peripherie derselben nahe wie 1 zu 3 verhält, so nimmt man, wenn sich z. B. die Peripherie 1 Linie ausdehnt, an dem Durchmesser nur eine Verlängerung von $\frac{1}{3}$ Linie wahr. Man darf sich daher nicht wundern, daß die Ausdehnung der Arterien in ihren Durchmessern während des Pulses so gering ist, daß man sie an den meisten Stellen an entblößten Arterien gar nicht durch das Gesicht wahrzunehmen im Stande ist, und es würde ganz irrig sein, mit PARRY darauf zu schließen, daß beim Pulse keine Erweiterung der Arterien in ihren Durchmessern Statt finde. Die Größe der gesammten Ausdehnung einer Arterie beim Pulse (d. h. sowohl der aus der Verlängerung der Arterie, als der aus ihrer Erweiterung entspringenden Ausdehnung) kann man mittelst einer von POISEUILLE ausgedachten Vorrichtung bei einem Pferde messen. Er machte nämlich die Arteria carotis communis am Halse eines lebenden Pferdes in einer Strecke 3 Decimetern ringsherum frei, so daß sie in die Höhe gehoben und in eine tergeschobene Rinne gelegt werden konnte. Diese Rinne war aus einer eisernen Röhre gebildet, aus deren Wand der ganzen Länge nach ein schmales Stück ausgehoben worden war. Dieses Stück setzte er, nachdem die Arterie in

¹⁾ Bichat. Allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff, B. I. Abth. 2. S. 63. Er hat sich in dem Irrthume, zu glauben, daß die Ortsbewegung, welche die Arterien Augenblick des Pulses erleiden, davon herrührten, daß die zuvor geschlängelten Arterien durch den Druck des Bluts gestreckt und gerade gemacht würden. Umgekehrt verhält sich umgekehrt, die Arterien werden im Augenblicke des Pulses ausgedehnt und daher länger und geschlängelt. Dasselbe findet nach dem Tode statt, wenn Anatomen in die Arterien Flüssigkeiten einspritzen. Sie schlängeln sich dann mehr, je mehr Kraft man bei der Einspritzung anwendet.

²⁾ Poiseuille, recherches sur l'action des artères dans la circulation artérielle. siehe Répertoire générale d'anatomie par Brocquet. 1829. Tome VII. p. 1.

Rinne gebracht worden war, wieder ein, verwandelte dadurch die Rinne wieder in eine Röhre, durch welche die Arterie (in welcher der Blutlauf fortbauerte) hindurchging, verschloß die beiden Enden der Röhre mit Wachs und Fett, und füllte den Raum, den die Arterie in der Röhre übrig ließ, mit mäßig warmen Wasser an, das er durch eine enge Glasröhre, die in die Röhre von außen hinein ging, einfüllte. Bei jedem Pulschlage stieg das Wasser in der 3 Millimeter dicken Glasröhre, durch die er das Wasser eingefüllt hatte, um 70 Millimeter, weil sich die in der eisernen Röhre gelegene, vom Wasser rings umgebene Arterie verlängerte und erweiterte, und das Wasser in die Glasröhre hinausdrängte. In dem Zwischenraume zwischen 2 Pulschlägen dagegen sank allemal das Wasser in der Glasröhre um eben so viel. Da er nun wußte, daß das eingeschlossene Stück der Arterie 235 Millimeter lang war, und 2106 Quadrat-Millimeter Raum einnahm, und daß es bei jedem Pulschlage um 210 Quadrat-Millimeter an Umfang zunahm, so folgt, daß es ungefähr um $\frac{1}{12}$ seines Raums ausgedehnt wurde.

Nuzen der Elasticität der Arterien.

Wären die Arterien wie Glasröhren sehr unausdehnbar, so würde das vom Herzen in sie auszutreibende Blut nicht eher Platz in ihnen finden, als bis das sämmtliche Blut in allen Arterien gleichzeitig vorwärts geschoben würde und Platz machte. Um aber das Blut in allen Stämmen, Zweigen und Haargefäßen gleichzeitig vorwärts zu schieben, würde von dem Herzen eine viel größere Kraft angewendet werden müssen, als erforderlich ist, wenn die Arterien ausdehnbar und elastisch sind. Denn unter jenen Umständen müßten alle die Hindernisse, die von der Reibung, Adhäsion des Bluts an den Wänden der Gefäße und von seinem Gewichte herrühren, gleichzeitig an allen Stellen des Gefäßsystems überwunden werden. Weil aber die Arterien ausdehnbar und elastisch sind, so findet das vom Herzen in sie auszustößende Blut zum Theil schon dadurch Platz, daß die dem Herzen näher gelegenen Arterien sich verlängern und erweitern, dadurch mehr Blut zu lassen im Stande sind und auf diese Weise das vom Herzen ausgetriebene Blut aufnehmen. Indem diese Arterien sich nun hierauf durch ihre Elasticität wieder verkürzen und verengern, und das Blut, das wegen der am Herzen befindlichen Taschenventile nicht wieder ins Herz zurückweichen kann, vorwärts drängen, bewirken sie, daß nun auch nach und nach die vom Herzen entfernteren Arterien vom vorwärts gedrängten Blute ausgedehnt werden, so, daß das Blut successiv in den nähern und entferntern Abtheilungen des Gefäßsystems schneller fortgeschoben wird. Weil dieses sehr schnell geschieht, so ist zwar der Puls an allen Arterien beinahe gleichzeitig, indessen ist er doch nicht so völlig gleichzeitig, daß man nicht zu fühlen im Stande wäre, daß jeder Pulschlag an der dem Herzen näheren Kopfschlagader ein wenig früher eintrete und nachlasse, als an der vom Herzen entfernteren Schlagader des Fußrückens ¹⁾.

¹⁾ Josias Weitbrecht, in den Commentar. Acad. imp. sc. Petropolitan. ad annum 1734 et 1735. Petropoli 1740. p. 317. — Th. Young, The Croonian

Man spricht daher mit Recht von einer Blutwelle, welche vom Anfange der Arterien bis an die Enden derselben fortgehe, und an jeder Stelle der Röhren in dem Zeitmomente, wo sie vorübergeht, den Puls verurache. Diese Welle besteht in einer fortschreitenden Ausdehnung der Wände der Arterien, die von Ort zu Ort längs der angefüllten Arterien fortgeht, und allemal an der Stelle, wo sie sich befindet, mit einer etwas verstärkten Vorwärtsbewegung des Bluts verbunden ist. Auf ähnliche Weise veruracht ein in die Mitte eines Teichs gefallener Stein eine Welle, welche endlich bis ans Ufer gelangt. Hierdurch wird nicht das vom Stein getroffene Wasser bis ans Ufer bewegt, sondern nur um den Stein herum auszuweichen genöthigt. Indem aber dieses Wasser wieder das benachbarte Wasser auszuweichen nöthigt, dessen Platz es einnimmt, so bewegt sich ein Wasserberg nach dem Ufer hin, der aber, während er fortrückt, immer von andern und andern Wasser gebildet wird. Um das ganze Wasser eines Teichs gleichzeitig ein klein wenig fortzuschieben, würde eine außerordentliche Kraft nöthig sein, dagegen nur successiv alle Wassertheilchen ein Stückchen fortzuschieben schon die Kraft hinreicht, die ein in das Wasser fallender Stein besitzt. Die Welle ist eine fortschreitende Form, keineswegs eine fortbewegte Materie. Während die Welle sich durch das Wasser hindurch bewegt, setzt sie an jeder Stelle, an welcher sie vorübergeht, das daselbst befindliche Wasser in eine kleine und nur eine kurze Zeit dauernde Bewegung. Die Wellenbewegung, die den Puls veruracht, ist eben so von der Fortbewegung des Bluts unterschieden, wie diese 2 Bewegungen im Flusse.

In dem Zeitraume von einem Herzschlage zum andern rückt das Blut in der Aorta nur um so viel weiter, als das vom Herzen ausgestoßene Blut Raum in dem an das Herz grenzenden Stücke der Aorta einnimmt, d. h. 6 bis 8 Zoll, die Blutwelle dagegen geht mit kaum meßbarer Geschwindigkeit bis ans Ende des Arteriensystems.

Hierzu kommt noch der Nutzen, den die elastische Haut der Arterien hat, indem sie bewirkt, daß das Blut nicht absetzweise fortgestoßen, sondern ununterbrochen vorwärts gedrückt wird. In der That fließt das Blut aus einer geöffneten Arterie eines lebenden Thiers in einem ununterbrochenen Strome aus, und dieser Blutstrom wird in größeren Arterien während jeden Pulschlages nur augenblicklich verstärkt. Die Verstärkung ist aber desto weniger merklich, je kleiner die Arterien sind, die man öffnet. Das Herz hat hierin einige Ähnlichkeit mit den Spritzen, z. B. mit den Feuerspritzen, daß die Flüssigkeit aus ihm in Zwischenräumen durch periodisch wiederholte Stöße ausgetrieben wird. Der Zweck beider Instrumente erfordert es aber, daß die Flüssigkeit in einem ununterbrochenen Strome fließe. Dieses ist in beiden dadurch bewirkt, daß bei jedem Drucke dieser Pumpwerke nicht nur die Flüssigkeit vorwärts getrieben, sondern auch ein elastischer Körper gespannt wird, welcher auf die Flüssigkeit zu drücken und sie auszutreiben fortfährt, während das Pumpwerk selbst nicht drückt. Dieser elastische Körper ist bei den Arterien die elastische Wand derselben, bei den Feuerspritzen die in ihrem Windkessel über dem Wasser befindliche Luft.

Druck, den die Arterien vom Blute auszuhalten haben.

Wie groß der Druck sei, welchen die Wände der Arterien im Momente des Pulses und in den Zwischenräumen zwischen den Pulschlägen vom Blute auszuhalten haben, kann man, wie schon oben erwähnt

lecture on the functions of the heart and arteries. Philos. Transact. for the year 1809. Part. I. p. 11 sq. — Ernestus Henricus Weber, Observationes anatomicae et physiologicae prolus. I. pulsum arteriarum non in omnibus arteriis simul, sed in arteriis a corde remotis paulo serius, quam in corde et in arteriis cordi vicinis fieri.

worden ist, bei einem lebenden Thiere dadurch finden, daß man wie Hales eine Arterie öffnet, in dieselbe eine senkrecht gestellte Glasröhre einfügt, anbindet, und beobachtet, wie hoch das Blut in der Röhre in die Höhe steigt. Auf diese Weise fand Hales¹⁾, daß das Blut in der Arteria carotis bei Pferden ungefähr 8—9 Fuß, beim Schafe 6½, bei verschiedenen Hunden im Mittel 4 Fuß hoch stieg, während es in Röhren, die in den entsprechenden Venen eingebunden worden waren, bei Pferden nur 12½ Zoll, beim Schafe 5½ Zoll, bei Hunden im Mittel 4 Zoll in der Röhre in die Höhe stieg. Er sah das Blut in der in eine Arterie gebrachten Röhre bei jedem Pulschlage um 1 oder einige Zoll bei heftiger Anstrengung der Muskeln um viel mehr steigen, beim tiefen Einathmen aber fallen. Weil aber Poiseuille²⁾ glaubt, daß die schnelle Gerinnung des Bluts die Versuche des Hales unsicher gemacht habe, so hat er eine an ihrem Anfange gebogene, mit einem Hahne versehene und mit Quecksilber gefüllte Röhre genommen, in ihren Anfang etwas kohlensaures Natron gethan, welches das Gerinnen des Bluts hindert, und, nachdem er die Röhre in eine Arterie eingebunden und den Hahn geöffnet hatte, beobachtet, einer wie hohen Quecksilbersäule das in der Arterie befindliche Blut das Gleichgewicht zu halten im Stande sei. Nach Poiseuille's Versuchen steigt das Blut bei Hunden höher als nach Hales Versuchen, was er daher leitet, daß das Blut sich bei diesen den Weg durch seine schnelle Gerinnung versperrt habe. Nach Poiseuille hält das Blut der Arterie bei Hunden im Mittel einer Quecksilbersäule von 151 Millimetern, oder einer Wassersäule von 6½ Par. Fuß, bei Rindern einer Quecksilbersäule von 161 Millimetern, oder eine Wassersäule von 6 Fuß 9 Zoll, bei Pferden einer Quecksilbersäule von 159 Millimetern, oder einer Wassersäule von 6 Fuß 8 Zoll, und also bei diesen Säugethieren im Mittel 156 Millimetern, d. h. einer Wassersäule von 6 Fuß 7 Zoll das Gleichgewicht. Er sah auch, daß der Druck, den die Wände der größeren Arterien auszuhalten haben, gleich sei, sie mögen nun dem Herzen näher oder von demselben entfernter liegen, sie mögen ein wenig größer oder kleiner sein. Auch bei verschiedenen Thieren ist nach seinen Versuchen der Druck, den das Blut vom Herzen erleidet, nicht sehr verschieden, und keineswegs der Größe und dem Gewichte des Herzens proportional, ein Satz, der mit der aus der mechanischen Betrachtung des Herzens sich ergebenden Theorie übereinstimmt; denn nach dieser wird der Druck, den ein großes und ein kleines Herz unter übrigens gleichen Umständen auf die enthaltene Flüssigkeit hervorbringt, dann gleich sein, wenn sich die Herzen selbst ähnlich bleiben, d. h., wenn die Fleischmasse des Herzens nicht nur wie die Oberfläche, sondern auch in allen Durchmessern wie die Durchmesser selbst an Dicke zunimmt. So kann es denn wohl sein, daß der Druck, den das Blut in den Arterien eines Hundes erleidet, dessen Herz immer 8 Poth wiegt, eben so groß sei als der Druck, den das Blut eines Kindes erfährt, dessen Herz über 7 Pfund wiegt.

Gefäße und Nerven der Arterien.

In der äußeren zelligen Haut der größeren Arterien verlaufen die ernährenden Arterien dieser Gefäße. Sie entspringen nicht unmittelbar aus der Höhle der Arterie, der sie angehören, sondern aus Zweigen, die dieselbe abgiebt, und bilden ein ziemlich dichtes Netz. Sie sind bei jüngeren Menschen zahlreicher als bei ältern, und lassen sich noch bei sehr kleinen Arterien, z. B. nach Sömmerring, bei de-

¹⁾ Hales, Haemastatics, übersetzt ins Französische unter dem Titel: Haemastatique de Hales, traduit par Sauvages. Geneve 1742. 4. p. 1. 89.

²⁾ Poiseuille, sur la force du coeur sortique, in Répert. gén. d'anatomie et de physiologie pathol. etc. red. par Breschet. Paris, Tome VI. cah. 3. 1828. p. 69.

nen, die etwas mehr als $\frac{1}{2}$ Linie im Durchmesser haben, erkennen. Von diesem Netze dringen nur sehr wenig Gefäße in die mittlere gelbe Haut ein, und Bichat ¹⁾ gesteht sogar, daß er weder durch Einspritzung von Flüssigkeiten in die Arterien, noch durch Oeffnung der Arterien an einem lebenden Thiere, die kleinen ernährenden Arterien habe bis zu der innern Membran dringen sehen. C. Ed. Leticierce ²⁾ spritzte gefärbtes Leinöl oder Serum in die Arterien, und trieb die Flüssigkeit in die feineren Gefäße noch mit dem Finger vorwärts. Auf diese Weise glaubt er bei Embryonen die eingespritzte Flüssigkeit bis zur innern Haut oder wenigstens bis in die Nähe der innern Haut dringen gesehen zu haben, durch welche die kleinen Gefäße durchschimmerten. Nach Döllinger breiten sich die kleinen Arterien nicht in Zwischenräumen zwischen den verschiedenen Lagen aus, in die man die mittlere Arterienhaut zerlegen kann, und eben so wenig bilden sie Netze, welche die einzelnen gelben Zirkelfasern umgeben, sondern zertheilen sich baumförmig, und deuten also durch ihre Verbreitungsart nicht an, daß die mittlere Arterienhaut aus concentrischen Blättern, und jedes von diesen aus von einander abgeforderten Zirkelfasern bestände. Auf ähnliche Weise verhalten sich auch die in den Arterienwänden befindlichen Venen. Auch sie bilden zahlreiche Netze in der zelligen Haut, in die nicht selten bei Einspritzungen die Injectionsmassen dringen. Sömmerring sah die größern Stämme der Arterien, z. B. des Unterschenkels, von deutlichen Saugadern dicht umzogen. Die größeren Stämme der Arterien besitzen, wie Sömmerring ³⁾ bemerkt, verhältnißmäßig feinere und wenigere Nerven, als die Stämme von mittlerer Größe. Je feiner die Arterien werden, desto dichter werden die Netze der sie umgebenden Nerven. Die Arterien am Kopfe, am Halse, in der Brust- und Bauchhöhle erhalten ihre Nerven vom sympathischen Nerven, der ihnen fast ausschließlich angehört. Es ist indessen schwer zu bestimmen, welche von den sie umgebenden Fäden in die Wände der Arterien selbst eindringen, und welche nur an ihnen hinlaufen. »Sehr schön und ohne mühsame Vorarbeit sieht man«, sagt Sömmerring ⁴⁾, »die Nerven netze, welche die Wirbelarterie in der Schädelhöhle umziehen.« Diese Nerven haben aber Luca und Bock nicht finden können, dagegen hat Bock ⁵⁾ Netze der sympathischen Nerven, welche die Nette der Carotis interna nach dem Gehirn begleiten, beschrieben. Ribes ⁶⁾ will Nervenfasern an den Arterien des Gehirns bis in die Substanz des Gehirns verfolgt haben, und Wrisberg ⁷⁾ fand Zweige

¹⁾ Bichat, Allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff, B. I. Abth. 2. S. 54.

²⁾ C. Ed. Leticierce, Essai sur quelques points d'anatomie etc. Paris 1829. Siehe Archives gén. d. Méd. Nov. 1829. S. 424.

³⁾ S. Th. Sömmerring, Vom Baue des menschlichen Körpers, Th. IV. Frankfurt 1801. S. 71.

⁴⁾ Sömmerring a. a. O. S. 72.

⁵⁾ A. C. Bock, Beschreibung des fünften Nervenpaars.

⁶⁾ Ribes, Mém. de la soc. méd. d'émulation VIII. 1817. p. 604 sq. Meckel Archiv B. V. p. 442.

⁷⁾ H. A. Wrisberg, sylloge commentationum anatomicarum: de nervis arteria venasque comitantibus p. 27.

die im Gesichte vom Nervus facialis und trigeminus zu den Arterien traten und sie begleiteten. An den Extremitäten gehen von Zeit zu Zeit von den größeren, neben den Arterien verlaufenden Nervenstämmen Aeste zu den Arterien und treten in ihre Häute hinein. Lucä hat sogar Zweige derselben, die in die mittlere Haut hineindringen, beschrieben ¹⁾. Diejenigen Nervenfasern indessen, welche er so hat abbilden lassen, als verwandelten sie sich in eine große dreieckige Lamelle, die sich mit dem Zellgewebe der Arterie vereinigte, hätten mehr vom Zellgewebe getrennt werden sollen; ein solcher Uebergang der Nerven in die Zellgewebshaut der Arterien hat sich nicht bestätigt ²⁾. Ribes ³⁾ behauptet, bis zum unteren Theile der Armpulsadern und zu den meisten Aesten derselben auch Gangliennerven, und längs der Arteria cruralis bis zur Kniekehlenpulsader vom linken Dickdarmgeflechte und vom Lendentheile des sympathischen Nerven, Fäden verfolgt zu haben. Diese Untersuchungen sind indessen so schwierig, und so leicht mit einer Täuschung verbunden, daß sie noch einer mehrfachen Bestätigung bedürfen. Sehr wichtig würde es allerdings für die Physiologie sein, wenn sich darthun ließe, daß sich Aeste der sympathischen Nerven zu allen Stellen des Gefäßsystems erstrecken.

Sehr auffallend ist es, daß ein fast ganz aus Gefäßen bestehendes Organ, der Mutterkuchen, in welchem so wichtige Prozesse der Absouderung, der Aufsaugung und der Blutbereitung vor sich gehen, so kleine Nerven enthält, daß selbst ihre Existenz bis auf die neueste Zeit zweifelhaft geblieben. Indessen hat man jetzt Ursache genug, hier wenigstens kleine Nerven anzunehmen. Bauer und Home ⁴⁾ glauben beim Delphin und beim Tapir ein Geflecht von Nerven am Nabelstrange und am Mutterkuchen, und endlich auch beim Menschen, und zwar bei diesem, jeder von beiden unabhängig von dem andern, einen Nervenfasern zwischen den 3 großen Gefäßen des Nabelstrangs aufgefunden zu haben. Ribes ⁵⁾ hat gemeinschaftlich mit Chaussier 2 bis 3 Nervenzweige an der Vena umbilicalis des Embryo gesehen. Endlich hat Otto in Breslau mündlich gegen mich behauptet, daß er sich von der Existenz von Nerven, welche an den Blutgefäßen am Nabelstrang gehen, überzeugt habe.

Fähigkeit verletzter Arterien, schmerzhaft zu werden.

Die Verletzung der Arterien scheint keinen merklichen Schmerz zu erregen. Haller ⁶⁾ sah niemals, daß ein Thier durch Geschrei oder auf andere Weise Zeichen von Schmerz zu erkennen gab, wenn er eine Arterie desselben an einer Stelle, wo kein Nerv lag, mit einem Faden oder Bande zusammenschnürte. Er beruft sich zugleich auf ähnliche Erfahrungen von *Bromfield* und *Pouteau*'s. Wenn dagegen *Bichat*, sobald er reizende Flüssigkeiten, wie Dinte oder verdünnte Säuren und Wein, in die Arterien lebender Thiere spritzte, heftigen Schmerz entstehen sah, so muß man wohl berücksichtigen, daß solche Flüssigkeiten durch die Poren der Gefäßwandungen zum Theil ausschwielen und mit den in der Nachbarschaft gelegenen Theilen, z. B. mit den Nerven in Berührung kommen könnten, und daß folglich der dadurch erregte Schmerz die Fähigkeit der Arterien, im verletzten Zustande Schmerz zu erregen, nicht beweiset.

¹⁾ *Sam. Ch. Lucæ*, Quaedam observationes anatomicae circa nervos arterias adeuntes. Francofurti ad Moenum 1810. 4. und *Reils Archiv* B. IX. 1809. Tab. XI. b.

²⁾ *Rudolphi*, Grundriss der Physiologie. Berlin 1821. 8. B. 1. S. 9.

³⁾ *Ribes a. a. O.*

⁴⁾ *Ev. Home*, in *Phil. Transact.* 1825. P. I. p. 78 sq.

⁵⁾ *Ribes*, in *Mém. de la soc. médic. d'émulation*. Tome VIII. 1817, übersezt in *Meckels Archiv* T. V. 1819. S. 445.

⁶⁾ *Haller*, *De partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus* Lib. II. Sect. 1. §. 12. Dasselben: *Second Mémoire sur les parties sensibles*, p. 217.

Fähigkeit der Arterien zu Lebensbewegungen 2).

Alle sorgfältig angestellten Beobachtungen stimmen darin überein, daß die Arterien nicht die Eigenschaft besitzen, auf die Weise, wie die Muskeln, schnelle Bewegungen durch eine ihnen bewohnende lebendige Kraft auszuführen. Sie haben keineswegs das Vermögen, durch eine solche Kraft sich plötzlich zu verengern oder zu erweitern, zu verlängern oder zu verkürzen, so daß man die Bewegung zu sehen im Stande wäre, und noch viel weniger können sie eine aus diesen Bewegungen zusammengesetzte unterscheidbare, wurmförmige Bewegung ausführen. Daß die Verlängerung und Verschiebung der Arterien und die Veränderung des Durchmessers, welche sie beim Pulse erleiden, eine mechanische Wirkung des Drucks sei, welchen die elastischen Wände der Arterien von Seiten des in ihnen eingeschlossenen Blutes erfahren, so bald dasselbe einem Drucke von dem in die schon vollen Arterien vom Herzen mit Gewalt vorwärts getriebenen Blute ausgesetzt wird, ist von Bichat und mehreren anderen Beobachtern so gründlich bewiesen worden, daß hierüber kein Zweifel übrig ist. Denn auch die Arterien eines todtten Thiers pulsiren auf dieselbe Weise, und machen dieselben Bewegungen, wenn man durch eine Röhre das Blut aus einer Arterie eines lebenden Thiers in sie herüber fließen läßt, oder wenn man sie mittels einer Spritze stoßweise Wasser eintreibt. Alle Versuche durch eine Reizung der lebenden Arterien, indem man sie sticht, kneipt, oder indem man sie electricirt und galvanisirt, eine plötzliche sichtbare Bewegung derselben, ein sichtbares Zusammenziehen, eine zuckende Verkürzung, oder endlich ein Zittern ihrer Fasern, wie bei den Fleischsalern, zu veranlassen, sind vergebens gewesen. Manche Körper, welche eine chemische Veränderung in der Substanz der Arterien hervorbringen, bewirken zwar, daß sich die Arterien, die sie berühren

2) *Alb. de Haller*, Opera minora, Tom. I. Lausannae 1763. 4. — *J. H. Zimmermann*, Diss. physiologica de irritabilitate. Gottingae 1751. 4. — *Guo-therus Verschuir*, diss. med. inaug. de arterium et venarum vi irritabili otta Groningae 1766. 4. — *R. Berkelmann* (praes. Hallero), De nervorum in arterias imperio, recus. in Disp. anat. select. coll. ed. Haller. Vol. IV. — *Bikker*, Diss. de Natura humana. Lugd. Bat. 1757. p. 45. — *H. van der Bosch*, Theoretische und praktische Bemerkungen über das Muskelvermögen der Blutgefäße. Münster und Osnabrück 1786. 8. — *P. A. Fabre*, essais sur différents points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. Paris 1770. 8. übers. v. *Platner*, unter dem Titel: Untersuchungen über verschiedene Gegenstände der theoretischen und praktischen Arzneiwissenschaft. Leipzig 1788. 8. — *Christ. Ludw. Hoffmann*, von der Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Theile. Mainz 1792. 8. — *Parrv*, Experimentalauntersuchung über die Natur, Ursache und Verschiedenheit des arteriösen Pulses, übers. v. *Emdden*. Hannover 1817. — *Car. Hastings* Diss. physiol. de vi contractili vasorum. Edinb. 1818. *Meckels Archiv*. VI. 1822. — *Oppenheim*, Diss. sist. experimenta circa vitam arteriarum. Mannh. 1822. — *J. H. Oesterreicher*, Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislaufe des Blutes. Nürnberg 1826. 4. — *G. Wedemeyer*, Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Capillargefäßen, mit erklärenden Hindeutungen auf pathologische Erscheinungen. Hannover 1828.

räumen und plötzliche Bewegungen machen, z. B. starke Säuren, reizende Alkalien, Körper, welche, wie der wasserfreie salzsaure Kalk mit großer Kraft an sich ziehen. Allein diese Körper bringen auch dieselbe Wirkung lange nach dem Tode hervor, wenn nicht etwa die Arterien schon solche Veränderungen durch die Fäulniß erlitten haben, welche diese Wirkung verhindern; und dies beruht nicht andern darauf, daß der Substanz der Arterienhaut ein Theil des Wassers entzogen wird, welches sie enthält, wodurch sie zusammenschrumpft und hart wird.

Allein eben so gewiß ist es, daß den Arterien an vielen, vielleicht an allen Stellen die Eigenschaft zukommt, sich durch ihre lebendige Kraft allmählig zu verengern, so daß man zwar die Bewegung, die sie machen, selbst nicht sehen, wohl aber die Veränderung der Gestalt der Canäle und der Menge von Blut, das sie enthalten, bemerken kann, welche die Bewegung derselben allmählig hervorbringt, wenn sie einige Zeit fortgebauert hat.

Wenn bei chirurgischen Operationen ganze Glieder weggenommen, dabei aber sehr viele kleine Arterien durchschnitten werden, so verengern sie sich, indem sie mit der Luft in Berührung kommen, in dem Grade, daß sie sogar zu bluten aufhören. Dauerte die Ergießung von Blut aus den kleinen Arterien so fort, wie sie im Augenblicke der Verletzung Statt findet, so würden die meisten chirurgischen Operationen unausführbar sein und den Tod durch Verblutung nach sich ziehen. Diese Verengung findet selbst bei Arterien, die nicht zu den sehr kleinen gehören, Statt. Man kann diese Zusammenziehung auch bei sehr großen Arterien dadurch hervorrufen, daß man die Arterien zerrt, um sich selbst drehet und windet. Neuerlich haben Alexander Thierry¹⁾ und Amussat die hierauf beruhende, oft vergessene Methode, Blutungen zu stillen, den Chirurgen wieder ins Gedächtniß zurückgerufen. Thierry hat seine Versuche bei Pferden, und dann auch bei einem Menschen an der bei der Amputation durchschnittenen Arteria cruralis gemacht. Er faßt das Ende der Arterie mit der Vincette, und dreht es, wenn die Arterie groß ist, 8 bis 10 mal, wenn sie eine mittlere Größe hat, 6 mal, und wenn sie klein ist, 4 mal herum, wodurch die Blutung nach seiner Behauptung sicher gestillt wird, und giebt ein Verfahren an, um auch nicht durchschnittene Arterien zu winden und zu drehen. Mit diesen Versuchen stimmt die längst gemachte Erfahrung sehr wohl überein, daß ein neugeborenes Kind, dessen Nabelstrang getheilt, aber nicht unterbunden wird, sich nicht leicht durch die Nabelarterien verblutet, wenn der Nabelstrang zerrissen oder zerbitzen, leicht aber wenn er durchschnitten wird.

Daß die Arterien durch eine ihnen beiwohnende, von ihrer Elasticität verschiedene, lebendige, bewegende Kraft ihren Durchmesser verändern können, muß man schon daraus schließen, daß durch Schaam und andere Gemüthsbewegungen die Anhäufung einer größern Menge Blut in den kleinen Blutgefäßen der Wangen, bei Erregung des Geschlechtstriebs durch Vorstellungen oder durch einen örtlichen Reiz eine Anhäufung des Bluts in den Blutgefäßen mancher Stellen der Geschlechtsorgane, durch Verletzungen aller Art ein Zudrang von Blut zu der verletzten Stelle veranlaßt wird, vermöge dessen oft selbst ziemlich große Arterien mehr vom Blute ausgebehnt werden, und weil sie nun eine größere Blutläule einschließen, stärker pulsiren. Denn ob man gleich sehr gut einsieht, daß das Herz, wenn es sich kraftvoller und

¹⁾ Alex. Thierry, De la torsion des artères. Paris 1829. 8. Siehe Archives générales de Méd. 1829. Oct. p. 321.

schneller zusammenzieht, die Blutbewegung im ganzen Körper zu beschleunigen im Stande sein müsse, so läßt sich doch die Beschleunigung oder Verlangsamung des Blutlaufs, sowie die Vermehrung und Verminderung der Blutmenge an einer einzelnen Stelle des Körpers, wenn sie nicht von einem Drucke auf diese Stelle, oder von einer andern mechanischen Ursache, sondern von einer Einwirkung des Nervensystems herrührt, nur erklären, wenn man annimmt, daß die Blutgefäße mit dem lebendigen Vermögen, ihren Durchmesser zu verändern, versehen seien. Ob diese Veränderung nur in einer Verengung derselben, oder in der Erweiterung an gewissen Stellen, oder in diesen beiden Arten der Veränderung ihres Durchmessers zugleich liege, läßt sich durch Beobachtung schwer entscheiden.

Man sieht aber so viel ein, daß, wenn die Arterien nicht bloß durch ihre Elasticität, sondern auch zugleich vermöge einer langsam wirkenden, sie verengenden Kraft dem Drucke des Bluts Widerstand leisten, sie an jeder Stelle erweitert werden können, ohne ein Vermögen, sich durch eine Lebenskraft auszudehnen, zu besitzen. Denn sobald die Kraft, durch welche sie sich im gewöhnlichen Zustande zu verengern streben, irgendwo gradweise nachlasse, so würden sie auch sogleich dafelbst durch den Druck des Bluts in demselben Grade erweitert werden. Als die Wirkung durch Elasticität allein kann aber eine solche Veränderung des Durchmessers der Arterien an einzelnen Stellen deswegen nicht angesehen werden, weil die Elasticität einer Arterie an einer einzelnen Stelle nur dann sich verändern kann, wenn sich die Substanz der Arterie verändert, nicht aber durch den schnell erfolgenden Einfluß der Nerven.

Hierzu kommen die mikroskopischen Beobachtungen von Gruithuisen ¹⁾, Thomson ²⁾, Wilson Philip ³⁾, Hastings ⁴⁾, Kaltenbrunner ⁵⁾ und Wedemeyer ⁶⁾ an durchsichtigen Theilen leben-

¹⁾ Gruithuisen, Mikroskopische Untersuchungen über den Kreislauf in den Capillargefäßen während der Entzündung; in der medicinisch-chirurg. Zeitung. Salzburg 1811. B. II. S. 298.

²⁾ J. Thomson, Lectures on inflammation exhibiting a view of the general doctrines pathological and practical of medical surgery. Edinb. 1813. S. 75, übersetzt von Krukenberg, unter dem Titel: Ueber Entzündung etc. Halle 1820. S. 127. 8. Auszug in *Meckels Archiv für die Physiologie*. B. I. S. 437.

³⁾ W. Philip, An experimental inquiry into the laws of the vital functions.

⁴⁾ Carolus Hastings, Disputatio physiologica inauguralis de vi contractili vasorum. Edinburgi 1818. 8. Ein Auszug daraus in *Meckels Archiv für die Physiologie* 1820. B. VI. S. 224. Derselbe, A treatise on inflammation of the mucous membranes of the lungs. London 1820, übers. in *Horns Archiv* 1821. Sept. 467.

⁵⁾ G. Kaltenbrunner, Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione, C. IX. Tab. Monachii 1826. 4.

⁶⁾ Georg Wedemeyer, Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und Capillargefäßen etc. Hannover 1828. 8. S. 239 sq.

der kaltblütiger Thiere. Wenn sie diese Theile mit reizenden Flüssigkeiten bestrichen, oder in ihnen durch andere Reize die regelmäßige Blutbewegung störten, so bemerkten sie, daß die kleinen Blutgefäße, welche im regelmäßigen Zustande beim Blutlaufe keine merkliche Veränderung ihres Durchmessers zu erleiden pflegen, sich nicht selten an einzelnen Stellen allmählig erweiterten oder verengerten.

Nach Thomson und Hastings hatte z. B. Kochsalzauflösung, auf die Schwimnhaut der Frösche gebracht, die Wirkung, daß sich viele Gefäße erweiterten, mehr Blut aufnahmen und dadurch der mit Salzwasser berührten Stelle ein rothes Ansehn gaben. Das flüchtige Laugensalz brachte nach Hastings dieselbe, nach Thomson's Versuchen dagegen die entgegengesetzte Wirkung, Verengerung vieler Haargefäße und Blässe hervor. Nach Wedemeyer wirkten Stückchen Kochsalz, die er 3 bis 4 Minuten lang auf eine Stelle des Mesenterium lebender Frösche legte, früher auf die kleinen Arterien und kleinen Venen, als auf die kleinsten Haargefäße. Zuerst verengerten sich die Arterien etwa um $\frac{1}{2}$ ihres Durchmessers, dann aber entstand an ihnen eine dem Aneurysma ähnliche Erweiterung. Die Venen erweiterten sich ohne vorhergehende Verengerung, und auch in den Haargefäßen entstand sehr bald nach der Anwendung des Kochsalzes eine deutliche Erweiterung und vermehrte Aufnahme von rothem Blute, so daß diejenigen Gefäße, welche zuvor durchsichtig gewesen waren, nun roth ausliefen. Flüchtiges Laugensalz brachte, nach Wedemeyer, fast immer eine allmähliche Erweiterung der kleinen arteriellen und venösen Gefäße hervor, und bei der Erweiterung trat häufig Stockung des Blutlaufs ein. Auch ein durch 14 bis 24 Plattenpaare erregter galvanischer Strom brachte, wenn er 10 bis 30 Secunden hindurch gewirkt hatte, zuweilen erst nach einigen Minuten eine sichtbare Verengerung der kleinen Arterien bis auf $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ oder sogar bis auf $\frac{1}{8}$ ihres Durchmessers hervor, wobei das Blut in den verengerten Stellen schneller, oberhalb aber an den Stellen, an welchen sich die Arterien erweiterten, langsamer floß. Auch die Haargefäße erweiterten sich schnell, gewöhnlich schon in dem Zeitraume einer Minute, und nahmen wegen der in ihnen enthaltenen großen Menge Bluts, das oft sogar zum Stillstehen kam, eine hellrothe Farbe an.

Aber auch größere Arterien verengern sich, wenn sie, wie das bei den Versuchen Parry's ¹⁾ der Fall war, entblößt und längere Zeit der Berührung der Luft ausgesetzt werden. Die Peripherie der Carotis eines Schaafs z. B. zog sich, während sie entblößt $\frac{1}{2}$ Stunde mit der Luft in Berührung war, von dem Umfange von $\frac{225}{400}$ Zoll bis auf den Umfang von $\frac{162}{400}$ Zoll zusammen. Auch Hastings sah, daß die Arteria cruralis, oder die Aorta, wenn sie 10 Minuten lang mit dem Scalpell, ohne einen Druck anzuwenden, geschnitten worden waren (wobei natürlich auch die Berührung der Luft mitwirkte), sich an dieser Stelle zusammenzog und $\frac{1}{4}$ Stunde bis $\frac{1}{2}$ Stunde zusammengezogen blieb. In einigen selteneren Beobachtungen Parry's und Hastings' geschah diese Zusammenziehung an einer ganz schmalen Stelle, und gab der Arterie das Ansehn, als wäre sie von einem schmalen Bande zusammengeschürzt gewesen. Auch Vershuir's ²⁾ frühere Versuche machen ein lebendiges Bewegungsvermögen der Arterien wahrscheinlich. Ist es schwer zu bestimmen, in welchem Grade die Veränderung des Durchmessers der Arterien mehr von der Elasticität, oder mehr von einer in ihnen wirksamen lebendigen Kraft abhängt. Hierher ist die

¹⁾ Hist. Parry, Experimentatuntersuchung über die Natur-Ursache und Verschiedenheit des arteriellen Pulses, übersetzt von Embden. Hannover 1817. 8. Exper. 24. 26. 15.

²⁾ Vershuir, De arteriarum et venarum vi irritabili. Groningae 1766. 4.

Erscheinung zu rechnen, daß die Arterien immer auch nach starkem Blutverluste voll sind, und daß sie sich also in dem Maasse verengern, als sich die Menge des in ihnen eingeschlossenen Blutes vermindert. Diese Verengung geht, während sich Thiere verbluten, sehr weit, z. B. nach Parry ¹⁾, so weit, daß sich die Peripherie der bloßgelegten Carotis von $\frac{220}{400}$ Zoll bis auf $\frac{127}{400}$ Zoll verkleinerte. Denn da diese während der Verblutung eingetretene und zuweilen während des Todes selbst vermehrte Zusammenziehung einer Arterie nach dem Tode wieder zum Theil nachließ, so daß die Carotis eines Schaafs, deren Peripherie vor der Verblutung $\frac{320}{400}$ Zoll betrug, und sogleich nach dem Tode durch Verblutung bis auf $\frac{160}{400}$ vermindert war, sich 15 Minuten nach dem Tode, und längere Zeit nachher, nur bis auf $\frac{25}{400}$ oder $\frac{252}{400}$ Zoll wieder erweiterte, so scheint nur ein Theil der Zusammenziehung, welche die Arterie während der Verblutung durch die geöffnete Vena jugularis erlitt, auf die Rechnung der Elasticität der Arterien gebracht werden zu dürfen, ein größerer Theil derselben aber als die Wirkung einer lebendigen Kraft angesehen werden zu müssen.

Auch bei Todesarten, bei welchen keine Verblutung Statt gefunden, glaubte Parry ²⁾ wahrgenommen zu haben, daß sich die Arterien während des Sterbens verengern und sich dadurch entleeren, nach dem Tode aber sich wieder erweitern.

In manchen Fällen ist auch schwer zu bestimmen, in welchem Grade die Vergrößerung des Durchmessers, die die Arterien erleiden, mehr von einer verminderten lebendigen Zusammenziehung derselben und einer deswegen entstehenden Ausdehnung durch den Druck des Bluts, oder von einem Wachstume der Wände der Arterien herrührt, z. B., wenn sich die Arterien des Uterus nach der Befruchtung so außerordentlich erweitern, oder wenn, nachdem eine Arterie, z. B. die Carotis der einen Seite, unterbunden worden ist, und nun die der andern Seite an Umfang zunimmt, oder wenn bei einer Arterienanschwellung, aneurysma, eines Hauptstammes sich die kleinen Seitenzweige erweitern, welche das oberhalb der Geschwulst liegende Stück des Stammes mit dem unter der Geschwulst liegenden Stücke desselben in Verbindung bringen. Parry ³⁾ sah die Erweiterung der Carotis der andern Seite nach der Unterbindung derselben auf der andern Seite so schnell erfolgen, daß auch hierbei ein Nachlaß in der lebendigen Zusammenziehung Statt gefunden zu haben schien.

Die Verkürzung der Stücken einer durchschnittenen Arterie, durch welche eine Zusammenziehung derselben entsteht, hängt, da sie auch nach dem Tode Statt findet, unstreitig größtentheils oder ganz von der Wirkung der Elasticität der Arterien ab, die sich vorher in einem gespannten Zustande befanden.

In welchem Theile der Substanzen, aus welchen die Arterienwand zusammengesetzt ist, die Lebensbewegung der Arterien ihren Sitz habe, läßt sich durch Versuche schwer ausmachen. In dem elastischen Gewebe der mittlern Arterienhaut scheint er nicht gesucht werden zu dürfen, denn in den größten Arterien, wo diese Haut am dicksten ist, ist die Lebensbewegung der Arterien am wenigsten wahrnehmbar. Im Gegentheile

¹⁾ Parry a. a. O. S. 40.

²⁾ Dasselbst a. a. O. S. 52.

³⁾ Dasselbst a. a. O. Exp. 23. 24.

hindert die Steifheit dieser elastischen Substanz die Verkleinerung des Umfangs einigermaßen.

Entstehung, Wachsthum, Krankheiten und Wiederherstellung verletzter Arterien.

Die kleinsten Gefäße scheinen, nach C. F. Wolffs ¹⁾ Beobachtungen am bebrüteten Hühner, welche durch die späteren Beobachtungen von Vander ²⁾, Rolando ³⁾, so wie durch die von Prevost, Dumas ⁴⁾ und Bär ⁵⁾ bestätigt worden sind, früher, oder wenigstens gleichzeitig, sichtbar zu werden, als das Herz und die großen Gefäßstämme. Sie entstehen vielleicht durch eine Art chemischer Veränderung in der Materie des Eistoffs, vermöge deren sich das Flüssige vom Festen an gewissen Stellen scheidet, und das Feste zu Gefäßwänden und zu Blutkörnchen sich verdichtet. Viele Arterien, welche sich später vor den benachbarten Arterien durch ihre Größe sehr auszeichnen, machen anfangs einen Theil eines Gefäßnetzes aus, in welchem sie durch Größe nicht hervorragen. Mancherlei kleine störende Umstände scheinen daher bewirken zu können, daß die Gänge dieses Netzes, welche sich der Regel nach erweitern, sehr wachsen und sich in größere Arterien verwandeln sollten, nicht gehörig erweitert werden, und daß dann das Blut durch andere Gänge desselben Netzes zu dem Orte, zu welchem es gelangen soll, hinfließt. Indem sich dann diese letzteren Gänge zu großen Stämmen erweitern, entstehen Abweichungen in der Ordnung, in welcher die kleinen Arterien aus den größeren hervorgehen, und in dem Wege, die sie zu den Theilen nehmen, denen sie Blut zuführen. Bei den Venen von mittlerer Größe sind diese Abweichungen noch weit häufiger, als bei den Arterien. Sehr interessant ist es, daß das Wachsthum der kleinen und großen Zweige der Arterien in einer solchen Uebereinstimmung geschieht, und daß das Wachsthum

¹⁾ C. F. Wolff, *Theoria generationis*. Hal. 1759. Fig. 7. 8. 10. und zwei Abbildungen über die Nutritionskraft, welche von der Kaiserl. Acad. d. Wiss. in St. Petersburg den Preis getheilt erhalten haben, die erste von Hrn. Hofrath Blumenbach, die zweite vom Hrn. Prof. Born, nebst einer ferneren Erläuterung eben derselben Materie von C. F. Wolff. St. Petersburg 1789. 4. Wolffs Erläuterungen. S. 13.

²⁾ Chr. Pander, *Diss. sistens historiam metamorphoseos, quam ovum incubatum prioribus quinque diebus subit*. Wirceburgi 1817. 8. Derselbe gemeinschaftlich mit Döllinger und d'Alton. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Hühnerchens im Hühner. Würzburg 1748. Fol. m. R.

³⁾ Rolando, *Dizionario periodico di medicina estosa dai DD. L. Rolando, e L. Martini Fascioli* 10. Torino 1822. c. 1823. Siehe auch *Picterss Allg. med. Annalen*, Supplementb. 1821 — 1825. Jan. 707.

⁴⁾ Prevost et Dumas, *Sur le développement du poulet dans l'oeuf*, in *Annales des sc. naturelles*. Tome XII. 1827. Déc. p. 415.

⁵⁾ D. Carl Ernst v. Baer, *Ueber Entwicklungsgeschichte der Thiere, Beobachtung und Reflexion*. Th. I. Königsberg 1828. 4. mit 3 Kt. S. 31 sq.

der Organe demjenigen Arterien proportional ist, welche zu ihnen das Blut hinführen. Die Hoden bleiben so lange klein, als die langen Stämme der Samenarterien. Zur Zeit, wo die Geschlechtsreife eintritt, wachsen beide entsprechend. Diefelbe Bewandniß hat es mit den Arterien jedes Muskels, die sich durch Uebung in gewissen Bewegungen vergrößert, und auch an den Arterien der Eierstöcke und des Uterus findet dasselbe Statt, während sich diese Theile nach der Befruchtung ziemlich schnell und nur für einige Zeit vergrößern.

Die Arterien heilen, weil sie gespannte elastische Canäle sind, deren Bunden durch die Elasticität der Wände auseinander gezogen werden nur dann, wenn die Bunden klein sind, und leichter, wenn sie der Länge, als wenn sie der Quere nach gehen. Denn Arterien, welche der Quere nach in beträchtlichem Grade verletzt werden, reißen weil sie in dieser Richtung theilbarer sind, leicht durch. Ist die Verwundung gering, so schließt sich auch zuweilen der Canal der Arterie an der verwundeten Stelle. Es fehlt indessen nicht an, bei lebenden Thieren, angestellten Experimenten, bei welchen gestochene, oder durch einen kleinen Einschnitt verletzte Arterien, durch eine aus gerinnbarer Lymphse bestehende Substanz vernarben ¹⁾, und an der verletzten Stelle mit den benachbarten Theilen zusammenkleben und verwachsen. Wenn man die Wundränder einer Arterie durch eine Naht, so verschließt sich ihr Canal an dieser Stelle durch gerinnbare Lymphse ²⁾. Ist eine Arterie ganz durchgeschnitten, so ziehen sich ihre Enden zurück und heilen nicht zusammen, sondern verschließen sich, ohne daß sich der Canal jemals wieder herstellt. Hierdurch unterscheiden sich die Arterien sehr von den Ausführungsgängen, welche sowohl, wenn sie verbunden, als wenn sie durchgeschnitten werden, leicht so heilen, daß in der getrunnenen Lymphse, die sie vereinigt, wieder einen Canal bilden. Die zurückgezogenen durchgeschnittenen Arterien verengern sich an dem durchgeschnittenen Ende und verschließen sich durch gerinnbare Lymphse die in Folge der Entzündung des Gefäßes abgefordert wird, und der Canal oft bis zu dem nächst höheren Aste ausfüllt, auch die Arte

¹⁾ *Fried. Pauli*, Commentatio physiologico-chirurgica de vulneribus sanand Göttingae 1825. 4. Ist die Namen derer, die Beobachtungen hierüber angeführt den gränzen. — *J. L. Petit*, Mem. de l'Ac. roy. des sc. à 1735. III. Tra des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent. Ed. Paris 1774. 8. T. III. p. 229. 244. Mem. sur les hemorrhagies. p. 435. *Scarpa*, sull'aneurisma rifsioni ed osservazioni anatomico-chir. Pavia 1801. fol. max. p. 83. cap. 2. §. 8. §. 9. — *S. Treasing*, Diss. de sistendis hemorrhagiis. Groningae 1804. 8. und in *Siebold's* Chirur. B. II. St. 2. 1801. p. 468. — *J. F. D. Jones*, a treatise on the process, employed by nature from divided and punctured arteries and on the use of ligatures. Lond 1805. 8. überf. von *Spaangenberg*. Haanover 1813. 8. — *P. A. Beccl*, Recherches et expériences sur les blessures des artères in Mem. de la s. med. d'emulation. 3me année. Part. II. Paris 1817. p. 569 — 603.

²⁾ *C. Arman*, Diss. de aneurysmate. Groningae 1773. 4. angeführt in *Th. Loe* scriptores, p. 619.

äußerlich mit den benachbarten Theilen zusammenkleben und verwachsen macht. Die Arterien sehen an der Stelle, welche von der entstandenen Lage der geronnenen Lympher bedeckt wird, roth aus. In der Lympher selbst entstehen neue kleine Blutgefäße, durch die dieselbe zu einer organisirten Materie wird.

Unterbindet man eine Arterie, die nicht durchschnitten worden, so stülzt sich die Arterie an der Stelle, wo die Unterbindung geschah, und auch ein Stück oberhalb und unterhalb dieser Stelle mit Lympher aus, und verwächst. Zuweilen treten aber später die 2 Theile der unterbundenen Arterie durch mehrere Arterien, die aus dem obern Ende abgehen und sich in das untere einmünden, mit einander in Verbindung. Diese Arterien entstehen dadurch, daß sich kleine Arterien, die entweder schon ursprünglich als Collateraläste vorhanden waren, oder die in der geronnenen Lympher neu entstanden sind, erweitern und vergrößern. Dergleichen Beobachtungen hat an der rechten Carotis eines Fuchses Maunoir ¹⁾ gemacht. Die beiden Stücke der geheilten Arterie endigten sich mit einem abgerundeten Ende, und vom obern zum untern Stücke der Arterie ging ein dünnes Gefäß, dessen Durchmesser ungefähr 1 Millimeter im Durchmesser hatte. Parry ²⁾ ließ die Arteria carotis zweier Widder unterbinden, und fand nach ihrer Heilung gleichfalls ein Stück der Arterie verwachsen, aber mehrere ziemlich dicke gewundene offene Arterien aus dem obern Stücke in das untere gehen. Mayer ³⁾ in Bonn machte denselben Versuch mit demselben Erfolge an einem Kaninchen, das er 1 Jahr, nachdem die Ligatur gemacht worden war, tödtete. v. Schönberg ⁴⁾ hat sich gleichfalls mit solchen Beobachtungen beschäftigt. Scarpa ⁵⁾, welcher die Arterien eines Menschen, bei dem er 27 Jahre zuvor ein Aneurysma der Arteria poplitea nach der Hunter'schen Methode operirt hatte, untersuchte, nachdem die Wachsmaterie eingespritzt worden war, fand die Arteria cruralis von der Stelle an, wo die profunda entspringt, bis zu der Stelle, wo die Arteria tibialis ihren Anfang nimmt, verschlossen und so verändert, daß sie einer dicken Violinrinne gleich. Die Verbindung des obern und untern Stückes geschah durch die erweiterten Aeste der Arteria femoris profunda und der Arteriae articulares. In der Mitte des verschlossenen Stückes der Arteria poplitea war eine Höhle, die mit der Arteria articularis inferior in Verbindung stand. Man sah hier zugleich die reise Thätigkeit der Aufsaugung, durch welche die Arteriengeschwulst sammt dem Blute, das sie enthielt, verschwunden war.

Eine Arterie eines Hundes, die Cassie entblößt und mit Cantharidentinctur

¹⁾ Maunoir, Mém. sur l'aneurysme et la ligature des artères. Genève, an X. 1802. 8. p. 106 Fig. 1.

²⁾ C. H. Parry, An experimental inquiry into the nature, cause and varieties of the arterial pulse, and into certain other properties of the large arteries in animals with warm blood, illustrated by engravings, übers. v. Embden. Hannover 1817. 8. S. 144 bis zu Ende. Fig. 1 bis 5.

³⁾ Mayer, Disq. de arteriarum regeneratione. Bonnae 1823. 4. p. 10.

⁴⁾ A. v. Schönberg, Memorie sul ristabilimento della circolazione nella legatione o anche recisione dei tronchi delle arterie. Napoli 1820.

Siehe auch Anton Huber, Neue Versuche an Thieren und deren Resultate, über die Wiedererzeugung der Arterien, mit beigelegten Bemerkungen darüber. Mit 3 lithogr. Taf. Wien 1827. 8.

⁵⁾ Scarpa, Esame comparativo del sistema arterioso di ambe due gliarti inferiori nel cadavere di un uomo, il quale 27 anni fa era stato operato d'aneurisma popliteo etc. 8. abgedruckt in Omodei Annali universali di medicina compilata. 1828. Auszug in der Salzburger Medicinisch-chirurgischen Zeitung. 1829. B. IV. S. 28.

berührt hatte, verschloß sich an dieser Stelle, nachdem die Wunde zugeheftet worden war. Die Arterie wurde äußerlich und inwendig roth, und bedeckte und füllte sich mit geronnener Lympe aus. Jones fand, daß die Arterien so geneigt sind, sich durch abgelösete Lympe zu verschließen, daß schon manche mechanische Verlegungen derselben diese Veränderung veranlassen, z. B. wenn man eine Arterie mittels eines um sie gelegten Fadens zusammenschnürt, dadurch die mittlere und innere Haut durchbricht, und dann den Faden sogleich wieder wegnimmt. Obgleich das Blut nach diesem Versuche anfangs durch das unterbunden gewesene Stück hindurch zu strömen fortfuhr, so füllte sich doch dieses Stück der entzündeten Arterie mit geronnener Lympe aus und verschloß sich. Bei einer entzündeten Arterie verliert die innere Haut ihren Glanz und ihre Glätte, läßt die sehr mit Blut ausgedehnten kleinen Blutgefäße durchschimmern, bedeckt sich inwendig mit gerinnender Lympe und läßt sich leichter von der mittleren Haut lostrennen. In Folge der Entzündung lockert sich nach Hodgson das Gewebe der Arterien zuweilen auf und nimmt ein fleischiges Ansehen an, zuweilen sammelt sich zwischen der inneren und mittleren Haut eine eiterige, käsige Substanz an, und bildet auf der inneren Oberfläche Erhöhungen von der Größe der Blattern. In einem brandigen Zustande sah Hodgson die Wände der Arterien niemals. Häufig kommen an der innern Haut weiße, undurchsichtige Flecke zum Vorschein, an welchen die Arterie später verküchert. An den Klappen der Arterien bilden sich zuweilen von selbst schwammige Auswüchse, die durch einen Stiel ansitzen. Daß nicht selten die innere Haut vieler Arterien nach dem Tode sehr gleichmäßig roth erscheint, weil sie aus dem Blute, das sich in einem gewissen Zustande der Färbung befindet, Farbstoff einsaugt, und daß diese Röthung nicht für ein Zeichen vorhandener Entzündung angesehen werden dürfe, ist schon Theil I. S. 252 erwähnt *).

*) Die Literatur über die krankhaften Veränderungen an den Arterien findet man sehr vollständig in *A. W. Otto*, Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere. Berlin 1830. S. 300 — 343.

Ueber die Entzündung der Arterien hat Morgagni in seiner Schrift *De sedibus et causis morborum*. Cap. XXVI. 35. XLIV. 3. einige Bemerkungen niedergelegt. — *J. P. Frank*, Epitome de curandis hominum morbis L. S. 118. 205. hat bewiesen, daß sie häufiger vorkomme, als man glaubte. — Dessen Schüler *Schmuck*, Diss. de vasorum sanguiferorum inflammatione. Heidelbergae 1793. erregte die Entzündung der Arterien an lebenden Thieren, und machte also Versuche darüber. Dasselbe thaten *Jo. Georg Sasse* mit *Ph. Fr. Meckels* Hülfe, De vasorum sanguiferorum inflammatione. Halae 1797 — und *Jones* a. a. O. Umständliche Werke über die Entzündung der Arterien sind das von Hodgson von den Krankheiten der Arterien und Venen, mit Rücksicht auf die Entwicklung und Behandlung der Aneurysmen, a. d. E. überf. von *Koberwein*, 1817. ins Franz. überf. v. *Breschet* unter dem Titel: *Hodgson, Traité des maladies des artères et des veines*. Paris 1819. 8. 2 Vol., und das von *Gendrin*, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier 1826. 8. überf. von *Radius*, unter dem Titel: Anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folgen in den verschiedenen Geweben des menschlichen Körpers. Leipzig 1828. Eine gut geschriebene Abhandlung von *J. E. Dezeimeris*, in welcher über die Entzündung der Arterien historische Bemerkungen aus den angeführten Schriften gegeben werden, steht im Arch. gén. de Méd. Déc. 1829. p. 481 sq.

Venen, Venae.

So wie es 2 verschiedene Arterien giebt, von welchen die Körperarterie das hellrothe, aus den Lungen zum Herzen gekommene Blut vom Herzen aus zu allen Theilen des Körpers führt, die Lungenarterie aber das dunkelrothe, aus allen Theilen des Körpers zum Herzen gekommene Blut von da aus zu den Lungen leitet, so giebt es auch 2 Klassen von Venen. Denn 2 große Körpervenen und eine Herzvene führen das bei der Ernährung der Theile des Körpers dunkel gewordene Blut der rechten Vorammer, und 4 Lungenvenen führen das beim Athemholen in den Lungen hellroth gewordene Blut der linken Vorammer des Herzens zu.

Die Venen fangen in den Haargefäßnetzen des Körpers und der Lungen an, wo sich die Röhren dieser Netze zu minder zahlreichen und größeren, und diese wiederholt zu noch wenigeren und zu noch größeren Röhren vereinigen. So oft 2 oder mehrere Zweige sich in einen größeren Zweig vereinigen, ist jedesmal der Querschnitt des größeren Zweiges etwas kleiner, als die zusammengerechneten Querschnitte jener kleinen Zweige. Daher ist die Höhle, welche entsteht, wenn man alle zu einer und derselben Ordnung gehörenden Röhren zusammenrechnet, nicht gleich weit, sondern in den Ästen größer, in den Stämmen kleiner. Aus diesem Grunde fließt auch das Blut, wie man sich durch die mikroskopische Beobachtung an durchsichtigen Theilen lebender Thiere überzeugen kann, in den kleineren Venen langsamer, in den größeren desto geschwinde, je mehr Reiser, Zweige und Äste sich schon unter einander vereinigt haben.

Körpervenen im Allgemeinen.

Die Körpervenen, welche das dunkelrothe Blut aus einem Theile des Körpers zurückführen, sind weiter, und meistens auch zahlreicher als die Arterien, die das Blut in diesen Theil hineingeführt hatten. Aus diesem Grunde fließt das Blut der Körpervenen nothwendig langsamer, als das Blut der Arterien, denn es fließt dem Herzen durch die weitesten und zahlreicheren Körpervenen in einer Minute eben so viel Blut zu, als von ihm durch die einzige und engere Körperarterie wegfießt. Haller rechnet mit Sauvages, daß der Querschnitt der Höhle der Körpervenen sich zu dem der Körperarterie nahe wie 9 zu 4 verhalte, und also mehr als noch einmal so groß sei, und eben so viel mal muß nothwendig auch das Blut in jenen Körpervenen langsamer als in der Körperarterie bewegt werden; wobei indessen nicht zu übersehen ist, daß wir kein Mittel haben, den Durchmesser der Körperarterien und der Körpervenen während des Lebens genau zu messen, und daß die Messungen, die man nach dem Tode anstellt, deswegen ungenau sind, weil die Arterien nach dem Tode leer und verengt, die Venen mit Blut gefüllt und erweitert gefunden werden. Die Messungen nach dem Tode erlauben daher nur eine ungefähre Schätzung der Größe jener Höhlen.

Communication der Körpervenen unter einander.

Die mittleren und größeren Röhren der Körpervenen sind aber nicht nur zahlreicher und weiter, sondern sie stehen auch meistens unter einander weit häufiger in Verbindung (in Communication) als die Arterien. Daß in einem Theile mehrere unter einander communicirende Venenstämme vorhanden sind, um das Blut von den Theilen wegzuführen, welches eine einzige Arterie zu ihnen hingeführt hatte, hat den Nutzen, daß, wenn die mit dünnen Wänden versehenen Venen an der einen Stelle von außen zusammengeedrückt werden, dem Blute dennoch durch benachbarte communicirende Venen ein Ausweg offen bleibt, oder wenn das Blut bei der Bewegung der Theile wegen seiner Schwere in der einen Richtung auf ein Hinderniß stößt, es in einer andern einen Ausweg habe. Die Venen sind an denjenigen Stellen viel zahlreicher, als die ihnen entsprechenden Arterien, und zugleich unter einander vielfach durch communicirende Zweige verbunden, wo die Bewegung des Blutes wegen des auf die Venen häufig geschehenden äußeren Druckes, leicht gehindert wird, z. B. in der Haut, zwischen den Muskeln, welche die Venen während sie sich zusammenziehen und dabei dick und hart werden, drücken, ganz vorzüglich an den Gliedmaßen, wo der Druck durch äußere Dinge und durch die Muskeln rings herum Statt finden kann. Zwischen den Muskeln der Gliedmaßen begleiten daher meistens 2 Venen 1 Arterie, so daß zu beiden Seiten die Arterie 1 Vene liegt, und diese tief liegenden Venen stehen mit den oberflächlichen, unter der Haut verlaufenden Venen in Verbindung, so daß das Blut, wenn die Gliedmaßen von außen gedrückt werden, aus der Haut in die tief liegenden Venen und von da weiter fließen, wenn aber die tief liegenden Venen von ihren Muskeln gedrückt werden, Blut aus diesen in die der Haut entweichend fließen kann.

Indessen giebt es noch andere Zwecke, warum die Körpervenen an manchen Stellen vervielfacht und unter einander in häufige Verbindung gebracht sind, z. B. um manche Theile, indem sie sich mit Blut füllen, auszudehnen und zu erwärmen, z. B. das männliche Glied, den Uterus, die Muttertrompeten, welche vielfache Netze großer Venen einschließen.

Klappen der Körpervenen ¹⁾.

An denjenigen Stellen, wo die Schwere der Blutssäule, oder der Druck von Seiten der Muskeln, oder ein äußerer Druck ein Hinderniß

¹⁾ *H. Fabricii ab Aquapendente de venarum ostioli Opera omnia* (Ausg. von *Albinus*). Lugd. Batav. 1738. Fol. p. 153. (Ausgabe von *Bohnus*, Lipsi 1687. Fol. p. 150.) *J. Gabr. Schmidt praeside, J. H. Meibomius valvulis s. membranulis vasorum earumque structura et usu.* Helms. 161 rec. in *Disp. anat. select. coll. A. Haller*, Vol. II. p. 49. — *Richelma (Theodul Kemper) Diss. de valvularum in corporibus hominis et brutorum natura, fabrica et usu mechanico; rec. ibid.* p. 79. — *J. Doebeli valv*

für die Bewegung des Bluts in den Venen herbeiführen können, befinden sich in den Venen die schon S. 28 erwähnten Klappen, die daher nicht allen Aesten der Körpervenen zukommen, sondern an mehreren, welche in weichen drüsigen Theilen, oder in der Bauch-, Brust- und Schädelhöhle vor Druck sehr geschützt liegen, fehlen. In der unteren Hohlvene und ihren beiden Hauptästen, den Venis iliacis, in den Venen des Gehirns und Rückenmarks, in der Wirbelvene, in den Zwischenrippenvenen, in denen der Gebärmere, des Magens, der Milz und des Pankreas, und an allen andern Aesten der Pfortader, in denen der Milz, der Leber, der Eierstöcke, des Uterus und in der Nabelvene, so wie auch in den Aesten der Herzvenen (nicht aber an der Einmündung ihres Stammes in das rechte Atrium) und endlich in den Venen der Knochen¹⁾ fehlen die Klappen der Regel nach entweder ganz, oder es finden sich wenigstens nur in manchen dieser Venen einfache und kleine klappenartige Vorsprünge, welche nicht verhindern können, daß eingespritzte Flüssigkeiten in den mit einiger Gewalt ausgedehnten Venen aus den Stämmen in die Zweige dringen. Auch in allen sehr kleinen Venen fehlen sie gänzlich, und schon bei Venen, die weniger als eine Linie im Durchmesser haben, kommen sie nach Haller nur sehr selten vor²⁾. Dagegen sind in den Venenstämmen und in den Venen von mittlerer Größe, da wo sie im Beariff sind aus der Brust und Beckenhöhle hervorzutreten, ferner an den Gliedmaßen, am Gesichte, an der Zunge und Mandel, an den Bauchdecken, an der Ruthe, in den Vasis spermaticis internis des Mannes, die aus der Bauchhöhle in den Hodensack treten, nicht aber in den Venis spermaticis internis des weiblichen Geschlechts, welche nur in der Bauchhöhle liegen³⁾, Klappen vorhanden. In der Vena azygos kommen oft Klappen vor⁴⁾. Merkwürdig befinden sich bei dem Menschen an Venen oft keine Klappen, wo bei den Säugethieren welche gefunden werden. So habe ich selbst und mehrere Anatomen vor mir in den Aesten der Vena portae des Pferdes Klappen gefunden. Der aufrechte Gang des Menschen und eine andere Lage und Befestigung der Eingeweide bei ihm macht es auch schon an sich wahrscheinlich, daß bei ihm in der Einrichtung der Klappen Verschiedenheiten Statt finden. Bei den Vögeln, bei welchen die Venen, wie ich wenigstens beim Schwane, wo ich sie untersucht habe, bemerkte, die Arterien an Zahl und Umfange bei weitem nicht so sehr übertreffen, als bei dem Menschen und bei den Säugethieren, stehen die Klappen viel seltener, als bei diesen, und bei den kaltblütigen Thieren fehlen sie, nach Swammer-

larum vasorum lacteorum lymphaticorum, sanguiferorum dilucidatio. Rostorhii 1694. 4. — Petr. Gericke, de valvulis venarum et earum usu. Helmst. 1723. — Perrault, Essais de Physique. Tom. III. Part. III. c. 5. Pl. 16, 17. S. 252, und Sömmerring, Gefäßlehre, p. 413. — Haller, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I. Lib. II. sect. 2. §. 15 — 22, wo auch eine ausführliche Geschichte der Entdeckungen und der jetzigen Beobachtungen Anderer zu finden ist.

¹⁾ Breschet, in Nova acta physico-medica academiae caesareae Leopoldinae. Tom. XIII. Bonnae. 4. p. 359. und dess. Recherches anatomiques sur le systeme veineux etc. p. 24, fand in den Venen der Knochen des Schädels keine einfache, häutige Vorsprünge, in denen der Wirbel aber konnte er keine bemerken.

²⁾ Haller a. a. O. §. 19.

³⁾ Monro, de semine et testibus, p. 14, fand allemal in der Samenvene des Mannes, aber nicht in der Samenvene des Weibes Klappen. Siehe Haller, de partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus. Lib. II. Sect. 2. §. 19. und Sömmerrings Gefäßlehre. 1801. S. 314.

⁴⁾ Kemper in Halleri Disp. anat. select. Vol. II. p. 112. Haller, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. T. I. Lib. II. sect. 2. §. 21.

86 Beschaffenheit der Venenklappen an verschiedenen Stellen.

dam, de Heide und Haller, ganz ¹⁾). Die Klappen der Venen sind dünner als die am Anfange der Arterien, indessen bemerkt man doch in ihnen zuweilen glänzende Fäserchen.

Die Klappen der kleinen Venen bestehen nicht selten nur aus einer Tasche. Dieses ist auch zuweilen an solchen Stellen großer Venen deren Venenäste in die Venenstämme einmünden, der Fall. In größeren Venen, und zwar vorzüglich an solchen Stellen, an welchen keine Venenäste in die Stämme eintreten, bilden je 2 einander gegenüber liegende meistens gleich große Taschen eine Klappe. Nur selten kommen in der großen Venen Klappen vor, die aus 3 neben einander liegenden Taschen bestehen, z. B. zuweilen in der Jugularvene nach Kerkring und Morgagni, oder in der Schenkelvene nach Haller. Der seltene Fall, wo 4 oder 5 Taschen eine Klappe gebildet haben sollen, ist wohl als regelwädrig anzusehen. Die paarweise gestellten Taschen in kleinen Venen sind sehr länglich und schmal. Unter den aus einer einzigen Tasche gebildeten Klappen giebt es sehr flache. Manche sind sogar nur einem kleinen häutigen Vorsprunge ähnlich, der als eine Verlängerung des einen Winkels erscheint, unter welchem ein kleiner Ast in einen großen Stamm eintritt ²⁾. Solche Klappen hindern oft, wie schon oben bemerkt worden ist, das Rückwärtsfließen einer mit Gewalt in den Venen rückwärts bewegter Flüssigkeit, durch welche die Venen sehr ausgedehnt werden, nicht. Nicht selten findet man bei Erwachsenen Venenklappen zerstört, z. B. die Hautfalte derselben von Löcherchen durchbrochen oder in ein Netz verwandelt oder nur den freien Rand der Klappe, der immer ein wenig dicker als der übrig Theil der häutigen Falte zu sein pflegt, vorhanden, der dann in Gestalt einer Faden- oder einer Brücke von der einen Seite zur andern herüber geht ³⁾. In der Regel wird bei Erwachsenen die große einfache Klappe, die an der Einmündung der untern Hohlvene in die rechte Vorkammer des Herzens befindlich ist (valvula Eustachii), zerstört. Nicht selten findet man auch die Klappe an der Einmündung der großen Herzvene in dieselbe verlegt, aber auch an andern Vene beobachtet man dasselbe, wenn man die Klappen oft genug untersucht.

Lungenvenen im Allgemeinen.

Die 4 Lungenvenen, welche das in den Lungen beim Athmen hell roth gewordene Blut in die linke Vorkammer des Herzens führen, unterscheiden sich dadurch von den Körpervenen, daß der Querschnitt ihre Höhle nicht größer ist, als der der Lungenarterie; denn in den Lungen selbst wird jeder Ast der Lungenarterie nur von einem ungefähr gleich dicken Aste einer Lungenvene begleitet, und der Querschnitt der Höhle

¹⁾ Haller a. a. O.

²⁾ Kemper. in Disp. anat. select. coll. Haller, Vol. II. p. 111.

³⁾ Haller. De Partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I Lib. II. sect. 2. §. 17.

der 4 Lungenvenen zusammengenommen ist, nach genauen, z. B. von Santorini ¹⁾ gemachten Ausmessungen, nicht größer als der der Lungenarterien, und scheint sogar zuweilen ein wenig kleiner zu sein. Es finden sich auch in den Lungen keineswegs 2 Ordnungen von Venen, oberflächliche und tiefliegende. Weil nun aber die Höhle in den Lungenvenen nicht größer ist, als die der Lungenarterien, so müssen sie während des Lebens mit einer ununterbrochenen Blutsäule angefüllt sein, woraus selbst wieder folgt, daß ein Druck auf die Lungen den Blutlauf in diese Venen nicht so leicht stören kann, da das Blut nur nach der einen Richtung gut ausweichen kann, und von dem nachdringenden Blute unaufhörlich fortgedrängt wird. Da nun überdies der Druck, den die Lungen beim Athmen erleiden, sehr gelind und regelmäßig ist, so scheint derselbe den Blutlauf nicht zu stören, und es scheint daher kein Schaden daraus zu erwachsen, daß die größeren und mittleren Aeste der Lungenvenen nicht einmal unter einander durch Anastomosen zusammenhängen, und daß in ihnen keine ausgebildeten halbmondförmigen Klappen vorhanden sind ²⁾, die den aus den Stämmen in die Aeste

¹⁾ Santorini, Observationes anatomicae. Venetiis 1724. 4. p. 145. sq. Haller, Elem. physiol. Lib. VIII. sect. 2. §. 23.

²⁾ Kemper in Richelmann Diss. de valvularum in c. h. et brutorum natura etc., in Haller Disp. anat. select. Vol. II. p. 112 sagt: Venae pulmonalis totum ductum, exceptis mitralibus, ubi cordi affigitur valvulis destitui assertit Willis (Pharmaceut. ration. part. 2. sect. 1. c. 1. p. 12.). Colligit hoc inde, quod liquor trunco ejus injectus, pariter ac in arteria, omnes illico ramos et surculos sine obice quovis pervaderit. At experimentum tum fallax est, sive liquore, sive aëre tentes. Valvulae enim facile rumpuntur, vel remouentur vi accedente, uti in quavis vena iis maxime munita experiri licet. Aër vero subtilior se subtile insinuat persaepe. Autopsia igitur consulto in cane et vitulo, hanc Willisio partium assentiri partim refragari apparuit. Semilunares enim non habet, attamen oblongas illas planas, ad surculorum in ejus ramos majores insertionem manifesto exhibet, et cum plurimae harum adsint, regressum ad innumeros surculos satis inhiberi, prioresque non requiri videntur.

Hales, Haemastatique ou la statique des animaux, traduit par Mr. de Sauvages, à Genève 1744. 4. p. 63 erzählt, er habe in einer Vena pulmonalis eines Schweins eine 3 Fuß lange senkrechte Röhre eingebunden und dieselbe mit lauem Wasser gefüllt, das Wasser sei aber weder in die Lungenarterien, noch in die Luftröhrenäste gedrungen. Er vermuthet daher, daß sie wohl Klappen haben müßten. Sauvages bestätigt in einer hierzu gemachten Anmerkung diese Vermuthung beim Schöpfe. Man braucht, sagt er, nur Quecksilber in diese Venen einzuspritzen, um sich von der Gegenwart dieser Klappen zu überzeugen.

C. Mayer, Ueber die Klappen in den Lungenvenen, in der Zeitschrift für Physiologie, herausgeg. von Tiedemann und Treviranus, B. III. Darmstadt 1829. 4. S. 156 sagt: es findet sich immer eine Klappe an der Stelle, wo ein Nebenast unter einem spitzen Winkel in den größeren Stamm der Lungenvene einmündet. Je spitziger der Winkel ist, um so deutlicher ist auch die Klappe entwickelt. Es finden sich keine Klappen an denjenigen Stellen, wo die Nebenäste unter einem rechten Winkel in den Hauptstamm sich einsenken (was sehr häufig nach Mayer der Fall ist). Bei der menschlichen Lunge sind diese Klappen größer und zahlreicher, als beim Schweine. Reich (Beiträge zur pathol. Anat. Berlin 1813. ©. 81, fand einmal vor der Mün-

eingespritzten Flüssigkeiten den Weg gänzlich versperren, denn man findet nur an Stellen, wo die Zweige in die Stämme unter spitzen Winkeln einmünden, kleine häutige Vorsprünge, die aber nach Mayer überall fehlen, wo diese Einmündung unter einem rechten Winkel geschieht.

Häute der Venen.

Die dünnere und sehr ausdehnbare Wand der Venen hat nur 2 Häute, eine äußere Haut, tunica externa, welche aus kleinen Gefäßen und aus sehr dünnen, in mannichfaltigen Richtungen laufenden sich vielfach durchkreuzenden Fäserchen besteht, die nach innen zu dicht auf einander liegen, und durch Einweichen im Wasser sich auflösen. An manchen Venen liegen in dieser Haut zarte, röthliche, weiche Längensfasern, die aber nicht zahlreich genug sind und dicht genug liegen, um eine Lage für sich allein zu bilden, auch zu klein sind, um genauer untersucht werden zu können. Diese Haut fehlt den Venen an den Orten, wo sie in Zwischenräumen liegen, die von steifen, unnachgiebigen Wänden begrenzt sind, ganz und gar, z. B. in den Knochen in den von sehnigen Häuten gebildeten Zellen der schwammigen Körper des Schädels und in den Sinibus der harten Hirnhaut.

Die innere Haut, tunica interna, hat die nämlichen Eigenschaften als die der Arterien, mit dem Unterschiede, daß sie etwas ausdehnbarer ist, von einem umgelegten Faden nicht so leicht durchschnitten wird, nicht so leicht im Alter verküchert, und in vielen Venen halbmondförmige Falten bildet, welche den Nutzen der Ventile haben. Sie haftet sehr fest an der äußern Haut, ist aber auch da vorhanden, wo diese fehlt, und kleidet dann die Zwischenräume aus, in denen das Venenblut läuft.

Ueber die Zahl der Häute der Venen und über die Richtung der in ihrer Wand verlaufenden Fasern sind die Anatomen zum Theil verschiedener Meinung. Manche Anatomen, wie Haller, Bichat¹⁾, J. F. Meckel²⁾ Beclard³⁾ und Marx⁴⁾ nehmen eine saizige, sehr dünne mittlere Haut an

dung der einen rechten Lungenblutader eine Klappe. Dieses ist bei den Menschen eine Ausnahme. Nach Cuvier, Vorlesungen über die vergleichende Anatomie, B. IV S. 133, kommen aber bei mehreren Amphibien Klappen an dieser Stelle als regelmäßige Bildung vor. Siehe J. F. Meckel, Handbuch der Anat. B. III. S. 368.

¹⁾ Bichat, Allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff. Leipzig 1802. Th. I. Abth. 2 p. 153.

²⁾ J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle 1815. B. I p. 10.

³⁾ P. A. Beclard, Elémens d'anatomie générale. Paris 1823. p. 396.

⁴⁾ Henricus Marx, Diatribe anatomico-physiologica de structura atque vitæ venarum. Carlsruhæ 1819. 8. p. 26.

in Verbindung getreten, und 55 Jahre lang in Verbindung geblieben war, die Mäntel der aneurysmatisch ausgehulenen Venen nicht dicker, wohl aber glaubte man an einer Stelle neu entstandene Fleischfasern an denselben beobachtet zu haben.

Gefäße und Nerven der Venen.

So wie die Wände der Arterien mit Gefäßen, vasa vasorum, versehen sind, welche auf ihre Ernährung abzwecken, so sind es auch die Wände der Venen. Vorzüglich deutlich sieht man diese Gefäße bei Venen, die in einem geringen Grade entzündet sind. Unter diesen Umständen wird auf ihnen, wie Ribes¹⁾ bemerkt, ein Netz kleiner Gefäße sichtbar, dessen Zwischenräume noch weiß sind.

Mehreren Anatomen²⁾ ist es nicht gelungen, Nerven zu den Häuten der Venen zu verfolgen. Bei großen Säugethieren, beim Pferde und Rinde, habe ich indessen nicht nur die Nerven bis zur Haut der Vena cava inferior, da wo sie in die Fossa der Leber eintritt, hin verfolgt, sondern auch dieselben zwischen den Häuten des Stückes dieser Vene, das in der Leber verborgen ist, und deswegen an dieser Stelle keine Nerven unmittelbar empfangen kann, weiter verlaufen und sich in Zweige theilen sehen³⁾. Da aber diese Vene an dieser Stelle mit einer wahren Muskelhaut versehen ist, welche den Venen des Menschen überall fehlt, so würde ich hieraus keinen sicheren Schluß auf das Vorhandensein von Nerven in den Venen des Menschen zu ziehen wagen, hätte ich nicht von Wutzer erfahren, daß er auch an der nämlichen Stelle Nerven des sympathischen Nerven zur Vena cava bei den Menschen treten gesehen und verfolgt habe.

Empfindungsvermögen in den Venen.

Schmerring⁴⁾ sagt, daß M. Monro in seinen Vorlesungen nicht habe, daß er an seiner eignen bloßgelegten Armvene keine Empfindung von Anstechen und Dehnen derselben gehabt habe. Nach Ribes⁵⁾ empfindet aber ein Kranker, der an einer Entzündung einer Vene leidet, im Anfange des Uebels einen leichten Schmerz längs der afficirten Vene.

¹⁾ Ribes, recherches sur la phlébite, Revue médicale, Juillet. 1825. p. 5.

²⁾ Noch neuerlich in Mascagni Prodomo della grande anatomia. Firenze 1819. Vol. p. 65.

³⁾ Siehe diese Nerven von mir beschrieben und abgebildet in Weigel Diss. de strato musculo tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus. Lipsiae 1823. 4. S. 29. Fig. 4.

⁴⁾ S. Th. Schmerring, Vom Baue des menschlichen Körpers. Th. IV. Frankfurt a. M. 1801. S. 412.

⁵⁾ Ribes, recherches faites sur la phlébite, Revue médicale, Juillet 1825. p. 13.

der Jüngere, überall vergebens gesucht. Marx hat zwar eine Lage von Quersäse dicht an der innern Haut der Venen abgebildet, seine Bemerkung ist jedoch se dem von Niemanden bestätigt worden. Eben so wenig ist die von Willis in d Venen gefundene Drüsenhaut neuerlich von Jemanden gefunden worden, und d gänzlich in Vergessenheit gekommen. Mascagni ¹⁾ nimmt, jedoch ohne hi reichende Beweise, wie bei den Arterien, so auch bei den Venen 4 Häute an.

Verhältnißmäßig geringe Zerreißbarkeit der Venenwände.

Alle Venen des Menschen, sowohl die Körpervenen, als die Lungen venen, sind viel dünner, durchsichtiger, nachgiebiger und ausdehnbarer als die Arterien. Sie zerreißen auch leichter, als sie, durch eine mit Gewalt in sie eingetriebene tropfbare oder luftförmige Flüssigkeit. Indessen zerreißen sie doch nicht um so viel leichter, als man verhältnißmäßig zu geringeren Dicke ihrer Wände erwarten sollte, und die Substanz der Wände an sich ist also fester, als die der Arterien. Bei manchen Säugethieren, z. B. bei den Pferden und Rindern, ist nun aber die Wand der Vena cava inferior auch fast eben so dick, oder sogar zuweilen noch dicker, als die neben ihr liegende Körperarterie. Es ist daher nicht zu verwundern, daß hier die Vene schwerer zerrißt, als die Arterie. Wenn nun also Wintringham ²⁾ beobachtete, daß beim Schafe eine größere Kraft angewendet werden mußte, um die Vena cava inferior, als um die neben ihr liegende Aorta durch eingetriebene Luft zu zersprengen, so darf man hieraus nicht den Schluß ziehen, daß auch die Vena cava inferior des Menschen schwerer zerreißbar sei.

Haller nimmt an, indem er die bis jetzt angestellten Messungen, die zum Theil ein verschiedenes Resultat gegeben haben, zugleich berücksichtigt, daß die Wände der großen Stämme der Venen wenigstens 5mal dünner, als die der neben ihnen gelegenen und ihnen entsprechenden Arterien sind. Indessen ist dieses Verhältniß an verschiedenen Stellen des Körpers ein verschiedenes. Die Venen der Füße z. B., welche den Druck des oft senkrecht aufsteigenden Bluts auszuhalten haben, haben dickere Wände, als Venen an andern Theilen von demselben Durchmesser. Die Venen der Knochen dagegen und die der harten Hirnhaut haben mit den andern Venen nur die innerste Haut gemein, welche hier die Zwischenräume in den Knochen und in der harten Hirnhaut, in welchen das Venenblut fließt, auskleidet, und folglich sind ihre hier von andern benachbarten Theilen unterstützten Wände äußerst dünn.

Nach Larren ²⁾ nimmt aber die Haut einer Vene, welche bei einem unglücklichen Ueberlasse so verletzt worden ist, daß das Blut der benachbarten, ist gleich verletzten Arterie durch die Wunde mit großer Gewalt in die Vene hinüber strömt, eine Beschaffenheit an, die der sehr ähnlich ist, welche die mittlere Arterienhaut hat. Anfangs, so lange sie sich noch nicht so verdickt hat, kann die Vene dem gewaltigen Stöße des Pulses nicht widerstehen, dehnt sich sehr aus und schlängelt sich vielfach. Schottkin fand bei einer Frau, bei welcher durch eine äußere Gewaltthätigkeit die Arteria radialis mit der Vena cephalica

¹⁾ Mascagni, Prodomo della grande anatomia. Firenze 1819. Fol. p. 64.

²⁾ Felpeau, Anatomie chirurgicale. Paris 1825. 8. T. I. p. 368.

in Verbindung getreten, und 55 Jahre lang in Verbindung geblieben war, die Haut der aneurysmatisch ausgehulenen Venen nicht dicker, wohl aber glaubte er an einer Stelle neu entstandene Fleischfasern an denselben beobachtet zu haben.

Gefäße und Nerven der Venen.

So wie die Wände der Arterien mit Gefäßen, vasa vasorum, versehen sind, welche auf ihre Ernährung abzwecken, so sind es auch die Wände der Venen. Vorzüglich deutlich sieht man diese Gefäße bei Venen, die in einem geringen Grade entzündet sind. Unter diesen Umständen wird auf ihnen, wie Ribes ¹⁾ bemerkt, ein Netz kleiner Gefäße sichtbar, dessen Zwischenräume noch weiß sind.

Mehreren Anatomen ²⁾ ist es nicht gelungen, Nerven zu den Häuten der Venen zu verfolgen. Bei großen Säugethieren, beim Pferde und Rinde, habe ich indessen nicht nur die Nerven bis zur Haut der Vena cava inferior, da wo sie in die Fossa der Leber eintritt, hin verfolgt, sondern auch dieselben zwischen den Häuten des Stück dieser Vene, das in der Leber verborgen ist, und deswegen an dieser Stelle ihre Nerven unmittelbar empfangen kann, weiter verlaufen und sich in Zweige theilen sehen ³⁾. Da aber diese Vene an dieser Stelle mit einer wahren Muskelhaut versehen ist, welche den Venen des Menschen überall fehlt, so würde ich hieraus keinen sicheren Schluß auf das Vorhandensein von Nerven in den Venen des Menschen zu ziehen wagen, hätte ich nicht von Buzer erfahren, daß er auch an der nämlichen Stelle Aeste des sympathischen Nerven zur Vena cava bei den Menschen treten gesehen und verfolgt habe.

Empfindungsvermögen in den Venen.

Edmerring ⁴⁾ sagt, daß Al. Monro in seinen Vorlesungen erzählt habe, daß er an seiner eignen bloßgelegten Armevene keine Empfindung von Anstechen und Dessnen derselben gehabt habe. Nach Ribes ⁵⁾ empfindet aber ein Kranker, der an einer Entzündung einer Vene leidet, im Anfange des Uebels einen leichten Schmerz längs der afficirten Vene.

¹⁾ Ribes, recherches sur la phlébite, Revue médicale, Juillet. 1825. p. 5.

²⁾ Noch neuerlich in Mascagni Prodomo della grande anatomia. Firenze 1819. Fol. p. 65.

³⁾ Siehe diese Nerven von mir beschrieben und abgebildet in Weigel Diss. de strato musculo tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus. Lipsiae 1823. 4. S. 29. Fig. 4.

⁴⁾ G. Th. Edmerring, Vom Baue des menschlichen Körpers. Th. IV. Frankfurt a. M. 1801. S. 412.

⁵⁾ Ribes, recherches faites sur la phlébite. Revue médicale, Juillet 1825. p. 13

Lebensbewegung der Venen ¹⁾.

Ungeachtet die Venen eben so wenig als die Arterien ein Vermögen besitzen, sich so schnell zusammenzuziehen, daß man die Bewegung selbst sehen könnte, und ihnen also diese Eigenschaft der Muskeln abgeht, so können sie sich doch allmählig verengern, so daß man die Wirkungen ihrer Zusammenziehung und Wiederausdehnung, wenn sie einige Zeit fortgedauert hat, gewahr wird. Daß man an ihnen die Falten, die diese Bewegung bewirken, nicht bemerkt und unterscheidet, ist hiergegen kein Einwurf, da die Lymphgefäße, welche gewissermaßen einen Anhang am Venensysteme bilden, mit noch viel dünneren Wänden versehen sind, und noch weniger unterscheidbare Falten besitzen, und doch sich sowohl wenn sie leer sind, mit Flüssigkeit, die sie einsaugen, füllen, als auch diese Flüssigkeit mit beträchtlicher Gewalt fortbewegen können, wobei durch die Kraft des Herzens nicht unterstützt werden, da sie mit den Arterien nicht ununterbrochen zusammenhängen.

Daß auch die Venen auf die Bewegung des Bluts in ihren Höhlen einen sehr merklichen Einfluß durch die Lebensbewegung ihrer Wände äußern, sieht man schon daraus, daß diese häutigen Venen, die bald bei einander verlaufen und unter einander in Verbindung stehen, in einem sehr verschiedenen Grade mit Blute gefüllt und vom Blute angefüllt sind. Wären die Venen Canäle, die selbst keine bewegliche Kraft hätten, und in denen das Blut nur durch die Kraft des nachbringenden Blutes emporstiege, so würden alle Venen, die unter einander zusammenhängen, so angefüllt sein, wie es ihre Weite mit sich bringt und bevor nicht alle tiefer gelegenen Venen völlig angefüllt wären, könnte das Blut in den höher gelegenen nicht emporsteigen.

Dieses ist aber nicht nur nicht der Fall, sondern Kälte, Furcht, Schmerz und andere Umstände bewirken auch eine ziemlich schnelle Verengung der Venen. Ohnmachten beim Aderlassen haben zur Folge, daß das Blut selbst aus sehr großen Venen so lange auszufließen aufhört, als die Ohnmacht dauert, und Vorstellungen der Seele bewirken zuweilen, daß es sich in den Venen des Corpus cavernosum des männlichen Gliedes anhäuft. Auch die Versuche an entblößten Venen lebender Thiere bestätigen die von mir ausgesprochenen Sätze. Verletzte, durchschnitene und unterbundene Venen ziehen sich oft in Kurzem sehr stark zusammen ²⁾. Die Beweise, die man aber von mechanischen, chemischen

¹⁾ Man sehe die oben S. 73 bei den Arterien genannten Schriftsteller, und von dieser vorzüglich Benschmir, ferner *Heinr. Marx*. *Diatrise anatomico-physiologica de structura atque vita venarum*, a medic. ord. Heidelbergensi praemii proposito ornata; c. fig. aere incis. c. Carlsruhae 1819. 8.

²⁾ *Marx* a. a. O. p. 79.

electricen Reizungen lebender Venen und von der Zusammenziehung in Folge der Berührung entblößter Venen mit der atmosphärischen Luft herkommt, sind nicht so sicher. Ich habe Venen durch Berührung mit der Luft noch so lange nach dem Tode sich sehr zusammenziehen gesehen, daß man nicht mehr daran denken konnte, die Zusammenziehung für die Wirkung einer Lebenskraft zu halten.

Bildungsvermögen der Venen und Krankheiten derselben.

In der gerinnbaren Lymphe, welche in entzündeten Theilen abgehobert wird, bilden sich nicht nur kleine Arterien, sondern auch kleine Venen. Schröder van der Kolk¹⁾ hat sie mit eingespritzter, gelblicher Flüssigkeit angefüllt und sichtbar gemacht. Daß dasselbe in der Substanz, durch welche ein gänzlich vom Körper getrennter Theil wieder anwächst, der Fall sei, folgt daraus, daß in einem solchen Theile der Kreislauf wieder hergestellt wird²⁾.

Die Wunden größerer Venen heilen sehr leicht und sehr vollkommen, ohne daß dabei der Canal derselben verschlossen wird. Von dieser Erscheinung, durch welche sie sich so sehr von den Arterien unterscheiden, ist der Grund zum Theil ein mechanischer, denn das Blut übt in den Venen einen viel geringeren Druck gegen die Wände aus, als in den Arterien, und die Wunden klaffen wegen geringerer Steifheit der Wände nicht, und werden, weil die Venen sich nicht eben sehr zurückzuziehen streben, nicht so sehr auseinander gezogen. Richter³⁾ untersuchte die Narben in mehreren Venen, die durch das Aderlassen verletzt worden waren, und rechnet die Venen zu den Theilen, die vorzüglich gut heilen.

J. Hunter⁴⁾ hat zuerst die Entzündung der Venen bei Pferden und beim Menschen beschrieben. Sie entsteht zuweilen nach dem Aderlasse. Bei einem Menschen, dem an der Armvene zur Ader gelassen worden, war die Veue vom Ellenbogen bis zur Achsel entzündet. Die innere Haut war in Eiterung übergegangen, es hatten sich im Innern aus geronnener Lymphe beständige Membranen und einige Abscesse gebildet. Peter Frank⁵⁾ berücksichtigte schon die Entzündung der Venen. Sasse⁶⁾ hat gute Beobachtungen über die Entzündung der Venen, die zum Theil von Ph. Meckel hervörhören, bekannt gemacht. Eravers beobachtete die Entzündung der Venen, welche nach Am-

¹⁾ J. L. C. Schröder van der Kolk, *Observationes anatomico-pathologicae et practicae argumenti*. Amstelodami 1826. S. p. 43.

²⁾ *Siehe* *Lq. I. S. 253.*

³⁾ F. C. Richter, *Diss. inaug. chir. de vulneratarum venarum sanatione*, praes. Autenrieth. Tübingae 1812. p. 8.

⁴⁾ J. Hunter, *Medical commentar. by a Soc. of Edinburgh*. Vol. III. 1775. p. 1. *Transact. of society for the improvement of medic. and chirurg. knowledge*. T. I. p. 18. III. p. 65.

⁵⁾ P. Frank, *de curand. hom. morbis*.

⁶⁾ Jo. Georg Sasse, *Diss. vasorum sanguiferorum inflammatione*. Halae 1797

putationen und nach dem Ausschneiden der Blutaderknoten entsteht. Vieles det man gesammelt in der durch Anmerkungen bereicherten französischen Uebersetzung von Hodgsons Werke und in den Abhandlungen von Ribes ¹⁾, Gendrin, Pelspeau und Dance ²⁾, Blandin ³⁾ und Dezeimeris ⁴⁾, so wie in Ott pathologischer Anatomie ⁵⁾. Die Venen röthen sich, wenn sie sich entzündet; wenn die Entzündung sehr heftig war, verdicken sich ihre Wände zuweilen in dem Grade, daß sie quer durchschnitten das Lumen erhalten, zuweilen werden sie durch eiternde und schwärende Vertiefungen uneben. Unter diesen Umständen sieht man an ihrer innern Fläche wenn sie unter Wasser getaucht werden, Botten, oder es bilden sich in ihnen Membranen aus geronnener, ausgechwitzter Lymphe, die zuweilen durch eine beträchtlich lange Strecke einer Vene fortsetzen.

Lymphgefäße.

Die Lymphgefäße, vasa lymphatica, die man auch einsaugende Gefäße oder Saugadern, vasa absorbentia ⁷⁾ nennt, sind durchsichtig mit äußerst dünnen Wänden und sehr vielen Klappen (Ventilen) versehen cylindrische, und wenn sie nicht vollkommen angefüllt sind, platte Röhrchen, welche das Vermögen besitzen, Flüssigkeiten an den Oberflächen des Körpers und seiner Höhlen und aus den kleinen Zwischenräumen seiner Substanz einzusaugen, sich damit zu füllen, dieselbe mit beträchtlicher Kraft fortzubewegen, in wenige größere Stämme sammeln und sie in die Venen zu ergießen, und dadurch in den Kreislauf zu bringen.

¹⁾ Ribes, in Mém. de la soc. méd. d'émulat. de Paris, 1816. T. VIII. p. 6 und Revue méd. Juillet 1825. p. 5.

Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier 1818. übers. v. Radius, Anatomische Beschreibung der Entzündung. Leipzig 1829. Th. 6. S. 19 und 38 sq.

²⁾ Pelspeau, in Archives gén. de méd. Oct. 1824. Dance, ebend. 1828.

³⁾ Blandin, in Mém. sur quelques accidens très graves à la suite des amputations des membres; Journ. hebdom. de méd. T. II. p. 579.

⁴⁾ Dezeimeris, Archives gén. de Méd. Dec. 1829. p. 481 sq. wo viel Eitern angeführt ist.

⁵⁾ A. W. Otto, Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und Thiere. Berlin 1830. S. 344, in welchem trefflichen Werke nicht nur über Arten der krankhaften Abweichungen an den Venen die vorhandenen Thatfachen seltener Vorfälle und mit eigenem Urtheile zusammengestellt, sondern auch viele eigene Beobachtungen beigebracht worden sind.

⁷⁾ Ältere Anatomen brauchten auch die Ausdrücke ductus lymphae, vasa serosa, Wassergefäße, (ein Ausdruck der unpassend ist, weil man auch die durchsichtigen, u. roth erscheinenden kleinen Arterien vasa serosa nennt), vasa valvulosa, diaphana crystallina, lactea, chylosa, Milch- oder Speisefestgefäße, welche a. letzteren Namen nicht von allen Lymphgefäßen, sondern nur von den während der Verdauung in milchweiße Flüssigkeit führenden, aus den Gedärmen kommenden Lymphgefäßen gebraucht werden dürfen, und von denen der erstere Ausdruck auch deswegen zweideutig weil auch die Gänge der Brustmilchdrüse der Frauen, durch welche die Milch in den Kreislauf zu bringen, so genannt werden können.

lauf zu bringen. Zwar sind auch die Venen so eingerichtet, daß das in ihnen befindliche Blut manche Stoffe, zu denen es eine Anziehung hat, durch die feuchten Wände hindurch an sich zieht. Allein man hat noch keinen hinreichenden Grund, anzunehmen, daß auch leere Venen, in welchen kein Blut vorhanden ist, Säfte hereinzuziehen, sich damit zu füllen und dieselben fortzubewegen fähig wären, vielmehr sprechen, wie später gezeigt werden soll, gegen eine solche Annahme wichtige Versuche. Die Säfte, die in den Saugadern fortbewegt werden, befinden sich demnach noch nicht im Kreislaufe, sondern nur auf dem Wege zu den Canälen des Kreislaufs, sie sind der Regel nach nicht roth, und also nicht Blut, aber demselben doch in anderer Rücksicht ähnlich. (S. Th. I. S. 100, 101.) Die Wände der Lymphgefäße und ihre Höhlen sind eine unmittelbare Fortsetzung der Wände und der Höhlen derjenigen Venen, in welche sie die Flüssigkeiten, die sie führen, ergießen, und sie selbst also als ein Anhang des Venensystems zu betrachten. Die Saugadern unterscheiden sich aber von den Venen nicht nur dadurch, daß sie eine vom Blute verschiedene Flüssigkeit führen, sondern noch, daß sie viel zahlreichere, nirgends ganz fehlende, und namentlich auch in den kleinen Zweigen vorhandene Klappen haben, noch dünnere und noch durchsichtigere Wände besitzen, sich nicht in jedem Organe in einen oder in einige wenige Stämme vereinigen, und daß sie endlich mit den Arterien in keiner so nahen Verbindung stehen, d. h., daß die Höhlen und Wände der Arterien sich nirgends in die Höhlen und Wände der Lymphgefäße auf eine solche Weise fortsetzen, daß eine Strömung von Säften aus jenen in diese während des Lebens möglich wäre. Hiermit ist indessen nicht geläugnet, daß allerdings Flüssigkeiten während des Lebens und nach dem Tode durch unsichtbare Poren aus den Arterien langsam in die Lymphgefäße übergehen können, erstlich nämlich durch eine Aushauchung, oder Durchschwüzung aus den kleinen Arterienetzen, die sich an den Wänden der größeren Lymphgefäße ausbreiten, und dann durch eine Aufsaugung von Seiten der kleinen Lymphgefäße, die sich unstreitig auch an den Wänden größerer Arterien befinden.

Endlich ist es aber eine die Lymphgefäße auszeichnende Einrichtung, daß sie die von ihnen eingesogenen Säfte, bevor sie dieselben in die Venen ergießen, einmal oder mehrmal durch röhrenförmige, rundliche und zugleich plattgedrückte, harte Drüsen, Lymph- oder Saugaderdrüsen, glandulae lymphaticae, conglobatae, hindurchführen, eine dem Lymphgefäßsysteme ausschließlich zukommende Classe von Organen, welche dazu eingerichtet zu sein scheint, daß hier die Lymphe, indem sie aus größeren in viele kleinere vielfach gewundene und verästelte Lymphgefäße vertheilt, und aus diesen wieder in größere Lymphgefäße zusammengeleitet wird, in einem kleinen Raume in eine

recht vielfache Berührung mit den Wänden der Lymphgefäße kommt an denselben sich recht langsam vorbei bewege, und daselbst dem Einflusse des Blutes ausgesetzt werde, das in unzähligen, viel dünneren Röhrchen, in den Haargefäßen, an den Wänden dieser Lymphgefäße langsam hindbewegt wird, und unstreitig sowohl gewisse Materien aus der Lymphe durch die Wände der Gefäße hindurch an sich ziehen, als auch andere Materien in die Lymphe absetzen kann, wodurch die Lymphe eine an vielen Stellen sichtbare Veränderung ihrer Farbe und ihrer Eigenschaften erfährt.

Wir wollen jetzt diese Eigenthümlichkeiten der Lymphgefäße im Einzelnen betrachten.

Klappen der Lymphgefäße und häufige Communication ihrer zahlreichen Stämme.

Da die Lymphgefäße nicht mit den Arterien in einer solchen Verbindung stehen, daß das vom Herzen fortgestoßene Blut in sie eindringen und sie anfüllen kann, so sind sie einer übermäßigen Ausdehnung noch weit weniger, als die Venen ausgesetzt. Ohne Nachtheil sind deswegen ihre Wände viel dünner, und daher auch zugleich durchsichtiger, als die der Venen, so daß sie, wenn sie mit der durchsichtigen Lymphe, die sie meistens führen, nicht sehr stark erfüllt sind, oder wenn sie nicht etwa eine weiße, oder anders gefärbte Flüssigkeit einschließen, mit einiger Anstrengung gesehen werden können. Dem Nachtheile, den die große Düntheit der Wände für die Lymphgefäße mit sich bringen könnte, durch den geringfügigsten äußeren Druck zusammengebrückt zu werden, ist dadurch verbeugt, 1) daß die Stämme der Lymphgefäße von mittlerer Größe, wie schon erwähnt worden, noch in weit größerer Zahl neben einander liegen, als die Stämme der Venen, und auch in einer weit vielfacheren Verbindung unter einander stehen, als diese, wodurch bewirkt wird, daß der Lymphe, wenn ihr an einer Stelle der Weg versperrt wird, immer noch an einer andern ein Ausweg offen steht: 2) daß sie viel zahlreichere, halbmondförmige Klappen haben, die, weil sie in kleinen Zwischenräume auf einander folgen, und an den mit Flüssigkeit erfüllten Lymphgefäßen meistens je 2 neben einander liegende Anschwellungen verursachen, den Lymphgefäßen das Ansehn knottiger Schnüre geben. Diese Klappen sind im Wesentlichen so eingerichtet, wie die der Venen, kehren, wie diese, ihren freien Rand nach dem Herzen zu, und verhindern das Zurückweichen der Lymphe nach den Nesten zu. Fast immer sind sie paarweis gestellt, sehr selten findet man eine 3fache einfache halbmondförmige Klappe. Bisweilen, z. B. in den

Lymphgefäßen der Leber sahe Lauth ¹⁾ ringförmige Klappen, welche dadurch entstehen, daß 2 halbmondförmige in einen etwas niedrigeren, ringförmigen Vorsprung zusammenfließen, der indessen meistens nicht hinreicht, der mit einiger Gewalt eingetriebenen Flüssigkeit Widerstand zu leisten.

Es scheint sehr nützlich zu sein, daß die Klappen der Lymphgefäße viel zahlreicher sind, als die der Venen, und nirgends fehlen. Die in den Lymphgefäßen bewegte Flüssigkeit bildet nämlich in ihnen noch viel weniger als in den Venen eine continuirliche Flüssigkeitssäule, sondern die Saugadern sind stellenweise mit Flüssigkeit erfüllt und leer. Je kürzer nun aber die in ihnen enthaltenen Flüssigkeitssäulen sind, desto mehr Klappen sind erforderlich, wenn die Flüssigkeit nicht zurücksinken soll, da sie durch die nachfolgende Flüssigkeit nicht daran verhindert wird. Hiermit hängt es wohl zusammen, daß im Hauptsaugaderstamme, ductus thoracicus, wo die Flüssigkeit, weil sie von allen Zeiten her in diesem engen Ringe zusammengebracht wird, unstreitig mehr eine continuirliche Säule bildet, weniger Klappen vorhanden sind.

In den Lymphgefäßen der Fische fehlen die Klappen, nach Hewson, Sheldon und Fohmann ²⁾ ganz, wenigstens leisten sie keinen bemerkbaren Widerstand, wenn man Flüssigkeiten in der entgegengesetzten Richtung in sie einpumpt, als in welcher die Lymphe fließt. Bei den Schildkröten haben Cruikshank ³⁾ und Sheldon ⁴⁾ Klappen wahrgenommen, die aber auch nicht verhindern, daß Flüssigkeit, nachdem die Lymphgefäße sehr ausgedehnt worden, aus den Stämmen in die Zweige dringe.

Festigkeit und Ausdehnbarkeit der Wände.

Ungeachtet der großen Dünnhheit, Durchsichtigkeit und äußerst beträchtlichen Ausdehnbarkeit der Wände sind die Lymphgefäße doch durch den Druck einer in sie eingetriebenen Flüssigkeit schwerer zerreißbar, als man glauben sollte. Werner und Feller ⁵⁾ behaupten, daß Blutgefäße, welche denselben Durchmesser als die von ihnen untersuchten Lymphgefäße hatten, immer von dem Drucke einer 12 Querfinger (Bolle?) hohen, in ihre Höhle gehenden Quecksilbersäule zerrissen wurden, daß aber die Lymphgefäße den Druck einer viel höheren Quecksilbersäule aushielten. Sie erfüllten einmal die Lymphgefäßstämme der unteren Extremitäten, und erhielten das Glied dabei in einer senkrechten Stellung, so daß die bis zum Anfange des Hauptsaugaderstammes reichende Quecksilbersäule wenigstens 4 Fuß hoch war, und doch zerrissen die sehr ausgedehnten Lymphgefäße des Unterleibes nicht. Hiermit stimmen Meckel's ⁶⁾ und Sheldon's ⁷⁾ Erfahrungen überein.

¹⁾ E. A. Lauth, Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Dissertation etc. Strasbourg 1824. p. 4.

²⁾ Fohmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heft I. Heidelberg 1827. Fol. Das Saugadersystem der Fische.

³⁾ Cruikshank a. a. O.

⁴⁾ Sheldon a. a. O. S. 28.

⁵⁾ Werner et Feller, Vaso. lacteor. atque lymphat. anatomico-physiologica descriptio, fasc. 1. c. tabb. IV. Lipsiae 1784. 4. p. 15, 16. Nota.

⁶⁾ J. S. Meckel d. ä. sagt in seiner Diss. epistolariis de vasis lymphaticis, welche enthalten ist in Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. Lipsiae 1760. 8. p. 81. membrana fortiter dilacerationi ac tensioni, magis quam venae, resistens: id quod injectio mercurii ope nos docet, quem vi aliquot librarum in minutum ramulum adactum eum non dilacerasse, saepius expertus sum.

⁷⁾ J. Sheldon, The history of the absorbent system, part the first, containing the chylography etc. London 1784. gr. 4. S. 27.

Lebensbewegung der Venen ¹⁾.

Ungeachtet die Venen eben so wenig als die Arterien ein Vermögen besitzen, sich so schnell zusammenzuziehen, daß man die Bewegung selbst sehen könnte, und ihnen also diese Eigenschaft der Muskeln abgeht, können sie sich doch allmählig verengern, so daß man die Wirkungen ihrer Zusammenziehung und Wiederausdehnung, wenn sie einige Zeit fortgedauert hat, gewahr wird. Daß man an ihnen die Fasern, die diese Bewegung bewirken, nicht bemerkt und unterscheidet, ist hiergegen kein Einwurf, da die Lymphgefäße, welche gewissermaßen einen Anhang am Venensysteme bilden, mit noch viel dünneren Wänden versehen sind und noch weniger unterscheidbare Fasern besitzen, und doch sich sowohl wenn sie leer sind, mit Flüssigkeit, die sie einsaugen, füllen, als auch diese Flüssigkeit mit beträchtlicher Gewalt fortbewegen können, wobei durch die Kraft des Herzens nicht unterstützt werden, da sie mit den Arterien nicht ununterbrochen zusammenhängen.

Daß auch die Venen auf die Bewegung des Bluts in ihren Höhlen einen sehr merklichen Einfluß durch die Lebensbewegung ihrer Wände äußern, sieht man schon daraus, daß diese häutigen Venen, die nicht bei einander verlaufen und unter einander in Verbindung stehen, in einem sehr verschiedenen Grade mit Blute gefüllt und vom Blute ausgebeht sind. Wären die Venen Canäle, die selbst keine bewegende Kraft hätten, und in denen das Blut nur durch die Kraft des nach bringenden Blutes emporstiege, so würden alle Venen, die unter einander zusammenhängen, so angefüllt sein, wie es ihre Weite mit sich bringt und bevor nicht alle tiefer gelegenen Venen völlig angefüllt wären, könnte das Blut in den höher gelegenen nicht emporsteigen.

Dieses ist aber nicht nur nicht der Fall, sondern Kälte, Furcht, Schreck und andere Umstände bewirken auch eine ziemlich schnelle Verengerung der Venen. Ohnmachten beim Ueberlassen haben zur Folge, daß das Blut selbst aus sehr großen Venen so lange auszufließen aufhört, als die Ohnmacht dauert, und Vorstellungen der Seele bewirken zuweilen, daß es sich in den Venen des *Corpus cavernosum* des männlichen Gliedes anhäuft. Auch die Versuche an entblößten Venen lebender Thiere bestätigen die von mir ausgesprochenen Sätze. Verletzte, durchschnitene und unterbundene Venen ziehen sich oft in Kurzem sehr stark zusammen ²⁾. Die Beweise, die man aber von mechanischen, chemischen

¹⁾ Man sehe die oben S. 74 bei den Arterien genannten Schriftsteller, und von diese vorzüglich *Berschuir*, ferner *Heinr. Marx*, *Diatriba anatomico-physiologic de structura atque vita venarum, a medic. ordine Heidelbergensi praemi proposito ornata*; c. fig. aere incisio col. *Carlsruhae* 1819. 8.

²⁾ *Marx* a. a. O. p. 79.

electrischen Reizungen lebender Venen und von der Zusammenziehung in Folge der Berührung entblößter Venen mit der atmosphärischen Luft kommt, sind nicht so sicher. Ich habe Venen durch Berührung mit der Luft noch so lange nach dem Tode sich sehr zusammenziehen gesehen, daß man nicht mehr daran denken konnte, die Zusammenziehung für die Wirkung einer Lebenskraft zu halten.

Bildungsvermögen der Venen und Krankheiten derselben.

In der gerinnbaren Lymph, welche in entzündeten Theilen abgesetzt wird, bilden sich nicht nur kleine Arterien, sondern auch kleine Venen. Schröder van der Kolk ¹⁾ hat sie mit eingespritzter, gelber Flüssigkeit angefüllt und sichtbar gemacht. Daß dasselbe in der Substanz, durch welche ein gänzlich vom Körper getrennter Theil wieder anwächst, der Fall sei, folgt daraus, daß in einem solchen Theile der Kreislauf wieder hergestellt wird ²⁾.

Die Wunden größerer Venen heilen sehr leicht und sehr vollkommen, ohne daß dabei der Canal derselben verschlossen wird. Von dieser Erscheinung, durch welche sie sich so sehr von den Arterien unterscheiden, ist der Grund zum Theil ein mechanischer, denn das Blut übt in den Venen einen viel geringeren Druck gegen die Wände aus, als in den Arterien, und die Wunden klaffen wegen geringerer Steifheit der Wände nicht, und werden, weil die Venen sich nicht eben sehr zurückzuziehen streben, nicht so sehr auseinander gezogen. Richter ³⁾ untersuchte die Narben in mehreren Venen, die durch das Aderlassen verletzt worden waren, und rechnet die Venen zu den Theilen, die vorzüglich gut heilen.

J. Hunter ⁴⁾ hat zuerst die Entzündung der Venen bei Pferden und beim Menschen beschrieben. Sie entsteht zuweilen nach dem Aderlasse. Bei einem Menschen, dem an der Armvene zur Ader gelassen worden, war die Vene vom Ellenbogen bis zur Achsel entzündet. Die innere Haut war in Eiterung übergegangen, es hatten sich im Innern aus geronnener Lymph bestehende Membranen und einige Abscesse gebildet. Peter Frank ⁵⁾ berücksichtigte auch schon die Entzündung der Venen. Sasse ⁶⁾ hat gute Beobachtungen über die Entzündung der Venen, die zum Theil von Ph. Meckel herrühren, bekannt gemacht. Travers beobachtete die Entzündung der Venen, welche nach Am-

¹⁾ J. L. C. Schröder van der Kolk, Observaciones anatomico-pathologicae et practicae argumenti. Amstelodami 1826. 8. p. 43.

²⁾ Siehe Th. I. S. 253.

³⁾ F. C. Richter, Diss. inaug. chir. de vulneratarum venarum sanatione, praef. Autenrieth, Tubingae 1812. p. 8.

⁴⁾ F. Hunter, Medical commentar. by a Soc. of Edinburgh. Vol. III. 1775. p. 1. Transact. of society for the improvement of medic. and chirurg. knowledge. T. I. p. 18. III. p. 65.

⁵⁾ P. Frank, de curand. hom. morbis.

⁶⁾ Jo. Georg Sasse, Diss. vasorum sanguiferorum inflammatione. Halae 1797.

Wände der Saugadern zu den Flüssigkeiten hätte, in sie hineingezogen wie also durch eine Kraft, welche der ähnlich wäre, durch welche sich Schwämme Pöschpapier vollsaugen, oder sie nehmen an, daß die in den Saugadern befindlichen Säfte eine Anziehung gegen die aufzusaugenden Flüssigkeiten ausüben und sie hereinziehen, ein Vorgang, den Dutrochet Endosmose genannt und durch welchen Flüssigkeiten mit beträchtlicher Kraft in häutige Canäle gezogen werden können. (Siehe S. 54.) Es ist dabei denkbar, daß die Saugadern ein solches Anziehungsvermögen hätten, von den absondernden Blutgefäßen in die Canäle der Saugadern abgesetzt würden, und sich immer erneuerten.

Anfang der Lymphgefäße.

Die kleinen Lymphgefäße nahe an ihrem Anfange füllen sich nicht nur durch Einsaugung von Flüssigkeiten während des Lebens oder auch nach dem Tode, und werden dadurch sichtbar, namentlich in der Oberfläche der serösen und der schleimabsondernden Häute, sondern man kann sie zuweilen auch dadurch sichtbar machen, daß man das in Lymphgefäße eingespritzte Quecksilber mit Gewalt rückwärts in die kleineren Zweige drückt, wo es dann zuweilen den Widerstand, den Klappen leisten, überwindet. Haase¹⁾ drückte auf diese Weise das Quecksilber aus den Lymphdrüsen der Jugumalgegend in die Saugadern der Haut, es endlich durch die Hautporen heraustram. Endlich aber kann man das Quecksilber, Luft und andere Flüssigkeiten, die man in das Zellgewebe einbringt, in die Ausführungsgänge der absondernden Drüsen mit einiger Gewalt eintreibt, in die kleinsten Lymphgefäße bringen. Weniger leicht gelingt dieses, wenn man die Harnblase und den Darm damit sehr stark anfaßt. Sticht man, sagt Sömmering²⁾, ein mit Quecksilber gefülltes Rohr in die Haut oder in den Hoden, so füllen sich die von diesen Stellen kommenden Saugadern, oder wird durch die Einspritzung mit dünnem Wachs, farbigen oder gefärbtem Leime eine Arterie zerrissen, und die Materie ins Zellgewebe getrieben, so füllen sich zuweilen von dieser Stelle an die Saugadern. Sömmering füllte durch einen solchen Zufall die feinsten Saugadern am Fuße mit Quecksilber. Jedermann zeigte in der Versammlung deutscher Naturforscher in Berlin Präparate vor, wo die feinsten Saugadern dadurch angefüllt worden waren, daß er durch einen Einschnitt Luft ins Zellgewebe geblasen, und dann Saugadern, welche sich hierbei mit Luft gefüllt hatten und dadurch sichtbar worden waren, Quecksilber eingespritzt hatte. Die auf diese Weise sichtbar gemachten Saugadern sind oft so dicht, daß die Zwischenräume zwischen ihnen sehr klein sind. Es fehlt bis jetzt noch an mikrometrischen Messungen, wie klein der Durchmesser der kleinsten auf irgend eine Weise angefüllten und dadurch sichtbar gemachten Lymphgefäße sei. Aber die feinsten Lymphgefäße, welche ich gesehen, sind noch immer von einem sehr großen Durchmesser, verglichen mit dem der kleinsten blutführenden Haargefäße.

H. Monro d. 2te, Jo. Fr. Meckel d. ältere, Cruikshank, Mascagni, Sömmering und mehrere ältere und neuere Anatomen haben durch Erfahrungen gemacht, daß Flüssigkeit mit einiger Gewalt in die Ausführungsgänge

¹⁾ Haase, De vasis cutis absorbentibus, siehe Ludwigs Amceel, in seiner Untersuchung von Cruikshanks Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße S. 129.

²⁾ Sömmering, vom Baue des menschlichen Körpers, Th. IV. Gefäßlehre S.

lauf zu bringen. Zwar sind auch die Venen so eingerichtet, daß das in ihnen befindliche Blut manche Stoffe, zu denen es eine Anziehung hat, durch die feuchten Wände hindurch an sich zieht. Allein man hat noch keinen hinreichenden Grund, anzunehmen, daß auch leere Venen, in welchen kein Blut vorhanden ist, Säfte hereinzuziehen, sich damit zu füllen und dieselben fortzubewegen fähig wären, vielmehr sprechen, wie später gezeigt werden soll, gegen eine solche Annahme wichtige Versuche. Die Säfte, die in den Saugadern fortbewegt werden, befinden sich demnach noch nicht im Kreislaufe, sondern nur auf dem Wege zu den Canälen des Kreislaufs, sie sind der Regel nach nicht roth, und also nicht Blut, aber demselben doch in anderer Rücksicht ähnlich. (S. Th. I. S. 100, 101.) Die Wände der Lymphgefäße und ihre Höhlen sind eine unmittelbare Fortsetzung der Wände und der Höhlen derjenigen Venen, in welche sie die Flüssigkeiten, die sie führen, ergießen, und sie selbst also als ein Anhang des Venensystems zu betrachten. Die Saugadern unterscheiden sich aber von den Venen nicht nur dadurch, daß sie eine vom Blute verschiedene Flüssigkeit führen, sondern noch, daß sie viel zahlreichere, nirgends ganz fehlende, und namentlich auch in den kleinen Zweigen vorhandene Klappen haben, noch dünnere und noch durchsichtigere Wände besitzen, sich nicht in jedem Organe in einen oder in einige wenige Stämme vereinigen, und daß sie endlich mit den Arterien in keiner so nahen Verbindung stehen, d. h., daß die Höhlen und Wände der Arterien sich nirgends in die Höhlen und Wände der Lymphgefäße auf eine solche Weise fortsetzen, daß eine Strömung von Säften aus jenen in diese während des Lebens möglich wäre. Hiermit ist indessen nicht geläugnet, daß allerdings Flüssigkeiten während des Lebens und nach dem Tode durch unsichtbare Poren aus den Arterien langsam in die Lymphgefäße übergehen können, erstlich nämlich durch eine Aushauchung, der Durchschwizung aus den kleinen Arterienetzen, die sich an den Wänden der größeren Lymphgefäße ausbreiten, und dann durch eine Aufsaugung von Säften der kleinen Lymphgefäße, die sich unstreitig auch an den Wänden größerer Arterien befinden.

Endlich ist es aber eine die Lymphgefäße auszeichnende Einrichtung, daß sie die von ihnen eingesogenen Säfte, bevor sie dieselben in die Venen ergießen, einmal oder mehrmal durch röhrenförmige, runderliche und zugleich plattgedrückte, härtliche Drüsen, Lymph- oder Saugaderdrüsen, glandulae lymphaticae, conglobatae, hindurchführen, eine dem Lymphgefäßsysteme ausschließlich zukommende Classe von Organen, welche dazu eingerichtet zu sein scheint, daß hier die Lymphe, indem sie aus größeren in viele kleinere vielfach gewundene und verzweigte Lymphgefäße vertheilt, und aus diesen wieder in größere Lymphgefäße zusammengeleitet wird, in einem kleinen Raume in eine

recht vielfache Berührung mit den Wänden der Lymphgefäße komme, an denselben sich recht langsam vorbei bewege, und daselbst dem Einflusse des Blutes ausgesetzt werde, daß in unzähligen, viel dünneren Röhrchen, in den Haargefäßen, an den Wänden dieser Lymphgefäße langsam hinbewegt wird, und unstreitig sowohl gewisse Materien aus der Lymphe durch die Wände der Gefäße hindurch an sich ziehen, als auch andere Materien in die Lymphe absetzen kann, wodurch die Lymphe eine an vielen Stellen sichtbare Veränderung ihrer Farbe und ihrer Eigenschaften erfährt.

Wir wollen jetzt diese Eigenthümlichkeiten der Lymphgefäße im Einzelnen betrachten.

Klappen der Lymphgefäße und häufige Communication ihrer zahlreichen Stämme.

Da die Lymphgefäße nicht mit den Arterien in einer solchen Verbindung stehen, daß das vom Herzen fortgestoßene Blut in sie eindringen und sie anfüllen kann, so sind sie einer übermäßigen Ausdehnung noch weit weniger, als die Venen ausgesetzt. Ohne Nachtheil sind deswegen ihre Wände viel dünner, und daher auch zugleich durchsichtiger, als die der Venen, so daß sie, wenn sie mit der durchsichtigen Lymphe, die sie meistens führen, nicht sehr stark erfüllt sind, oder wenn sie nicht etwa eine weiße, oder anders gefärbte Flüssigkeit einschließen, nur mit einiger Anstrengung gesehen werden können. Dem Nachtheile, den die große Düntheit der Wände für die Lymphgefäße mit sich bringen könnte, durch den geringfügigsten äußeren Druck zusammengebrückt zu werden, ist dadurch vorgebeugt, 1) daß die Stämme der Lymphgefäße von mittlerer Größe, wie schon erwähnt worden, noch in weit größerer Zahl neben einander liegen, als die Stämme der Venen, und auch in einer weit vielfacheren Verbindung unter einander stehen, als diese, wodurch bewirkt wird, daß der Lymphe, wenn ihr an einer Stelle der Weg versperrt wird, immer noch an einer andern ein Ausweg offen steht; 2) daß sie viel zahlreichere, halbmondförmige Klappen haben, die, weil sie in kleinen Zwischenräumen auf einander folgen, und an den mit Flüssigkeit erfüllten Lymphgefäßen meistens je 2 neben einander liegende Anschwellungen verursachen, den Lymphgefäßen das Ansehn knottiger Schnüre geben. Diese Klappen sind im Wesentlichen so eingerichtet, wie die der Venen, kehren, wie diese, ihren freien Rand nach dem Herzen zu, und verhindern das Zurückweichen der Lymphe nach den Nesten zu. Fast immer sind sie paarweis gestellt, sehr selten findet man eine 3fache oder eine einfache halbmondförmige Klappe. Bisweilen, z. B. in den

Lymphgefäßen der Leber sahe Lauth ¹⁾ ringförmige Klappen, welche dadurch entstehen, daß 2 halbmondförmige in einen etwas niedrigeren, ringförmigen Vorsprung zusammenfließen, der indessen meistens nicht hinreicht, der mit einiger Gewalt eingetriebenen Flüssigkeit Widerstand zu leisten.

Es scheint sehr nützlich zu sein, daß die Klappen der Lymphgefäße viel zahlreicher sind, als die der Venen, und nirgends fehlen. Die in den Lymphgefäßen sich bewegte Flüssigkeit bildet nämlich in ihnen noch viel weniger als in den Venen eine continuirliche Flüssigkeitssäule, sondern die Saugadern sind stellenweise mit Flüssigkeit erfüllt und leer. Je kürzer nun aber die in ihnen enthaltenen Flüssigkeitssäulen sind, desto mehr Klappen sind erforderlich, wenn die Flüssigkeit nicht zurücksinken soll, da sie durch die nachfolgende Flüssigkeit nicht daran verhindert wird. Hiermit hängt es wohl zusammen, daß im Hauptausgaderstamme, ductus thoracicus, wo die Flüssigkeit, weil sie von allen Zeiten her in diesem engen Gänge zusammengebracht wird, unstreitig mehr eine continuirliche Säule bildet, weniger Klappen vorhanden sind.

In den Lymphgefäßen der Fische fehlten die Klappen, nach Hewson, Sheldon und Fohmann ²⁾ ganz, wenigstens leisten sie keinen bemerkbaren Widerstand, wenn man Flüssigkeiten in der entgegengesetzten Richtung in sie einspricht, als in welcher die Lymphe fließt. Bei den Schildkröten haben Cruikshank ³⁾ und Sheldon ⁴⁾ Klappen wahrgenommen, die aber auch nicht verhindern, daß Flüssigkeit, nachdem die Lymphgefäße sehr ausgedehnt worden, aus den Stämmen in die Zweige dringe.

Festigkeit und Ausdehnbarkeit der Wände.

Ungeachtet der großen Dünne, Durchsichtigkeit und äußerst beträchtlichen Ausdehnbarkeit der Wände sind die Lymphgefäße doch durch den Druck einer in sie eingetriebenen Flüssigkeit schwerer zerreißbar, als man glauben sollte. Werner und Feller ⁵⁾ behaupten, daß Blutgefäße, welche denselben Durchmesser als die von ihnen untersuchten Lymphgefäße hatten, immer von dem Drucke einer 12 Quersfinger (Zolle ⁶⁾) hohen, in ihre Höhle gehenden Quecksilbersäule zerrissen wurden, daß aber die Lymphgefäße den Druck einer viel höheren Quecksilbersäule aushielten. Sie erfüllten einmal die Lymphgefäßstämme der unteren Extremitäten, und erhielten das Glied dabei in einer senkrechten Stellung, so daß die bis zum Anfange des Hauptausgaderstammes reichende Quecksilbersäule wenigstens 4 Fuß hoch war, und doch zerrissen die sehr ausgedehnten Lymphgefäße des Unterleibes nicht. Hiermit stimmen Meckel's ⁶⁾ und Sheldon's ⁷⁾ Erfahrungen überein.

¹⁾ E. A. Lauth, Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Dissertation etc. Strasbourg 1824. p. 4.

²⁾ Fohmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heft I. Heidelberg 1827. Fol. Das Saugadersystem der Fische.

³⁾ Cruikshank o. a. O.

⁴⁾ Sheldon a. a. O. S. 28.

⁵⁾ Werner et Feller, Vaso. lacteor. atque lymphat. anatomico-physiologica descriptio, fasc. 1. c. tabb. IV. Lipsiae 1784. 4. p. 15, 16. Nota.

⁶⁾ S. F. Meckel d. ä. sagt in seiner Diss. epistolaris de vasis lymphaticis, welche enthalten ist in Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. Lipsiae 1760. 8. p. 81. membrana fortiter dilacerationi ac tensioni, magis quam venae, resistent, id quod injectio mercurii ope nos docet, quem vi aliquot librarum in maiorem ramulum adactum eum non dilacerasse, saepius expertus cum.

⁷⁾ J. Sheldon, The history of the absorbent system, part the first, containing the chylography etc. London 1784. gr. 4. S. 27.

98 Festigkeit und Ausdehnbarkeit der Wände der Lymphgefäße.

nach welchen die Haut der Lymphgefäße fester als die der Arterien und Venen von gleicher Größe ist, indem sie den Druck von einer hohen Quecksilbersäule, als Arterien und Venen von derselben Größe und so als noch 4 mal größere aushalten.

Weil nun aber die Lymphgefäße so leicht und so sehr beträchtlich ausdehnbar und zugleich sehr elastisch sind, so ist ihr Durchmesser während des Lebens und nach dem Tode sehr veränderlich. Saugadern welche, wenn sie angefüllt sind, sehr weite ansehnliche Canäle sein können, wenn sie leer sind, oft kaum gesehen werden. Von dieser großen Ausdehnbarkeit rührt es auch her, daß die Klappen des Ductus thoracicus und zuweilen auch die der anderen Lymphgefäße nicht zu reichen, die erweiterte Höhle zu verschließen, wenn Flüssigkeiten ihnen entgegen aus den Stämmen in die kleinen Zweige eingetrieben werden. Hunter gelang es einmal, die Saugadern sehr vollständig mit Luft anzufüllen, welche er in den Saugaderstamm einblies.

Zahl und Beschaffenheit der Häute der Lymphgefäße

Schon aus der Gegenwart der halbmondförmigen Klappen im Inneren der Lymphgefäße, welche durch vorspringende Falten der inneren Haut gebildet werden, kann man den Schluß ziehen, daß die Lymphgefäße wenigstens 2 Häute besitzen. Cruikshank¹⁾ wendete den Hauptsaugaderstamm, ductus thoracicus, eines Pferdes um, so daß die innere Oberfläche zur äußeren wurde, und zog ihn hierauf auf einen Glaszylinder, der dicker als der Saugaderstamm war. Weil nun die innere Haut der Lymphgefäße zerreißenbarer als die äußere ist, so riß hierbei, und hierdurch wurde die äußere Haut sichtbar. E. A. Sauter erzählt, daß es auf dem anatomischen Theater in Straßburg gelungen sei, auch mit Hilfe des Scalpells beide Häute von einander zu trennen. Fasern, die man für Muskelfasern halten könnte, nimmt man an den Lymphgefäßen nicht deutlich wahr. Es giebt zwar einige Anatomen welche wenigstens am Saugaderstamme großer Thiere kreisförmige Fasern gefunden zu haben behaupten, namentlich sagt Cruikshank, daß ihm zuweilen beim Menschen besser als beim Pferde gelungen sei, die schon Nuck beobachteten Fasern zu ziehen, und Sheldon²⁾ sagt ausdrücklich, er am Ductus thoracicus des Vierdes Cirkelfasern beobachtet habe. B. N. G. Schreger³⁾ glaubt solche Fasern bei dem Menschen und bei Kuh beobachtet zu haben.

¹⁾ Cruikshank, The anatomy of the absorbing Vessels of the human body, second ed. London 1790. 4. p. 61, übers. von Ludwig. Leipzig 1789. 4. S.

²⁾ Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Diss. Strasbourg 1824. 4. p. 2.

³⁾ Sheldon, The history of the absorbent system, part the first, containing chylography. London 1784. 4. p. 26.

⁴⁾ B. N. G. Schreger, Fragmenta anat. etc. p. 9—12. Fig. 2—6.

Indessen konnten Anatomen, wie Mascagni, J. F. Meckel d. j. und Rudolphi, keine solche Fasern finden, und namentlich Rudolphi weder beim Menschen noch beim Pferde. Die Wand der Lymphgefäße hat, wie die glücklichen Einspritzungen des Mascagni¹⁾ und Cruikshank²⁾ beweisen, ernährende Blutgefäße. Cruikshank³⁾ fand es sogar wahrscheinlich, daß an den Wänden größerer Saugadern sich kleinere verbreiteten. Nerven hat man sich, unstreitig weil sie zu klein sind, noch nicht auf der Wand der Lymphgefäße verbreiten gesehen.

Durchmesser aller Lymphgefäße zusammengenommen.

Denkt man sich die Höhle aller Lymphgefäßstämme, die die Lymphe aus einem Theile, z. B. aus dem Oberschenkel, fortführen, in eine Röhre vereinigt, so kann man die Frage aufwerfen, wie sich wohl der Durchmesser derselben zu dem der Arterien und Venenstämme dieses Theils verhalte. Eine Antwort auf diese Frage ist sehr schwierig, weil wir den Durchmesser, den die Lymphgefäßstämme bei einem Gesunden während des Lebens haben, nicht kennen, und weil diese Gefäße, wenn sie blutlich mit Flüssigkeiten angefüllt werden, wegen ihrer großen Nachgiebigkeit sich über alle Erwartung ausdehnen. Nach Sömmerrings⁴⁾ Schätzung würden die Saugadern eines Theils, wenn man sie in einen Stamm vereinigt dächte, wenigstens noch einmal so weit sein als die in einen Stamm vereinigten Arterien desselben, und nach J. F. Meckels⁵⁾ Vorstellung würde das Saugadersystem ungefähr dieselbe Weite als das Venensystem haben, und jeder größere Arterien- oder Venenstamm wird noch ihm im Allgemeinen von wenigstens 10 Lymphgefäßstämmen begleitet. Sehr auffallend ist es aber, daß so zahlreiche Saugaderstämme nur in 2 Hauptstämmen von einem so geringen Durchmesser zusammenkommen, von welchem der größere nur etwa die Größe eines Rabenschnabels oder eines Gänsefedertiels hat.

Mechanismus und Kräfte, wodurch die Einsaugung geschieht.

Sehr merkwürdig ist die Eigenschaft der Saugadern, Flüssigkeiten sich einzuziehen, sich damit zu füllen und sie mit nicht unbeträchtlichem Gewalt weiter fortzutreiben. Wenn man z. B. den Ductus tho-

¹⁾ Mascagni, Geschichte der einsaug. Gefäße, übers. von Ludwig. S. 37.

²⁾ Cruikshank, Geschichte der einsaugenden Gefäße, übers. von Ludwig. S. 57.

³⁾ Cruikshank, ebendasselbst.

⁴⁾ Sömmerring, vom Baue des menschl. Körpers. Th. IV. S. 528.

⁵⁾ J. F. Meckel d. j., Handbuch der menschl. Anatomie. Halle 1815. Th. I. S. 216.

racicus bei lebenden, zuvor gefütterten Thieren unterbindet, so soll zuweilen Gewalt der andringenden Lymphe diesen Gang zer Sprengt haben ¹⁾, oder man ihn, wie Tiedemann und Gmelin ²⁾ thaten, bei Säugethieren, die Stunden zuvor gefüttert und dann durch einen Schlag auf den Kopf betäubt worden waren, unterbindet, so füllt er sich strotzend mit Speisefast an, und tritt denselben, wenn man in ihn hineinsieht, mit einem mehrere Zoll hohen Sprun gleich dem aus einer Vene hervorgetriebenen Blute, in einem Bogen hervor. Verbündet man ihn hierauf von neuem, so füllt er sich zwar einige Zeit da wieder an, aber seine Flüssigkeit fließt, wenn er nur angestochen wird, aus, in einem Bogen hervorzuspringen. Das lebendige Bewegungsvermögen Saugadern kommt indessen nicht mit dem der Muskeln überein, die eine mechanische, chemische und electriche Reizung derselben veranlassen keine schnelle sichtbare Zusammenziehung derselben.

Wenn man die Saugadern zerschneidet, oder sie mit der Luft, mit warmem Wasser, mit verdünntem Weingeiste in Berührung bringt, so verengern sie sich zwar nicht selten beträchtlich ³⁾, aber dieses geschieht so allmählig, daß man den verengerten Zustand, nicht aber die Bewegung, durch die die Verenger zu Stande kommt, beobachten kann. Nur Schwefelsäure und vielleicht die Speisefastbutter und ähnliche Mittel, welche eine chemische Veränderung in der Substanz der Wände hervorbringen, indem sie z. B. die in derselben befindliche Feuchtigkeit an sich ziehen, veranlassen auch eine schnellere sichtbare Bewegung ein Zusammenschrumpfen. Indessen ist kein Grund vorhanden, warum man eine langsame Verengung, wenn es erwiesen ist, daß sie nicht von einer todtlichen Kraft der Materie abhängt, nicht auch als die Wirkung der Reizbarkeit ansehen sollte.

Da nun überdies die Einsaugungsthätigkeit während des Lebens nach Verschiedenheit der Umstände hier und da bald gemindert, bald verstärkt wird, ohne daß man davon einen physikalischen Grund angeben kann, so sind Cruikshank, Sömmerring, Rudolphi, J. Meckel d. j., Tiedemann und die meisten Anatomen der Meinung, daß die während des Lebens, und die bald nach dem Tode, so lange ein Mensch noch warm ist, geschehende Einsaugung unter dem Einfluß einer Lebensthätigkeit erfolge.

Nach dem Tode, aber auch später, nachdem schon der Körper erkaltet ist, bringen noch Flüssigkeiten in die Saugadern ein, und erfüllen sie. Mascagni ⁴⁾ benutzte diese Eigenschaft derselben, um die allerfeinsten Saugadern mit gefärbten Flüssigkeiten anzufüllen, in die man

¹⁾ Haller, Elementa Physiol. Lib. XXV. Sect. 2. §. 2. und §. 6., der Monro, de hydropse p. 18 anführt. N. Oudemann, de venarum praecipue malaricarum fabrica et actione, 1794. 8. p. 190, führt auch in dieser Hinsicht Hewson an.

²⁾ F. Tiedemann und L. Gmelin, Versuche über die Wege, aus welchen Substanzen aus dem Magen und Darmkanale in's Blut gelangen, über die Verrihtung der Milz und die geheimen Harnwege. Heidelberg 1820. 8. S. 10.

³⁾ Sömmerring, in seiner Gefäßlehre, S. 535, und B. N. G. Schreger, Tract de irritabilitate vasorum lymphaticorum, Lips. 1789, exp. 1 — 17. Lip. 1789. recuss. in P. Frank, Delectus opusculorum medicorum. Tom. X.

⁴⁾ Mascagni, Vasorum lymphaticorum historia et ichnographia. Senis 1787. p. 22 und 14.

den Stämmen aus, weil es die Klappen verhindern, keine Flüssigkeiten einziehen kann. Er mengte lauwarmem Wasser Dinte bei, und spritzte diese Flüssigkeit in die Brusthöhle, in die Bauchhöhle, in die Luftröhre u. s. w.; die Lymphgefäße saugten sie auf, und dadurch wurden äußerst dicke Nese derselben an der Pleura, an dem Peritonäo und an der inneren Oberfläche der Luftröhren sichtbar, von welchen manche aus so dünnen Röhrchen bestanden, daß Mascagni das Mikroskop zu Hülfe nehmen mußte, um sie deutlich zu sehen. Bei einem Kinde gelang dieser Versuch Schregeru sogar, als er nach 40 Stunden nach dem Tode angestellt wurde. Von der 26sten bis zur 48sten Stunde gelang er bei Kindern und jungen Menschen dem Mascagni gewöhnlich, bei Erwachsenen aber wollte er nicht leicht später als 6 bis 8 Stunden nach dem Tode gelingen. Dem Cruikshank glückten diese Versuche gar nicht, aber Sömmerring bemerkte ganz deutlich, daß sich die Saugadern eines schon ein Paar Tage toden Seehundes sehr leicht mit der in den Därmen enthaltenen verdünnten schwärzlichen Masse füllten. Cruikshank ¹⁾ und Sömmerring ²⁾ halten diese Auffaugung für die Wirkung einer todtten Haarröhrchenkraft, von der Cruikshank glaubte, daß sie während des Lebens auf irgend eine Weise verhindert sei, ihre Wirksamkeit zu äußern. J. F. Meckel d. j. dagegen scheint auch sie für die Wirkung einer noch längere Zeit nach dem Tode zurückbleibenden Reizbarkeit anzusehen, vielleicht aus dem Grunde, weil diese Einsaugung nach Mascagni's Erfahrungen, wenn eine gewisse Anzahl Stunden nach dem Tode verflossen sind, und bevor noch die Fäulniß angetreten ist, aufhört, eine Erfahrung, die sich indessen auch mit Sömmerrings und Cruikshanks Ansicht verträgt.

In einzelnen Fällen läßt es sich also oft schwer bestimmen, ob die Einsaugung durch eine lebendige Thätigkeit, oder durch physikalische Kräfte bewirkt worden sei.

Diejenigen Physiologen, welche die einsaugende Thätigkeit der Saugadern durch eine Lebensfähigkeit derselben erklären, können sich entweder, wie Hunter, vorstellen, daß die Saugadern so eingerichtet wären, daß sie vermöge einer abwechselnden Erweiterung und Verengerung ihrer Höhle einsaugten, also auf eine solche Weise, wie das Einsaugen bei den Blutiaeln und bei manchen saugenden Insekten geschieht, oder sie können sich denken, daß die einzusaugende Flüssigkeit durch Strömungen einer elektrischen Materie, welche durch eine lebendige Thätigkeit, z. B. der Nerven, erregt würden, in die Saugadern hereingezogen würden, oder endlich, daß die Flüssigkeiten zwar durch eine Haarröhrchenkraft in die Saugadern hereingezogen würden, daß aber dennoch ihre Auffaugung und Fortbewegung von der lebendigen Thätigkeit der Saugadern abhängig wären, weil die Poren, die die Flüssigkeiten in die Saugadern hereinfließen, sich durch eine lebendige Kraft zu verengern und zu öffnen im Stande wären, und weil die Fortbewegung der aufgenommenen Flüssigkeiten durch die Reizbarkeit der Saugadern bewirkt würde.

Da man bis jetzt noch niemals auffaugende Enden der Saugadern gesehen und mikroskopisch untersucht hat, so kann man keine von diesen und von noch andern möglichen Vermuthungen der Art bestätigen oder widerlegen.

Diejenigen Physiologen, welche die einsaugende Thätigkeit der Saugadern durch physikalische Kräfte zu erklären versuchen, behaupten entweder, daß die einzusaugenden Flüssigkeiten durch die Anziehung, welche die Materie der

¹⁾ Cruikshanks Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße, a. d. G. von Ludwig. Leipzig 1789. 4. S. 38.

²⁾ Sömmerring, von Baue des menschl. Körpers, Th. IV. S. 625.

102 Geschichte d. Einsaugung durch Capillarität oder Endosmose?

Wände der Saugadern zu den Flüssigkeiten hätte, in sie hineingezogen würde also durch eine Kraft, welche der ähnlich wäre, durch welche sich Schwämme um Leinwandpapier vollsaugen, oder sie nehmen an, daß die in den Saugadern befindlichen Säfte eine Anziehung gegen die aufzusaugenden Flüssigkeiten äußerten und sie hereinzögen, ein Vorgang, den Dutrochet Endosmose genannt hat und durch welchen Flüssigkeiten mit beträchtlicher Kraft in häutige Canäle hereingezogen werden können. (Siehe S. 54.) Es ist dabei denkbar, daß die Säfte die ein solches Anziehungsvermögen hätten, von den absondernden Blutgefäßen in die Canäle der Saugadern abgesetzt würden, und sich immer erneuerten.

Anfang der Lymphgefäße.

Die kleinen Lymphgefäße nahe an ihrem Anfange füllen sich nicht nur durch Einsaugung von Flüssigkeiten während des Lebens oder auch nach dem Tode, und werden dadurch sichtbar, namentlich in der Oberflache der serösen und der schleimabsondernden Häute, sondern man kann sie zuweilen auch dadurch sichtbar machen, daß man das in die Lymphgefäße eingespritzte Quecksilber mit Gewalt rückwärts in die noch kleineren Zweige drückt, wo es dann zuweilen den Widerstand, den die Klappen leisten, überwindet. Haase ¹⁾ drückte auf diese Weise das Quecksilber aus den Lymphdrüsen der Juginalgegend in die Saugadern der Haut, wo es endlich durch die Hautporen herauskam. Endlich aber kann man Quecksilber, Luft und andere Flüssigkeiten, die man in das Zellgewebe oder in die Ausführungsgänge der absondernden Drüsen mit einiger Gewalt eintreibt, in die kleinsten Lymphgefäße bringen. Weniger leicht gelingt dieses, wenn man die Harnblase und den Darm damit sehr stark anfüllt. Sticht man, sagt Sömmerring ²⁾, ein mit Quecksilber gefülltes Rohr unter die Haut oder in den Hoden, so füllen sich die von diesen Stellen kommenden Saugadern, oder wird durch die Einspritzung mit dünnem Wachs, farbigem Oel oder gefärbtem Leime eine Arterie zerrissen, und die Materie ins Zellgewebe getrieben, so füllen sich zuweilen von dieser Stelle an die Saugadern. Sömmerring füllte durch einen solchen Zufall die feinsten Saugadern am Fuße mit Quecksilber. Jedermann zeigte in der Versammlung deutscher Naturforscher in Berlin Präparate vor, wo die feinsten Saugadern dadurch angefüllt worden waren, daß er durch einen Einschnitt Luft ins Zellgewebe geblasen, und dann in Saugadern, welche sich hierbei mit Luft gefüllt hatten und dadurch sichtbar geworden waren, Quecksilber eingespritzt hatte. Die auf diese Weise sichtbar gemachten Saugadern sind oft so dicht, daß die Zwischenräume zwischen ihnen sehr klein sind. Es fehlt bis jetzt noch an mikrometrischen Messungen, wie klein der Durchmesser der kleinsten auf irgend eine Weise angefüllten und dadurch sichtbar gemachten Lymphgefäße sei. Aber die feinsten Lymphgefäße, welche ich gesehen, sind noch immer von einem sehr großen Durchmesser, verglichen mit dem der kleinsten blutführenden Haargefäße.

A. Monro d. 2te, Jo. Fr. Meckel d. ältere, Cruikshank, Mascagni, Sömmerring und mehrere ältere und neuere Anatomen haben viel Erfahrungen gemacht, daß Flüssigkeit mit einiger Gewalt in die Ausführungsgänge

¹⁾ Haase, De vasis cutis absorbentibus, siehe Ludwigs Numert. in seiner Uebersetzung von Cruikshanks Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gefäße S. 129.

²⁾ Sömmerring, vom Baue des menschlichen Körpers, Th. IV. Gefäßlehre S. 497.

gänge der absondernden Drüsen gespritzt, in die Lymphgefäße übergehen. Vorzüglich häufig hat man das bei Eintreibung von Luft, Quecksilber und andern Flüssigkeiten in die Samenleiter der Hoden, in den Gallengang der Leber und in die Luftröhre der Lungen gesehen. Auch von Einspritzungen in die Ausführungsgänge der Milchdrüsen, in die Harnleiter der Nieren ist zuweilen dieselbe Wirkung beobachtet worden. Ob aber, wie Manche behauptet haben, in allen diesen Fällen eine Zerreißung vor sich gegangen, oder ob die Flüssigkeit durch natürliche Oeffnungen in die Saugadern getreten sei, läßt sich nicht entscheiden. So viel ist gewiß, daß in manchen Fällen, wo die Flüssigkeiten in die Saugadern übergingen, keine in's Zellgewebe ergossene Flüssigkeit gesehen wurde. Hieraus folgt indessen noch nicht, daß die Flüssigkeit auf natürlichen Wegen in die Saugadern übergegangen sei, sondern nur, daß die kleinen, leicht zerreißbaren Saugadern eine solche Lage an den Wänden der Ausführungsgänge haben, daß ihre dünne Haut mit der, welche die innere Oberfläche jener Canäle begränzt, da wo sie dieselbe berührt, verschmolzen ist, so daß die Haut der Ausführungsgänge an den Stellen, wo sie an die Saugadern stößt, zuweilen leichter zerreißt, als da, wo sie an die Zellen des Zellgewebes gränzt.

Mehrere Beobachter, Lieberkühn, Hunter, Hewson, Cruikshank, Hedwig, Bleunland, glaubten an den Botten der dünnen Gedärme eine oder mehrere große, mit unbewaffnetem Auge sichtbare Oeffnungen gesehen zu haben, die sie für die einsaugenden Mündungen der Lymphgefäße hielten. Haase hielt die Hautporen, durch welche, wie vorhin erzählt worden ist, das von ihm in den Lymphgefäßen rückwärts gedrückte Quecksilber zum Vorschein kam, für die Oeffnungen der Lymphgefäße auf der Haut. Indessen läßt sich auf keine Weise darthun, daß diese Behauptungen wahr wären. Jene größeren Oeffnungen, die man an den Botten zu sehen meinte, sind von vielen andern Beobachtern, namentlich von Rudolphi, U. Meckel, nicht bestätigt worden, und wenn sie auch vorhanden wären, so würde daraus immer noch nicht folgen, daß sie einsaugende Mündungen der Lymphgefäße wären; denn von den auf der Haut bemerklichen Oeffnungen ist es gewiß, daß sie nicht den Lymphgefäßen, sondern den Ausführungsgängen der Hautdrüsen angehören, und auf ähnliche Weise könnten die Oeffnungen an den Botten keinen Schleimdrüsen angehören. Bei den Fischen, bei welchen man Flüssigkeiten mit Leichtigkeit aus den Stämmen in die kleinen Zweige und bis dicht an die Oberfläche der Gedärme treiben kann, weil hier keine Klappen, die es hindern, vorhanden sind, ist doch nach Hewsons und Fohmanns ¹⁾ Erfahrungen der freie Austritt derselben auf die Oberfläche der Gedärme oder auf andere Oberflächen des Körpers gehindert. Der mäßige Druck, durch welchen das Quecksilber eingespritzt wird, reicht hierzu nicht hin. Man muß das Quecksilber mit einiger Gewalt rückwärts streichen, damit es in die Höhle der Gedärme überahe. Dieses kann entweder, wie Hewson vermuthet, daher rühren, daß, obgleich nicht in dem Canale der Saugadern, doch in den Mündungen derselben Klappen vorhanden sind, die einen Ausfluß der in den Lymphgefäßen befindlichen Flüssigkeit in die Gedärme hindern, oder wie Fohmann vermuthet, daß die Lymphgefäße keine offene Enden, sondern nur Oeffnungen, die durch ihre Wände schieß durchgehen, besitzen. Unter diesen Umständen würde die eingespritzte Flüssigkeit eben so wenig aus den Lymphgefäßen austreten, als Flüssigkeiten, die in den Zwölffingerdarm gespritzt werden, von da aus in den Ausführungsgang der Leber und des Pankreas übergehen. Die Versuche von Leuret und Laissagne ²⁾, daß der Chylus eines Säugethiers, wo-

¹⁾ F. Fohmann, Das Saugadernsystem der Wirbelthiere, Heft 1. Das Saugadernsystem der Fische. Heidelberg 1827.

²⁾ Leuret und Laissagne, Recherches physiologiques et cliniques, pour servir à l'histoire de la digestion. Paris 1825. S. p. 66, 69, 70.

104 Saugen die Lymphgefäße durch die Poren ihrer Wände ein?

mit die Lymphgefäße sehr vollkommen angefüllt gewesen, in die Gedärme an vielen Stellen hervorgebrungen sei, als sie in den Ductus thoracicus lauwarmes Wasser eingespritzt hätten, bedarf noch sehr der Bestätigung.

Daß Luft oder Quecksilber, wenn sie in das Zellgewebe eingetrieben werden, und die Zellen desselben ausdehnen, so leicht in die Lymphgefäße übergehen, beweist, wie mir scheint, auch nicht, daß die Lymphgefäße daselbst mit offenen Enden anfangen. Denn bekanntlich gehen Flüssigkeiten, die in eine weite, membranöse Höhle gespritzt werden, sehr schwer in häutige Canäle über, die sich in derselben mit engen Oeffnungen münden. So kann man z. B. durch Einblasen von Luft in die Gedärme nicht einmal die Schleimdrüsen des Darmkanals aufblasen, deren Ausführungsgänge doch viel weitere Oeffnungen haben, als die Saugadern haben können. Dagegen läßt es sich wohl denken, daß bei der gewaltsamen Ausdehnung des Zellgewebes, Lymphgefäße, welche zwischen den Zellen verlaufen, zerrissen, und daß ihre Wände ausgepreßt, und die Ränder der durch Zerreißung entstandenen Oeffnung wegen ihrer Anheftung an benachbarte Zellen aneinander gehalten werden, so daß die Luft und das Quecksilber sehr leicht in sie übergehen kann.

Es bleibt also noch immer unentschieden, ob die Lymphgefäße als offene Röhren anfangen, oder nur durch sehr kleine Oeffnungen, die sich in ihren Wänden befinden, einsaugen. Noch viel weniger darf man daraus, daß in viel selteneren Fällen Luft, Wasser, Wachs und Quecksilber, welche in die Arterien oder in die Venen gespritzt wurden, in die Saugadern übergangen ¹⁾, folgern, daß ein solcher Zusammenhang zwischen den Gefäßen des Kreislaufs und den Saugadern Statt finde, daß während des Lebens eine Strömung von Blut oder von Blutwasser aus den feinsten Verzweigungen der Blutgefäße in die Saugadern geschehe. Gegen eine solche Annahme sprechen sehr viel Gründe.

¹⁾ *Monro* hat die hierüber gemachten Erfahrungen gesammelt. Siehe *Opuscula de Vasis lymphaticis*. Lipsiae 1760. 8. p. 32. sq. *Ruck* (*Adenographia*, p. 52) blies nämlich Luft in die *Arteria splenica* ein. Es erhoben sich auf der Oberfläche der *Milz* Bläschen, und aus ihnen gingen mit Luft erfüllte Lymphgefäße hervor. Wenn er aber Quecksilber in die *Milzarterie* einspritzte, so ging dieses nicht in die Lymphgefäße über, obwohl es in manchen andern Theilen sehr leicht den Weg aus den Arterien in die Lymphgefäße findet, wo der Versuch mit der Luft oft nicht gelingt. *Berger*, *Cowper*, *Lister* und *Bartholin* der Sohn sahen auch andere Flüssigkeiten aus der *Milzarterie* in die Lymphgefäße übergehen. *Morgagni* (*Adversaria anatomica* II. *Animad* 47.) trieb mit mäßiger Kraft Luft in die *Vena lienalis*, und sah, daß sich die Lymphgefäße an der Oberfläche derselben damit füllten. *Cowper* hat dasselbe beobachtet. Indessen hat *Monro* gezeigt, daß, wenn Quecksilber oder Luft auch sehr langsam in die *Milzvene* eingebracht wird, diese Flüssigkeiten doch die Zellen der *Milz* sogleich anfüllen. *Cowper*ern, dem es nicht gelingen wollte, Quecksilber aus der *Arteria spermatica* in die *Vena spermatica* hindüberzutreiben, gelang es ohne Schwierigkeit, es aus der *Vena spermatica* in die Lymphgefäße übergehen zu machen. Etwas ähnliches beobachtete *Ruck*. *Cowper* und *Ruck* sahen auch den Uebergang von Flüssigkeiten aus der *Nierenvene* in die Lymphgefäße. *Inson* und *Cowper* wollen sogar Quecksilber oder Wachs aus der *Arteria mesenteria* in die Lymphgefäße übergetrieben haben. *Monro*, *Mascagni* und andere neuere Anatomen dagegen behaupten, daß diesem Uebergange immer eine Zerreißung und eine Erfüllung des Zellgewebes vorhergehe.

die von B. Hunter ¹⁾, A. Monro ²⁾, Hewson ³⁾, J. F. Meckel d. ä. ⁴⁾ und Mascagni ⁵⁾ entwickelt worden sind.

Wenn es einen solchen Zusammenhang der Blut- und Lymphgefäße gäbe, vermöge dessen die letzteren mit zu den Wegen gehörten, in welchen der Kreislauf geschieht, so würden die Lymphgefäße bei lebenden Thieren in der Regel voll von den circulirenden Säften, und bei todtten nicht davon so unerfüllt gefunden werden, sie würden sich wie andere Gefäße, die während des Lebens von dem Strome einer circulirenden Flüssigkeit ausgebehnt werden, verhalten. Dieses ist aber nicht nur nicht der Fall, sondern sie enthalten sogar an vielen Stellen Säfte, die nicht in den Blutgefäßen circuliren, und zwar oft in einem so concentrirten Zustande, daß sie nicht durch eine circulirende Flüssigkeit verbannt worden zu sein scheinen. So enthalten z. B. die Lymphgefäße der Därme und des Gefröses von Thieren, während sie in der Verdauung begriffen sind, Chylus, die, welche von der Leber herkommen, zuweilen eine etwas durch Galle gefärbte, die welche von den schwärzlichen Stellen der Lungen anfangen, zu eine schwärzliche Flüssigkeit, die, welche von einer Stelle herkommen, an welcher Blut ins Zellgewebe ergossen war, eine blutig gefärbte Lymphe; und also eine Flüssigkeit, welche sie aus dem Zellgewebe und von den Oberflächen der Höhlen einzusaugen Gelegenheit haben, die aber nicht in den Arterien und Venen circulirt. Daß Flüssigkeiten, die von den Arterien oder Venen aus in die Haargefäße gespritzt worden, zuweilen in die Lymphgefäße übergehen, kann man, wie oben gesagt worden, in manchen Fällen dadurch erklären, daß die Flüssigkeit in Folge einer Zerreißung zuvor ins Zellgewebe getreten sei, und von da aus den Weg in die Lymphgefäße gefunden habe, wo dieses nicht sichtbar war, vertiefen vielleicht die Blutgefäße und die Lymphgefäße so neben einander, daß ihre zarten Wände da, wo sie einander berührten, zu einer einzigen dünnen Haut verschmolzen, und also einer Zerreißung sehr ausgesetzt waren, vermöge welcher sich die Flüssigkeit, ohne in das Zellgewebe auszutreten, aus der einen Classe von Gefäßen in die andere ergießen konnte. Wenn endlich Flüssigkeiten, die in die Arterien oder Venen gespritzt werden, ungefärbt in die Saugadern übergehen, und zugleich in die größern Höhlen des Körpers, so wie auch in die Zellen des Zellgewebes austreten, so können sie auch durch die Wege, durch welche während des Lebens die Auscheidung geschieht, oder durch eine Art von Durchschwüzung aus den Blutgefäßen, die sich an den Wänden der Lymphgefäße verbreiten, in die Lymphgefäße übergegangen sein. Die Milz und die Saugaderdrüsen sind Blutgefäßreiche Organe, in welchen ein Uebergang von eingespritzten Flüssigkeiten aus der einen Classe dieser Röhren in die andere vorzüglich leicht Statt findet, und zwar in der Milz aus den Blutgefäßen in die Lymphgefäße ⁶⁾, in den Saugaderdrüsen aus den Lymphgefäßen in die Blutgefäße (namentlich in die Venen). Sie wenig man aber Grund habe, daraus, weil in diesen Organen eingespritzte

¹⁾ William Hunter, Medical commentaries. London 1762. S. 5.

²⁾ Alex. Monro, de venis lymphaticis valvulosis et earum potissimum origine. Berolini 1760. 8. Lipsiae 1780.

³⁾ W. Hewson, Experimental inquiries into the properties of the blood, P. II. London 1774.

⁴⁾ Jo. Fried. Meckel, Nova experimenta de finibus venarum et vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria. Berol. 1772. 8.

⁵⁾ Mascagni a. a. O. Sect. III.

⁶⁾ Lobstein, Diss. de liene. Arg. 1774. Nach ihm entspringen die Saugadern der Milz aus den Arterien und Venen derselben.

Flüssigkeiten sehr leicht aus der einen Classe von Röhren in die andere abgehen, zu schließen, daß dieses auf eine so uneingeschränkte Weise auch während des Lebens der Fall sei, sieht man aus dem, was man an den Lungen beobachtet. Man sehe in dieser Hinsicht das nach, was hierüber an der Stelle, wo über die Struktur der Saugaderdrüsen gehandelt wird, gesagt werden wird.

Daß aber die Saugadern an der Oberfläche gewisser Häute und im Zellgewebe Flüssigkeiten einziehen und sich damit füllen können, sieht man nicht nur aus der Anfüllung der Lymphgefäße der Gedärme in dem Speisefaste, sondern auch aus der Aufnahme gewisser Gifte in den Körper an den Stellen, wo sie mit Oberflächen, die mit Lymphgefäßen versehen sind, in Berührung kommen. Denn daß das venerische Gift, wenn es mit den äußeren Geschlechtstheilen in Berührung kommt, durch die Lymphgefäße aufgenommen werde, sieht man aus dem Umstand, daß die Inguinaldrüsen davon anschwellen, zu welchen die aus dieser Theilen kommenden Lymphgefäße gehen. Bei Ammen, welche durch venerische Kinder, welche sie säugen, angesteckt werden, schwellen auch die Achseldrüsen an ¹⁾. Bei Geschwüren von mancherlei Art schwellen auch die nächsten Lymphdrüsen an, in welche die vom Geschwür ausgehenden Lymphgefäße gehen.

Fortgang der Saugadern.

Die Saugadern haben, wie schon gesagt worden, überall eine häufige Vereinigung und Verbindung der benachbarten Röhren die Form der Netze. Vorzüglich dicht scheinen diese Netze in der Nähe der Botten der Gedärme zu sein. Unter den Botten liegen kleine, runde, weiche Körper, welche Lieberkühn zu den Drüsen rechnete, von welchen Hedwig behauptete, daß sie das aufnahmen, was die Saugadern in den Därmen aufgesogen hätten, und welche nach Hewson und Rudolphi bei der Schilddrüse, bei der man das Quecksilber aus den Stämmen der Lymphgefäße in die Zweige spritzen kann, ohne alle Gewalt anzuwenden, mit Quecksilber gefüllt werden und sich mit Lymphgefäßnetzen bedecken zeigen. Während ihres Verlaufs nach dem Ductus thoracicus nimmt jeder Saugaderstamm im Allgemeinen am Durchmesser und an der Dicke seiner Wand etwas zu. Am Fuße und Unterschenkel z. B. sind die Saugaderstämme enger und mit dünneren Wänden versehen, und am Obersehenkel, in den Weichen und im Becken nehmen sie immer noch zu, bis sie endlich in der Lendengegend, da, wo sie in den Hauptsaugaderstamm übergehen, die größten sind. Indessen da sie zuweilen an manchen Stellen sehr aufgedehnt oder zusammengezogen sind, so finden sich an vielen Stellen Abweichungen von dieser Regel. Die Saugaderstämme sind in manchen Thieren vorzüglich groß. Die Saugadern der Hoden z. B. sind, nach Sömmerring

¹⁾ Monro a. a. O. S. 61.

²⁾ Rudolphi, Grundriß der Physiologie, B. II. Abth. 2. S. 214.

ring, im Saamenstrange, ehe sie noch einen langen Weg gemacht haben, und bevor sie in den Unterleib getreten sind, weiter und stärker, als irgend ein Saugaderstamm der unteren Gliedmaßen, und die der unteren Gliedmaßen sind wieder wider und stärker als die Saugaderstämme der oberen. Die Saugadern des Kopfes aber sind am feinsten. In großen Leuten oder Riesen sind sie größer, als in Zwergen. In jungen Leuten endlich sind sie voller, als in alten.

In manchen Theilen nehmen sie, wie Sömmerring bezeugt, zu gewissen Zeiten sehr am Umfange zu, z. B. im Uterus während der Schwangerschaft, und in den Brüsten während des Säugens, in welchen letzteren Organen sie hin und wieder mehr als eine Linie im Durchmesser betragen.

Auch hat, wie Sömmerring bemerkt, ihre Verfertigung und Zusammenmündung an verschiedenen Stellen eine eigenthümliche Form, so daß man oft schon an dieser Form erkennen kann, welchem Theile sie angehören, so sind z. B. die Saugadern der Oberfläche der Leber neßförmig, die des Hoden bündelförmig, die des Herzens baumförmig, und zwischen denen der Zungen befinden sich ungefähr rhomboidale Zwischenräume, Theile, in welchen die Saugadern in der größten Menge vorhanden, in welchen sie noch nicht mit Gewißheit beobachtet worden sind.

Wenn man die Substanz des Gehirns, das Rückenmark, die Augen, das Innere der Knochen und Knorpel, den dem Kinde im Mutterleibe angehörenden Mutterkuchen, die Eihäute und den Nabelstrang wegchnet, so kann man behaupten, daß man an allen übrigen Theilen des Körpers Saugadern deutlich sichtbar gemacht habe. Am zahlreichsten sind sie an den Oberflächen absondernder Häute in den Drüsen und im Zellgewebe. Ihre Stämme verlaufen in der größten Zahl im lockeren Zellgewebe, theils nämlich in dem Zellgewebe, durch das die Haut so verschiebbar ist in der Nähe der Hautvenen, theils in den Lücken zwischen den größeren Theilen des Körpers, zwischen Muskeln, Knochen und andern Organen, in welchen auch große Blutgefäßstämme in lockerem Zellgewebe aufgehängt sind. Sars behauptet Mascagni¹⁾, Saugadern auch im Auge gefunden und sie bis zu den Drüsen verfolgt zu haben. Cruikshank²⁾ füllte Saugadern mit Quecksilber, die aus der Substanz eines Rückenwirbels hervorkamen, und in ihm in mehrere Zweige getheilt waren; Brugmanns soll in den hohlen Knochen der Vögel, und Schreger³⁾, Uttini⁴⁾, Mascagni und Fohmann⁵⁾ glaubten in der Nachgeburt Lymphgefäße entdeckt zu haben. Indessen ist man bei der Erkennung und Verfolgung der Lymphgefäße, wenn man sie nicht künstlich anzufüllen und sie bis zu den Lymphgefäßen zu verfolgen im Stande ist, so leicht einer Täuschung und einer Verwechslung der Lymphgefäße mit Venen ausgeföhrt, daß auf die genannten Beobachtungen nicht viel gerechnet werden kann. Gesäße übr-

¹⁾ Mascagni, Vasorum lymph. hist. et ichnographia, p. 8. Uebers. von Ludwig, S. 11.

²⁾ Cruikshank, Geschichte der Saugadern, übers. v. Ludwig, S. 172.

³⁾ B. N. G. Schreger, de functione placentae uterinae. Erlang. 1799. 8.

⁴⁾ Uttini, siehe Meckels Archiv, B. II, S. 258 und Memorie dell' istituto nazionale Italiano, Tom. I. P. 2. Bologna 1806. p. 209.

⁵⁾ Vincenz Fohmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere, Heft 1. Das Saugadersystem der Fische. Fol. Heidelberg u. Leipzig 1827. p. 11. Anmerkung.

gens die Aufnahme neuer Substanzen in die Blutgefäße des Kindes im Mutterleibe nur durch Saugadern, so müßten im Nabelstrange so große Saugadern verlaufen, daß man über ihre Existenz nicht zweifelhaft bleiben könnte.

Saugaderdrüsen.

Theile des Körpers, an welchen die Lymphdrüsen liegen. Ihre Zahl und Größe.

Nur in sehr seltenen Fällen ¹⁾ haben zuverlässige Anatomen ²⁾ die Saugader von einer Gegend, wo keine Saugaderdrüsen liegen, bis zum Ductus thoracicus verfolgt, ohne daß sie durch eine Saugaderdrüse hindurch ging. In der Regel führt jede ihren Saft in eine Drüse, oder sogar, nachdem er schon durch eine hindurch gegangen ist, in eine zweite und in eine dritte. Diese Saugaderdrüsen sind im Rücken, an Händen und Füßen, in der Schädel und Rückgrathgegend so wie auch in der Substanz der Organe noch nicht gefunden worden. An den Unterschenkeln und an den Vorderarmen kommen wenige und nur sehr kleine Saugaderdrüsen vor. Außerst klein sind diejenigen, welche sich an dem Neugeborenen befinden. Die größten finden sich am Anfange (der Wurzel) des Gefäßes und an der Lungenwurzel, in der Leistengegend, in der Achselhöhle und am Halse. Ihre Zahl ist bei verschiedenen Menschen an der nämlichen Stelle nicht dieselbe. Ist sie geringer, so sind die Drüsen dafür größer.

Der Durchmesser derselben beträgt bei den kleinsten etwa 1 Linie und ist etwa also dem einer Linse gleich, bei den größten beträgt er über 3 Linien. Sie sehen an den Gliedmaßen röthlich, im Gefäß während der Verdauung, wo sie mit weißem Speisensaft angefüllt sind, weißlich, in der Nähe der Galle absondernden Leber etwas gelblich, in der Nähe der Milz, wie sie, braunröthlich, und in der Nähe der Lungenröhren erwachsener Menschen wie die schwärzlichen Flecke der Lunge schwärzlich aus.

Hüllen der Lymphdrüsen und ihr innerer Bau.

Sie besitzen einen ziemlich glatten, aus Zellgewebe bestehenden Überzug, der aber mit dem in den Drüsen befindlichen Zellgewebe das Innigste zusammenhängt, und sich daher nicht von der Oberfl.

¹⁾ Hewson, Opus posthumum anglice ed. M. Falconar, latine vertit var Wynpersse. L. B. 1785. 8. p. 44.

²⁾ Cruikshank, The anatomy of the absorbing vessels of the human body, second ed. London 1790. 4. p. 79. in Ludwig's Uebers. S. 72.

der Drüsen leicht und rein ablösen läßt. An benachbarten Theilen sind sie durch lockeres, dehnbare Zellgewebe angeheftet, und daher im gesunden Zustande in einigem Grade verschiebbar. Fleischfasern nimmt man an ihrer Haut nicht wahr, wiewohl Malpighi dergleichen gesehen zu haben meinte.

Drüsen, deren Lymphgefäße nicht erfüllt sind, haben eine ziemlich glatte Oberfläche, und zeigen, wenn man sie durchschneidet, auf ihrer Schnittfläche eine ziemlich gleichförmige Substanz, die wegen der beträchtlichen Menge Blutes, welche diesen Drüsen zugeführt wird, röthlich ansieht. Sind aber die Lymphdrüsen mit Flüssigkeit sehr angefüllt, so wird ihre Oberfläche zugleich und ihre Substanz ungleichförmig gefärbt.

Die Lymphdrüsen bestehen aus Lymphgefäßen, Arterien, Venen, aus Zellgewebe und wahrscheinlich auch aus kleinen Nerven. Um eine vollständige Kenntniß vom Baue derselben zu haben, müßte man daher wissen, wie sich diese verschiedenen Arten von Canälen in ihnen verhalten, wie sie unter einander zusammenhängen. Vieles ist hierüber noch zweifelhaft.

Die Lymphgefäße machen den größten Theil der Organe aus, aus denen die Lymphdrüsen zusammengesetzt sind, sie sind die Grundlage, auf welcher sich daselbst die Arterien und Venen, die auch sehr groß und zahlreich sind, ausbreiten. Nerven gelangen zu den Saugaderdrüsen auch, aber die Anatomen sind noch darüber im Streite, ob sie nur an ihnen vorübergehen, oder sich wirklich in ihnen endigen. Walther ¹⁾, Mascagni ²⁾, Schmidt ³⁾ und Sömmerring ⁴⁾ sahen keine Nerven, welche sich in den Saugaderdrüsen endigen. Hewson, Wrisberg ⁵⁾, Berner, Feller ⁶⁾ und Fischer ⁷⁾ bei Menschen, Schreger ⁸⁾ aber bei Hunden, glauben gesehen zu haben, wie Nerven, die durch die Saugaderdrüsen gingen, Zweige an kleineren Abtheilungen der Drüsen gaben.

Verlauf der Lymphgefäße durch die Lymphdrüsen.

Die Lymphgefäße, welche in eine Lymphdrüse eintreten und Flüssigkeit in sie hineinführen (*Vasa inferentia*), theilen sich auf der einen Seite in der Nähe der Drüse, oder in der Substanz derselben wiederholt

¹⁾ J. Gottlob Walther, *Tabula nervorum thoracis et abdominis*. Berol. 1783. Fol. in der Vorrede.

²⁾ Mascagni, *Vasorum lymph. hist. et ichnogr.* p. 30.

³⁾ J. A. Schmidt, *Commentarius de nervis lumbalibus*. Vindobonae 1794. p. 49, 62.

⁴⁾ Sömmerring, *vom Baue des menschl. Körpers*, IV. 516.

⁵⁾ Wrisberg, *Comment. soc. Goettingensis* 1788. Vol. IX.

⁶⁾ Werner et Feller, *Vasorum lacteorum atque lymph. anat. phys. descriptio*, p. 22.

⁷⁾ J. L. Fischer, *Descriptio nervorum lumbalium*, Vorrede.

⁸⁾ B. N. G. Schreger, *Beiträge zur Cultur der Saugaderlehre*. Th. I. S. 249.

in kleinere Zweige. Die Lymphgefäße, welche aus einer Lymphdrüse austreten und die Lymphe aus ihr wieder fortführen (vasa efferentia) entfließen in derselben aus kleinen Lymphgefäßen, welche wiederholt sammeltreten, um auf der gegenüberliegenden Seite der Drüse einen austretenden Stamm oder mehrere solche Stämme zu bilden. Die Größe der austretenden Lymphgefäße ist häufig kleiner als die der eintretenden dafür sind jene aber auch dann etwas dicker. Die eintretenden Lymphgefäße gehen, nachdem sie sich in kleinere Zweige getheilt haben, ununterbrochen in die aus den Lymphdrüsen austretenden Lymphgefäße über, denn der Druck einer mäßig hohen Quecksilbersäule reicht nicht aus, um Quecksilber, ohne daß eine Ausleerung desselben ins Gewebe erfolgt, aus den einführenden Gefäßen in die ausführenden über zu treiben, sondern der Widerstand, den das Quecksilber durch Friction in den kleinen Lymphgefäßen der Drüse erfährt, hindert es vielmehr nicht einmal, daß dieser Druck das Quecksilber in den austretenden Stämmen noch weiter treiben, und sogar durch eine zweite Lymphdrüse in welche der ausgetretene Stamm von neuem eintritt und sich daselbst wieder auf die beschriebene Weise verhält, hindurchtreiben kann. Die kleinen Aeste der Lymphgefäße sind in der Substanz der Lymphdrüsen nicht selten vielfach geschlängelt und gewunden, fast wie die Samenarterien im Hoden, aber sie theilen sich bei weitem nicht in so enge Röhrchen, als die Blutgefäße, welche die Lymphgefäße mit einem Haargefäßnetze umgeben. So wie in den Lungen 2 verschiedene Flüssigkeiten, Luft und Blut mit einander durch in Berührung und in Wechselwirkung kommen, daß das Blut in äußerst feinen und dünnwandigen Röhrchen an der innern Oberfläche der Lufttröhren, welche ihrer Theilung in kleinere Zweige einen viel größeren Durchmesser behalten, voriuströmt, auf eine ähnliche Weise scheinen in den Lymphdrüsen 2 tropfbare Flüssigkeiten, Lymphe und Blut, dadurch mit einander in Berührung und in Wechselwirkung gesetzt zu werden, daß das Blut in unzähligen, äußerst feinen dünnwandigen Röhrchen an der Oberfläche der viel größeren Röhren der Lymphgefäße voriuströmt. Bei dieser Art der Berührung der beiden Flüssigkeiten kann unstreitig jede von der andern Stoffe an sich ziehen, oder auch in die Höhle der einen oder der andern gewisse Materien absondern.

Um den Verlauf der Lymphgefäße in den Lymphdrüsen genau kennen zu lernen, darf man sich nicht begnügen, dieselben mit Quecksilber anzufüllen, sondern man muß sie auch wie Mascagni, bei jungen gesunden Menschen mit gefärbten Flüssigkeiten anfüllen, welche nicht erstarrten, und muß dann die Lymphgefäße mit der Spitze feiner Nadeln und Messer auseinander zu ziehen und zu entwickeln suchen. Auf diese Weise hat sich Mascagni überzeugt, daß sich die Lymphgefäße in den Lymphdrüsen sowohl an der Oberfläche, als auch im Innern

¹⁾ Siehe Mascagni, Vasorum lymphatic. hist. et ichnogr. p. 32. in Ludw. Uebersetzung S. 48. Ich selbst habe mich durch mikrometrische Messung von der außerordentlichen Dünne der Röhrchen des Blutgefäßnetzes in Lymphdrüsen an einer der Berliner Sammlung aufbewahrten Liberti'schen Präparate überzeugt.

auch nach dem Tode Flüssigkeiten, die in eine Classe von Canälen eingespritzt werden, in großer Menge und leicht durch eine Ruptur oder durch eine Erweiterung der Poren in die andere übertreten, ohne zuvor in das Zellgewebe auszutreten. Dieses ist, wie schon erwähnt worden, in den Lungen der Fall. Die Blutgefäße liegen daselbst so an der innern Oberfläche der Luftröhren, daß Flüssigkeiten, die nach dem Tode in die Arterien gespritzt werden, sogar leichter in die Luftröhrenäste, als in das Zellgewebe und in die Venen übergehen ¹⁾, und daß sie durch einen Druck in die Luftröhre übergehen, der nicht größer ist, als der, welchen eine 1 Fuß hohe Wassersäule hervorbringt ²⁾; und doch ist es gewiß, daß sich das Blut während des Lebens nicht in die Luftröhrenäste ergießt. Gerade so, wie sich die Lymphgefäße der Lymphdrüsen dann nicht vollkommen durch eingespritztes Quecksilber erfüllen lassen, wenn das Quecksilber einen Ausweg in die Venen nimmt, eben so lassen sich, nach Reisseisen ³⁾, die Blutgefäßneße der Lungen durch die in sie eingespritzte Flüssigkeit nicht vollständig erfüllen, wenn dieselbe einen Ausweg in die Luftröhrenäste nimmt. So wie es daher in den Lungen einen unmittelbaren Uebergang aus den Arterien in die Venen durch die Blutgefäßneße giebt, eben so giebt es in den Lymphdrüsen aus den Vasis inferentibus einen unmittelbaren Uebergang in die Vasa efferentia durch die Lymphgefäßneße, sowie es in den Wänden eines Blutgefäßnes der Lungen Poren oder kleine Oeffnungen giebt, die sich in die Luftröhren öffnen, welche aber im Leben im Stande sind, dem vorbeiströmenden Blute Widerstand zu leisten, und nach dem Tode leicht erweitert werden, eben so scheinen in den Lymphgefäßneßen der Lymphdrüsen dergleichen in die Blutgefäße gehende Poren oder kleine Oeffnungen zu existiren, die sich nach dem Tode erweitern können, so wie endlich die in den Luftröhren der Lungen befindlichen luftförmigen Flüssigkeiten und das in den Blutgefäßen der Lungen an jenen Luftröhrenästen vorbeiströmende Blut eine gegenseitige Anziehung auf einander äußern, so daß das Blut Luft aus den Luftröhren, und die Luft in den Luftröhren Luft aus dem Blute an sich zieht, eben so scheidet die in den Lymphgefäßen befindliche Flüssigkeit und das an den Wänden der Lymphgefäße in den Lymphdrüsen vorbeiströmende Blut eine Anziehung auf einander äußern zu können, vermöge deren die Lympha Stoffe aus dem Blute, und das Blut Stoffe aus der Lympha an sich zieht, ohne daß ein wirkliches Ueberströmen der Flüssigkeit aus der einen Classe von Canälen in die andere stattfindet. Mit dieser Vorstellung stimmt sehr wohl überein, daß der Durchgang aller Lymphgefäße eines Organs zusammengenommen, von den Stellen an, wo sie durch viele Lymphdrüsen wiederholt durchgehen, kleiner wird, und daß endlich alle Lymphgefäße in dem engen Ductus thoracicus zusammenkommen. Denn da der Durchmesser der Gefäße der Menge von Flüssigkeit unter übrigens gleichen Umständen entspricht, die sie einschließen sollen, so kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß sich die Menge der in den Lymphgefäßen fortgeführten Flüssigkeit auf dem Wege durch die Lymphdrüsen auf irgend eine Weise vermindere. Vielleicht geschieht dieses in den Lymphdrüsen dadurch, daß etwas davon von dem Blute der Venen angezogen, und hierdurch, oder aus einem andern Grunde, in die Höhle der Venen abgefondert werde. Diese Vorstellung hat in der That auch deswegen viel für sich, weil es zweckmäßig scheint, daß bei dem überhohen Durchgange der Lympha durch die Lymphdrüsen der dem Blute schon in einer Drüse ähnlicher gewordene Theil der Lympha, mit den noch nicht ver-

¹⁾ Abraham Kaau, *Perspiratio diæta Hippocrati per universum corpus anatomicè illustrata*. Lugd. Batav. 1738. 8. §. 118. p. 54.

²⁾ E. Hales, *Haemastatique ou la statique des animaux; exp. hydrauliques faites sur des animaux vivans*, traduit par Sauvages, à Geneve 1744. 4. p. 62.

³⁾ Franc. Dan. Reisseisen, *De fabrica pulmonum commentatio a regia acad. scient. Berolinensi præmio ornata*. c. Tab. VI. Berolini 1822. Fol. p. 16.

kann, wie durch die Ausdehnung einzelner Stellen der gewundenen Lymphgefäße durch die eingespritzte Flüssigkeit Zellen entstehen, nicht aber, wie, wenn wirklich-fold Zellen an der Oberfläche der Drüsen vorhanden wären, sie zu Geflechtern oder Röhren, die einen ziemlich gleichen Durchmesser hätten, umgewandelt werden könnten, macht es sehr wahrscheinlich, daß die Zellen, wenigstens zum Theil von einem zufälligen Drucke der eingespritzten Flüssigkeiten auf einzelne Stellen der Lymphgefäße herrühren, oder dadurch vergrößert worden sind.

Malpighi und Cruikshank, welche beide unter den älteren Anatomen Zellen in den Lymphdrüsen annehmen, stimmen doch in der genauen Beschreibung dieser Zellen nicht überein, und Cruikshank, welcher als der vorzüglichste neuerer Vertheidiger des Vorhandenseins von Zellen in den Lymphdrüsen angesehen werden muß, hat selbst nicht einmal die Meinung, daß die Zellen in den Lymphdrüsen eine Unterbrechung zwischen den einführenden und ausführenden Gefäßen hervorbrächten, deutlich ausgesprochen, seine Abbildungen zeigen vielmehr eine Reihe von Drüsen, von welchen manche nur aus verschlungenen, gewundene Lymphgefäßen, ohne alle Zellen, andere nur aus Zellen und gar nicht aus gewundenen und verschlungenen Lymphgefäßen zu bestehen scheinen; eine Figur endlich zeigt auf eine sehr lehrreiche Weise den Mittelzustand¹⁾. An ihr sieht man wie die Windungen und Schleifen der Lymphgefäße an manchen Stellen in den Drüsen eine Form allmählig annehmen, durch welche sie Zellen zu bilden scheinen und diese Abbildung kommt sehr mit der von J. F. Meckel d. ä.²⁾ auf mehrere Tafeln gegebenen Abbildungen überein. Wenn Cruikshank aber sich auch auf die mit Quecksilber angefüllte, getrocknete, und dann durchschnitene Lymphdrüse von Pferden beruft, in welchen er große, seitwärts unter einander zusammenhängende Höhlen fand, so stützt er sich auf keinen sehr haltbaren Beweis. Denn es ist bekannt, daß die Zwischenräume weicher thierischer Theile, wenn sie, während sie trocken, mit Flüssigkeiten angefüllt sind, durch das Zusammenkleben und Zusammenziehen mancher Stellen, die nicht angefüllt waren, und durch die Ausdehnung anderer oft ein Ansehen erhalten, das sehr von dem natürlichen abweicht. Eben so wenig widersprechen Werner und Feller, welche gewöhnlich als Vertheidiger des Vorhandenseins von Zellen in den Lymphdrüsen angesehen werden, der Ansicht, daß die in den Lymphdrüsen von Anderen beschriebenen Zellen nur weitere Stellen der Lymphgefäßgeflechte sind, und nirgends behaupten sie, daß diese Zellen abgesonderte Räume wären, aus welchen die ausführenden Lymphgefäße mit so engen Oeffnungen entsprängen, daß die Lymphe nicht an den Zellen in sie herüberfließen könnte, sondern durch eine aufsaugende Thätigkeit aufgenommen werden müßte, vielmehr sagen sie, daß in den größeren Lymphdrüsen, so oft sich 2 oder mehrere Lymphgefäße vereinigen, aus dieser mit einer Klappe versehenen Stelle eine Zelle entsteht³⁾. Meckel, Hewson und Mascagni erklären sich geradezu für die Meinung, daß die bei der Anfüllung der Lymphgefäße der Lymphdrüsen sichtbar werdenden Zellen nur erweiterte Stellen und Schlingungen der Lymphgefäße wären. Denn die Zellen, welche Hewson in den Lymphdrüsen erwähnt, dürfen ja nicht mit denen des Cruikshank verwechselt werden. Sie gehören gar nicht hierher, denn sie sind nach ihm so klein, daß sie nur durch stark vergrößernde Mikroskope gesehen werden können. Sie sind so klein, daß die gleichförmigste Röhre, welche mit unbewaffnetem Auge und mit Lupen angesehen, glatt aussähe, noch recht gut die Hewson'schen Zellen besitzen könnte; denn nach der in Hewson's Werken von diesen Zellen gegebenen Abbildung sind sie nur etwa so groß als die Blutkörperchen⁴⁾.

Hinsichtlich der über die Zellen in den Lymphdrüsen des Menschen beobachteten Thatsachen sind also die neueren Anatomen im Wesentlichen nicht verschiedener Meinung. Fast alle haben diese Zellen beobachtet. Nur darüber, was

1) Cruikshank a. a. O. Tab. 3. Fig. 7.

2) J. F. Meckel a. a. O. Tab. V u. VI.

3) Werner und Feller behaupten vielmehr das Gegentheil, p. 24: „Absumuntur etiam (vasa lymphatica) majoribus ramificationibus in ipsam glandulam, à qua tamen serratum progressum ostendunt, ut bene expleta talis glandula est innumeris minutis nodulis compositum corpus referat.“

4) Hewson a. a. O. Tab. IV. auf der 400mal im Durchmesser vergrößerten Figur.

aus den Beobachtungen gefolgert werden dürfe, weichen sie von einander ab. Bei den Thieren findet hinsichtlich der Lymphdrüsen eine große Verschiedenheit Statt. Bei manchen, z. B. bei den Walfischen, scheinen die Lymphdrüsen Säcke mit gefäßreichen Wänden zu sein. Abernethy¹⁾ spritzte in die Lymphgefäße der Lymphdrüsen der Walfische Wachs oder auch Quecksilber ein, und Knox wiederholte diese Untersuchung beim Delfine und Meerschweine. Die Lymphdrüsen dieser Thiere schließen eine verhältnismäßig sehr große Höhle ein, in welche sich Lymphgefäße und Venen mit weiten Mündungen öffnen sollen. Eine 2te Classe von Lymphgefäßen bildet an der innern Oberfläche dieser hohlen Drüsen ein Gebilde, in welchem sie sich vielfach unter einander verbinden. Diese gehen nicht in die Höhle der Drüse, sondern in die Vasa efferentia über. Knox hat diese Vasa efferentia nach vielen vergeblichen Bemühungen beim Delfin und Meerschweine glücklich angefüllt, und den Uebergang zum Ductus thoracicus sichtbar gemacht. Dieser Bau der Lymphdrüsen bei den Cetaceen verdient eine wiederholte reame Untersuchung, aber auf die menschlichen Lymphdrüsen kann man von ihnen einen Schluß ziehen. Abernethy selbst sagt, in den Lymphdrüsen des Menschen wären die Zellen so klein, daß sie meistens nur durch das Mikroskop gesehen werden könnten.

Die Lymphdrüsen sind nur bei den Säugethieren sehr ausgebildet, wo unter diesen sind sie wieder bei dem Menschen bei weitem in größter Menge vorhanden. Bei den Vögeln fehlen sie fast ganz, bei den Amphibien und Fischen sind sie gar nicht vorhanden. Sie werden bei diesen Thierclassen durch Geflechte von Lymphgefäßen ersetzt. Bei den Wadern bemerkte Lauth²⁾ in diesen Geflechtern allemal da, wo Lymphgefäße sich theilen oder vereinigen, Erweiterungen, die hier dasselbe zu thun scheinen, was man in den Lymphdrüsen der Säugethiere für Zellen halten hat.

Endigung der Lymphgefäße.

Ob alle Lymphgefäße des menschlichen Körpers den Saft, den sie führen, nur durch 2 bis 4 Stämme in die hinter den linken und rechten Schlüsselbeine gelegenen großen Venen ergießen, oder ob sie sich auch an anderen Stellen in dieselben öffnen, ist eine neuerlich viel besprochene und bestrittene Frage, die man selbst wieder in die 3 Fragen theilen kann: 1) ob es kleine Lymphgefäße gebe, die ihre Flüssigkeit in kleine Venen, die noch nicht zu größeren Stämmen zusammengetreten sind, ergießen, eine Frage, die mit der, ob es einsaugende Enden der Venen gebe, fast identisch ist; 2) ob eine solche Verbindung von Lymphgefäßen und Venen innerhalb der Lymphdrüsen Statt finde, daß die Säfte aus den Lymphgefäßen daselbst in die Blutgefäße hinüberfließen können; 3) ob sich Lymphgefäßstämme in größere Venen an anderen Stellen des Körpers als an den angegebenen endigen?

¹⁾ Abernethy, Phil. Tr. for the year 1796. — Knox, Edinburgh medical and surgical Journal, Jul. 1824. p. 23. übers. in *Froriep*, Notizen 1824. Aug. p. 51. — J. Ch. Ogilvie in London, medical and physical Journal, Febr. 1827.

²⁾ E. A. Lauth, Essai sur les vaisseaux lymphatiques etc. 4. Strasbourg 1824. p. 29.

Strand, Anatomic. III.

114 Endigen sich kleine Lymphgefäße in kleine Venen?

Was die erste Frage anlangt, so reichen die bis jetzt hierüber gemachten Erfahrungen noch nicht hin, um sie zu bejahen. Eine der interessantesten Beobachtungen, die man dafür anführen kann, ist die von Fohmann: Sie bedarf aber noch einer ferneren Bestätigung. »Als ich 4 Tage vor dem Tode«, sagt Fohmann ¹⁾, »die Bauchhöhle eines Selbstmörders öffnete, fand ich die Saugadern auf einem Stücke des Dünndarms stropend von Milchsaft. Ich bedeckte dieses, um zuvörderst die Injection der Arterien und Venen vorzunehmen, mit einem in warmes Wasser getauchten Tuche. Kaum aber war die Einsprigung der Arterien beendet, als ich die kurz zuvor so sichtbaren Milchgefäße sich vor meinen Augen entleeren sah, und obgleich das Stück des Dünndarms durch sie früher ein ganz marmorirtes Aussehen erhalten hatte, so war jetzt keine Spur mehr von ihnen wahrzunehmen. Die Venen waren blutleer, doch ich aber in den Wurzeln derselben eine Flüssigkeit bemerkte, und sie deshalb einschchnitt, so fand ich eine weiße, chylusartige Flüssigkeit in denselben.« Fohmann glaubt, daß die Lymphgefäße den Chylus, mit dem sie gefüllt waren, in die Venen ergossen hätten. Dieser Annahme stehen die Experimente von Hunter, Cruikshank, Mascagni und Anderen entgegen, welche niemals die Venen sich mit Milchsaft füllen sahen. Daraus aber, daß manche sich durch die Wände der Blutgefäße dringen und, vom circulirenden Blute angezogen, sehr schnell in den Kreislauf gelangen, auch wo kein Zusammenhang eines Theils mit dem übrigen Körper durch Lymphgefäße Statt findet ²⁾, oder wo der Ductus thoracicus zugleich unterbunden war ³⁾, wird, so viel ich einsehe, wohl ein solches Einsaugungsvermögen der Venen, wie es die Lymphgefäße besitzen, noch ein Uebergang sehr kleiner Saugadern in kleine Venen bewiesen. Dem man muß das Vermögen einer in einer häutigen Röhre befindlichen Flüssigkeit durch die Poren der feuchten Wände hindurch eine außerhalb befindliche Flüssigkeit an sich zu ziehen, sehr von dem Vermögen einer Röhre, sich auch, wenn sie leer ist, mit Flüssigkeit zu füllen und die aufgenommene Flüssigkeit fortzuführen, unterscheiden. Die letzteren Eigenschaften besitzen, so viel wir wissen, auch die Lymphgefäße; die erstere, wobei genau genommen die in der Röhre enthaltene Flüssigkeit der einsaugende Körper ist, kommt offenbar auch den Venen zu, z. B. in den Lungen, wo das Blut ohne die Dazwischenkunft der Lymphgefäße unmittelbar durch die Wände der Blutgefäße hindurch Luft einsaugt. Emmerl ⁴⁾ rücksichtlich einer solchen Einsaugung bewiesen, daß die Venen, wenn in ihnen kein Blut circulirt; sich mit einem Gifte nicht erfüllen und dasselbe nicht weiter abgeben, ob sie es gleich, so lange in ihnen die Circulation des Blutes geschah, sehr schnell aufnahmen und im Körper verbreiteten ⁵⁾.

Was die 2te Frage betrifft, so ist so viel erwiesen, daß die Lymphgefäße und die Venen in den Lymphdrüsen in einer solchen Lage und gegenseitigen Berührung sind, daß Quecksilber, welches in die Lymphgefäße eingespritzt wird, und aus diesen Canälen einen Ausweg nimmt, fast eben so leicht in die Venen als in die Zellen des Bindegewebes übergeht.

¹⁾ Vincenz Fohmann, Anatomische Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen, mit einer Vorrede von F. Tiedemann. Heidelberg 1821. 8. S. 28.

²⁾ Magendie und Dülle in Magendie's Physiologie, übers. v. Heusinger. B. 1. S. 178 und 179. Segalas in Magendie Journal de Physiologie, B. II. 1824. 117—122.

³⁾ Mayer, in Meckels Archiv für Physiologie, B. III. S. 496.

⁴⁾ Emmert, Tübinger Blätter, B. 2. S. 88 sq. und Meckels Archiv für Physiologie I. S. 176, und Schnell, Historia veneni Upas Antiar. Tubingen 1815. S. 31.

Dem J. F. Meckel d. ä. ¹⁾, Hewson ²⁾, Ph. F. Meckel ³⁾, Fohmann ⁴⁾, Lippi und mehrere Andere haben einen solchen Uebergang des Quecksilbers aus den Lymphgefäßen der Lymphdrüsen in die Venen gesehen, und mehrere von diesen versichern, ihn so oft und ohne eine Anziehung des Quecksilbers ins Zellgewebe beobachtet zu haben, daß an der Thatsache selbst niemand zweifeln kann. Fohmann behauptet sogar, daß er diesen Uebergang in gesunden Drüsen und bei einem sehr geringen Drucke beobachtet habe. Dieser leichte Uebergang des Quecksilbers in die Venen macht wenigstens so viel wahrscheinlich, daß da, wo in den Lymphdrüsen die dünnen Wände der Venen und Lymphgefäße in Berührung sind, kein Zellgewebe dazwischen liege, denn wäre dieses der Fall, so müßte das Quecksilber, ehe es durch eine Zerreißung aus den Lymphgefäßen in die Venen gelangte, in das zwischen ihnen gelegene Zellgewebe ergossen werden, und könnte erst dann durch eine neue Zerreißung der Wände der Venen aus dem Zellgewebe in die Venen übergehen, was nicht leicht vorkommen kann, weil Quecksilber, sobald es einmal ins Zellgewebe gelangt ist, sich leichter dasselbst neue Wege sucht, als es von da aus die Wände der Venen zerreißt. Auch hat man den Uebergang von Quecksilber aus den Lymphgefäßen in die Venen bemerkt, wenn auch kein Quecksilber in das Zellgewebe ergossen war. Es ist aber schon oben gesagt worden, daß eine so genaue Berührung der Venen und Lymphgefäße in den Lymphdrüsen, vermöge deren die Ströme dieser 2 Flüssigkeiten nur durch eine so sehr dünne, leicht zerreißbare Wand geschieden sind, für die Verrichtung der Lymphdrüsen sehr wichtig sein können. Denn so wie in den Lungen, wo die feinsten Luftröhrendäste und die Blutgefäße in einer ähnlichen Berührung sind, die Luft und das an den Luftröhren offen vorbeischießende Blut durch die dünnen Wände hindurch eine wechselseitige Anziehung auf einander äußern, so daß das Blut gewisse Bestandtheile der Luft, und die Luft gewisse Bestandtheile des Bluts an sich zieht, so kann wohl auch etwas ähnliches in den Lymphgefäßen und Blutgefäßen der Lymphdrüsen Statt finden, weil hier gleichfalls 2 verschiedene Flüssigkeiten, Lymph und Blut, in

¹⁾ J. F. Meckel, Nova experimenta et observationes de sinibus venarum ac vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria corporis humani ejusdemque structuræ utilitate. Berolini 1772.

²⁾ G. Hewson, Opus posthumum sive rubrarum sanguinis particularum et fabricae ususque glandularum lymphaticarum thymi et lienis descriptio, iconibus illustrata. Anglice ed. M. Falconar. Latine vertit J. Th. van de Wypersse. Lugd. Bat. 1785. 8. p. 37.

³⁾ G. E. Lindner, Specimen inaugurale medicum de lymphaticorum systemate. Halae 1787. p. 87.

⁴⁾ Vincenz Fohmann, Untersuchungen über die Verbindung der Saugadern mit den Venen. Heidelberg 1821. 8.

ähnliche Berührung kommen. Da nun auch in den Lungen sehr leicht Flüssigkeiten, die in die Lungenarterie gespritzt werden, in die Luftröhrenäste übergehen, und dennoch daselbst bei Gefunden während des Lebens keine Oeffnungen da sind, durch welche Blut herüberfließen könnte, sondern nur gewisse Materien aus den Blutgefäßen in die Luftröhrenäste abgefondert, und gewisse andere in die Blutgefäße aus den Luftröhrengefäßen hereingezogen werden; so ist es wohl nicht unwahrscheinlich, daß auch die Wege, durch welche das Quecksilber nach dem Tode in die Lymphdrüsen aus den Lymphgefäßen in die Venen übergeht, bei Gefunden während des Lebens nicht so offen stehen, daß Lymph in Substanz hinüberfließen kann, sondern daß die 2 verschiedenen Flüssigkeiten nur durch die Wände ihrer Gefäße hindurch einen wechselseitigen Einfluß auf einander ausüben, und nur gewisse Substanzen an sich ziehen und fahren lassen, und folglich ist es umgekehrt, weil, wie ich zeigen werde, noch andere Umstände bei jenem Uebergange des Quecksilbers dafür sprechen, wahrscheinlich, daß das Quecksilber in den Lymphdrüsen nach dem Tode allerdings, in Folge einer Zerreißen der Gefäßwände oder der Ausdehnung von Poren, aus den Lymphgefäßen in die Venen übergehe.

Es sprechen nämlich mehrere von Mascagni und andern Anatomen in diesem Uebergange beobachtete Umstände für eine Zerreißen der Gefäßwände. Ein¹⁾ füllten sich durch den gewöhnlichen Druck einer Quecksilberäule die Vasa inferentia und efferentia der Lymphdrüsen, und das Quecksilber ging aus den zuerst erfüllten Drüsen in andere und nochmals in andere über, ohne daß aus den ersten Drüsen Quecksilber in die Venen gelangte. Als nun aber der Widerstand groß wurde, und Mascagni das Quecksilber durch den Druck mit den Fingern weiter vorwärts trieb, so fing es plötzlich an, reißend schnell und in so großer Menge in die Venen überzugehen, daß nicht nur das Quecksilber, welches aus der Röhre ausfloß, gar nicht mehr in die Lymphgefäße drang, und vielmehr ganz in die Venen überging, sondern daß auch Quecksilber, welches die Lymphdrüsen und die Vasa efferentia erfüllt hatte, in die Venen zurückging, während diese Gefäße am Umfange abnahmen. Auch soll, nach Mascagni, wenn das Quecksilber in den Lymphdrüsen aus den Lymphgefäßen in die Venen übergeht, immer irgendwo in der Drüse eine Zerreißen und ein Ausstreten des Quecksilbers ins Zellgewebe Statt finden. Zuweilen sei dieses an der Oberfläche der Drüse der Fall, wo es dann in die Augen fällt, zuweilen im Innern der Drüse, wo es, wenn man die Drüse nicht zerschneidet, verborgen bleibt. Mascagni behauptet sogar, gesehen zu haben, daß eine auf diese Weise ausgebeulte Zelle des Zellgewebes einer Drüse, die er aufschnitt, mit einer zerrissenen Vene in eine so offenbare Communication stand, daß das Quecksilber selbst dann noch fortfuhr in die Vene hinüber zu fließen, als er die Zelle geöffnet hatte. Dem Henslow ist es, fast zu der nämlichen Zeit als J. F. Meckel v. d. A. sein Arbeiten über die Lymphgefäße bekannt machte, nicht selten vorgekommen, daß das Quecksilber in den Lymphdrüsen aus den Lymphgefäßen in die Venen überging, ohne daß das Quecksilber zugleich ins Zellgewebe austrat. Der Fall, den er ausführlich erzählt, ist dem von Mascagni sehr ähnlich. Auch hier wurde das Quecksilber, als es nicht weiter fortrücken wollte, durch den Druck mit den Fingern vorwärts getrieben. Nun bemerkte er eine Abnahme des Quecksilbers, die zuführenden Gefäße entleerten sich, das Quecksilber ging jetzt ganz leicht, aber in sehr kleinen Kügelchen, durch eine aus der Drüse kommende Vene in die

¹⁾ Mascagni, Vasorum lymphat. hist. et ichnogr. p. 32, 29.

ena cava inferior über, und rückte von nun gar nicht durch die Drüse vor. In kurzer Zeit war eine große Menge Quecksilber in die Vena cava gelangt, aber in das Zellgewebe der Drüse war kein Quecksilber ergossen. Hewson¹⁾ ist durch einige Beobachtungen selbst überzeugt, daß eine unmittelbare Verbindung der Lymphgefäße in die kleinsten Blutgefäße Statt finde, aber auch die Beobachtungen sind keineswegs geeignet, dieses zu beweisen.

J. F. Meckel's d. ä. Beobachtung²⁾ ist von derselben Art. Die Drüse, welcher der Uebergang aus den Lymphgefäßen in die Venen Statt fand, war Meckel's. Selbst eine 18 Zoll hohe Quecksilbersäule vermochte nicht, das Quecksilber in die Vasa efferentia überzutreiben. Endlich, da Meckel mit dem Finger auf die Vasa inferentia drückte, fühlte er ein schnelles Entweichen des Quecksilbers aus diesen Gefäßen, und nun erst beobachtete er den Uebergang von Quecksilber in die Venen.

Sogar die Beobachtungen Fohmann's (in welchen das Quecksilber gleich leichter dann in die Venen überging, wenn es durch die Vasa inferentia seinen Fortgang nicht nahm), scheinen der Vermuthung günstig zu sein, daß der Uebergang in die Venen durch eine Zerreißung oder Ausdehnung fast ungleicher Wege erfolge. Denn in vielen Fällen, in welchen er das Quecksilber in die Venen übergehen sahe, füllten sich die Vasa efferentia nicht damit. Dieser fand veranlaßt bei ihm sogar die von Rosenthal³⁾ widerlegte Vermuthung, daß es bei manchen Säugethieren, namentlich beim Hunde und Seehunde, Lymphdrüsen gebe, die gar keine Vasa efferentia besäßen, sondern bei welchen die Venen die Stelle derselben verträten. Denn Rosenthal hat später diese Vasa efferentia sehr glücklich angefüllt, und Rudolphi hat dieselben bestätigt.

Eben so versichert Antommarchi⁴⁾, und bewies es der von der Pariser Academie ernannten Commission durch Versuche, daß ein Austreten des Quecksilbers aus den Lymphgefäßen in die Venen dann nicht Statt finde, wenn die Venen gesund sind, wenn das Quecksilber sie vollkommen erfüllt und ohne Hinderniß in die Vasa efferentia und bis in den Ductus thoracicus fortgeht; daß gegen diesen Uebergang vorzüglich in krankhaft veränderten Lymphdrüsen erfolge, und daß er, wenn er einmal beginnt, mit großer Leichtigkeit und Gewalt fortdauert, und die von Biancini⁵⁾ in Pisa angestellten Versuche haben dasselbe bestätigt gegeben.

Wenn wir aber auch Fohmannen, dessen treffliche Untersuchungen anerkannt zu werden verdienen, zugeben, daß das Quecksilber oft auch in gesunden Drüsen und ohne daß ein zu starker Druck angewendet wird, aus den Lymphgefäßen innerhalb der Lymphdrüsen in die Venen übergehe, und daß dieses oft genug erfolge, ohne daß sich Quecksilber ins Zellgewebe ergossen wird, so folgt daraus doch keinesweges, daß während des Lebens ein solcher Zusammenhang zwischen Venen und Lymphgefäßen da sei, vermöge dessen Säfte aus den Lymphdrüsen in die Venen hinüberfließen, und daß das beobachtete Hinüber-

¹⁾ *Guiljelmi Hewson's Opus posthumum sive rubrarum sanguinis particularum et fabricae usaque glandularum lymphaticarum thymi et lienis descriptio, iconibus illustrata.* Anglice edidit *Magnus Falconar.* Latine vertit et notas addidit *J. Th. van de Wynpersee.* Lugd. Bat. 1785. 8. p. 37.

²⁾ *J. F. Meckel d. ä. a. O. p. 7.*

³⁾ *Rosenthal in Friese's Notizen, B. II. 1822. S. 5.*

⁴⁾ *Antommarchi, Mém. sur la non-communication normale des vaisseaux lymphatiques et des veines, résultat de quelques expériences tentées devant la commission nommée par l'Académie des sc., in Férussac Bullet. des sc. méd. Tome XVIII. 1829. 162. sq.*

⁵⁾ *Biancini, Recherches sur le trajet des vaisseaux lymphatiques iléo-lombaires et chylières, et sur leur respectives terminaisons, in Férussac, Bullet. des sc. méd. Avril 1830. p. 1.*

fließen des Quecksilbers nach dem Tode ohne eine Zerreißung oder ohne die Ausdehnung von Poren geschehe. Denn daß das Quecksilber in der Regel bei Gesunden nicht in die Venen übergeht, sondern daß das Lymphgefäßsystem sehr vollständig angefüllt werden kann, ohne daß ein solcher Uebergang Statt findet, daß es, wenn es einmal in die Venen überzugehen anfängt, dann plötzlich so leicht und so schnell in sie hinüberfließt, und sogar aus den vorher erfüllten Lymphgefäßen zurückfließt, um sich in die Venen zu ergießen, und daß endlich bei Menschen und Thieren, die während der Verdauung gestorben sind, oft die Lymphgefäße und Lymphdrüsen des Gekröses von weißem Chylus strömen und nachdem der Hauptstamm unterbunden worden, bis zum Zerreißn ausgezehrt worden, während die aus den Lymphdrüsen hervortretenden Venen rothes Blut enthalten, macht es fast gewiß, daß, während das Quecksilber sich in die Venen plötzlich einen so offenen Weg bahnt, ein Zerreißung vor sich gegangen sei. Denn gäbe es nur sehr enge Verbindungsanäle zwischen den Lymphgefäßen und Venen in den Drüsen welche in den meisten Fällen den Uebergang des Quecksilbers aus den Lymphgefäßen in die Venen nicht gestatteten, sondern sich erst dann wenn das Quecksilber durch die Vasa efferentia weiter zu fließen gehindert wäre, erweiterten, so würde diese Veränderung nicht so plötzlich vor sich gehen, und die Wege würden sich nicht so sehr erweitern, daß das Quecksilber durch die geringste Kraft hinüberfließen könnte. Gäbe es dagegen in den Lymphdrüsen weite Verbindungsanäle zwischen den Lymphgefäßen und Venen, so müßte das Quecksilber dafelbst in der Leichnamen gesunder Menschen in der Regel aus den Lymphgefäßen in die Venen übergehen, es dürfte nicht so viele Beispiele geben, wo das Quecksilber mehrere Lymphdrüsen durchläuft, die Lymphgefäße strömen erfüllt, und nicht in die Venen gelangt.

Man darf, wie schon erwähnt worden, nicht mit Fohmann entgegen, es sei unbegreiflich, wie das Quecksilber die Gefäßwände von zweierlei verschiedenen Gefäßen, erst die der Lymphgefäße (um aus ihnen auszutreten), dann die der Venen (um in sie einzutreten) zersprengen könne, und daß das aus den Lymphgefäßen ausgetretene Quecksilber vielmehr zunächst ins Zellgewebe austreten müsse, und sich da leichter weiter verbreiten, als die Wand einer Vene zerreißt werde. Denn in manchen Absonderungsorganen, in welchen 2 Classen von Canälen in einer Berührung sind, welche den Zweck hat, daß während des Lebens aus der einen Classe derselben in die andere etwas abgefordert werden soll, ist es gewiß, daß diese Canäle mit so dünnen Wänden an einander liegen, und daß ihre Wände da, wo sie an einander liegen, mit einander zu einer einzigen Wand verschmolzen sind, daß allerdings

auch nach dem Tode Flüssigkeiten, die in eine Classe von Canälen eingespritzt werden, in großer Menge und leicht durch eine Ruptur oder durch eine Erweiterung der Poren in die andere übertreten, ohne zuvor in das Zellgewebe auszutreten. Dieses ist, wie schon erwähnt worden, in den Lungen der Fall. Die Blutgefäße liegen daselbst so an der innern Oberfläche der Luftröhren, daß Flüssigkeiten, die nach dem Tode in die Arterien eingespritzt werden, sogar leichter in die Luftröhrenäste, als in das Zellgewebe und in die Venen übergehen ¹⁾, und daß sie durch einen Druck in die Luftröhre übergehen, der nicht größer ist, als der, welchen eine 1 Fuß hohe Wassersäule hervorbringt ²⁾; und doch ist es gewiß, daß sich das Blut während des Lebens nicht in die Luftröhrenäste ergießt. Gerade so, wie sich die Lymphgefäße der Lymphdrüsen dann nicht vollkommen durch angespritztes Quecksilber erfüllen lassen, wenn das Quecksilber einen Ausweg in die Venen nimmt, eben so lassen sich, nach Reisseisen ³⁾, die Blutgefäßneze der Lungen durch die in sie eingespritzte Flüssigkeit nicht vollständig erfüllen, wenn dieselbe einen Ausweg in die Luftröhrenäste nimmt. So wie es daher in den Lungen einen unmittelbaren Uebergang aus den Arterien in die Venen durch die Blutgefäßneze giebt, eben so giebt es in den Lymphdrüsen aus den Vasis inferentibus einen unmittelbaren Uebergang in die Vasa efferentia durch die Lymphgefäßneze, sowie es in den Wänden eines Blutgefäßnezes der Lungen Poren oder kleine Oeffnungen giebt, die sich in die Luftröhren öffnen, welche aber im Leben im Stande sind, dem vorbeistömenden Blute Widerstand zu leisten, und nach dem Tode leicht erweitert werden, eben so scheinen in den Lymphgefäßnezen der Lymphdrüsen dergleichen in die Blutgefäße gehende Poren oder kleine Oeffnungen zu existiren, die sich nach dem Tode erweitern können, so wie endlich die in den Luftröhren der Lungen befindlichen luftförmigen Flüssigkeiten und das in den Blutgefäßen der Lungen an jenen Luftröhrenästen vorbeistömende Blut eine gegenseitige Anziehung auf einander äußern, so daß das Blut Luft aus den Luftröhren, und die Luft in den Luftröhren Luft aus dem Blute an sich zieht, eben so scheint die in den Lymphgefäßen befindliche Flüssigkeit und das an den Wänden der Lymphgefäße in den Lymphdrüsen vorbeistömende Blut eine Anziehung auf einander äußern zu können, vermöge deren die Lymphstoffe aus dem Blute, und das Blut Stoffe aus der Lymph an sich zieht, ohne daß ein wirkliches Ueberströmen der Flüssigkeit aus der einen Classe von Canälen in die andere stattfindet. Mit dieser Vorstellung stimmt sehr wohl überein, daß der Durchmesser aller Lymphgefäße eines Organs zusammengenommen, von den Stellen an, wo sie durch viele Lymphdrüsen wiederholt durchgehen, kleiner wird, und daß endlich alle Lymphgefäße in dem engen Ductus thoracicus zusammenkommen. Denn da der Durchmesser der Gefäße der Menge von Flüssigkeit unter übrigens gleichen Umständen entspricht, die sie einschließen sollen, so kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß sich die Menge der in den Lymphgefäßen fortbewegten Flüssigkeit auf dem Wege durch die Lymphdrüsen auf irgend eine Weise vermindere. Vielleicht geschieht dieses in den Lymphdrüsen dadurch, daß etwas davon von dem Blute der Venen angezogen, und hierdurch, oder aus einem andern Grunde, in die Höhle der Venen abgefondert werde. Diese Vorstellung hat in der That auch deswegen viel für sich, weil es zweckmäßig scheint, daß bei dem wiederholten Durchgange der Lymph durch die Lymphdrüsen der dem Blute schon in einer Drüse ähnlicher gewordene Theil der Lymph, mit den noch nicht ver-

¹⁾ Abraham Kaau, *Perspiratio dicta Hippocrati per universum corpus anatomico illustrata.* Lugd. Batav. 1738. 8. §. 118. p. 54.

²⁾ E. Haies, *Haemastatique ou la statique des animaux; exp. hydrauliques faites sur des animaux vivans,* traduit par Sauvages, à Geneve 1744. 4. p. 62.

³⁾ Franc. Dan. Reisseisen, *De fabrica pulmonum commentatio a regia acad. scient. Berolinensi praemio ornata.* c. Tab. VI. Berolini 1822. Fol. p. 16.

120 Deffnen sich Lymphgefäße in viele Venenstämme?

ähnlichen nicht gemengt bleibe, und mit ihm gemeinschaftlich eine 2te, und oft eine 3te, oder sogar eine 4te Drüse durchläufe, sondern daß er vielmehr davon getrennt und allmählig durch eine aus den Lymphgefäßen in die Blutgefäße gehende Absonderung in das Blut gebracht werde.

Was die 3te Frage anlangt, ob sich die Lymphgefäßstämme in größere Venen an andern Stellen des Körpers, als an dem hinter dem Schlüsselbeine gelegenen, öffnen und endigen, so beweist der Umstand, daß die Mehrzahl der Lymphgefäße, und sogar solche, welche von dem vom Schlüsselbeine sehr entfernten Stellen, z. B. von den Füßen und von dem Hoden kommen, sich in den Ductus thoracicus begeben, und durch ihn erst auf einem so langen Umwege mit den Venen hinter dem Schlüsselbeine in Verbindung gebracht werden, offenbar, daß es nicht der Zweck der Natur sei, die Lymphge auf dem nächsten Wege in die Venen zu führen, vielmehr darf man wohl einen besonderen Zweck muthmaßen, warum hier erst hinter dem Schlüsselbeine Lymphgefäße von allen Stellen des Körpers zusammenkommen, um sich in die Venen einzumünden. Wenn es nun auch wirklich einzelne seltene Ausnahmen von der Regel gäbe, in welchen sich Lymphgefäße in die Vena cava inferior geöffnet hätten, so würde man unstreitig mit größtem Rechte diese für Naturspiele oder Abweichungen von der Regel halten, als dadurch die Annahme, daß ein allgemeinerer Zweck zu dem erwähnten Umwege der Lymphge Statt finde, für umgestoßen halten.

In der That aber sind die Beobachtungen, durch welche man bis jetzt eine offenbare Einmündung von Lymphgefäßen in die untere Hohlader oder in die Vena azygos zu beweisen gemeint hat, noch nicht von wichtigen Einwürfen frei.

Haller ¹⁾, der selbst dieser Meinung ist, führt zwar einige Anatomien an, die einen solchen Uebergang beobachtet haben, und neuerlich hat ihn Lippi ²⁾ nicht nur beschrieben, sondern auch mehrmals abgebildet. Indessen hat schon Haller gezeigt, daß die Beobachtungen der von ihm angeführten Schriftsteller nicht hinreichen, das zu beweisen, was sie beweisen sollen, und Lippi hat sich nicht gehörig vor der Täuschung sicher gestellt, der man bei dieser Art der Untersuchung häufig ausgesetzt ist, im Gegentheile enthält seine Schrift verschiedene vorläufige Behauptungen, und verdient keineswegs ein unbedingtes Zutrauen. Es ist nämlich zuweilen schwer, kleine Venen, welche aus den Lymphdrüsen austreten, von Lymphgefäßen zu unterscheiden. Da nun das Quecksilber, wie schon gesagt worden, innerhalb der Lymphdrüsen ziemlich leicht in die Venen übergeht, so kommt man in die Gefahr, solche aus den Lymphdrüsen hervortretende, mit Quecksilber gefüllte Venen für Lymphgefäße zu halten, die sich in die nächsten größeren Venenstämme begeben. Selbst Fohmann ³⁾, der doch auch der Meinung ist, daß sich kleine Lymphgefäße auch außerhalb der Lymphdrüsen in kleine Venen öffnen, hat nie bei dem Menschen außerhalb einer Lymphdrüse den Uebergang eines Lymphgefäßes in eine große Vene gesehen, und er erklärt daher die Lippischen Beobachtungen für Täuschungen von der Art, wie ich sie erwähnt habe. Lippi

1) Haller, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Lib. II. Sect. 3. §. 13.

2) Regolo Lippi, Illustrazioni fisiologiche e patologiche del sistema linfatico-chilifero mediante la scoperta di un gran numero di comunicazioni di esso col venoso. Firenze 1825. groß 4. Atlas mit 9 Steindrucktafeln in Fol. Tab. I—III.

3) Fohmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heidelberg 1827. 1. Bd.

Indessen ist diese Lage des Herzens, weil das Herz bei verschiedenen Menschen von verschiedener Größe, und sein Beutel unten an dem beweglichen Zwerchfelle angeheftet ist, nicht immer genau dieselbe. Denn beim Einathmen scheint das Herz mit dem Zwerchfelle ein wenig herabsinken, und beim Ausathmen wieder ein wenig heraufsteigen zu müssen, wiewohl die Bewegung des sehnigen Mittelpunktes des Zwerchfells nicht sehr beträchtlich sein mag, weil der Lage und Anfügung nach der hintere Theil dieser queren Scheidewand am meisten, der vorderste gar nicht, und der mittlere nur im mittleren Grade herauf- und herab bewegt werden kann, womit auch die von Morgagni und Portal an lebendig geöffneten Thieren gemachten Erfahrungen sehr wohl übereinstimmen, nach welchen sich der sehnige Mittelpunkt des Zwerchfells beim Athmen nur sehr wenig bewegt. Bei lebenden Menschen überzeugt man sich auch, daß sogar die Stellung des Körpers einen Einfluß auf die Lage des Herzens habe. Bei vielen Menschen fühlt man nämlich äußerlich den Herzschlag nicht, während sie auf dem Rücken oder auf der rechten Seite liegen, und hiermit stimmt das überein, was Morgagni bei Leuten beobachtete, daß das Herz, während der Mensch auf dem Rücken liegt, mit seinem breiten Ende und mit dem dasselbe bedeckenden Theile des Herzbeutels auf der Wirbelsäule aufliege, daß es sich aber, wenn der Kumpf vorwärts gebogen wird, mit seiner Spitze den Rippen nähere.

Gewicht des Herzens.

Das Gewicht des Herzens und das Verhältniß desselben zum Gewichte des ganzen Körpers ist ziemlich veränderlich. Robinson hat sich bemühet durch eine Anzahl Wägungen das mittlere Verhältniß zu finden. Nach Satorrini wiegt das Herz etwa 1 Pfund, nach Labor 10 Unzen. Bei Embrionen ist, wie Portal ¹⁾ und J. F. Meckel d. j. gefunden haben, das Herz im Verhältnisse zum Gewichte des ganzen Körpers sehr viel schwerer, und verhält sich zu demselben im 2ten und 3ten Monate der Schwangerschaft wie 1 zu 50, beim reifen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120 ²⁾. M. J. Weber ³⁾ in Bonn fand bei 2 Hingerichteten fast gleich langen (5 Fuß 6 Zoll 1 Lin. und 5 Fuß 8 Zoll 10 Lin. M.) Männern von 27 und 47 Jahren das Gewicht des Herzens nach abgeschnittenen Blutgefäßen fast gleich, nämlich 21 $\frac{1}{2}$ und 21 Loth, ungeachtet das Gehirn bei beiden ein sehr verschiedenes Gewicht hatte (nämlich 3 Pfunde (Medicinalpfunde?) und 16 $\frac{3}{4}$ Lothe, und 2 Pfunde und 21 Lothe). Bei dem erstern Verbrecher wurde auch das Gewicht des ganzen Körpers bestimmt, und 134 Pfund gefunden, so daß also das Herz $\frac{1}{150}$ des ganzen Körpers ausmachte.

Der Herzbeutel, Pericardium.

Das Herz ruht, bei der aufrechten Stellung des Menschen nicht mit seinem ganzen Gewichte auf dem Zwerchfelle, und zieht dabei auch nicht mit demselben an den großen, zu den Lungen übergehenden, oder in der Brusthöhle emporsteigenden Blutgefäßstämmen. Wenn wir auf dem Rücken liegen, so drückt es nicht mit seinem vollen Gewichte auf die Speiseröhre und auf die große Körperarterie, was sehr leicht nach-

¹⁾ A. Portal, Cours d'anatomie médicale etc. Paris 1804. 8. Tome III. p. 35.

²⁾ J. F. Meckel, Handbuch der menschl. Anatomie. B. 3. S. 44.

³⁾ M. J. Weber, in Rasse's Zeitschrift für die Anthropologie. 1825. Heft 3. S. 31. sq.

schwülsten zwischen der verletzten Stelle und den nächsten Sadrüsen, rotbe, durch die Haut durchschimmernde, zuweilen schmale Streifen entstehen sieht, welche in der Form und Lage mit den Gefäßen Aehnlichkeit haben, und weil dann meistens zugleich die Drüsen, zu welchen sich jene Saugadern begeben, anschwellen, so man, daß sich die Saugadern unter gewissen Umständen schnell den. Gendrin ¹⁾ hat einen Fall der Art mitgetheilt, in welchen den Zustand der Lymphgefäße und des benachbarten Zellgewebetomisch zu untersuchen Gelegenheit fand. Das Zellgewebe, von umgeben waren, war roth und verdichtet, und mehr oder weniger einer eiterartigen und blutigen Flüssigkeit getränkt. Die Gefäße wurden wegen ihrer Kleinheit nicht deutlich wahrgenommen, nur als röhrlche erhabene Fasern unterschieden. Derselbe (steller fand auch einmal bei einer an Entzündung des Bauchstorbenden Wöchnerin den Ductus thoracicus entzündet, die verdickt und den Anfang desselben in Vereiterung begriffen. Andral hat 2 Fälle der Art bekannt gemacht.

Astl. Cooper ²⁾ fand an 3 Stellen die Klappenpaare des thoracicus in Verschwärung, und denselben dadurch verschlossene demselben Aufsatze findet sich auch ein Fall verzeichnet, wo in Folge der Anschwellung eines Hoden die Lymphgefäße des Strangs geschwollen, ihre Wände verdickt, und in gewissen Entfernungen mit kleinen Knoten versehen fand, welche durch ein Zeit Klappen entstanden waren.

Mehrere andere Fälle, in welchen Cruikshank, Masci Affalini, Walter, Poncy, Hopfengärtner, Rasse, Allobstein, den Ductus thoracicus durch geronnene Lymphe oder verwachsen fanden, und die man von Otto ³⁾ verzeichnet will ich hier nicht erwähnen.

Sehr oft findet man die Lymphgefäße sehr erweitert, womit ein gewisser Grad der Verstopfung der Lymphdrüsen verbunden ist deren Lymphgefäße das Quecksilber nach Mascagni's Behauptung schwer oder gar nicht durchgeht, aber bei Anwendung einiger Ge-

¹⁾ A. N. Gendrin, Anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folge und mit Nachträgen und mit einem Register vermehrt von Radius, Th. II 1829. 8. S. 69. 70.

²⁾ Andral, in Arch. gén. de Méd. Tome VI. p. 503.

³⁾ Astley Cooper, in Medical record, et researches from the papers of a medical association. London 1798. Vol. I. p. 28. und bei Gendrin a p. 72.

⁴⁾ A. W. Otto, Lehrbuch der pathologischen Anatomie. Berlin 1830. S. 359.

das Zellgewebe und in die Venen übertritt. Daher eignen sich auch Leichname mit sehr erweiterten und mit verhärteten Lymphgefäßen oft nicht zum Einspritzen des Quecksilbers. Zuweilen enthalten die Lymphgefäße in der Nähe großer Eiteransammlungen Eiter, in der Nähe großer Blutausströmungen Blut, und in der Leber, bei Verstopfung der Gallengänge, nach *Assalini*, *Saunders*, *Mascagni* und *Sömmerring*, Galle. In der Nähe von Knochengeschwülsten (zuweilen aber auch wo sie nicht vorhanden waren), fand man in Saugadern, oder in dem Ductus thoracicus Kalkerde, und zwar manchmal in solcher Menge, daß die Saugadern dadurch verstopft wurden. *Otto* führt in dieser Hinsicht die Beobachtungen von *Portal*, *Cheston*, *J. G. Walter*, *Schreger*, *Mascagni*, *Assalini*, *Goodlad* und *Scarpa* an. Bei Strinarbeitern, welche viel Staub einathmen, scheint derselbe nach *Sömmerring* und *Portal* in den Lungen eingesogen und in die Bronchialdrüsen abgesetzt zu werden. Vielleicht rührt die schwarze Farbe, welche in großer Menge zwischen den Lappchen der Lungen nicht mehr jugendlicher Menschen, und in noch größerer Menge in den Bronchialdrüsen enthalten ist, von einem zerfetzten, von den Saugadern aufgesogenen und in die Bronchialdrüsen abgesetzten vegetabilischen Staube her. *Andral* ¹⁾ hat indessen in vielen Fällen, wo er es erwartete und darnach suchte, niemals Eiter und Blut in den Lymphgefäßen gefunden, so daß er sogar an der Richtigkeit der von *Cruikshank*, *Mascagni*, *Sömmerring* und *Saunders* gemachten Beobachtungen zweifelt.

Die mannichfaltigen krankhaften Veränderungen, welche die Lymphdrüsen erleiden können, die man entzündet, vergrößert, vereitert, verhärtet, verstopft, und also für Flüssigkeiten, die in den Lymphgefäßen vorwärts bewegt werden, schwer durchgänglich, erdige Concretionen enthaltend, und mit einer der Consistenz und Farbe nach dem Käse ähnlichen Substanz erfüllt findet, kann hier nicht die Rede sein ²⁾.

¹⁾ *Andral*, in *Magendie Journal de Physiol. exp.* 1822. Cah. 3. p. 279. Siehe *Gerson* und *Julius Magaz. d. ausländischen Lit.* 1823. März 281.

²⁾ Ich verweise auch in dieser Hinsicht auf *Otto's* Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere, Bd. 1. Berlin 1830 8. S. 364 sq. und auf die reichhaltige, daselbst angeführte Literatur, und führe nur einige neue, hierher gehörige Schriften an: *S. Th. Soemmerring*, de morbis vasorum absorbentium corporis humani. Francofurti 1793. 8. — *Gilbert*, Essai sur le système lymphatique dans l'état de santé et de maladie. Paris 1804. — *Attenhofer*, Lymphatologie, oder Abhandlungen über das lymphatische System und dessen Leiden. Wien 1808. — *W. Goodlad*, a practical essay on the diseases of the vessels and glands of the absorbent system. London 1814. 8. — *Andral's* und *Gendrin's* angeführte Schriften.

Das Herz. Cor.

Gestalt und Lage des Herzens.

Das Herz ist eine hohle, von häutigen und fleischigen Wänden umgebene, sackförmige Erweiterung an den größten Blut führenden Röhren des Körpers, welche durch Scheidewände in 4 Höhlen eingetheilt, in einem geschlossenen serösen Sacke, dem Herzbeutel, pericardium, eingehüllt, und im unteren und mittleren Theile der Brusthöhle aufgehängt ist.

Es liegt nicht genau in der Mittellinie, sondern schief. Es ist nämlich an seinem oberen und nach rechts und hinten gewendeten Ende breit, am unteren, nach links und vorn gekehrten spitz. Es ist aber nicht kegelförmig, denn die Abschnitte desselben, welche entstehen, wenn man es quer durchschneidet, sind nicht genau kreisförmig. Vielmehr hat es eine etwas abgeplattete, auf der unteren, sehr beweglichen Wand der Brusthöhle, auf dem Zwerchfelle, aufliegende und eine convexe gewölbte, nach oben gekehrte Seite, und diese beiden Seiten stoßen durch 2 stumpfe, abgerundete Ränder, durch den vorderen und den hinteren Rand an einander, welche vorn und nach links in der Spitze zusammenlaufen.

Bei den Säugethieren, bei welchen in der gewöhnlichen Stellung das Brustbein nach abwärts gekehrt ist, ruht das Herz auf dem Brustbein in der mittleren Ebene, durch welche man sich den ganzen Körper in 2 gleiche Hälften getheilt denken kann, und kehrt seine Spitze nach der Mitte des vorderen Theiles des Zwerchfells, berührt aber dasselbe bei den meisten Säugethieren nicht. Bei dem zum aufrechten Gange bestimmten Menschen aber, bei welchem in der gewöhnlichen Stellung das Brustbein vorwärts gekehrt ist, und das Zwerchfell die tiefste Stelle der Brusthöhle ausmacht, liegt das Herz mit seiner ganzen platten Seite auf dieser gekrümmten muskulösen Scheidewand, und nimmt einen größeren Theil der linken als der rechten Hälfte der Brusthöhle ein, denn seine breitere, nach hinten und zugleich ein wenig nach oben und rechts gewendete Seite erstreckt sich nicht weit in die rechte Hälfte der Brusthöhle hinüber, während die Spitze und der nächste Theil des Herzens, welche zusammen wohl $\frac{2}{3}$ desselben ausmachen, ganz in der linken Hälfte der Brusthöhle liegen. Das breitere Ende liegt demnach hinter dem rechten Rande des Brustbeins, und reicht von der Befestigung des Zwerchfells am unteren Theile des Brustbeins ungefähr bis zu der Gegend empor, wo die Knorpel der 4ten und 5ten Rippe sich mit dem Brustbeine verbinden, und der hinterste Theil desselben befindet sich hier in der Gegend des 8ten Brustwirbels ziemlich nahe an der Wirbelsäule, von der er durch die Speiseröhre und Aorta und durch diese Organe überziehenden Theil des Herzbeutels getrennt ist. Der unterste Theil der Spitze des Herzens liegt bei Todten ungefähr in der Höhe des äußeren Theiles des Knorpels der 6ten Rippe, oder des Zwischenraums, welcher zwischen ihm und dem folgenden Knorpel befindlich ist. Beim Lebenden, wo die Spitze während der Zusammenziehung eine kleine Bewegung aufwärts und vorwärts zu machen scheint, schlägt sie ungefähr zwischen der 5ten und 6ten Rippe an einer Stelle an, welche zwischen der Mittellinie des Brustbeins und dem Seitenrande der Brust ziemlich in der Mitte liegt.

Indeffen ist diese Lage des Herzens, weil das Herz bei verschiedenen Menschen von verschiedener Größe, und sein Beutel unten an dem beweglichen Zwerchfelle angeheftet ist, nicht immer genau dieselbe. Denn beim Einathmen scheint das Herz mit dem Zwerchfelle ein wenig herabsinken, und beim Ausathmen wieder ein wenig heraufsteigen zu müssen, wiewohl die Bewegung des schnigen Mittelpunktes des Zwerchfells nicht sehr beträchtlich sein mag, weil der Lage und Anfügung nach der hintere Theil dieser queren Scheidewand am meisten, der vorderste gar nicht, und der mittlere nur im mittleren Grade herauf- und herabbewegt werden kann, womit auch die von Morgagni und Portal an lebendig geöffneten Thieren gemachten Erfahrungen sehr wohl übereinstimmen, nach welchen sich der schnigte Mittelpunkt des Zwerchfells beim Athmen nur sehr wenig bewegt. Bei lebenden Menschen überzengt man sich auch, daß sogar die Stellung des Körpers einen Einfluß auf die Lage des Herzens habe. Bei vielen Menschen fühlt man nämlich äußerlich den Herzschlag nicht, während sie auf dem Rücken oder auf der rechten Seite liegen, und hiermit stimmt das überein, was Morgagni bei Leuten beobachtete, daß das Herz, während der Mensch auf dem Rücken liegt, mit seinem breiten Ende und mit dem dasselbe bedeckenden Theile des Herzbeutels auf der Wirbelsäule aufsteige, daß es sich aber, wenn der Kumpf vorwärts geneigt wird, mit seiner Spitze den Rippen nähere.

Gewicht des Herzens.

Das Gewicht des Herzens und das Verhältniß desselben zum Gewichte des ganzen Körpers ist ziemlich veränderlich. Robinson hat sich bemühet durch eine Anzahl Wägungen das mittlere Verhältniß zu finden. Nach Satorini wiegt das Herz etwa 1 Pfund, nach Labor 10 Unzen. Bei Emmonen ist, wie Portal¹⁾ und J. F. Meckel d. j. gefunden haben, das Herz in Verhältniß zum Gewichte des ganzen Körpers sehr viel schwerer, und verhält sich zu demselben im 2ten und 3ten Monate der Schwangerschaft wie 1 zu 10, beim reifen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120 (M. J. Weber²⁾ in Bonn fand bei 2 Hingerichteten fast gleich langen (5 Fuß 6 Zoll Lin. und 5 Fuß 8 Zoll Rhnl. M.) Männern von 27 und 47 Jahren das Gewicht des Herzens nach abgeschnittenen Blutgefäßen fast gleich, nämlich 21½ und 21 Loth, ungeachtet das Gehirn bei beiden ein sehr verschiedenes Gewicht hatte (nämlich 3 Pfunde (Medicinalpfunde?) und 16¾ Lothe, und 2 Pfunde und 21 Lothe). Bei dem erstern Verbrecher wurde auch das Gewicht des ganzen Körpers bestimmt, und 134 Pfund gefunden, so daß also das Herz $\frac{1}{150}$ des ganzen Körpers ausmachte.

Der Herzbeutel, Pericardium.

Das Herz ruht, bei der aufrechten Stellung des Menschen nicht auf seinem ganzen Gewichte auf dem Zwerchfelle, und zieht dabei auch mit demselben an den großen, zu den Lungen übergehenden, oder der Brusthöhle emporsteigenden Blutgefäßstämmen. Wenn wir auf dem Rücken liegen, so drückt es nicht mit seinem vollen Gewichte auf die Speiseröhre und auf die große Körperarterie, was sehr leicht nach-

¹⁾ A. Portal, Cours d'anatomie médicale etc. Paris 1804. 8. Tome III. p. 35.

²⁾ J. F. Meckel, Handbuch der menschl. Anatomie. B. 3. S. 44.

³⁾ M. J. Weber, in Rasse's Zeitschrift für die Anthropologie. 1825. Heft 3. S. 31. 19.

theilige Folgen gehabt haben würde, und eben so wenig übt es einen nachtheiligen Druck auf die neben ihm gelegenen Lungen aus, wenn wir uns auf die eine oder auf die andere Seite legen; umgekehrt aber erfährt es auch bei seiner Bewegung kein beträchtliches Hinderniß von den benachbarten Organen, denn es ist in einem, in der Brusthöhle befestigten und ausgedehnten, inwendig glatten serösen Beutel aufgehängt, und wird gewissermaßen schwebend erhalten.

Es befinden sich nämlich in der Brusthöhle außer dem unten und in der Mitte gelegenen Herzbeutel noch 2 seröse, zu beiden Seiten liegende große Säcke, die Brustfellsäcke, welche mit einem großen Theile ihrer Oberfläche oben, unten und seitwärts an den Wänden der Brusthöhle, die sie überziehen, angewachsen sind ¹⁾. Der Theil dagegen, welchen diese 2 Säcke einander zuzuföhren, ist zwischen der vorderen und hinteren, so wie auch zwischen der unteren Wand und dem oberen spitzen Ende der Brusthöhle ausgespannt, und bildet 2 durch die ganze Länge der Brusthöhle gehende Scheidewände, die sich in der Regel nirgends beröhren, sondern oben und vorn, wo sie einander am nächsten sind, vorzüglich durch Zellgewebe und Fett, oben und nach hinten zu durch die großen Blutgefäßstämme, die Speise- und die Luftröhre, endlich unten durch das in seinem Herzbeutel eingeschlossene Herz von einander getrennt werden.

Der Herzbeutel, welcher unten ziemlich die Gestalt des Herzens hat, aber größer ist, liegt also zwischen diesen beiden Scheidewänden, und ist, so weit er sie beröhrt, in allen Punkten mit ihnen durch Zellgewebe verbunden. Unten liegt er mit dem Theile, welcher der platten Seite des Herzens entspricht, auf der gewölbten Fläche des Zwerchfells angeheftet, und überzieht den vorderen und mittleren, größtentheils sehnigen, von den Brustfellsäcken nicht bedeckten Theil desselben. Dieser Theil des Zwerchfells ist größer als die platte Seite, und folglich größer als der größte Umfang des Herzens. Der Herzbeutel hängt hier bei Erwachsenen dem Zwerchfelle ziemlich fest an. Es beugen sich sogar Fasern, die bei älteren Personen ein sehniges Ansehen und große Festigkeit haben, vom Zwerchfelle zu dem nicht an ihm angewachsenen Theile des Herzbeckels hinauf, überziehen ihn und machen seine Haut, die schon durch Zellgewebe verstärkt ist, dicker, die daher inwendig serös, äußerlich aber von festem Zellgewebe bedeckt, und bei Erwachsenen vielleicht sogar in einigem Grade sehnig ist. Bei Embryonen und Kindern hängt der Herzbeutel nicht so fest mit dem Zwerchfelle zusammen, und er ist

¹⁾ Siehe N. F. Otto, von der Lage der Organe in der Brusthöhle, als Einladungsprogramm zc. Breslau 1829. 4. mit 5 Kupfern Steinbrud.

daher bei ihnen nicht so dick und sehnig. Zwischen dem Brustbeine und dem Herzbeutel befindet sich sehr lockeres, nachgiebiges Zellgewebe. Auf diese Weise wird nun der Herzbeutel durch jene 2 von den beiden Brustfellblättern gebildeten Scheidewände und durch das Zwerchfell in seiner Lage und ausgespannt erhalten, und da diese 2 Säcke zuweilen nicht gleich groß sind, sondern der rechte sich weiter nach der Mittellinie des Brustbeins zu erstreckt als der linke, und der linke Brustfellsack nebst der linken Lunge so gestaltet ist, daß er Platz für den Herzbeutel und das Herz übrig läßt, so liegt der Herzbeutel eben so wie das Herz mehr in der linken Seite der Brusthöhle, als in der rechten. Oben erstreckt er sich aber beträchtlich höher hinauf, als das Herz, ungefähr bis zur 2ten Rippe und bis zum Handgriffe des Brustbeins; denn er bedeckt daselbst nicht nur das Herz, sondern auch die mit dem dicken Ende des Herzens in Verbindung stehenden großen Blutgefäßstämme, namentlich das Stück der Vena cava superior bis an die Stelle, wo die Vena azygos in sie hineingeht, die A. Aorta vorn bis in die Nähe des Ursprungs der A. anonyma, hinten (jedoch nicht so hoch herauf,) die A. pulmonalis gemeinschaftlich mit der Aorta, ohne zwischen beide Gefäße einzubringen, ferner die Lungenvenen der linken und rechten Seite und den zwischen ihnen gelegenen oberen Theil des linken Vorhofs, endlich die untere Hohlvene und den unteren Ast der rechten Lungenarterie.

Von allen diesen Stellen aus schlägt sich der Herzbeutel gegen das Herz um, überzieht es, und stellt also einen überall geschlossenen Sack dar, von welchem das obere Ende in die Höhle des untern hineingestülpt ist, ungefähr wie die eine Hälfte des Sackes einer Schlafmütze in die andere hineingeschoben wird. Das Herz ruht in diesem umgestülpten Theile desselben, füllt die nach oben offenstehende Höhle desselben aus, wird von ihm fest überzogen, und erhält daher, so wie auch der nächste Theil der großen Blutgefäßstämme, eine äußere Haut von ihm. Läßt man in den Herzbeutel Luft, so kann man die Stelle, wo sich der Herzbeutel an die großen Blutgefäße anlegt, und sie und das Herz zu überziehen anfangt, sehen. Schneidet man ihn auf, so sieht man, wie sich der umschlagende Theil des Herzbeutels zwischen die verschiedenen, mit dem Herzen zusammenhängenden Röhren hineinschlägt, und daher manche ringsum oder fast ringsum überzieht, 1. B. die rechten Lungenvenen, die linken Lungenvenen, den rechten Ast der Lungenarterie, die Vena cava inferior, und die Vena cava superior, manche aber, 3. B. die Aorta und den Stamm der Arteria pulmonalis, nicht einzeln, sondern gemeinschaftlich umgiebt, und sich also auch nicht zwischen sie hineinschlägt. Der an der Aorta sich umschlagende Theil des Herzbeutels ist der oberste Theil desselben. Hinten hängt dieser Theil den hinter der Aorta liegenden Luftröhrenast an. Nicht bei allen Leichnamen schlägt sich aber der Herzbeutel genau an derselben Stelle der großen Gefäßstämme um. Bei manchen Menschen überzieht er ein größeres, bei anderen ein kleineres Stück derselben.

Läge das Herz so im Herzbeutel, daß es von einem am unteren Theile des Herzbeutels gebildeten Umschlage überzogen würde, so würde es mit seinem ganzen Gewichte auf dem Zwerchfelle aufliegen, und nicht ein Theil seiner Last durch den Herzbeutel unterstützt und getragen werden, und dadurch in seiner Bewegung mehr

gehindert sein. Der zwischen den Brustfellsäcken und dem Zwerchfelle an gespannte Herzbeutel verhindert aber auch zugleich den Druck der Lungen an das Herz, und den des Herzens auf die Lungen; und weil der freie und der angewachsene Theil des Herzbeutels, wie jede seröse Haut, an der nach der Hin zugekehrten Oberfläche glatt und schlüpfrig ist, so gleitet die schlüpfrige Oberfläche des Herzens an der des Beutels ohne ein großes Hinderniß hin und her. Der umgeschlagene und am Herzen angewachsene Theil des Herzbeutels ist viel dünner und durchsichtiger, als der freie nicht angewachsene denn er ist nicht wie dieser durch eine dicke Lage dichten Zellgewebes und durch sehnige Fasern verstärkt.

Der den Herzbeutel während des Lebens erfüllende, von den Blutgefäßen desselben ausgehauchte Dunst scheint sich schon während des Lebens in geringer Menge, in größerer aber nach dem Tode zu Herzbeutelwasser, liquor pericardii, zu verdichten. Man findet etwa einen Theelöffel oder einen halben oder ganzen Eßlöffel voll, bei manchen Todesarten, ohne eine vorausgegangene Krankheit des Herzbeutels, and beträchtlich mehr davon. Während des Lebens aber scheint in ihm viel weniger, indessen meistens doch etwas tropfbare Flüssigkeit vorhanden zu sein. Litzke tödtete viele Hunde sehr schnell, indem er ihnen den Kopf abschchnitt, und untersuchte sogleich, ob ihr Herzbeutel tropfbare Flüssigkeit enthielt, und fand immer etwas Herzbeutelwasser. Portal fand bei Thieren, die er sehr schnell tödtete, entweder sehr wenig oder auch gar keins. Bei jungen Thieren aber mehr als bei alten Thieren, was mit Duverney's und Haller's Beobachtung übereinstimmt, nach welchen der Herzbeutel des menschlichen Fetus weit mehr Wasser als der der Erwachsenen enthält. Das Herzbeutelwasser ist auch bei jungen Thieren röthlicher, als bei alten. Die Flüssigkeit selbst scheint nach Werzelius die Natur des Blutwassers zu haben, dem der größte Theil seines Gehalts an Eiweiß entzogen worden. Es nützt der Dunst, durch dessen Verdichtung es entsteht, indem er die Oberfläche des Herzens und des Herzbeutels schlüpfrig macht, und das Verwachsen beider verhütet. Hieraus sieht man auch, wie wichtig es ist, daß die Haut des Herzbeutels so dicht, undurchbringlich und überall geschlossen sei, damit das Herzbeutelwasser nicht ins Zellgewebe dringe und abfließe. Im Gegentheile aber befördert die abgesonderte Flüssigkeit des Herzbeutels, weil sie viel Faserstoff enthält, und also die Natur der gerinnbaren Lymphe annimmt, das Verwachsen. Unter solchen Umständen verschwindet zuweilen die Höhle des

¹⁾ Man darf sich nicht vorstellen, man könne durch ein vorsichtiges Präpariren wirklich den Herzbeutel von der Oberfläche der großen Gefäßstämme und des Herzens so los schälen, daß er sich als ein unverletzter geschlossener Sack darstelle; denn hinter den großen Arterien über den Atrien und vor den Lungenvenen befindet sich ein von der serösen Haut desselben ausgekleideter Zwischenraum. Man kann in der Höhle des auf geschnittenen Herzbeutels hinter der Aorta und pulmonalis mit dem gekrümmten Fingere herumgreifen. Sollte sich der Herzbeutel unverletzt abziehen lassen, so müßte in die ser Deffnung eine Scheidewand befindlich sein. Man muß sich daher den eingestülpte Theil des Herzbeutels nicht als die Hälfte eines einfachen Stückes vorstellen, sondern ihn sich so denken, als ob quer durch denselben ein Canal durchginge, der an beiden Seiten des umgeschlagenen Theiles des Herzens der Höhle des Herzbeutels offen steht. Dieser Canal geht hinter der Aorta und A. pulmonalis und vor den Lungenvenen und Atrien hindurch.

Herzbeutels gänzlich, indem die beiden Abtheilungen desselben, der angewachsene und der freie, zusammenleben und mit einander verwachsen, so daß Ungeübte sogar auf den Gedanken kommen können, der Herzbeutel fehle ganz, was nur in höchst seltenen Fällen, deren Verzeichniß Otto gegeben hat, Statt findet, z. B. bei Mißbildungen, vermöge deren das Herz frei zur Brusthöhle herabhängt. So wie der Herzbeutel allen Wirbeltieren zukommt, so scheint auch im Vorhandensein einen wesentlichen Vortheil für die Bewegung des Herzens zu haben, und es ist eine Sache der Pathologie, zu zeigen, welche Störungen in den Fällen beobachtet werden, in welchen die Hülle des Herzbeutels verschwindet.

Die Schlagadern des Herzbeutels kommen von den Arteriis *ammariis internis*, *pericardiaco-phrenicis*, *phrenicis*, *mediastinis*, *thymicis*, *bronchialibus*, *oesophageis*, theils auch aus der Aorta selbst; die Venen gehen in die gleichnamigen zurück.

Saugadern des Herzbeutels gehen theils zu den Drüsen, welche der Mittelhaut, theils zu denen, welche im obern Theile der Brust liegen.

Ob der Herzbeutel von den Nerven, welche durch ihn zum Herzen gehen, selbst Fäden erhalte, ist noch zweifelhaft ¹⁾. Empfindlichkeit der Herzbeutel wenig oder gar nicht gezeigt ²⁾.

Um sich eine Uebersicht über die Lage und Bestimmung der 4 Höhlen des Herzens, über ihre Oeffnungen, über deren Zusammenhang mit den benachbarten großen Blutgefäßen zu verschaffen, dienen folgende Betrachtungen.

Die äußerlich sichtbare Längenfurche, die Quersfurche und die Eintheilung des Herzens durch dieselben in vier Abtheilungen.

Schon von außen nimmt man auf beiden Oberflächen des Herzens, wenn es angefüllt ist, eine Spur der in ihm liegenden Scheidewand als eine von der Spitze des Herzens bis zu seinem breiten Ende verlaufende, gekrümmte Längenfurche wahr, welche nicht ganz in der Mitte der beiden Oberflächen liegt. Sie ist die Gränze der beiden Hälften des Herzens. Eine viel tiefere Quersfurche bildet die Gränze zwischen dem am dicken Ende gelegenen häutigen und dem übrigen fleischigen Theile des Herzens.

Da, wo diese Quersfurche äußerlich sichtbar ist, finden sich inwendig 2 ringförmige Vorsprünge, und die von ihnen umgebenen Oeffnungen

¹⁾ Haller sagt (*Elem. phys.* I. p. 280.): „in eo sacco pauci manere videntur, neque satia noti“; und auch nach Walters Untersuchungen gehört der Herzbeutel zu den Theilen, welche keine Nerven enthalten. (*tabb. nervor. thor. et abd.* Praef. p. 2.

²⁾ Haller, *elem. physiol.* I. p. 280.

Das Herz. Cor.

Gestalt und Lage des Herzens.

Das Herz ist eine hohle, von häutigen und fleischigen Wänden umgebene, sackförmige Erweiterung an den größten Blut führenden Röhren des Körpers, welche durch Scheidewände in 4 Höhlen eingetheilt in einem geschlossenen serösen Sacke, dem Herzbeutel, pericardium eingehüllt, und im unteren und mittleren Theile der Brusthöhle aufgehängt ist.

Es liegt nicht genau in der Mittellinie, sondern schief. Es ist nämlich an seinem oberen und nach rechts und hinten gewendeten Ende breit, unteren, nach links und vorn gekehrten spit. Es ist aber nicht kegelförmig, denn die Abschnitte desselben, welche entstehen, wenn man es durchschneidet, sind nicht genau kreisförmig. Vielmehr hat es etwas abgeplattete, auf der unteren, sehr beweglichen Wand der Brusthöhle, auf dem Zwerchfelle, aufliegende und eine concave gewölbte, oben gekehrte Seite, und diese beiden Seiten stoßen durch 2 stumpf abgerundete Ränder, durch den vorderen und den hinteren Rand an einander, welche vorn und nach links in der Spitze zusammenlaufen.

Bei den Säugethieren, bei welchen in der gewöhnlichen Stellung das Brustbein nach abwärts gekehrt ist, ruht das Herz auf dem Brustbeine in der ersten Ebene, durch welche man sich den ganzen Körper in 2 gleiche Hälften theilen kann, und kehrt seine Spitze nach der Mitte des vorderen Theiles des Zwerchfells, berührt aber dasselbe bei den meisten Säugethieren nicht. Dem zum aufrechten Gange bestimmten Menschen aber, bei welchem in der wöhnlichen Stellung das Brustbein vorwärts gekehrt ist, und das Zwerchfell die tiefste Stelle der Brusthöhle ausmacht, liegt das Herz mit seiner ganzen platten Seite auf dieser gekrümmten muskulösen Scheidewand, und nimmt einen großen Theil der linken als der rechten Hälfte der Brusthöhle ein, denn sein breites nach hinten und zugleich ein wenig nach oben und rechts gewendetes Ende erstreckt sich nicht weit in die rechte Hälfte der Brusthöhle hinüber, während die obere und der nächste Theil des Herzens, welche zusammen wohl $\frac{2}{3}$ desselben ausmachen ganz in der linken Hälfte der Brusthöhle liegen. Das breitere Ende liegt 1 Zoll nach hinter dem rechten Rande des Brustbeins, und reicht von der Befestigung des Zwerchfells am unteren Theile des Brustbeins ungefähr bis zu der 5ten Rippe empor, wo die Knorpel der 4ten und 5ten Rippe sich mit dem Brustbein verbinden, und der hinterste Theil desselben befindet sich hier in der Gegend des Brustwirbels ziemlich nahe an der Wirbelsäule, von der er durch die Speiseröhre und Aorta und durch diese Organe überziehende Theil des Herzbeutels trennt ist. Der unterste Theil der Spitze des Herzens liegt bei Todten ungefähr in der Höhe des äußeren Theiles des Knorpels der 6ten Rippe, oder des Zwischenraums, welcher zwischen ihm und dem folgenden Knorpel befindlich ist. Bei Lebenden, wo die Spitze während der Zusammenziehung eine kleine Bewegung aufwärts und vorwärts zu machen scheint, schlägt sie ungefähr zwischen der 5ten und 6ten Rippe an einer Stelle an, welche zwischen der Mittellinie des Brustbeins und dem Seitenrande der Brust ziemlich in der Mitte liegt.

Indessen ist diese Lage des Herzens, weil das Herz bei verschiedenen Menschen von verschiedener Größe, und sein Beutel unten an dem beweglichen Zwerchfelle angeheftet ist, nicht immer genau dieselbe. Denn beim Einathmen scheint das Herz mit dem Zwerchfelle ein wenig herabsinken, und beim Ausathmen wieder ein wenig heraufsteigen zu müssen, wiewohl die Bewegung des sehnigen Mittelpunktes des Zwerchfells nicht sehr beträchtlich sein mag, weil der Lage und Anfügung nach der hintere Theil dieser harten Scheidewand am meisten, der vorderste gar nicht, und der mittlere nur im mittleren Grade herauf- und herabbewegt werden kann, womit auch die von Morgagni und Portal an lebendig geöffneten Thieren gemachten Erfahrungen sehr wohl übereinstimmen, nach welchen sich der sehnige Mittelpunkt des Zwerchfells beim Athmen nur sehr wenig bewegt. Bei lebenden Menschen überzeugt man sich auch, daß sogar die Stellung des Körpers einen Einfluß auf die Lage des Herzens habe. Bei vielen Menschen fühlt man nämlich äußerlich den Herzschlag nicht, während sie auf dem Rücken oder auf der rechten Seite liegen, und hiermit stimmt das überein, was Morgagni bei Thieren beobachtete, daß das Herz, während der Mensch auf dem Rücken liegt, in seinem breiten Ende und mit dem dasselbe bedeckenden Theile des Herzbeckens auf der Wirbelsäule aufsteige, daß es sich aber, wenn der Kumpf vorwärts geneigt wird, mit seiner Spitze den Rippen nähert.

Gewicht des Herzens.

Das Gewicht des Herzens und das Verhältniß desselben zum Gewichte des ganzen Körpers ist ziemlich veränderlich. Robinson hat sich mühet durch eine Anzahl Wägungen das mittlere Verhältniß zu finden. Nach Sartonini wiegt das Herz etwa 1 Pfund, nach Labor 10 Unzen. Bei Empsoner ist, wie Portal¹⁾ und J. F. Meckel d. j. gefunden haben, das Herz zu Verhältniß zum Gewichte des ganzen Körpers sehr viel schwerer, und verhält sich zu demselben im 2ten und 3ten Monate der Schwangerschaft wie 1 zu 1, beim reifen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120. M. J. Weber²⁾ in Bonn fand bei 2 Hingerichteten fast gleich langen (5 Fuß 6 Zoll Lin. und 5 Fuß 8 Zoll Rhnl. M.) Männern von 27 und 47 Jahren das Gewicht des Herzens nach abgeschnittenen Blutgefäßen fast gleich, nämlich 21 $\frac{1}{2}$ und 21 Loth, ungeachtet das Gehirn bei beiden ein sehr verschiedenes Gewicht hatte (nämlich 3 Pfunde (Medicinalpfunde?) und 16 $\frac{3}{4}$ Lothe, und 2 Pfunde und 21 Lothe). Bei dem erstern Verbrecher wurde auch das Gewicht des ganzen Körpers bestimmt, und 134 Pfund gefunden, so daß also das Herz $\frac{1}{150}$ des ganzen Körpers ausmachte.

Der Herzbeutel, Pericardium.

Das Herz ruht, bei der aufrechten Stellung des Menschen nicht auf seinem ganzen Gewichte auf dem Zwerchfelle, und zieht dabei auch mit demselben an den großen, zu den Lungen übergehenden, oder der Brusthöhle emporsteigenden Blutgefäßstämmen. Wenn wir auf dem Rücken liegen, so drückt es nicht mit seinem vollen Gewichte auf die Speiseröhre und auf die große Körperarterie, was sehr leicht nach-

¹⁾ A. Portal, Cours d'anatomie médicale etc. Paris 1804. 8. Tome III. p. 35.

²⁾ J. F. Meckel, Handbuch der menschl. Anatomie. B. 3. S. 44.

³⁾ W. S. Weber, in Rasse's Zeitschrift für die Anthropologie. 1825. Heft 3. S. 31. sq.

Cirkelfasern, und in den Venen von Zellgewebe und eingestreueten zar Längfasern umgeben ist, wird sie an der erweiterten Stelle, die das Herz bildet, von Fleischfasern, durch welche sie mit beträchtlicher Kraft verengert werden kann, und von dem angewachsenen Theile des Herzsackes umgeben. Diese Fleischfasern sind von doppelter Art. Man findet Fleischfasern erstrecken sich von der einen Erweiterung, durch welche das dunkelrothe Blut fließt, auf die andere hinüber, durch welche das hellrothe Blut bewegt wird, und sind also gemeinschaftliche Fleischfasern beider Herzhälften; andere gehören nur einer an. So hat z. B. die Vorammer ihre besondern, und beide haben auch gemeinschaftliche Fleischfasern, und eben so verhält es sich auch bei den Kammern. Indessen sind diese 2 Classen von Fleischfasern nicht lagenweise von einander trennt, sondern unter einander verschmolzen, verflochten und oft schwer zu unterscheiden. Aber die Vorammern und Herzkammern haben keine gemeinschaftlichen Fleischfasern, denn diese hängen nur durch Zellgewebe unter einander zusammen; daher trennen sich auch die Vorammern nach Vieutaud¹⁾, durch langes Kochen gänzlich von den Kammern weil sich diese aus Zellgewebe und etwas knorpelartiger Materie bestehende Verbindung zu Leim auflöst. Unstreitig hängt es mit dieser Einrichtung, vermöge welcher zwar beide Vorammern unter einander, und so auch beide Kammern durch gemeinschaftliche Fleischfasern verbunden sind, keine Fleischfasern aber von einer Vorammer ohne Unterbrechung auf eine Kammer übergehen, ab, daß während des Lebens sich beide Vorammern gleichzeitig und eben so sich auch beide Kammern gleichzeitig, die Kammern und Vorammern aber abwechselnd zusammenziehen.

Der Vorhof, oder was dasselbe ist, die obere Abtheilung der rechten und der linken Herzhälfte, ist nicht bestimmt, das Blut mit sehr großer Kraft und sehr weit fortzutreiben. Denn das Blut geht aus ihm in die unter und vor ihr liegende Kammer über, welche er anfüllt, dem er sich entleert. Hierzu reicht der Druck, den die viel dünnere Lage von Fleischfasern, von der er umgeben ist, hervorbringen kann. Die Vorammern, welche also nur von einer dünnen Lage Fleischfasern umgeben sind, besitzen nur dünne häutige, nicht dicke sehr fleischige Wände, und da, wo beide mit ihrer einen Seite an einander stoßen, entsteht auch dadurch eine dünne häutige Scheidewand, septum atriorum. Die Vorammern fallen auch aus diesem Grunde, wegen der geringen Steifigkeit ihrer Wände, zusammen, und sie nicht durch die in ihnen enthaltene Flüssigkeit ausgedehnt erhalten werden.

Die Kammer, d. h. die untere Abtheilung der rechten und der linken Herzhälfte ist dagegen bestimmt, das Blut mit sehr großer Kraft und weit fortzudrücken.

¹⁾ Joseph Vieutaud's Zerlegerkunst nach der neuesten, von Portal veranlaßten Ausgabe, übers. B. I. Leipzig 1782. S. 611.

Dem die linke Herzkammer schiebt die, alle Körperarterien erfüllende, bis in das sehr enge Haargefäßnetz aller Theile des Körpers reichende, hellrothe Blutssäule durch dieses Netz hindurch allmählig in die Körpervenen vorwärts, und auf ähnliche Weise drückt die rechte Vorkammer die, die Lungenarterie und alle Lungenarterienäste erfüllende, bis in das Haargefäßnetz aller Lungenläppchen reichende dunkelrothe Blutssäule durch dieses Netz hindurch allmählig gegen die Lungenvenen vorwärts.

Die beträchtliche Druckkraft, welche hierzu erforderlich ist, liegt in den dicken fleischigen Wänden dieser Kammern, die bei der linken Herzkammer noch viel dicker, d. h. ungefähr 3mal so dick, als bei der rechten sind; worüber man sich nicht wundern darf, da unstreitig eine größere Kraft erforderlich ist, um das Blut vom Herzen aus in alle Theile des Körpers, und durch das daselbst befindliche, im Allgemeinen engere Haargefäßnetz hindurch zu treiben, als es vom Herzen aus in die viel näher gelegenen Lungen, und durch das sie durchbringende, im Allgemeinen aus etwas weiteren Röhrchen bestehende Haargefäßnetz hindurch zu drücken. Die rechte Herzkammer unterscheidet sich also nicht nur dadurch von der linken, daß sie beim erwachsenen gefunden Menschen dunkelrothes Blut einschließt, daß sie mehr nach vorn und nach rechts liegt, sondern auch dadurch, daß ihre Wände dünner sind, und daß ihre Spitze, von außen angesehen, nicht ganz so tief nach unten herabreicht, als die der linken Herzkammer.

Da, wo die beiden, von ihren fleischigen Wänden umgebenen Herzkammern mit ihrer einen Seite an einander liegen, und äußerlich durch eine dünne Lage untereinander theils verwebter, theils verschmolzener Fleischbündel vereinigt sind, entsteht die Scheidewand der Herzkammern, *septum ventriculorum*, welche zwischen den beiden fleischigen Säcken von unten, und links bis zum breiten oberen Ende nach rechts und oben reicht, und zwischen den Ventrikeln etwas dünner als der größere Theil der übrigen Wände des linken Ventrikels ist. Am hinteren Ende der Kammern befindet sich dicht neben der Scheidewand und mehr nach vorn der Ausgang in die Arterie, *ostium arteriosum*, und daneben weiter nach hinten und von der Scheidewand entfernter der etwas größere und etwas elliptische, aus der Vorkammer hereingehende Eingang in die Herzkammer, *ostium venosum*. Diese beiden Oeffnungen liegen am linken Ventrikel dicht neben einander, im rechten dagegen ist ein nicht unbeträchtlicher Theil der Wand des breiten Endes der Kammer zwischen ihnen.

Die von dünnen Wänden gebildeten Theile des Herzens, die Vorkammern oder Vorhöfe, stehen mit Röhren in Verbindung, die gleichfalls dünne Wände haben, mit Venen, die eben deswegen, weil sie das Blut dem Herzen zuführen, keinen heftigen Druck von Seiten des Herzens

erleiden, und daher auch ohne Schaden dünne Wände besitzen &

Die von dicken fleischigen Wänden gebildeten Theile des H die Herzkammern, stehen mit Röhren in Verbindung, die den Dr von den Herzkammern fortgestoßenen Blutes auszuhalten im Stan Die Dicke der Wände der Arterien entspricht also selbst wieder de der fleischigen Wände der Herzkammern, mit welchen sie zusa hängen; denn die Aorta, welche von der dickeren und fleisc linken Herzkammer ausgeht und von ihr mit größter Gewalt ve gepresstes Blut aufnimmt, hat eine dickere Wand als die Lungen welche mit der etwas weniger fleischigen rechten Herzkammer i bindung steht.

Größe der Höhlen des Herzens.

Man hat hinreichenden Grund anzunehmen, daß die Höh rechten Herzhälfte eben so weit als die der linken sind; denn da i gegebenen Zeit nothwendig eben so viel Blut durch die eine als die andere Herzhälfte fließen muß ¹⁾, wenn nicht ein Mangel o Uebermaß des Blutzuflusses in der einen oder andern Herzhälfte er soll, und da die 2 Ventrikel, und eben so auch die 2 Worta ihre Bewegung, durch die sie das Blut fort pumpen, gleichzeitig r so folgt schon hieraus, daß ihre Höhlen während des Lebens gleich sein:

Santorini ²⁾, der die Arterien und Ventrikeln einzeln mit Wasser fand auch nach dem Tode die Größe der Höhlen der rechten und linke hälfte gleich. Uehnliche Beobachtungen haben Lower ³⁾, v. Moor ⁴⁾, M Lieutaud ⁵⁾ und Sabatier ⁶⁾ gemacht. Die entgegengesetzten, al

¹⁾ Da die vom rechten Ventrikel aus in die Lungen getriebene Flüssigkeit, wei Wasserdampf und Kohlenäure ausgehaucht wird, etwas an Menge abnimmt, Luft, die daselbst ins Blut aufgenommen zu werden scheint, diesen Verlust nicht ganz ersetzt, so könnte man meinen, daß aus diesem Grunde die Hi linken Herzhälfte etwas enger sein müßten, als die der rechten. Allein die Au durch die Lungen beträgt nach den Versuchen von Lavoisier und Segui Stunden nur 1370a Gran. Da nun aber das Herz in diesem Zeitraume 34000 bis 40000 mal Blut ausstößt, und auf die vielen Anfüllungen der an Flüssigkeit durch Lungenausdünstung zu vertheilen ist; so steht jeder leicht die linke Herzhälfte wegen jenes Verlustes nicht merklich enger sein könne. ! weniger scheint aber die durch den Ductus thoracicus zum Blute hinzut Flüssigkeit einen größeren Durchmesser der rechten Herzhälfte verursachen zu Denn da der Mensch im gewöhnlichsten Falle an Gewicht nicht zunimmt, so i annehmen, daß von dem von der linken Herzhälfte ausgetriebenen Blute fast viel Flüssigkeit durch Absonderungen aus den Blutgefäßen austritt, als d Ductus thoracicus in dieselben zurückkommt.

²⁾ Santorini, Obs. anat. p. 144.

³⁾ Lower, Tractatus de corde etc. London 1689. 8. p. 34.

⁴⁾ v. Moor, cogitat. de instaurat. medic. Amst. 1695. p. 67.

⁵⁾ Lieutaud, Essays anat. p. 230.

⁶⁾ Joh. Nic. Weiss, de dextro cordis ventriculo post mortem ampliori. 1767. 4.

⁷⁾ Ant. Chaum. Sabatier, an in vivis animalibus ventriculorum cordis capacitas. Paris 1772. 4. und Traité complète d'anat.

viel zahlreicheren Beobachtungen ¹⁾, wo die rechte Herzhälfte bei Erwachsenen beträchtlich weiter gefunden wurde, als die linke, beweisen aber das Gegentheil nicht. Denn theils sieht jeder leicht ein, daß eine beim Sterben zeitig eintretende Stöckung des Bluts in den Lungen eine krankhafte Ausdehnung der rechten Herzhälfte, die sich dann ihres Blutes nicht entleeren kann, zur Folge haben könne, theils daß die durch gewaltsame Einsprizung oder durch das Einfüllen von Quecksilber hervorgebrachte Anfüllung der Herzhöhlen bewirken könne, daß der nachgiebigere rechte Ventrikel mehr als der minder nachgiebige linke ausgedehnt werde, und aus diesem Grunde haben Santorini's und Portals Beobachtungen, wo Wasser und Wachs mit großer Behutsamkeit eingegossen wurde, ein verhältnißliches Gewicht, bei Le Gallois ²⁾ und J. F. Meckel's ³⁾ Beobachtungen aber, wo Quecksilber eingefüllt wurde, ist das große specifische Gewicht des Quecksilbers, und folglich der bedeutende Druck desselben mit in Anschlag zu bringen. Dadurch erklärt sich, wie der rechte Ventrikel bei Meckel's Versuchen noch ein halbmal, noch einmal, oder sogar zweimal so weit als der linke erschien, während Portal ⁴⁾, der den Rauminhalt aller 4 Höhlen des Herzens in verschiedenen Ältern und unter verschiedenen Umständen verschieden und nicht in einem gleichbleibenden Verhältnisse fand, zu dem Endresultate geführt wurde, daß im Allgemeinen alle 4 Höhlen des Herzens gleich weit wären. Anders verhält sich die verhältnißmäßige Weite der beiden Herzhälften bei dem Embryo, bei welchem ein in der Scheidewand der Vorhöfe befindliches Loch ein Ueberströmen des Bluts aus der rechten Herzhälfte in die linke gestattet.

Deffnungen der vier Herzhöhlen und Klappen an einigen dieser Deffnungen.

Die Deffnungen, durch welche die Venen ihr Blut in die Vorkammern ergießen, haben, mit Ausnahme der Herzvene (welche mit einer einfachen, halbmondförmigen Klappe, *valvula Thebesii*, versehen ist) entweder gar keine Klappen, oder wenigstens keine, die den Rücktritt des Bluts aus den sich zusammenziehenden, mit Blut angefüllten Vorkammern verhindern könnten. Alle Deffnungen der 4 Lungenvenen in der linken, und die der Vena cava superior in der rechten Vorkammer haben gar keine Klappen. Die der Vena cava inferior hat zwar bei dem Embryo, und zuweilen auch bei dem Erwachsenen eine vorspringende halbmondförmige Falte, *valvula Eustachii*, die aber an der vordern Seite mehr schief als quer gestellt ist, und den Rücktritt des Bluts niemals verhindern kann, übrigens bei dem Erwachsenen meistens bis auf eine kleine Spur verschwindet. Dagegen sind die 4 Deffnungen, die sich am breiten Ende der beiden Herzkammern befinden, *ostia arteriosa* und *ostia venosa* der Kammern, mit Klappen versehen, die so eingerichtet sind, daß die an der Vorkammeröffnung, *ostium venosum*, befindlichen Klappen (*valvulae tricuspidales* des rechten, *valvulae mitrales* des linken Ventrikels) das Blut herein, aber nicht in die Vorkammer zurück, die an der

¹⁾ Schon der Verf. des dem Hippocrates zugeschriebenen Buches *de corde* nahm an, daß die Höhle der vorderen Kammer geräumiger sei, *Jo. Cl. Adr. Helvetius Mém. de l'Ac. roy. des sc. de Paris*, 1718. p. 283 sq. fand sie um $\frac{1}{6}$ geräumiger. Winslow *expos. anat.* IV. n. 53. Sénac *Traité du coeur*, T. I. p. 191. 346. Haller, *El. phys.* I. 328. Aurivillius, *De inaequali vasorum pulmonalium et exilitate cordis amplitudine*. Gottingae 1750. 4. in Halleri coll. VII. p. 257. Le Gallois und J. F. Meckel d. j. und Andere sind derselben Meinung.

²⁾ Le Gallois, *Dict. des sc. médicales*, V. 450.

³⁾ J. F. Meckel, *Handbuch der menschlichen Anatomie*. Halle 1817. S. 46.

⁴⁾ A. Portal, *Cours d'anat. méd.* Paris 1804. S. III. p. 39, 40, und in Jof. Ricetauds *Zergliederungskunst*, nach Portals Ausgabe übers. Leipzig 1782. S. 1. S. 659.

136 Klappen an der Grenze der Vorhöfe und Kammern.

Arterienöffnung, ostium arteriosum befindlichen (valvulae semilunares) das Blut in die Arterien hinaus, nicht aber in die Kammer zurückweichen lassen. Die erste Öffnung jedes Ventrikels, welche das Blut aus der Vorkammer in die Kammer hereinläßt, ostium venosum ventriculi, liegt am breiten Ende jedes Ventrikels in einiger Entfernung von der Scheidewand, und ist von einem mäßig elliptischen als runden, dichten und etwas harten Ringe umgeben. Die Öffnung, welche das Blut aus der Herzkammer in die mit ihr in Verbindung stehende Arterie hinausläßt, ostium arteriosum ventriculi, liegt am breiten Ende jedes Ventrikels dicht neben der Scheidewand, ist enger und kreisförmiger: des rechten Ventrikels (der Lungenkammer) liegt ganz vorn, die des linken Ventrikels (der Körperherzkammer) dahinter.

Der wesentlichste Theil der Klappe an jeder Vorkammeröffnung ist eine ringförmige Falte oder Verdoppelung der innersten Haut des Herzes, welche von dem die Öffnung umgebenden festen, aus verdichtetem Bindegewebe bestehenden Rande ausgeht, und in die Höhle der Kammer hereinhängt. Schneidet man daher die Kammer in der Nähe der Vorkammeröffnung von der Vorkammer ab, so hängt diese häutige Falte ungefähr wie ein Mühsenfutter, das man aus einer Mühe herausgehoben hat, aus der Vorkammer herunter. Diese ringförmige Falte hat aber in beiden Kammern keinen geraden Rand, sondern ist durch gleich tiefe Einschnitte in mehrere mit einer stumpfen Spitze versehenen Lappen getheilt. In der rechten Kammer sind ungefähr 3 größere Einschnitte, und man kann daher meistens 3 abgerundete, nicht gleich große Zipfel unterscheiden, welche aber zuweilen durch noch kleinere Einschnitte noch mehr Lappen zerfallen, oder auch durch Vereinigung zweier Zipfen auf 2 Zipfel reducirt werden. Der größte Zipfel liegt nach unten, und ist so gestellt, daß er den in der Nähe des ostium venosum gelegenen Theil der Kammer von dem in der Nähe des ostium arteriosum befindlichen trennt. Man nennt gewöhnlich diese Klappe die dreizipfliche oder dreispitzige Klappe, valvula tricuspidalis. In der linken Kammer ist die häutige Falte der Klappe meistens nur durch Einschnitte in 2 Hauptlappen oder Zipfel getheilt, die auch so gelegen sind, daß der eine den Zugang zur Körperarterie vom Eingange in den Ventrikel scheidet, und heißt die mühsenförmige, valvula mitralis. An beiden Klappen kommen aber sehr häufig in der Gestalt und Theilung in Zipfel Abweichungen vor, woraus man sieht, daß es bei uns im Einzelnen so sehr nicht ankommt.

Weil nun aber die ringförmige Falte in die Kammer hereinhängt und die Vorkammeröffnung nur einen Theil der Wand am breiten Ende der Kammer einnimmt, so bleibt an diesem Ende nothwendig ein Raum zwischen den Wänden der Kammer und der Falte übrig. Das in diesem selbst befindliche Blut, das, wenn sich das Herz zusammenzieht, keinen hinreichenden Ausweg hat, drückt die Lappen des herabhängenden häutigen Ringes aneinander, und verschließt sich dadurch den Rückweg zur Vorkammer; damit nun aber die Gewalt des Blutes die Lappen

Warzenförmige Muskeln des Herzens und ihr Nutzen. 137

häutigen Ringes aneinander, nicht aber etwa zurückbrücke, so gesamt von der den Herzwänden zugekehrten Oberfläche des häutigen Ringes und von den Rändern der Zipfel viele, dem Anschein nach sehnige, zer einander verwobene Fäden aus, die sich zu minder zahlreichen, fetten Fäden vereinigen, und sich an den Seitenwänden der Herzklammer befestigen. Es bedurfte indessen noch einer besonderen Vorrichtung, damit diese Fäden den Zweck, die Zipfel der Klappe und den ganzen Ring zurückzuhalten, erfüllen könnten. Denn die Seitenwände der Herzklammer nähern sich während ihrer Zusammenziehung der oberen und, wodurch die an sie befestigten Fäden der Klappen erschlaffen werden, und deswegen in diesem Momente nicht geeignet sein würden, die Klappe zurückzuhalten, wenn die meisten Fäden nicht an kleine fleischlegel (warzenförmige Muskeln, *musculi papillares*) befestigt wären, welche sich auf der innern Oberfläche des Herzens erheben und hinter der Vorkammeröffnung hingekehrt sind.

Durch diese Fleischlegel wird bewirkt, daß die Fäden auch während Zusammenziehung des Herzens immer hinreichend straff bleiben, denn eben so viel, als die Wand der Ventrikeln bei ihrer Zusammenziehung der Vorkammeröffnung näher kommt, scheint sich gleichzeitig die Spitze jedes Fleischlegels durch Zusammenziehung des Fleischlegels davon zu entfernen. Oft sind mehrere solche Fleischlegel oder Warzenmuskeln unter einander verwachsen.

Die Fäden, welche von einem Fleischlegel ausgehen, erstrecken sich in den Einschnitt zwischen 2 Zipfel, nicht aber an die Spitze des Zipfels. Ihre Zahl, Größe und Lage ist in verschiedenen Herzen verschieden. In der Regel sind sie aber im linken Ventrikel viel dicker und größer als im rechten. Dieses war auch nöthig, weil im linken, fleischigeren Ventrikel ein stärkerer Gewalt, mit welcher die Klappen gedrückt werden, größer ist. In beiden sind daselbst auch die Haut der Klappe und ihre Fäden fester und dicker. Im rechten sind sie nicht so sehr unter einander verwachsen, und können noch freier in die Höhle hinein, unstreitig weil der eine große Ventrikel sehr in der Mitte des Ventrikels liegt. Den sehnigen Fäden, welche sich von den Warzenmuskeln aus an der gewölbten Oberfläche des häutigen Zipfel ausbreiten, kommen andere kürzere entgegen, die ihren Anfang in dem Umfange des Ostium venosum nehmen. Auch diese Fäden sind zuweilen mit sehr kleinen Warzenmuskeln versehen.

Die Ränder der vier Oeffnungen, an welchen die Fleischfasern des Herzens mit freien Enden anfangen oder sich endigen.

Das Herz besteht zum Theil aus solchen Fasern, welche die Höhlen desselben kreisförmig oder spiralförmig umgeben und deren Anfang und Ende verborgen bleibt. Indessen giebt es auch 4 Stellen am Herzen, wo viele Muskelfasernbündel offenbar ihren Anfang nehmen. Diese 4 Stellen sind die Ränder der 2 Vorhofsöffnungen, ostia venosa, und der 2 Arterienöffnungen, ostia arteriosa, an dem breiten Ende der Herzkammern.

Der Rand der 2 Vorhofsöffnungen ist zugleich die Gränze der Vorhöfe und der Kammern. Ein großer Theil dieses Randes entsteht dadurch, daß sich zwischen den Herzkammern und Vorkammern eine quere, ringsherum gehende Einschnürung befindet, die von außen gesehen die Quersfurche zwischen den Vorhöfen und Kammern, von innen betrachtet aber jenen ringsförmigen Vorsprung bildet, an welchem die Vorhofsklappe ansitzt. In dem tiefsten Theile dieser Einschnürung liegt ein dichtes, hartes Zellgewebe, welches dem vorspringenden Ringe der Vorhofsöffnungen seine Festigkeit giebt, und in diesem Zellgewebe bemerkt man, wenn man von außen in die Einschnürung eindringt, 2 fast knorpelartige, gekrümmte Streifen, von denen der eine im hinteren, der andere im vorderen, durch die Körperarterie verdeckten Theile der Quersfurche liegt.

Der vordere sowohl als der hintere knorpelige Streifen geht von der Einschnürung, die die rechte Vorkammeröffnung bildet, zu der, welche die linke bildet, hinüber, und verbindet beide mit einander, und es giebt daher, wenn die Knorpeladern sehr ausgebildet sind, in der Quersfurche an jeder Seite nur eine Stelle, wohin diese knorpeligen Streifen nicht reichen. Der vordere knorpelige Streifen liegt da, wo der hintere Rand der Körperarterie an die Quersfurche stößt. Auf beiden Seiten der Körperarterie hat er 2 dickere Stellen, die hinter derselben durch eine dünnere Fortsetzung zusammenhängen. Der hintere knorpelige Streifen hat auch 2 dickere Stellen ¹⁾, welche durch eine dünnere, oft kaum mehr wahrnehmbar mittlere Stelle unter einander verbunden sind. Indessen ist der knorpelartige Streifen nicht bei allen Menschen so sehr ausgebildet. Wolff fand selbst einmal sehr unvollkommen.

Das harte Zellgewebe, welches in dieser Furche liegt, und die knorpelähnliche Substanz unterbrechen die Fleischfasern des Vorhofs und der Herzkammer. Denn es gehen, wie schon oben bemerkt worden, keine Fleischfasern von den Vorhöfen über die Quersfurche weg zu den Herzkammern hinüber. An diesem harten Zellgewebe befinden sich also Ent-

¹⁾ Auf Zoder's Tafeln CXIII. Fig. 248 und 51.

²⁾ C. F. Wolff, De textu cartilagineo cordis etc. Acta acad. sc. imp. Petropoli pro anno 1781. Petropoli 1784. p. 211. — und in der von Zoder revidirten Copie seiner Figuren CXIII. Fig. 2. 49. 48. 50. 51. 52.

von Muskelfaserbündeln, welche einerseits zu den Vorhöfen, andererseits zu den Ventrikeln sich erstrecken.

An dem Ausgange jeder Herzkammer in die mit ihm in Verbindung stehende große Arterie, *ostium arteriosum ventriculi*, stoßen an einer ringsförmigen, etwas härteren Stelle die gelben Fasern der Arterien mit den Fleischfasern des Herzens zusammen. In dem zunächst angrenzenden Stücke der Arterie befinden sich die 3 halbmondsförmigen Klappen, *valvulae semilunares*, deren Einrichtung und Zweck schon S. 28 beschrieben worden ist. Sie bestehen in 3 neben einander liegenden, halbmondsförmigen Falten der inneren Haut der Arterien, zwischen jeder dieser Falten und der Wand der Arterie befindet sich ein nach dem Herzen zu verschlossener Zwischenraum. So entsteht eine Tasche, die ihre offene Seite vom Herzen abwendet, und mit den Taschen verglichen werden kann, welche man inwendig in Kutschen anzubringen pflegt. Jede derselben ist in der Mitte am tiefsten, und läuft seitwärts in 2 Spitzen, *cornua*, aus, eine Form, die dadurch entsteht, daß die liniensförmige Stelle, an welcher die Falte an der Arterienwand anhängt, C-förmig gekrümmt ist, und ihre convexe Seite nach dem Herzen zu wendet. Die Spitzen aller 3 Falten stoßen in 3 Punkten zusammen, die an dem kreisförmigen Umfange der Arterie wie die Winkel eines gleichschenkligen Triangels liegen. Der freie Rand jeder solchen Tasche erstreckt sich also von einem dieser Punkte zum andern, und hat in seiner Mitte eine kleine, aus Zellgewebe bestehende Verdickung, *Nodus Arantii*. Zwischen den 2 Blättern jeder Falte liegt zwar etwas Zellgewebe, an dem man auch etwas Faseriges unterscheidet, was man aber nicht für Muskelfasern halten kann. Die Klappen nebst ihren *Nodulis* sind in der Körperarterie dicker und fester als in der Lungenarterie, und stehen also mit der großen Muskelkraft der linken Herzkammer und mit den dicken Wänden der Körperarterie im Verhältnisse. Die Wand der beiden Arterien ist an den 3 Stellen, an welchen sie die 3 Taschen bilden hilft, etwas auswärts gebogen, und es entstehen daher 3 *Sinus* derselben.

Ueber die Fleischfasern des Herzens im Allgemeinen.

Der Bau des Herzens deutet darauf hin, daß es sich in allen seinen Durchmessern ziemlich gleichmäßig, aber rücksichtlich der verschiedenen Höhlen mit verschiedener Kraft zu verengen bestimmt sei.

Denn es giebt keine parallelen geraden Faserlagen, die von einer bestimmten Stelle zu einer 2ten gehen; es giebt keine Punkte, die als *punctum fixum*, als Anfangs- oder Befestigungspunkt, und als *punctum mobile*, als beweglicher Endpunkt der Fasern betrachtet werden könnten.

140 Ueber die Fleischfasern des Herzens im Allgemeinen.

An der Gränze zwischen den Herzkammern und Vorhöfen sind zwei Fleischfasern durch eine aus hartem dichten Zellgewebe bestehende unterbrochen, und es giebt also hier sichtbare Enden von Muskelfasern. Allein diese Linie, so wie der Rand der arteriösen Mündungen der Herzkammern, sind viel zu klein, als daß sich die unzähligen Fasernbündel des Herzens daselbst unmittelbar ansehen könnten, und die Falten, welche die Natur bei andern Muskeln getroffen hat, um große Anzahl von Fleischfasern auf einen einzigen kleinen Befestigungspunkt mittelbar wirken zu lassen, Sehnenfasern, an deren Seite sie Muskelfasern anfügen, fehlen hier gänzlich, auch würde man sich leicht irren, wenn man die genannten Linien für unbeweglicher als andere Stellen des Herzens, und also für Stütz- oder Befestigungspunkte hielt. Bei dem Gegeneinanderwirken der Muskelfasern müssen sich die Bewegungen an manchen Stellen allerdings aufheben und diese Stellen dadurch zu unbeweglichen werden; allein, welche Stellen dieses geschieht, läßt sich mit Gewißheit nicht ausmitteln. Sehr wahrscheinlich findet dieses an einer Stelle der Scheidewand der Herzkammern Statt.

Gerade Muskelfasern bringen, wenn sie sich verkürzen, mittelst ihrer Enden eine Bewegung anderer Theile hervor, gekrümmte Muskelfasern dagegen wirken durch die Veränderung ihrer Krümmung mittelst ihrer ganzen Seite auf benachbarte Körper. Bei geraden Muskelfasern summiert sich die bewegende Kraft, die die Verkürzung der Faser in allen ihren Punkten hervorbringt, an den Enden, und diese müssen daher sehr befestigt sein. Eine muskulöse Faser, die ringförmig in sich selbst zurückläuft, bedarf dagegen keines Befestigungs- und Endpunktes. Der Ring wird nur kleiner, wenn sie sich zusammenzieht. Wenn sie aber auch keinen geschlossenen Ring darstellt, sondern wenn sich die Enden derselben seitwärts an benachbarte Fasern anlegen, und in deren Scheiden mit eingeschlossen werden, so wird dieses doch dieselbe Wirkung haben, und die Verbindung der Fasern wird leicht die nöthige Festigkeit erhalten, weil eine solche Faser mittelst vieler Punkte ihrer Seitenfläche und nicht bloß mit ihrer Spitze einer andern Faser anhängt, zumal wenn sich nicht viele Fasern an der nämlichen Stelle, sondern die eine sich hier, andere da, in einem Bündel von Fasern endigt, so daß das Bündel ein Ende ist, während es doch selbst aus mit Enden versehenen Fasern besteht. Wenn man daher die Structur des Muskelgewebes des Herzens untersucht, so darf man nicht erwarten, wie bei den meisten andern Muskeln, ein Anfang und ein Ende der meisten Fasern nachweisen zu können. Es ist hier überall sichtbare Einrichtung, daß aus der Scheide eines Bündels Fasern in die Scheide des andern hinübergehen und aufgenommen werden, und dieser Uebergang und Umtausch der Fasern findet

nicht nur zwischen den größeren Bündeln Statt, sondern, wenn man die größeren Bündel in kleinere, und diese in noch kleinere zu zerlegen sucht, so findet man, daß ein solcher Umtausch und Zusammenhang noch zwischen haarfeinen Muskelfasern beobachtet wird. (Siehe Th. I. S. 406.) Diese Verschmelzung und Trennung benachbarter Bündel wiederholt sich aber so oft, daß, wenn ein Bündel eine Strecke fortgegangen ist, es fast unmerkbar wird, ob es noch Fasern von denen enthält, aus welchen es an einer andern Stelle bestand.

Aber die Muskelfaserbündel des Herzens verschmelzen nicht nur vielfach unter einander, sondern sie verflechten sich auch an mehreren Stellen. Dieses geschieht ganz vorzüglich an der äußern und an der innern Oberfläche. Zwischen den gespaltenen Bündeln dringen Fasern von der Oberfläche zu tieferen Lagen, und diese wieder an die Oberfläche. Hierdurch wird die Zerlegung des Fleisches des Herzens in mehrere abgeordnete Lagen, strata, sehr erschwert, und diese Zerlegung kann daher nur schwierig, indem ein Theil der Fleischbündel durchschnitten oder zerstört wird, bewirkt werden. Auch die zu einer Lage gehörenden Fasern gehen vielfach über einander und unter einander weg. Diese Verflechtung und Verschmelzung der Fasern oberflächlicher und tiefer Lagen des Fleisches scheint den Thieren zu haben, daß die verschiedenen Faserlagen bei einer gleich kraftvollen Zusammenziehung alle ihre Wirkung äußern können, und daß die tieferen Lagen sich die oberflächlicheren (welche bei ihrer Zusammenziehung dick werden) nicht so in eine solche Erschlaffung versetzt werden, welche ihre Zusammenziehung nutzlos macht. Wohl nun aber die verschiedenen Lagen nicht einzeln für sich wirken, so war es auch nicht nöthig, daß sie sich an einander beziehentlich zu verschieben im Stande wären, und es liegt daher auch kein lockeres Zellgewebe, welches eine solche Verschiebung begünstigt, zwischen ihnen. Man kann daher die Lagen der Muskelfasern und den Verlauf der Faserbündel nur sehr im Allgemeinen untersuchen.

Muskelfasern der Vorhöfe ¹⁾.

Die Muskelfasern des Herzens überhaupt und also auch die der Vorhöfe, liegen zwischen der innern (von der Gefäßhaut), und der äußeren, vom Herzbeutel gebildeten) Haut des Herzens. An den Vorhöfen, vorzüglich im rechten, ist die Lage der zwischen diesen Häuten liegenden Muskelfasern so dünn, daß sich beide Membranen in den Zwischenräumen der unter einander verflochtenen Muskelbündel nicht selten berühren. Nimmt man die äußere, vom Herzbeutel fortgesetzte Haut der Vorhöfe weg, so sieht man, daß dieselben an ihrer vorderen Seite platte Bündel von Fasern befindlich sind, welche im Ganzen eine quere, zum Theil auch schiefe Richtung haben, und von

¹⁾ Ich werde mich hierbei durch Ziffern auf die Wolffschen Abbildungen beziehen, und zwar, weil die Originale nicht leicht Jedem zu Gebote stehen, auf die in Foders's Gesäßstücke enthaltenen Copien.

Die Ränder der vier Oeffnungen, an welchen die Fleischfasern des Herzens mit freien Enden anfangen oder sich endigen.

Das Herz besteht zum Theil aus solchen Fasern, welche die Höhlen desselben kreisförmig oder spiralförmig umgeben und deren Anfang und Ende verborgen bleibt. Indessen giebt es auch 4 Stellen am Herzen, wo viele Muskelfaserbündel offenbar ihren Anfang nehmen. Diese 4 Stellen sind die Ränder der 2 Vorhofsoeffnungen, *ostia venosa*, und der 2 Arterienöffnungen, *ostia arteriosa*, an dem breiten Ende der Herzkammern.

Der Rand der 2 Vorhofsoeffnungen ist zugleich die Gränze der Vorhöfe und der Kammern. Ein großer Theil dieses Randes entsteht dadurch, daß sich zwischen den Herzkammern und Vorhöfen eine quere, ringsherum gehende Einschnürung befindet, die von außen gesehen die Quersfurche zwischen den Vorhöfen und Kammern, von innen betrachtet aber jenen ringförmigen Vorsprung bildet, an welchem die Vorhofsklappe ansetzt. In dem tiefsten Theile dieser Einschnürung liegt ein dichtes, hartes Zellgewebe, welches dem vorspringenden Ringe der Vorhofsoeffnungen seine Festigkeit giebt, und in diesem Zellgewebe merkt man, wenn man von außen in die Einschnürung eindringt, fast knorpelartige, gekrümmte Streifen, von denen der eine im hinteren, der andere im vorderen, durch die Körperarterie verdeckten Theile der Quersfurche liegt.

Der vordere sowohl als der hintere knorpelige Streifen geht von der Einschnürung, die die rechte Vorammeröffnung bildet, zu der, welche die linke bildet, hinüber, und verbindet beide mit einander, und es giebt daher, wenn die Knorpelfäden sehr ausgebildet sind, in der Quersfurche an jeder Seite nur eine Stelle, wohin diese knorpeligen Streifen nicht reichen. Der vordere knorpelige Streifen liegt da, wo der hintere Rand der Körperarterie an die Quersfurche stößt. Auf beiden Seiten der Körperarterie hat er 2 dickere Stellen, die hinter derselben durch eine dünnere Fortsetzung zusammenhängen. Der hintere knorpelige Streifen hat auch 2 dickere Stellen¹⁾, welche durch eine dünnere, oft kaum mehr wahrnehmbare mittlere Stelle unter einander verbunden sind. Indessen ist der knorpelartige Streifen nicht bei allen Menschen so sehr ausgebildet. Wolff fand ihn selbst einmal sehr unvollkommen.

Das harte Zellgewebe, welches in dieser Furche liegt, und die knorpelähnliche Substanz unterbrechen die Fleischfasern des Vorhofs und der Herzkammer. Denn es gehen, wie schon oben bemerkt worden, bei den Fleischfasern von den Vorhöfen über die Quersfurche weg zu den Herzkammern hinüber. An diesem harten Zellgewebe befinden sich also End-

¹⁾ Auf Eobers Tafeln CXIII. Fig. 248 und 51.

²⁾ C. F. Wolff, De textu cartilagineo cordis etc. Acta acad. sc. imp. Petropoli pro anno 1781. Petropoli 1784. p. 211. — und in der von Eober verfertigten Copie seiner Figuren CXIII. Fig. 2. 49. 48. 50. 51. 52.

en Muskelfaserbündeln, welche einerseits zu den Vorhöfen, andererseits zu den Ventrikeln sich erstrecken.

In dem Ausgange jeder Herzkammer in die mit ihm in Verbindung stehende große Arterie, ostium arteriosum ventriculi, stoßen in einer ringsförmigen, etwas härteren Stelle die gelben Fasern der Arterien mit den Fleischfasern des Herzens zusammen. In dem zunächst angrenzenden Stücke der Arterie befinden sich die 3 halbmondförmigen Klappen, *valvulae semilunares*, deren Einrichtung und Zweck schon S. 28 beschrieben worden ist. Sie bestehen in 3 neben einander liegenden, halbmondförmigen Falten der inneren Haut der Arterien, zwischen jeder dieser Falten und der Wand der Arterie befindet sich ein nach dem Herzen zu verschlossener Zwischenraum. So entsteht eine Tasche, die ihre offene Seite vom Herzen abwendet, und mit den Taschen verglichen werden kann, welche man inwendig in Kutschen anbringen pflegt. Jede derselben ist in der Mitte am tiefsten, und läuft abwärts in 2 Spitzen, *cornua*, aus, eine Form, die dadurch entsteht, daß sie linienförmige Stelle, an welcher die Falte an der Arterienwand anhängt, förmig gekrümmt ist, und ihre convexe Seite nach dem Herzen zu wendet. Die Spitzen aller 3 Falten stoßen in 3 Punkten zusammen, wie an dem kreisförmigen Umfange der Arterie wie die Winkel eines dreieckigen Dreiecks liegen. Der freie Rand jeder solchen Tasche wendet sich also von einem dieser Punkte zum andern, und hat in seiner Mitte eine kleine, aus Zellgewebe bestehende Verdickung, *Nodus crantii*. Zwischen den 2 Blättern jeder Falte liegt zwar etwas Zellgewebe, an dem man auch etwas Faseriges unterscheidet, was man aber nicht für Muskelfasern halten kann. Die Klappen nebst ihren *Nodulis* sind in der Körperarterie dicker und fester als in der Lungenarterie, und stehen also mit der großen Muskelkraft der linken Herzkammer und mit den dicken Wänden der Körperarterie im Verhältnisse. Die Wand der beiden Arterien ist an den 3 Stellen, an welchen sie die 3 Taschen bilden hilft, etwas auswärts gebogen, und es entstehen daher 3 *Sinus* derselben.

Ueber die Fleischfasern des Herzens im Allgemeinen.

Der Bau des Herzens deutet darauf hin, daß es sich in allen seinen Durchmesser ziemlich gleichmäßig, aber rücksichtlich der verschiedenen Höhlen mit verschiedener Kraft zu verengen bestimmt sei.

Denn es giebt keine parallelen geraden Faserlagen, die von einer bestimmten Stelle zu einer 2ten gehen; es giebt keine Punkte, die als *punctum fixum*, als Anfangs- oder Befestigungspunkt, und als *punctum mobile*, als beweglicher Endpunkt der Fasern betrachtet werden könnten.

An der Gränze zwischen den Herzkammern und Vorhöfen sind zwar die Fleischfasern durch eine aus hartem dichten Zellgewebe bestehende Linie unterbrochen, und es giebt also hier sichtbare Enden von Muskelfasern. Allein diese Linie, so wie der Rand der arteriellen Mündungen der Herzkammern, sind viel zu klein, als daß sich die unzähligen Fleischbündel des Herzens daselbst unmittelbar ansetzen könnten, und die Anstalten, welche die Natur bei andern Muskeln getroffen hat, um eine große Anzahl von Fleischfasern auf einen einzigen kleinen Befestigungspunkt mittelbar wirken zu lassen, Sehnenfasern, an deren Seite sich Muskelfasern anfügen, fehlen hier gänzlich, auch würde man sich sehr irren, wenn man die genannten Linien für unbeweglicher als andere Stellen des Herzens, und also für Stütz- oder Befestigungspunkte hielt. Bei dem Gegeneinanderwirken der Muskelfasern müssen sich die Bewegungen an manchen Stellen allerdings aufheben und diese Stellen dadurch zu unbeweglichen werden; allein, welche Stellen dieses sich läßt sich mit Gewißheit nicht ausmitteln. Sehr wahrscheinlich findet dieses an einer Stelle der Scheidewand der Herzkammern Statt.

Gerade Muskelfasern bringen, wenn sie sich verkürzen, mittelst ihrer Enden eine Bewegung anderer Theile hervor, gekrümmte Muskelfasern dagegen wirken durch die Veränderung ihrer Krümmung mittelst ihrer ganzen Seite auf benachbarte Körper. Bei geraden Muskelfasern summiert sich die bewegende Kraft, die die Verkürzung der Faser in allen ihren Punkten hervorbringt, an den Enden, und diese müssen daher sehr befestigt sein. Eine muskulöse Faser, die ringförmig in sich selbst zurückläuft, bedarf dagegen keines Befestigungs- und Endpunktes. Der Ring wird nur kleiner, wenn sie sich zusammenzieht. Wenn sie aber auch keinen geschlossenen Ring darstellt, sondern wenn sich die Enden derselben seitwärts an benachbarte Fasern anlegen, und in deren Scheiden mit eingeschlossen werden, so wird dieses doch dieselbe Wirkung haben, und die Verbindung der Fasern wird leicht die nöthige Festigkeit erhalten, weil eine solche Faser mittelst vieler Punkte ihrer Seitenfläche, und nicht bloß mit ihrer Spitze einer andern Faser anhängt, zumal wenn sich nicht viele Fasern an der nämlichen Stelle, sondern die eine sich hier, die andere da, in einem Bündel von Fasern endigt, so daß das Bündel ohne Ende ist, während es doch selbst aus mit Enden versehenen Fasern besteht. Wenn man daher die Structur des Muskelgewebes des Herzens untersucht, so darf man nicht erwarten, wie bei den meisten andern Muskeln, einen Anfang und ein Ende der meisten Fasern nachweisen zu können. Eine hier überall sichtbare Einrichtung ist, daß aus der Scheide des einen Bündels Fasern in die Scheide des andern hinübergehen und aufgenommen werden, und dieser Ubergang und Umtausch der Fasern findet

nicht nur zwischen den größeren Bündeln Statt, sondern, wenn man die größeren Bündel in kleinere, und diese in noch kleinere zu zerlegen sucht, so findet man, daß ein solcher Umtausch und Zusammenhang noch zwischen haarfeinen Muskelfasern beobachtet wird. (Siehe Th. I. S. 406.) Diese Verschmelzung und Trennung benachbarter Bündel wiederholt sich aber so oft, daß, wenn ein Bündel eine Strecke fortgegangen ist, es fast unübersehbar wird, ob es noch Fasern von denen enthält, aus welchen es an einer andern Stelle bestand.

Aber die Muskelfaserbündel des Herzens verschmelzen nicht nur vielfach unter einander, sondern sie verflechten sich auch an mehreren Stellen. Dieses geschieht ganz vorzüglich an der äußern und an der innern Oberfläche. Zwischen den gespaltenen Bündeln bringen Fasern von der Oberfläche zu tieferen Eagen, und diese wieder an die Oberfläche. Hierdurch wird die Zerlegung des Fleisches des Herzens in mehrere abge sonderte Eagen, strata, sehr erschwert, und diese Zerlegung kann daher nur flüchtig, indem ein Theil der Fleischbündel durchschnitten oder zerstört wird, bewirkt werden. Auch die zu einer Lage gehörenden Fasern gehen häufig über einander und unter einander weg. Diese Verflechtung und Verschmelzung der Fasern oberflächlicher und tiefer Eagen des Fleisches scheint den Augen zu haben, daß die verschiedenen Faserlagen bei einer gleich kraftvollen Zusammenziehung alle ihre Wirkung äußern können, und daß die tieferen Eagen durch die oberflächlicheren (welche bei ihrer Zusammenziehung dick werden) nicht etwa in eine solche Erschlaffung versetzt werden, welche ihre Zusammenziehung nutzlos macht. Weil nun aber die verschiedenen Eagen nicht einzeln für sich wirken, so war es auch nicht nöthig, daß sie sich an einander beträchtlich zu verschieben im Stande wären, und es liegt daher auch kein sehr lockeres Zellgewebe, welches eine solche Verschiebung begünstigt, zwischen ihnen. Man kann daher die Eagen der Muskelfasern und den Verlauf der Faserbündel nur sehr im Allgemeinen untersuchen.

Muskelfasern der Vorhöfe ¹⁾.

Die Muskelfasern des Herzens überhaupt und also auch die der Vorhöfe, liegen zwischen der innern (von der Gefäßhaut), und der äußeren, (vom Herzbeutel gebildeten) Haut des Herzens. An den Vorhöfen, vorzüglich im rechten, ist die Lage der zwischen diesen Häuten liegenden Muskelfasern so dünn, daß sich beide Membranen in den Zwischenräumen der unter einander verflochtenen Muskelbündel nicht selten berühren. Nimmt man die äußere, vom Herzbeutel fortgesetzte Haut der Vorhöfe weg, so sieht man, daß äußerlich an ihrer vorderen Seite platte Bündel von Fasern befindlich sind, welche im Ganzen eine quere, zum Theil auch schiefe Richtung haben, und von

¹⁾ Ich werde mich hierbei durch Ziffern auf die Wolffschen Abbildungen beziehen, und zwar, weil die Originale nicht leicht Jedem zu Gebote stehen, auf die in Feders Originalwerke enthaltenen Copien.

denen sehr viele ununterbrochen von einem Vorhofe zum andern übergehen ¹⁾. Manche von diesen Bündeln fangen aus der Quersfurche zwischen den Ventrikeln und Atrien an. Auf der hinteren Seite der Vorhöfe findet man zwar wenigere, aber doch einige Bündel, welche von einem Vorhofe auf den andern in schiefer oder in querer Richtung übergehen ²⁾. Die obere Stelle des linken Vorhofs, in welche sich die 4 Lungenvenen begeben, ist aber von queren Fasern umgeben, welche nur dem linken Vorhofe angehören, und sich nicht auf den rechten erstrecken ³⁾. Dasselbe gilt von der oberen Stelle des rechten Vorhofs, in welche sich die obere Hohlvene öffnet, und von einigen Bündeln an der hinteren Wand des rechten Vorhofs ⁴⁾. Diejenigen Bündel, welche diesen Venen zunächst liegen, umgeben den Anfang der Venen selbst mit kreisförmigen oder schief herumgewundenen Fasern.

Unstreitig giebt es zwischen jenen queren Fasern, die von einem Vorhofe zu dem andern übergehen, auch viele, welche zwischen beide Vorhöfe dringen und die Scheidewand der Vorhöfe bilden helfen; allein die Muskelfasern sind so sehr unter einander verflochten, daß es schwer ist, sie weit zu verfolgen.

Diejenigen Bündel von Fasern, welche über den obern Theil der Vorhöfe hinweggehen, und also oben herum von der vorderen Seite zur hinteren Seite gelangen, liegen größtentheils von jenen queren Fasern bedeckt. Sie bilden keine besondere Lage, sondern sind mit jenen queren und schiefen Fasern vielfach verflochten und verschmolzen.

Mehrere Bündel, die diese Richtung haben, liegen hinten längs der Grenze der beiden Vorhöfe am linken Vorhofe ⁵⁾, andere ziehen sich über dem rechten Vorhofe von hinten herauf, und äußerlich neben der Vena cava superior vorbei, und gehören dem rechten Vorhofe allein an ⁶⁾. Gerdy ⁷⁾ hat auch ein Bündel von Längensfasern beschrieben und abgebildet, welches sich von hinten her mitten über den linken Vorhof zwischen den rechten und linken Lungenvenen her aufbeugt und sich oben auf die vordere Seite herumkrümmt.

Man sieht leicht ein, daß die queren Fasern die Vorhöfe der Quere nach verengern und sie gegen die Scheidewand pressen, daß ferner die Längensfasern sie gegen das feste Zellgewebe in der Quersfurche, und also an die Kammern andrücken und anziehen, wozu wahrscheinlich auch die eigene Zusammenziehung der Scheidewand das ihrige beiträgt, und daß endlich die vielen Fasern, die eine sehr mannichfaltige Richtung haben, und die erwähnten beiden Arten von Fasern unter einander vereinigen, sowie die netzförmig verflochtenen Bündel, die dicht an der innern Haut der Vorhöfe befindlich sind, eine gleichförmige Verengerung der Vorhöfe nach allen Richtungen hervorbringen. Die die Venen an ihrer Einmündung zunächst umgebenden Kreisfasern wirken vielleicht wie Schließmuskeln (Sphincteren).

¹⁾ Siehe Loders Tafeln, CXIII. Fig. 2. 91 bis 108.

²⁾ Loder, CXIV. Fig. 1. 129. 130.

³⁾ Loder, CXIV. Fig. 1. 160. 167. 168. 169, und die dazwischen stehenden Nummern, so wie auch CXIII. Fig. 2. 113. 114. 117. 112. 119. und die dazwischen stehenden Nummern.

⁴⁾ Loder, CXIII. Fig. 2. 120. 121.

⁵⁾ Loder, CXIV. Fig. 137. 138.

⁶⁾ Loder, CXIV. Fig. 1. 164. 148.

⁷⁾ Loder, CXIV. Fig. 1. 142. 143. 140. 146.

⁸⁾ Gerdy, Recherches, discussions et propositions etc. à Paris 1823. 4. Fig. 8. mm. k. p. 28.

Einer besonderen Erwähnung bedürfen noch die Bündel von Fleischfasern, welche den Herzohren eigenthümlich sind. Sie sind vorzugsweise sehr unter einander verflochten, und zeichnen sich durch ihre runde, nicht platte Form aus, und springen daher auch, wenn man die aufgeschnittenen Herzohren von innen betrachtet, sehr in die Augen, und machen die innere Oberfläche derselben uneben.

Allgemeine Beschreibung der Muskelfasern der Kammern.

An den Vorkammern haben, wie wir so eben gesehen haben, die Fleischbündel während ihrer Zusammenziehung die Wirkung, daß die Vorkammern sowohl an die in den Ventrikel führenden Ausgänge angebrückt, als auch der Quere nach zusammengeschnürt werden, und zwar theils durch Fasern, welche beiden Vorkammern gemeinschaftlich zukommen, theils durch solche, welche jeder eigenthümlich sind. Die Verflechtung und Verschmelzung der Fleischbündel hat zugleich den Nutzen, daß das gedrückte Blut, das nach allen Richtungen auszuweichen strebt, die innere Haut des Herzens nicht zwischen den Muskelfasern auswärts dränge, und daß die Vorkammern ziemlich gleichmäßig in allen Richtungen verengert werden können.

Die fleischigen Wände der Herzkammern sind viel dicker. Die Fleischbündel derselben gehen theils von einem Ventrikel auf den andern über, und gehören also 2 Ventrikeln zugleich an, theils sind sie einem Ventrikel eigenthümlich. Die ersteren sind von den letzteren nicht völlig geschieden, sondern beide an einigen Stellen verflochten. Die gemeinschaftlichen Fasern beider Ventrikeln liegen an der Oberfläche, und sind links gewunden, sie laufen am linken Ventrikel mehr der Länge nach, am rechten mehr der Quere nach. Sie concentriren sich am linken Ventrikel an der Spitze, beugen sich daselbst in die Höhle hinein, und hängen dort mit den innersten, nehförmig verflochtenen, an der Höhle des linken Ventrikels gelegenen Fasern zusammen, welche gleichfalls mehr der Länge nach laufen. Zwischen ihnen und diesen nehförmigen Fasern liegt eine 2te Classe von Fasern, die auch schief, aber mehr der Quere nach verlaufen, sich einander durchkreuzen, und den mittelften Platz in der Dicke der Wände des linken Ventrikels einnehmen. An den Längenfurchen, vorzüglich an den der convergen Seite des Herzens gelegenen, scheinen manche tiefere Fasern an die Oberfläche, und manche oberflächliche in die Tiefe zu dringen, und hier sind also manche Bündel der gemeinschaftlichen Fasern mit den der besonderen Fasern verflochten. Im Allgemeinen kann man aber doch vom Herzen behaupten, daß ein dünnwandiger und ein dickwandiger, von eigenthümlichen Fasern gebildeter Ventrikel neben einander liegen, da, wo sie sich berühren, eine Scheidewand bilden,

und in einer äußern, beiden gemeinschaftlichen Lage schiefer Fasern eingehüllt sind. Am breiten Ende der Ventrikeln, wo die Höhle am weitesten ist, ist auch die Wand am dicksten, am spitzen Ende dagegen am dünnsten, unstreitig aus dem nämlichen mechanischen Grunde, aus welchem diejenigen Herzen der Thiere, die eine kleine Höhle haben, auch weniger dicke Wände besitzen, als die welche eine weite Höhle haben.

Die Einrichtung, daß die Fasern auch hier so verschiedene Richtungen haben und unter einander verwebt und verschmolzen sind, hat denselben Nutzen, der rücksichtlich der Vorkammern so eben angegeben worden ist. Allein die große Menge von übereinander liegenden Fasern scheint hier noch die von mir beschriebene besondere Anordnung der verschiedenen Eagen nothwendig gemacht zu haben. Denn man sieht leicht ein, daß, wenn sehr viele Eagen von Cirkelfasern an den Herzkammern über einander gelegen hätten, und äußerlich von Längfasern umgeben worden wären, die tieferen Eagen durch die Zusammenziehung und durch das damit verbundene Dickerwerden der äußeren Eagen nach innen gebogen, und dadurch abgespannt und unfähig gemacht worden sein würden, durch ihre Zusammenziehung den Druck zu vergrößern, den die Herzkammern auf das Blut ausüben. Diesem Nachtheile ist aber dadurch, wie es scheint, vorgebeugt worden, daß die schiefen Fasern des Ventrikels, welche mehr eine quere Richtung haben, und vollständige oder unvollständige Ringe bilden, zwischen jenen 2 Eagen von Längfasern liegen, und unten an der Spitze eine Oeffnung lassen, durch welche die 2 erwähnten Eagen von Längfasern unter einander zusammenhängen. Denn die nahe an der Höhle liegenden netzförmigen Fasern, bei welchen die Richtung nach der Länge vorherrscht, werden durch die sich zusammenziehenden Quersfasern nicht nur abgespannt, sondern im Gegentheile noch mehr gespannt, und umgekehrt, hindern sie auch die mehr der Quere nach laufenden Fasern ganz und gar nicht, ihre Wirkung zu thun, sondern sie ziehen dieselben näher an einander und verengern die Höhle durch die Verkürzung des Herzens. Am rechten Ventrikel, an welchem es nur eine Lage Fasern giebt, die sich sehr der Richtung der Länge nähert, liegt diese unstreitig aus demselben Grunde inwendig, und ist daselbst von 2 Eagen schiefer Fasern umgeben, welche sich sehr der queren Richtung nähern. Jeder Ventrikel hat also solche 2 Eagen schiefer Fasern, die sich sehr der queren Richtung nähern, und vollkommene oder unvollkommene Ringe bilden, und diese 2 Eagen durchkreuzen sich, und nur wenige Fasern liegen ganz quer.

Specielle Beschreibung der Muskelfasern der Herzkammern.

Entblößt man die Herzkammern von dem vom Herzbeutel zu ihnen übergehenden Ueberzuge, so werden linksgewundene Bündel von Fleischfasern, die

efflächliche Lage ausmachen, sichtbar, d. h., Fasern, die, man mag späte Ende des senkrecht aufgestellten Herzens nach unten oder nach oben und man mag das Herz so aufstellen, daß uns die platte oder die gewölbte Seite zugesiehet ist, immer, wenn man sie von unten nach oben verfolgt, unserer rechten Hand zu unserer linken in die Höhe krümmen ¹⁾. Am Ventrikel geht dabei die Richtung der Fasern weniger quer, als am rechten am rechten selbst wieder ist sie an der platten Seite noch mehr quer, ²⁾. Am linken Ventrikel sind die Fleischbündel dieser ersten Art, und unterscheiden sich dadurch von den Faserbündeln der tieferen ersten Ventrikels, die, mit Ausnahme der an der Höhle gelegenen netzartig, platt sind. Diese Lage ist übrigens dünn, denn schon in einer sehr geringen Tiefe ändert sich die Richtung der Fleischfasern nach meinen Untersuchungen beträchtlich.

Die Längenfurche, welche an der gewölbten Oberfläche ³⁾ die inwendige Scheidewand der Herzkammer andeutet, gehen, nach Wolff und nach meinen Untersuchungen, manche Bündel deutlich von der rechten Kammer zur linken ununterbrochen über, und es besteht also diese Lage zum Theil aus Fasern, welche beiden Kammern gemeinschaftlich angehören. Manche machen durch eine kleine Biegung, setzen aber dann ihren Weg fort. An einigen aber scheinen hier auch Fasern der rechten und linken Kammer in die Längenfurche zu dringen, indem sie sich wie in einandergeschobene Finger durchkreuzen. Man merkt man in der Furche einen festen Zusammenhang der neben einander verlaufenden Fasern, der es sehr erschwert, sie weiter zu verfolgen. Dieses letztere ist in hohem Grade in der an der platten Seite gelegenen Längenfurche, wo es Wolff aus diesem Grunde weit schwerer wurde, die Fasern von dem einen Ventrikel auf den andern zu verfolgen. Vielmehr findet man nach Wolff einige der Länge der Furche nach verlaufende Bündel, welche mit den benachbarten verschmelzen ⁴⁾. Ich habe die Lage der Muskelfasern des Herzens, welchem ich es besonders dazu zubereitet hatte ⁵⁾, wiederholt untersucht, und an der hinteren Längenfurche keine solche Fasern, wie sie Wolff abgerufen gesehen, und vielmehr gefunden, daß die Fasern weit leichter in die hintere Längenfurche vom einen Ventrikel zum andern, als auf der gewölbten Oberfläche verfolgt werden konnten.

Es ist noch nicht gehörig bestimmt, wie viele von den Fleischbündeln an den Längenfurchen zur Scheidewand dringen und wie sie sich in derselben verhalten.

Es folge hier dem in der Mechanik üblichen Sprachgebrauch: der Mechaniker stellt eine Schraube, deren Windung er beschreiben will, senkrecht vor sich hin, gleichviel, ob die Schraubenschraube nach oben, oder abwärts gekehrt ist. Er sieht nur, wie der Kopf der Schraubenschraube, den er sehen kann, läuft, wenn er ihn von unten nach oben mit den Augen verfolgt. Bei den im Handel gewöhnlich vorkommenden Schrauben läuft er von der Linken nach der Rechten des Beschauenden, und man nennt sie daher rechtsgewunden. Nach demselben Grundsatz bestimmt man die Windung der Schnecke des rechten und linken menschlichen Ohrs. Wenn man aber, wie Wolff, diejenige Windung rechts nennt, die von unten nach der rechten Seite des Beschauenden hinausgeht, dem das Herz gehört, und wenn man demnach die Fasern, die auf der convexen Seite liegen, als in entgegengesetzter Richtung gewunden betrachtet, als die, welche auf der platten Seite befindlich sind, so kommt man in die Gefahr, sich zu verwirren und mißverstanden zu werden. Ich werde daher bei der Beschreibung der Windungen der Herzfaser die Worte rechts und links nicht auf den Beschauenden, sondern auf den Beschauenden beziehen.

Der. CXIII, CXIV und CXV. Fig. 1. und 2.

Wolff, CXIII, Fig. 1. und 2. CXIV. Fig. 2.

Wolff, CXIV, Fig. 1. CXV. Fig. 2.

Ich füllte 2 frische Menschenherzen mit einer aus gekochtem Leinöl, gemeinem Terpentin und Wernicke zusammengesetzter Masse an, welche die Eigenschaft hat, bei ihrer Erhärtung im kalten Zustande flüssig zu sein, und in Kurzem sehr fest zu werden. Diese Herzen ließ ich 24 Stunden und länger kochen, indem ich, so bald als möglich, den Herzbeutel stammenden Ueberzug des Herzens hinwegnahm. Nachdem das Fett und das Zellgewebe größtentheils entfernt worden waren, zerlegte ich die Muskelfasern, die noch eine große Festigkeit hatten.

Wandt, Anatomie. III.

Aber so viel ist gewiß, daß weder alle zur Scheidewand gehen, noch daß alle von einem Ventrikel auf den andern fortsetzen, und daß man sich also die 2 Ventrikel als 2 Behälter denken dürfe, von welchen jeder nur von eigenen Fleischfasern umwunden, und welcher nur an der Seite, wo er mit andern zusammenstößt, an ihn angewachsen wäre, noch daß die äußere Lage Fleischfasern eine beiden Ventrikeln völlig gemeinschaftliche dünne Schale welche die von ihren besondern Fleischfasern umgebenen 2 neben einander liegenden Ventrikel einschliesse, und keine Fasern enthalte, die zur Scheidewand über und nur einem Ventrikel angehörten.

Die Scheidewand der Ventrikel ist bei weitem nicht so dick, wie die Seitenwände derselben zusammengenommen, was der Fall sein würde, wenn Ventrikel ringsum von einer gleichdicken fleischigen Wand umgeben wäre beide mit ihrer einen Wand an einander stießen. Da aber beide Ventrikel sich von einer ihnen großentheils gemeinschaftlichen Fleischfaserslage umgeben so trägt diese wenig dazu bei, die Scheidewand dick zu machen.

Der Theil der Scheidewand, welcher dem rechten Ventrikel zugekehrt und von den fortgesetzten Fasern des rechten Ventrikels gebildet wird, ist meinen Untersuchungen äußerst dünn, viel dünner als die Wand des rechten Ventrikels. Er besteht nur aus netzförmig verflochtenen Fasern, und selbst dies nicht allein von fortgesetzten Muskelfasern des rechten Ventrikels gebildet, denn es gehen an der vorderen Längsfurche Muskelfasern des linken Ventrikels in diesen Theil der Scheidewand über, und hängen sogar mit dem quer durch die Höhle des rechten Ventrikels laufenden Fleischbündel zusammen. In der der hinteren Längsfurche aber gehen die eignen Muskelfasern des rechten Ventrikels in diesen Theil der Scheidewand über.

Was die Enden der Fasern dieser oberflächlichsten Lagen von Fleischlangt, so sind diese derselben in der queren Gränzfurche zwischen Ventrikeln Artrien an dem aus härterem Zellgewebe und aus knorpelähnlicher Materie bestehenden Ringe und an den Rändern der 2 Arterienöffnungen angeheftet. Viele von ihnen aber auch aus der Längsfurche hervor, ohne daß man ihr Ende nachweisen kann.

Die Lungenarterie sitzt mit ihrem Anfange auf einer hohlen, kegelförmigen fleischigen Verlängerung des rechten Ventrikels auf, welche zum Theil aus förmigen, etwas schief liegenden Fasern besteht¹⁾. Am breiten Ende des Herzes erstrecken sich manche Fasern in die Zwischenräume, welche zwischen den hier befindlichen 4 Öffnungen, den 2 Vorhoföffnungen und den 2 Kammeröffnungen befindlich sind.

An der Spitze der linken Herzkammer bilden die Fasern dieser äußeren Lagen eine Art von Wirbel oder Mittelpunkt²⁾. Durch eine Öffnung, welche die 2te beschreibende Lage Fleischlage an dieser Stelle hat, schlagen sich vielleicht von den hier zusammengekommenen Fasern der ersten Lage nach innen hinein gelangend dadurch an die innere Oberfläche, wo sie eine entgegengesetzte Richtung von dem spitzen nach dem breiten Ende, anzunehmen scheinen, sich aber wegen vielfachen Verflechtung sehr schwer verfolgen lassen. (Jener Verlauf findet bei der Untersuchung mehrerer, unten genannter Anatomen Statt, nach dem sie sich die einen Wirbel bildende oberflächliche Lage an diesem Loch fest³⁾ die nächsten Fasern der 2ten Lage⁴⁾ schlagen sich in das Loch hinein.) Es ist übrigens in der Wirkung keinen großen Unterschied, ob die sehr der Länge laufenden Fasern der äußeren Oberfläche wirklich in die innere Oberfläche umgebrochen übergehen, oder ob sie unten an der Seite des Herzens nur unter einander verwachsen sind. Die Fasern des rechten Ventrikels bilden an der Spitze selbst keinen solchen Wirbel, sondern gehen theils an der vorderen Längsfurche des linken, theils an der hinteren Längsfurche in die Scheidewand des rechten Ventrikels über.

Ich habe bis jetzt die äußerste Lage der Fleischfasern der Kammern beschrieben. Nun wende ich mich sogleich zur Beschreibung der allerinnersten

¹⁾ Loder, CXIII. Fig. 1, 48, 53. Fig. 2, 63, 58. CXIV. 42—47, 62. CXVI. Fig. 2, 3—5, 6—11.

²⁾ Dasselbst, CXIII. Fig. 1, 151, 152. Fig. 2. vorzüglich deutlich CXIV. F. 19. 136—151. CXV. Fig. 2. 125.

³⁾ Dasselbst, CXVI. Fig. 3, 47, 48.

⁴⁾ Dasselbst, CXVI. Fig. 3, 46. Fig. 1, 88, 89.

welche mit der inneren Haut des Herzens in Berührung ist, und werde dann erst die beiden diesen beiden Lagen befindlichen mittleren Lagen beschreiben. Die innerste Lage der Fleischfasern des rechten und des linken Ventrikels besteht aus nezförmig unter einander verflochtenen Faserbündeln, die sich an den Seitenwänden überziehen, und an ihnen im Ganzen mehr der Länge nach verlaufen, theils aber auch nicht selten an der Spitze als ringsum freie Bündel von einer Wand zur gegenüberliegenden gehen, und die Spitze in viele kleine Stellen theilen. Sie werden von der sehr dünnen und durchsichtigen Haut des Herzens überzogen, die sich in die von ihnen gebildeten Zwischenräume hineinbläht. Sie hängen mit den in die Höhle der Herzkammern hervorragenden Wurzelmuskeln zusammen, deren bei der Beschreibung der Klappen Erwähnung gemacht ist. In der linken Herzkammer ist diese innerste Lage weit dicker als in der rechten, aber in der rechten giebt es in der Nähe der Spitze mehr quer über durch die Höhle des Ventrikels gehende freie Fleischbündel.

Zwischen der äußersten Lage, welche beide Herzkammern größtentheils gemeinschaftlich überzieht, und der innersten nezförmigen Lage, befindet sich an der rechten Herzkammer eine einzige dünne Lage, an der linken Herzkammer aber eine dicke Fleischlage, welche sich nach Wolff¹⁾ in 3 bis 4 Lagen theilen läßt. Die Fasern, von welchen sie gebildet wird, erstrecken sich meistens nicht von der einen Kammer auf die andere hinüber, sondern gehören, so wie die der innersten Lage, jedem der beiden Ventrikel einzeln an. Da die Fleischfasern des linken Ventrikels, welche an der Oberfläche linksgewunden und sehr der Länge nach hinaufsteigen, in den tieferen Lagen allmählig eine fast quere, zugleich aber noch immer links gewundene, dann nach unten nach eine fast quere rechtsgewundene, hierauf eine rechtsgewundene und sehr der Länge nach gehende Richtung annehmen, und noch tiefere Fasern endlich fast gerade der Länge nach verlaufen, übrigens keine Grenzen, namentlich keine Lagen von Zellgewebe zwischen den verschiedenen Schichten bemerklich sind, so hängt es sehr von der Willkühr ab, wie viel verschiedene Lagen man an dieser mittlern Lage unterscheiden will, und es ist folglich hieran kein großes Gewicht zu legen.

Durchschneidet man bis zu einer gewissen Tiefe die oberflächlichste Lage der Fleischfasern des rechten Ventrikels und schält dieselbe gewissermaßen ab, was freilich nur mit einiger Gewalt und mittelst des Durchschneidens mancher von der Oberfläche in die Tiefe dringender, und aus der Tiefe an die Oberfläche tretender Fleischbündel gelingt, so entblößt man am rechten Ventrikel die mittlere Lage von Fasern²⁾, die durch die Richtung ihrer Muskelfasern von der äußern unterscheidbar ist. Die Fleischfasern verlaufen nämlich an ihr ziemlich der Länge nach, zugleich aber meistens etwas rechtsgewunden, während die der äußern Lage fast quer verlaufen, und zugleich linksgewunden sind. Die Lage dieser Fasern ist am linken Ventrikel sehr viel dicker, als am rechten. Sie besteht am rechten nicht einmal die ganze Oberfläche, sondern an manchen Stellen kommen die nezförmig verflochtenen Muskelfasern zum Vorschein³⁾, welche die mittlere Lage bilden; an diesen Stellen findet ein offener Zusammenhang dieser inneren Lage mit der mittleren Statt. Daher kommt es auch, daß man, wenn man nach dem Beispiele Winslows die beiden Herzkammern von einander nahezu absondern und losstrennen, und dabei so wenig Fasern als möglich durchschneiden will, man den größten Theil der Scheidewand der Herzkammern am linken Ventrikel zurücklassen muß.

Am linken Ventrikel kann man das zwischen der äußersten und innersten Lage gelegene Fleisch etwa in 3 Lagen theilen, 1) in die, welche auf die äußerste Lage zunächst folgt, und eben so wie sie links gewunden hinaufsteigt,

1) C. F. Wolff, Diss. VII. De stratis fibrarum in universum; Nova Acta Acad. sc. imp. Petrop. Tomus III. ad annum 1785. Petropoli 1788. p. 227. — Diss. de fibris mediis fibrarum ventriculi dextri. Nova acta sc. imp. Petrop. ad annum 1786. Petropoli 1789. p. 211 und 242; ferac Diss. X. De strato secundo fibrarum ventriculi sinistri. Nova acta ad ann. 1788. Petropoli 1790. p. 217.

2) Loder. CXVI. Fig. 1 und 3.

3) Dasselst. CXVI. Fig. 1. 48. 49. 50. 53. 60. 65.

und in einer äußern, beiden gemeinschaftlichen Lage schiefer Fasern eingehüllt sind. Am breiten Ende der Ventrikeln, wo die Höhle am weitesten ist, ist auch die Wand am dicksten, am spitzen Ende dagegen am dünnsten, unstreitig aus dem nämlichen mechanischen Grunde, aus welchem diejenigen Herzen der Thiere, die eine kleine Höhle haben, auch weniger dicke Wände besitzen, als die welche eine weite Höhle haben.

Die Einrichtung, daß die Fasern auch hier so verschiedene Richtungen haben und unter einander verwebt und verschmolzen sind, hat denselben Nutzen, der rücksichtlich der Vorkammern so eben angegeben worden ist. Allein die große Menge von übereinander liegenden Fasern scheint hier noch die von mir beschriebene besondere Anordnung der verschiedenen Lagen nothwendig gemacht zu haben. Denn man sieht leicht ein, daß, wenn sehr viele Lagen von Cirkelfasern an den Herzkammern über einander gelegen hätten, und äußerlich von Längensfasern umgeben worden wären, die tieferen Lagen durch die Zusammenziehung und durch das damit verbundene Dickerwerden der äußeren Lagen nach innen gebogen, und dadurch abgespannt und unfähig gemacht worden sein würden, durch ihre Zusammenziehung den Druck zu vergrößern, den die Herzkammern auf das Blut ausüben. Diesem Nachtheile ist aber dadurch, wie es scheint, vorgebeugt worden, daß die schiefen Fasern des Ventrikels, welche mehr eine quere Richtung haben, und vollständige oder unvollständige Ringe bilden, zwischen jenen 2 Lagen von Längensfasern liegen, und unten an der Spitze eine Oeffnung übrig lassen, durch welche die 2 erwähnten Lagen von Längensfasern mit einander zusammenhängen. Denn die nahe an der Höhle liegenden netzförmigen Fasern, bei welchen die Richtung nach der Länge vorherrscht, werden durch die sich zusammenziehenden Quersfasern nicht nur abgespannt, sondern im Gegentheile noch mehr gespannt, und umgekehrt, hindern sie auch die mehr der Quere nach laufenden Fasern ganz und gar nicht, ihre Wirkung zu thun, sondern sie ziehen dieselben näher an einander und verengern die Höhle durch die Verkürzung des Herzens. Am rechten Ventrikel, an welchem es nur eine Lage Fasern giebt, die sich sehr der Richtung der Länge nähert, liegt diese unstreitig aus demselben Grunde inwendig, und ist daselbst von 2 Lagen schiefer Fasern umgeben, welche sich sehr der queren Richtung nähern. Jeder Ventrikel hat also solche 2 Lagen schiefer Fasern, die sich sehr der queren Richtung nähern, und vollkommene oder unvollkommene Ringe bilden, und die 2 Lagen durchkreuzen sich, und nur wenige Fasern liegen ganz quer.

Specielle Beschreibung der Muskelfasern der Herzkammern.

Entblößt man die Herzkammern von dem vom Herzbeutel zu ihnen übergehenden Uebergange, so werden linksgewundene Bündel von Fleischfasern, die

Mitte liegen, von denen die oberflächliche Lage der Längensfasern links gewunden, die innere Lage von Längensfasern rechts gewunden ist;

4) daß endlich beide Ventrikel an ihrer innern Oberfläche netzförmig verflochtene Fasern (die innerste Lage) besitzen, bei welchen die Längensrichtung vorherrscht, und die mit den Warzenmuskeln der Klappen in Verbindung stehen. Aus dieser Darstellung sieht man ein, daß der rechte Ventrikel sowohl rechtsgewundene als auch linksgewundene, fast quere Fasern besitze, und daß bei dem linken Ventrikel nicht nur dasselbe Statt finde, sondern daß er auch 2 Lagen von sehr der Länge nach laufenden Fasern besitze, die nach entgegengesetzter Richtung gewunden sind. Daß der linke Ventrikel viel mehr Quersfasern als Längensfasern, und viel mehr Quersfasern als der rechte Ventrikel besitze, und daß er auch die Längensfasern vor ihm ganz voraus habe. Endlich, daß die an der äußeren Oberfläche des Herzens und die an der inneren Oberfläche desselben gelegenen Faserbündel durch eine Theilung derselben in Nester verflochten und verschmolzen sind, und zum Theil eine mehr cylindrische Gestalt haben, während dagegen die in der Mitte gelegenen weniger ästig, und vielmehr platt sind.

Am rechten Ventrikel kann man demnach 3 Lagen von Fasern unterscheiden:

- 1) die oberflächliche Lage aus fast queren linksgewundenen, platten und ästigen Bündeln;
- 2) die mittlere Lage aus fast queren, rechtsgewundenen platten;
- 3) die innerste netzförmige Lage aus rundlichen, mehr nach der Länge laufenden ästigen Fasern bestehende.

Am linken Ventrikel kann man mit Wolff 5 Lagen von Fasern annehmen:

- 1) die oberflächliche Lage aus mehr der Länge nach laufenden, linksgewundenen, rundlichen, ästigen Strängen bestehende;
- 2) die mittlere Lage aus fast queren, linksgewundenen platten;
- 3) die auch zur mittlern Lage gehörige, aus fast queren rechtsgewundenen;
- 4) die innere Lage aus mehr der Länge nach laufenden, rechtsgewundenen platten;
- 5) die innerste Lage aus netzförmigen, verflochtenen, ästigen, rundlichen, meistens mehr die Längensrichtung habenden Fasern bestehende und in die Warzenmuskeln übergehende.

Bereinigt man nun die hier mit 2 und 3 bezeichneten Quersfasern unter einem Namen, so erhält man nur 4 Lagen; theilt man dagegen die mit 5 bezeichnete innerste Lage in 2, so kann man sogar 6 Lagen unterscheiden, ohne in seiner Meinung abzuweichen. Wolff nimmt 5 bis 6 Lagen an.

In den wesentlichen Punkten stimmen die Beschreibungen mehrerer Anatomen, die sich mit der Structur des Herzens beschäftigt haben, Lancisi's, Winslow's, Glasse's, Senac's, Haller's, Wolff's, Gerdy's u. meine eigenen Beobachtungen sehr gut überein, und versteht man unter fibrillis reclus Fasern, welche sich der Längenrichtung nähern, und unter fibrillis spirales gewundene Fasern, die sich der queren Richtung nähern, so vereinigen sie auch damit die Beschreibungen des Borellus und des Lower¹⁾, die all Andern hierin vorangegangen sind.

Alle diese Anatomen nehmen am linken Ventrikel äußere, mehr der Länge nach laufende, mittlere, mehr quere, innere neßförmige, wieder mehr der Länge nach laufende Fasern an.

Senac's Beschreibung der Muskelfasern des Herzens stimmen in der Hauptsache auch mit der von Wolff gegebenen überein, wie schlecht auch die ihm gegebenen Abbildungen sind. Denn am rechten Ventrikel erkannte Senac 3 Lagen äußere, von der Basis zur Spitze schief, und nach der linken Seite des Herzens zu herübersteigende, die sich aber der queren Lage mehr nähern, die des linken Ventrikels, mittlere, die auch eine sehr quere Lage haben, ab entgegengesetzt als die vorigen gewunden sind, und endlich innere neßförmig. Am linken Ventrikel steigen, nach Senac, die oberflächlichen Fasern vorn in der Grundfläche zur Spitze nach der linken Seite des Herzens zu herab, in nächster tiefer liegenden Lagen behalten diese Richtung bei, nehmen aber immer mehr und mehr, und endlich ganz die quere Lage an. Die noch tiefer liegenden werden wieder von neuem schief, aber in entgegengesetzter Richtung, und nehmen je tiefer sie liegen, desto mehr eine von der Spitze zur Basis gehende Längenausrichtung an, und die innersten bilden dann endlich die neßförmig verflochtenen Muskel, die man trabeculae carneae nennt²⁾.

Unsere Kenntniß vom Baue des Herzens würde nun aber noch vollständiger sein, wenn wir den Verlauf der Fasern und die Lagen, die sie bilden, nicht nur an den Seitenwänden, sondern auch an der Scheidewand genau kennten. Aber gerade die fibröse Structur der Scheidewand ist von vielen Anatomen oberflächlicher untersucht und sogar von dem genauesten Beschreiber der Herzfaser, von Wolff ganz mit Stillhschweigen übergangen worden.

Ich fand bei der von mir gemachten Untersuchung der Herzfaser, daß von der Scheidewand der Herzkammern nur eine sehr dünne Lage dem rechten Ventrikel angehört, eine Lage, die sehr viel dünner ist, als die Seitenwände des rechten Ventrikels; denn wenn ich die Fleischfasern der Scheidewand von der Höhle des rechten Ventrikels aus abzuwickeln anfing, so gehörten nur eine sehr dünne Lage neßförmiger und sehr wenig rechts gewundene Fasern dem rechten Ventrikel, und unter ihnen folgten sogleich Fasern, die dem linken Ventrikel gehörten und der Länge nach und etwas linksgewunden verliefen; dann folgten eine dicke Schicht schief, aber zugleich sehr quer verlaufender Fasern, bis endlich zuletzt die neßförmigen innersten Fasern des linken Ventrikels sichtbar gemacht wurden. An der vorderen Längenfurche sieht man sogar, wie ich schon an einer andern Stelle bemerkt habe, gar keine Fasern von der Ober-

¹⁾ Borellus und Lower's Beobachtungen, nicht in Haller: De part. corp. hum. praecip. fabrica et functionibus. Lib. IV. Sect. 3. §. 22.

²⁾ Sénac, Traité de la structure du coeur, seconde édit. à Paris 1774. 4. Tome Tab. X et XI.

fläche und von der mittleren Lage des rechten Ventrikels sich zur Scheidewand desselben begeben, wohl aber die netzförmigen Fasern derselben ununterbrochen mit der 2ten Lage des linken Ventrikels zusammenhängen. Die dem linken Ventrikel angehörenden Fasern der Scheidewand lassen sich leicht von einander abziehen, und sie sind also in der Tiefe nicht so unter einander verschlochten, wie an der Oberfläche in der Längenfurche, und gehen auch nicht wie da quer durch die Scheidewand.

Obgleich es ziemlich leicht ist, die beschriebenen Faserlagen des Herzens zu erkennen, so ist es doch sehr schwer, zu sagen, in welchem Zusammenhange sie unter einander stehen, z. B. ob die inneren, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern des linken Ventrikels eine Fortsetzung der äußern, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern sind, und welche Faserbündel = Cirkel, welche vielleicht Spiralen bilden u. s. w. Vieles, was hierüber geäußert worden ist, ist Vermuthung, und nur an einzelnen Stellen gelingt es, diesen Zusammenhang zu entwickeln.

Was die Frage anlangt, ob vielleicht die an der äußeren und an der inneren Oberfläche des linken Ventrikels verlaufenden Fasern, die sich der Längsrichtung nähern, sich unter einander verbinden, so ist schon lange bekannt, daß ein großer Theil der an dem breiten Ende der Ventrikel entspringenden, über den linken Ventrikel weggehenden Fasern unten an der Spitze des linken Ventrikels zusammenkommen und dasselbst eine Art von Wirbel bilden. Es ist auch bekannt, daß die mittlere Lage von Herzfasern daselbst ein von gebogenen Fasern umgebenes Loch übrig läßt. Schon Borellus und Lower¹⁾, Lancisi²⁾ und

¹⁾ Ich setze hier das her, was Haller sehr kurz und deutlich von dem Resultate ihrer Untersuchungen über den Bau des Herzens anführt (De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus, Lib. IV. Sect. 3. §. 22.) Wenn man unter fibris rectis solche die sich von der Längsrichtung unter fibris spirae similes solche, die sich der queren Richtung nähern, versteht, so stimmen diese Beobachtungen ziemlich gut mit den der neueren Anatomen überein: »docuerat, fibras nempe rectas a basi ad mucronem euntes et in caveas ventriculorum reflexas: tum duo alia strata fibrarum, quae ad spirae modum ad mucronem descendant, postquam secum sui similibus decussarunt, et partim columnas interni cordis effecerunt et partim ad basin redierunt.

²⁾ Die Resultate der Untersuchungen des Lancisi an frischen, an gefodten und an in Ossa macerirten Herzen, welche mit den Beobachtungen Wolffs und mit den meinigen sehr gut übereinstimmen, setze ich in einem kurzen Auszuge hierher, bei welchem ich der Kürze und Verständlichkeit wegen manches weggelassen habe.

»Fibrae ex extrema facie auricularum oblique et spirali quasi ordine per extimam ventriculorum partem ad usque mucronem ducuntur, mole simul augentur crassum ventriculorum corticem componunt, exceptis paucis, quae in medio itinere « (in sulco longitudinali?) » introrsum penetrant, et spirales fibras hic illic vinciunt. Cum vero spirales fibrae ad mucronem pertigerint, facta simplici advolutione, introferuntur, intimamque ventriculorum, ac sinistri praesertim faciem eleganter constituunt. Etenim vel nudis oculis cognoscitur internas ventriculorum partes ac tendineos valvularum tricuspidalium funiculos ex liisdem fibris oriri, quibus externa ventriculorum facies coagmentatur.«

(später Winslow¹⁾ waren der Meinung, daß von jenem Wirbel aus Fasern in das Innere des linken Ventrikels aufstiegen, und daß daher die Fasern in der Nähe der inneren Oberfläche, die sehr der Länge nach liegen, mit den Fasern an der äußeren Oberfläche, die sich auch der Längenrichtung nähern, ununterbrochen zusammenhängen. Diefelbe Ansicht hat auch Glass²⁾ vertheidigt, und selbst Wolff³⁾ hat Beobachtungen gemacht, die ihr günstig sind, denn er hat nicht nur jene in der mittleren Lage befindliche Oeffnung an der Spitze des linken Ventrikels auch beobachtet, sondern auch gesehen, wie sich die Längensfasern der äußeren Lage an dieser Oeffnung festsetzen und sie verschließen, und wie sich einige Bündel der darauf folgenden Lage in die Oeffnung hineinschlagen.

Gerdy⁴⁾ behauptet; die oberflächliche Lage von Fleischfasern, welche über die Längensfurchen von einem Ventrikel zum andern hinüberginge und beide Ventrikel vereinigte, entspringe am breiten Ende der Ventrikel an den Oeffnungen, durch welche die Adrien und die Arterien mit den Ventrikeln zusammenhängen. Die an der vorderen Seite des breiten Endes des rechten Ventrikels entspringenden Fasern ließen über die vordere Längensfurche schief nach links herab, concentrirten sich an der Spitze, bildeten daselbst eine Krümmung, die mit dem unteren Theile einer S verglichen werden könnte, und ließen inwendig im Fleische des linken Ventrikels gegen das breite Ende desselben hinauf. Die oberen Enden dieser in Form einer S gekrümmten Fasern vereinigten sich also nicht, denn das eine wäre oben am rechten, das andere Ende oben am linken Ventrikel befestigt. Der oben am rechten Ventrikel entspringende Theil dieser in Form einer S gekrümmten Fasern läge an der Oberfläche beider Ventrikel, der oben am linken Ventrikel endigende Theil dieser Fasern läge in der Tiefe zwischen andern Fleischfasern des linken Ventrikels. Die an der hinteren Seite des breiten Endes des linken Ventrikels entspringenden Fasern krümmten sich

Alter fibrarum ordo occultatur a Natura inter supradictos spiralem fibrarum faeces, quas scilicet primo externam, et mox ultro productas internam cordis faciem componere memoravimus. Etenim alia multi generis strata fibrarum, quae centrum tenent crassitie parietum sinistri praesertim ventriculi tamquam intra duplicatum istarum fasciarum marginem stricto continentur. Haec fibrarum strata ducuntur ordine, plus minus ad longitudinem cordis inclinato, ita, ut nonnulla acutum, nonnulla rectum efficiant: sed istae fibrae quasi vinctae non ea lege feruntur, ut per mucronem intra cavitas pertingant, sed in circulares tendines ad cordis basim locatos, a quibus exterius seu paulo superius ortum sumpserunt, majori ex parte interius seu paulo inferius recurrunt. *Jo. Mar. Lancisii de motu cordis et aneurysmatibus opus posthumum.* Lugd. Batav. 1740. Propositio 31, p. 106.

¹⁾ *Winslow*, Sur les fibres du coeur et sur les valvules avec la manière de les préparer pour les démonstrer, *Mém. de l'Ac. roy. des sc.* 1711. *Ausgabe in 8.* p. 197.

²⁾ *Glass*, Halleri Coll. Disp. anat. select. Vol. II. p. 251. Clare igitur jam apparere putem, tres tantum praecipuos fibrarum esse ordines, qui cordis specubus circumdantur, *exteriores* videlicet, quae ab ejus basi ortae et spirali quasi reptatu oblique sinistrorsum delatae, minimam partem ad cordis cuspidem decurrunt, ubi ad interiora ejus reflexae, oblique sursum rursus asurgunt, cordis basin repetendo: quae igitur alteram fibrarum obliquarum seriem eamque *interiorem* sistunt. Inter hosce binos fibrarum ordines tertium intercedit *medius*, in plures lamellas facile dividuus, qui ex villis plus minusve transversalibus conflatus, quorum quaedam utrumque cordis ventriculorum complectuntur.

³⁾ *Wolff*, *Nova acta Petrop.* T. X. 1792. p. 180, 181 seqt: Nimirum ubi a oram aperturae hujus ventriculi (sinistri) fibrae flabellatae minores perveniunt, flexae circa oram in cavitatem ventriculi ea ratione descendunt, ut ad parietem eundem quem exterius hactenus texerant, se applicent et retrorsum oblique basin et marginem versus interius continentur fibrisque a immisceant parietalibus internis.

⁴⁾ *P. N. Gerdy*, *Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de physiologie et de pathologie*; à Paris 1823. 4. p. 24 sq.

über die hintere Längenfurche zum rechten Ventrikel hinüber, concentrirten sich aber nicht an der Spitze desselben, sondern drängen in die vordere Längenfurche in den rechten Ventrikel ein, würden aber schon vorher von Fasern der vorderen Seite des Herzens bedeckt. Sie hätten auch die Form einer 8, und die eine Hälfte der 8 wäre an der Oberfläche, die andere in der Tiefe am rechten Ventrikel gelegen, der Anfang dieser in Form einer 8 gekrümmten Bündel wäre hinten an den Oeffnungen des linken Ventrikels, das Ende derselben an den Oeffnungen des rechten Ventrikels angeheftet.

Zweitens beschreibt Gerdy in jedem Ventrikel Fleischbündel, die immer nur einem von beiden Ventrikeln angehören und sich nicht von einem auf den andern erstrecken. Diese bilden Ringe oder Stücke von Ringen, welche den mittleren Raum zwischen der oberflächlichsten und tiefsten Faserlage an den Wänden der Ventrikel einnehmen. Endlich beschreibt Gerdy tiefliegende Fleischbündel, welche an dem der platten Seite des Herzens zugekehrten Theile der Scheidewand quer aus der Höhle des einen in die Höhle des andern hinübergehen, und sich daselbst den eigenthümlichen Fasern jedes Herzens zugesellen, denen sie dann in ihrem weiteren Verlaufe gleichen. Ich muß gestehen, daß ich diese tiefen gemeinschaftlichen Fasern beider Ventrikel nicht gefunden habe. Ueberhaupt hat Gerdy das, was er beobachtet hat, von dem, was er sich zusammengereimt und was er geschlossen hat, nicht genug getrennt, und seine Arbeit ist nicht geeignet, die Dunkelheit aufzuklären, die über den Verlauf der einzelnen Fleischbündel noch herrscht.

Beschreibung der vier Abtheilungen des Herzens im Einzelnen.

Der rechte oder vordere Vorhof, oder der Hohlvenensack,
atrium dextrum.

Der rechte Vorhof (oder mit andern Worten, die rechte Vorlammer, der Hohlvenensack), atrium dextrum, von Manchen auch Herzohr im weiteren Sinne des Wortes genannt, bildet den am meisten nach rechts und nach vorn gelegenen Theil des breiten Endes des Herzens. Innerhalb des Herzbeutels tritt von oben die obere, von unten, wo der Vorhof auf dem Zwerchfelle aufliegt, die untere Hohlvene in ihn hinein. Beide Hohlvenen haben hierbei keine solche Richtung, daß sie, wenn man sie sich verlängert dächte, auf einander träfen, denn die obere steigt so herab, daß sie zugleich etwas von hinten nach vorn gerichtet ist. Das Herzohr, auricula, im eigentlichen Sinne des Wortes, ist ein vom vorderen Theile desselben ausgehender gebogener platter, und an seiner Spitze verschlossener Bispel, der den Ursprung der Körperarterie bedeckt. An der Stelle, wo sich äußerlich die Quersurche, und inwendig der Rand befindet, welcher die in die Kammer führende Vorhofsmündung umgiebt, ferner an der Scheidewand, an der ringförmigen Oeffnung der Hohlvene, und hinten weiter herunter ist der Vorhof nicht uneben. Dagegen ist der vordere und nach rechts gelegene, zwischen dem Herzohr und der untern Hohlvene befindliche Theil des Vorhofs durch die muscoli pectinati, Kammuskeln, uneben. Vom glatten Rande der Vorhofsmündung geht nämlich ein breites und dickes Fleischbündel aus, welches sich in viele kleine, rundliche Fleischbündel spaltet, die sich am ganzen erwähnten vordern, zwischen der Vena cava inferior und der Auricula

gelegenen Theile des Vorhofs aufwärts herumbiegen, und oben mit ähnlichen Bündeln zusammenstoßen, die vom vordern und inneren fleischigen Theile der glatten Mündung der Vena cava superior ausgehen. Mit diesen rundlichen Fleischfaserbündeln hängen auch die ununterbrochen zusammen, welche die Höhle des Herzohrs uneben machen, indem sie sich daselbst vielfach durchkreuzen.

An der ziemlich glatten Scheidewand, septum atriorum, befindet sich die von einem (vorzüglich oben dicken) fleischigen Ringe, isthmus, umgebene ovale Grube, fossa ovalis, die dünnste Stelle der Scheidewand und die Spur einer hier bei der Frucht vorhanden gewesen ovalen Oeffnung, foramen ovale, durch welche die beiden Vorhöfe unter einander communicirten. Neben der erhabensten Stelle des Isthmus in dem Winkel, wo sich die äußerlich sichtbare Längsfurche und Quersfurche an der platten Seite des Herzens einander durchkreuzen, befindet sich im rechten Vorhofe die von einer einfachen, halbmondförmigen Klappe, valvula Thebesii, bedeckte rundliche Oeffnung der Herzvene, der kleinsten unter den in den Vorhof gehenden Venen.

Da, wo die Vena cava inferior in die vordere Nebenkammer übergeht, liegt ohnweit des Ostium venosum der vordern Herzkammer eine sichelförmige häutige Falte der inneren Haut, welche von ihrem Aufhänger ¹⁾ die Eustachische Klappe (valvula Eustachii) heißt. In der Mitte ist sie am breitesten, nach ihren zugespitzten Enden zu wird sie allmählig schmaler. Sie erstreckt sich von dem untern linken Theile des Ringes, der das Foramen ovale umgiebt, schräg vorwärts und rechts zu der vordern Seite der Mündung der Vena cava inferior, so daß ihr eines Ende an jenem, das andere an dieser liegt. Ihre vordere Fläche ist nach dem Ostium venosum der vordern Herzkammer, ihre hintere Fläche nach der Mündung jener Vene, und ihr concaver Rand ist aufwärts gewandt. Im Embryo ist sie unverletzt, und scheint den Nutzen zu haben, das Blut der Vena cava zum Foramen ovale zu leiten, indem sie, gleichsam als ein Damm, es von dem Ostium venosum der vordern Herzkammer abhält. Auch in Erwachsenen findet man sie in manchen Herzen ganz; in einigen aber findet man sie durchlöcheret, und nicht selten netzförmig, von mehreren großen Löchern durchbrochen. Bei manchen auch mehr oder weniger verschmälert, und in einigen vermisst man sie ganz.

In der Nähe des Isthmus befinden sich zuweilen Oeffnungen kleiner, sich besonders mündender Herzvenen, foramina Thebesii.

¹⁾ Eustach. in libell. de vena sine pari. Antigramm. 11. Opusc. p. 289. —
Richtig sind die Abbildungen dieser Klappe in seinem Tafeln. Tab. VIII. f. 6. XVI. f. 3.

Wände und von der mittleren Lage des rechten Ventrikels sich zur Scheidewand desselben begeben, wohl aber die netzförmigen Fasern derselben ununterbrochen mit der 2ten Lage des linken Ventrikels zusammenhängen. Die dem linken Ventrikel angehörenden Fasern der Scheidewand lassen sich leicht von einander abziehen, und sie sind also in der Tiefe nicht so unter einander verflochten, wie an der Oberfläche in der Längensfurche, und gehen auch nicht wie da quer durch die Scheidewand.

Obgleich es ziemlich leicht ist, die beschriebenen Faserlagen des Herzens zu erkennen, so ist es doch sehr schwer, zu sagen, in welchem Zusammenhange sie unter einander stehen, z. B. ob die inneren, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern des linken Ventrikels eine Fortsetzung der äußern, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern sind, und welche Faserbündel = Cirkel, welche vielleicht Spiralen bilden u. s. w. Vieles, was hierüber geäußert worden ist, ist Vermuthung, und nur an einigen Stellen gelingt es, diesen Zusammenhang zu entwickeln.

Was die Frage anlangt, ob vielleicht die an der äußeren und an der inneren Oberfläche des linken Ventrikels verlaufenden Fasern, die sich der Längsrichtung nähern, sich unter einander verbinden, so ist schon lange bekannt, daß ein großer Theil der an dem breiten Ende der Ventrikel entspringenden, über den linken Ventrikel weggehenden Fasern unten an der Spitze des linken Ventrikels zusammenkommen und davalst eine Art von Wirbel bilden. Es ist auch bekannt, daß die mittlere Lage von Herzfäsern daselbst ein von gebogenen Fasern umgebenes Loch übrig läßt. Schon Borellus und Lower¹⁾, Lancisi²⁾ und

¹⁾ Ich setze hier das her, was Haller sehr kurz und deutlich von dem Resultate seiner Untersuchungen über den Bau des Herzens anführt (De partium c. h. praecipuorum fabrica et functionibus, Lib. IV. Sect. 3. §. 22.) Wenn man unter fibris rectis solche die sich von der Längsrichtung unter fibris spirae similes solche, die sich der queren Richtung nähern, versteht, so stimmen diese Beobachtungen ziemlich gut mit den der neueren Anatomen überein: »docuerat, fibras nempe rectas a basi ad mucronem euntes et in caveas ventriculorum reflexas: tum duo alia strata fibrarum, quae ad spirae modum ad mucronem descendunt, postquam secum sui similibus decussarunt, et partim columnas interni cordis effecerunt et partim ad basin redierunt.

²⁾ Die Resultate der Untersuchungen des Lancisi an frischen, an geföchten und an in Essig macerirten Herzen, welche mit den Beobachtungen Wolffs und mit den meinigen sehr gut übereinstimmen, setze ich in einem kurzen Auszuge hierher, bei welchem ich der Kürze und Verständlichkeit wegen manches weggelassen habe.

»Fibrae ex extima facie auricularum oblique et spirali quasi ordine per extimam ventriculorum partem ad usque mucronem ducuntur, mole simul augeatur crassum ventriculorum corticem componunt, exceptis paucis, quae in medio itinere « (in sulco longitudinali?) » introrsum penetrant, et spirales fibras hic illic vinciunt. Cum vero spirales fibrae ad mucronem pertigerint, facta simplici advolutione, introferuntur, intusnamque ventriculorum, ac sinistri praesertim faciem eleganter constituunt. Etenim vel nudis oculis cognoscitur interna ventriculorum partes ac tendineos valvularum tricuspidalium funiculos ex iisdem fibris oriri, quibus externa ventriculorum facies coagmentatur.«

Der linke oder hintere Vorhof, oder der Lungenvenensac-
atrium sinistrum oder posterius.

Er liegt etwas höher und mehr rückwärts als der Hohlvenen wird von vorn von der Lungenarterie und von der Körperarterie, die einer zwischen beiden Vorhöfen befindlichen Einbeugung liegen, bed so daß man von vorn nichts von ihm sieht, als das links neben Lungenarterie hervorragende Herzohr. Man muß daher das Herz seiner platten Seite aus betrachten, um diesen Vorhof deutlich zu se Daselbst treten in den oberen Theil des Vorhofs die 4 Lungenve- 2 rechts und 2 links ein. Die Oeffnungen der 2 rechten liegen 1 unter einander, und eben so auch die der 2 linken; dagegen befindet ein großer Zwischenraum zwischen den rechten und den linken Oeffnungen. An keiner einzigen Oeffnung ist eine Klappe vorhanden. Der linken Herzkammer nähere Theil des Vorhofs nimmt keine Venen a

Das linke Herzohr, auricula sinistra, ist ein links hervorstehen mehrfach eingekerbter, durch seine Muskelfasern gefalteter Zipfel, die Gestalt und Größe nicht immer dieselbe ist. Es ist kleiner als das rechte Herzohr, und liegt nach links neben der Lungenarterie, wo sein gekerbter Rand etwas herabhängt.

Inwendig unterscheidet sich der linke Vorhof dadurch von dem rechten, daß, wenn man die Höhle des Herzohrs abrechnet, in ihm 1 rundliche, einzeln hervorspringende, verflochtene Fleischbündel vorkommen indem die Oberfläche derselben meistens von einer dickeren Lage Faser bedeckt, und daher glatt ist, und keine musculos pectinatos zeigt.

Ein Theil der dünnen Stelle der Scheidewand, welche wir im rechten Vorhofe mit dem Namen fossa ovalis bezeichneten, wird oft links von einer halbmondförmigen Falte, valvula foraminis ovalis bedeckt, welche ihren am Isthmus angewachsenen convexen Rand 1 der platten Oberfläche des Herzens, ihren freien concaven Rand 1 der gewölbten Oberfläche desselben kehrt. An ihrer Stelle findet 1 oft nur einen kleinen gebogenen, etwas hervorspringenden Wulst. ist das Ueberbleibsel einer Klappe, welche nach dem ersten Drittel Lebens des Embryo von der platten Seite aus emporkommt und foramen ovale immer mehr und mehr bedeckt, so daß beim Neugeborenen nur noch eine enge Stelle übrig ist, durch welche die beiden Vorhöfe an dem der gewölbten Seite des Herzens näheren Theile des rechten Lochs unter einander zusammenhängen.

Die linke oder hintere Herzkammer, oder die Aortenkammer, *ventriculus sinister*, oder *posterior*.

Sie hängt durch eine eingeschnürte Stelle mittelst einer großen elliptischen Oeffnung, *ostium venosum*, mit dem Lungenvenensacke zusammen, das in die Körperarterie führende *ostium arteriosum* liegt an dem breiten Ende dieser Kammer dicht neben dem *ostium venosum* und ganz an der Scheidewand, da es hingegen in der rechten Herzkammer um ein beträchtliches Stück von dem *ostium venosum* entfernt ist. Eine kegelförmige, zur Arterie hingehende Verlängerung des Ventrikels, welche an der rechten Herzkammer vorhanden ist, fehlt hier. Die Vorhofsklappe, *valvula mitralis*, besteht aus 2 Hauptklappen, von welchen der eine, der Scheidewand nähere, zwischen der Vorhofsoeffnung und der Arterienöffnung, der andere auf der entgegengesetzten Seite der Vorhofsoeffnung liegt. An die Seite dieser Zipfel, nicht an die Spitzen, setzen sich die Fäden von 4 oder 5 von der hinteren Wand entspringende Warzenmuskeln an, unter denen meistens 3 vorzüglich groß sind.

Die Scheidewand kehrt dem linken Ventrikel eine concave Oberfläche zu, und giebt dadurch seiner Höhle eine fast eiförmige Gestalt.

Inwendig liegen erhabene, unter einander verflochtene Bündel, die wie an den blinden Zipfeln der Vorhöfe und der Herzkammern überhaupt, so auch hier an der Spitze des linken Ventrikels, vorzüglich hervorspringend sind.

Mit dem Herzen stehen folgende große Blutgefäßstämme in Verbindung 1).

¹⁾ *Bernhard*, (*C. A. Rudolphi*) *Diss. de arteriarum e cordo prodeuntium aberrationibus*. Berol. 1818. 4.

Betrachtet man nicht allein die Abweichungen, die bei dem Ursprunge der Arterien und der Venen vom Herzen, sondern auch die, welche an den Hauptstämmen beobachtet werden, so überzeugt man sich, daß die Körpervenen Abweichungen in ihrem Ursprunge weit mehr als die Arterien unterworfen sind. Dieses ist an den kleineren Zweigen, z. B. an der Zungenvene oder an der ersten Interkostalvene noch weit mehr der Fall, als an den größten Stämmen, von welchen *J. F. Meckel* d. j. sogar zu beweisen suchte, daß sie seltener als die ihnen entsprechenden Theile des Arterien Systems in ihrem Ursprunge und Verhalten veränderlich wären. (*J. F. Meckel*, über den Verlauf der Arterien und Venen im deutschen Archive für die Physik, B. 1. S. 285, worin ihm indessen *H. W. Otto* (Lehrb. d. pathol. Anatomie des Menschen und der Thiere, Bd. 1. Breslau 1830) und *M. J. Weber* (*Meckels* Archiv für Anatomie und Physiologie, 1829. S. 1) und wol die meisten Anatomen nicht beistimmen. Am meisten unbestimmt sind die Hautvenen. Bei einigen, zum Theil von anerkannten Anatomen (z. B. in einem von *Winslow* beobachteten Falle) gemachten Untersuchungen sollen bei Mißgeburten zugleich mit dem Herzen auch die Venen gefehlt haben. Siehe diese Fälle gesammelt von *H. W. Otto* (Lehrb. d. pathol. Anat. 1830. S. 346.). Aber wie *Otto* bemerkt, sind gewöhnlich die Venen selbst dann vorhanden, wenn das Herz und die Arterien fehlen.

158 Gefäßstämme, die in das breite Ende des Herzens treten.

- 1) Die vena cava inferior oder ascendens, die untere oder aufsteigende Hohlader, tritt unter allen Blutgefäßen an der tiefsten Stelle ins Herz, nämlich in den auf dem Zwerchfelle aufliegenden Theil des Hohlvenensacks, atrium dextrum;
 - 2) die vena cava superior oder descendens, die obere oder herabsteigende Hohlvene, ist kleiner und liegt unter allen oben mit dem Herzen in Verbindung stehenden Blutgefäßstämmen am meisten nach rechts, wo sie etwas vorwärts gewendet in den Hohlvenensack, atrium dextrum, herabsteigt;
 - 3) die arteria pulmonalis, die Lungenarterie, ist unter den 3 oben und vorn mit dem Herzen in Verbindung stehenden großen Blutgefäßstämmen das mittlere, und steigt aus der obersten Stelle der Lungenkammer, ventriculus dexter, etwas schief nach oben empor;
 - 4) die arteria aorta, die Körperarterie, ist unter den 3 oben und vorn mit dem Herzen in Verbindung stehenden großen Blutgefäßstämmen das am meisten nach links gelegene.
Ihr Anfang wird von der Lungenarterie zum Theil verdeckt, und sie steigt schief nach rechts aus der Aortenkammer, ventriculus sinister, empor, und ihr Anfang kreuzt sich demnach mit dem Anfange der Lungenarterie, hinter welchem er liegt. Sie hat eine dickere Wand als die Lungenarterie, und hat eine fast gleich große Höhle als sie. Ihre Öffnung im Herzen ist aber etwas enger als der des ersten Stückes ihres Canals.
 - 5) Die vier Lungenvenen sind nächst der eignen Vene des Herzens die dünnsten Blutgefäßstämme, welche mit dem Herzen in Verbindung stehen. Sie treten auch unter allen am meisten nach hinten und in querer Richtung in dasselbe ein. Man sieht sie daher nur deutlich, wenn man das Herz von seiner platten Seite aus betrachtet. Sie liegen paarweise, 2 rechte rechts, 2 links links, zu beiden Seiten des Lungenvenensacks, in welchem auf jeder Seite wieder die eine etwas höher, die andere nahe dabei, aber etwas tiefer eintritt.
-

Entwicklung des Herzens und der großen Blutgefäßstämme.

Ueber die Entwicklung des Herzens beim menschlichen Embryo hat namentlich *S. F. Meckel* ¹⁾ wichtige Beobachtungen gemacht.

Wenn man das Gewicht des Herzens mit dem Gewichte des Körpers vergleicht, so findet man es bei Embryonen verhältnißmäßig größer als bei Erwachsenen, ganz vorzüglich bei sehr jungen Embryonen. Bei 2 bis 3 Monate alten Embryonen verhält sich sein Gewicht zum Gewichte des Körpers nach *Meckel* wie 1 zu 50, beim reifen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120. Bei einem 8½ Par. Linien langen, von mir zergliederten Embryo machte die senkrechte Höhe des Herzens von der Spitze bis zum obersten Punkte des linken Vorhofs fast ¼ von der Länge des ganzen Körpers ²⁾. Die Lungen waren noch so klein, und das Herz so groß, daß der Herzbeutel einen großen Theil der Rippen überzog. Bis zum 4ten Monate liegt das Herz noch nicht sehr merklich mit der Spitze nach links gewandt.

Bei einem 5 Linien langen Embryo, den *Meckel* zergliederte, lag das Herz nicht senkrecht und symmetrisch, und erfüllte die ganze Brusthöhle; dasselbe war bei Embryonen von 6 und 7 Linien Länge der Fall, bei welchen die Lungen noch nicht unterschieden werden konnten. Die Vorkammern, vorzüglich die rechte, sind bei so kleinen Embryonen überaus groß, und viel größer als die Kammern.

So lange noch keine Lungen vorhanden sind, wird sowohl der rechte als der linke Ventrikel (nicht wie beim Erwachsenen der linke Ventrikel allein) für die Fortbewegung des Körperbluts benützt. Daher war es auch nöthig, daß der rechte Ventrikel zu dieser Zeit eben so fleischig war als der linke, und man darf sich nicht darüber wundern, daß er in einer gewissen Periode des Embryoiebens, in welcher die Lungen noch wenig oder gar nicht ausgebildet sind, sogar größer ist als der linke Ventrikel. Denn es giebt eine Periode, wo die aus dem rechten Ventrikel entspringende Arterie kein Blut oder fast gar kein Blut zu den noch nicht sichtbaren oder noch sehr kleinen Lungen führt, wo aber der schon sehr große und fleischige rechte Ventrikel das Blut durch seine Kraft hauptsächlich in die untere Körperhälfte und in die Eihäute treibt, während der linke Ventrikel und die Aorta das Blut hauptsächlich in die obere Körperhälfte, und namentlich in das außerordentlich große Gehirn und in das gleichfalls einen sehr großen Raum einnehmende

¹⁾ *S. F. Meckel d. j.*, Handbuch der Anatomie, B. 3. S. 44, und Archiv für die Physiologie, B. 2. S. 404.

²⁾ *E. H. Weber*, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Embryo, in *Meckels Archiv* 1827. p. 25a.

Fleisch des Herzens treiben. Bei jenem $8\frac{1}{2}$ Linie langen Embryo fand ich von dem breiten Ende der Ventrikeln emporsteigende Arterien, die eine, welch der Aorta entsprach, ging zu dem überaus großen Kopfe (Hals und Brustgäbe fehlten noch) die 2te, die der Lungenarterie entsprach, stieg begenförmig über Arterien hinweg, und bildete ganz allein die Körperarterie für die untere Körperhälfte, Aorta descendens. Der Bogen der Aorta, der die Aorta ascendens i der Aorta descendens in Verbindung bringen sollte, fehlte entweder ganz, u wurde nur durch einen sehr viel dünneren, wegen seiner Kleinheit nicht unterscheidbaren, aus der Kopfaorta in die Aorta descendens gehenden Canal vertreten. Bei einem 2 Lin. langen Embryo fand Meckel die 2 genannten Stämme an ihrer Ursprünge so vereinigt, daß sie äußerlich nicht unterschieden werden konnten, u wenn sie durchschnitten wurden, bemerkte er eine sie trennende Scheidewand. Da hier schlug sich der eine Stamm als Kopfaorta zum Kopfe, der andere als Aorta descendens über die Atrien bogenförmig nach hinten zur unteren Körperhälfte und es wurde kein Aortenbogen bemerkt. (Bei noch kleineren Embryonen konnte Meckel die Scheidewand zwischen den 2 Arterien nicht sehen, was bei der Kleinheit der Theile nicht zu verwundern ist.) Bei etwas älteren Embryonen bemerkt man, daß der Aortenbogen längere Zeit dünner ist als die 2 Arterien die er verbindet. Zu jener Zeit circulirt das Blut durch die obere u durch die untere Körperhälfte fast in Form einer 8, und die aus den beiden Ventrikeln entspringenden 2 großen Arterien sind beide für Körperarterien anzusehen, von welchen die eine den Kopf, der zu dieser Zeit die obere Körperhälfte ausmacht, die andere die untere Körperhälfte u die Eihäute mit Blut versieht. Denn es fließt aus dem rechten Ventrikel fast ganz in die Arteria aorta descendens, von da zur unteren Körperhälfte und zu den Eihäuten, und von hier aus in die Vena cava inferior zurück, welche sich nach Wolffs ¹⁾, Meckels ²⁾ und anderer Anatomen Bemerkung bei so kleinen Embryonen nicht in den rechten sondern in den linken Vorhof begiebt. Hiermit ist der Blutlauf in der unteren Hälfte der 8 vollendet. Von hieraus geht das Blut in den linken Ventrikel, von da in die Aorta ascendens, und in die Zweige, die sich zum Fleische des Herzens, zu dem sehr großen Kopfe und Rückgrate in der oberen Körperhälfte begeben, fast gar nicht aber in die Aorta descendens. Von jenen Theilen fließt es nun durch die Vena cava superior in den rechten Vorhof und in den rechten Ventrikel. Hiermit ist dann der Lauf des Bluts in der oberen Hälfte der 8 vollendet, und es beginnt der Blutlauf in der unteren Hälfte der 8 von neuem. Der Blutlauf würde hiernach zu einer gewissen Periode des Embryolebens ziemlich in Form einer 8 vor sich gehen, fände nicht in gewissem Grade eine Vermischung des Bluts der beiden Körperhälften wegen der noch unvollständigen Scheidewand Statt. Diese Einrichtung des Blutlaufs, der also durch die obere und durch die untere Körperhälfte fast in Form einer 8 geschieht, und durch die obere Körper

¹⁾ J. C. Wolff, Novi commentarii acad. sc. imp. Petropol. T. XX. p. 35. Tab. VII u. VIII.

F. Meckel, im Archiv für die Physiol. B. II. 1816. p. 406, 411.

Die linke oder hintere Herzkammer, oder die Aortenkammer, *ventriculus sinister*, oder posterior.

Sie hängt durch eine eingeschnürte Stelle mittelst einer großen elastischen Oeffnung, *ostium venosum*, mit dem Lungenvenensacke zusammen, das in die Körperarterie führende *ostium arteriosum* liegt an dem breiten Ende dieser Kammer dicht neben dem *ostium venosum* und ganz an der Scheidewand, da es hingegen in der rechten Herzkammer um ein beträchtliches Stück von dem *ostium venosum* entfernt ist. Eine kegelförmige, zur Arterie hingehende Verlängerung des Ventrikels, welche an der rechten Herzkammer vorhanden ist, fehlt hier. Die Vorhofsklappe, *valvula mitralis*, besteht aus 2 Hauptklappen, von welchen der eine, der Scheidewand nähere, zwischen der Vorhofsöffnung und der Arteriendöffnung, der andere auf der entgegengesetzten Seite der Vorhofsöffnung liegt. An die Seite dieser Zipfel, nicht an die Spitzen, setzen sich die Fäden von 4 oder 5 von der hinteren Wand entspringende Warzenmuskeln an, unter denen meistens 3 vorzüglich groß sind.

Die Scheidewand kehrt dem linken Ventrikel eine concave Oberfläche zu, und giebt dadurch seiner Höhle eine fast eiförmige Gestalt.

Inwendig liegen erhabene, unter einander verschlochtene Bündel, die wie an den blinden Zipfeln der Vorhöfe und der Herzkammern überhaupt, so auch hier an der Spitze des linken Ventrikels, vorzüglich hervorspringend sind.

Mit dem Herzen stehen folgende große Blutgefäßstämme in Verbindung ¹⁾.

¹⁾ Bernhard, (*C. A. Rudolphi*) Diss. de arteriarum e corde prodeuntium aberrationibus. Berol. 1818. 4.

Betrachtet man nicht allein die Abweichungen, die bei dem Ursprunge der Arterien und der Venen vom Herzen, sondern auch die, welche an den Hauptstämmen beobachtet werden, so überzeugt man sich, daß die Körpervenen Abweichungen in ihrem Ursprunge weit mehr als die Arterien unterworfen sind. Dieses ist an den kleineren Zweigen, z. B. an der Lungenvene oder an der ersten Intercostralsvene noch weit mehr der Fall, als an den größten Stämmen, von welchen J. F. Meckel d. j. sogar zu beweisen suchte, daß sie seltener als die ihnen entsprechenden Theile des Arteriensystems in ihrem Ursprunge und Verhalten veränderlich wären. (J. F. Meckel, über den Verlauf der Arterien und Venen im deutschen Archiv für die Physiol. B. 1. S. 285, worin ihm indeffen H. W. Otto (Lehrb. d. pathol. Anatomie des Menschen und der Thiere, Bd. 1. Breslau 1830) und W. J. Weber (Meckels Archiv für Anatomie und Physiologie, 1829, S. 1) und wol die meisten Anatomen nicht beistimmen. Am meisten unbestimmt sind die Hautvenen. Bei einigen, zum Theil von anerkannten Anatomen (z. B. in einem von Winslow beobachteten Falle) gemachten Untersuchungen sollen bei Mißgeburten zugleich mit dem Herzen auch die Venen gefehlt haben. Siehe diese Fälle gesammelt von H. W. Otto (Lehrb. d. pathol. Anat. 1830. S. 346.). Aber wie Otto bemerkt, sind gewöhnlich die Venen selbst dann vorhanden, wenn das Herz und die Arterien fehlen.

Idee, daß das Blut bei dem Embryo in Form einer 8 circulirt, hat sich folglich wenigstens für eine gewisse Periode des Lebens kleiner Embryonen durch Wolffs und Meckels Beobachtungen bestätigt. Aber je mehr sich der Embryo seiner Reise nähert, desto weniger ist diese Idee mehr anwendbar. Denn das Herz und die großen Gefäßstämme erfahren während des Embryolebens und noch nach der Geburt eine Reihe Veränderungen, welche den Zweck haben, die erstere Form des Kreislaufs (wo das Blut in Form einer 8 durch die obere und durch die untere Körperhälfte circulirt, in die 2te Form zu verwandeln, wo das Blut, wie bei dem Erwachsenen, im doppelten Kreislaufe (im Körperkreislaufe und im Lungenkreislaufe) bewegt wird.

Sobald die Lungen entstehen und größer wachsen, wachsen nämlich von dem bis jetzt für die untere Körperhälfte bestimmt gewesenen Arterienstamme Aeste, die in die Lungen gehen. Je größer aber der Durchmesser dieser Aeste wird, desto kleiner wird die zur unteren Körperhälfte gehende Fortsetzung des Stammes, die man den Botallischen Stamm nennt, und je kleiner diese Fortsetzung wird, desto mehr nimmt der um ihr communicirende Aortenbogen am Umfange zu. So kommt es denn endlich dahin, daß der vorher sehr dünne Aortenbogen, der die Aorta ascendens und descendens verbindet, so dick wird, daß die Aorta descendens als Fortsetzung der Aorta ascendens, das ehemalige Anfangsstück der Aorta descendens aber als Arteria pulmonalis, und ihre Fortsetzung als Ductus arteriosus Botalli betrachtet wird.

In dem Maße, als die zu den Lungen gehenden Arterienäste größer werden, schließt sich nicht nur die Oeffnung in der Scheidewand der Kammern, sondern die Vorkammern wachsen auch auf solche Weise, daß die Mündung der Vena cava inferior mehr und mehr rechts zu liegen kommt, so daß sie sich erst unter der Scheidewand, und dann im rechten Atrio befindet. Die Scheidewand, die als eine Art von Falte von der gewölbten Seite des Herzens nach der platten zu herabwächst und sich vergrößert, läßt bekanntlich eine Oeffnung, das ovale Loch in der Nähe der platten Seite, übrig. Ungefähr im Anfange des 3ten Monats erhebt sich von dieser platten Seite aus am unteren Rande dieses Lochs eine halbmondförmige Falte, die immer höher und höher wird, so daß ihr freier, nicht angewachsener, halbmondförmiger Rand dem oberen Rande des ovalen Lochs immer näher und näher kommt, und endlich im 6ten Monate, nach Meckel, noch über diesen Rand emporsteigt. Da nun diese Klappe des ovalen Lochs, valvula foraminis ovalis, an der

Ueber den Kreislauf des Bluts im Kinde, das noch nicht geathmet hat, Karl 1826, haben über diesen Gegenstand geschrieben und auch die Literatur

linken Seite der Scheidewand im linken Atrio liegt, so hindert sie das im linken Atrio befindliche Blut, in das rechte Atrium zu dringen, gestattet aber einem Theile des im rechten Atrio befindlichen Blutes (jedoch durch eine immer enger und enger werdende Oeffnung), ins linke Atrium hinberzufließen, sobald das rechte Atrium stärker gefüllt ist, oder sich mit mehr Kraft zusammenzieht. Bei dem reifen Embryo geht, wie man aus dem Vorhergehenden einsehen, keineswegs die Oeffnung aus einer Vorlammer in die andere gerade hinüber, sondern das Blut wird zwischen der Klappe des ovalen Lochs und dem oberen Theile der Scheidewand in einer Art von Spalte empor, und so schief in das linke Atrium hinüber gebrängt.

Die Eustachische Klappe ist eine halbmondförmige Falte, die am unteren Theile der Oeffnung der Vena cava inferior in die rechte Vorlammer festsetzt, sich mit ihrem Ende bis in die Nähe der Scheidewand erstreckt, und mit ihrem freien concaven Rande in der Höhle der Vorlammer vorragt. Sie scheint allerdings eine zeitlang den Uebergang des Blutes aus der Vena cava inferior in das ovale Loch zu befördern, und ihn in die rechte Kammer zu erschweren. Weil aber nach Meckel's¹⁾ Messungen (an nicht mit eingespritzter Materie erfüllten Herzen, welche allerdings nach gemachter Injection vorzuziehen sind), die in die Lunge ringenden Äste der Lungenarterie schon im 5ten Monate einen gleichen Rauminhalt haben, als der in die Aorta übergehende Ductus arteriosus Botalli, und diese Äste, ganz im Verhältnisse der Größe ihrer Höhle, auch mit circulirendem Blute erfüllt sind, und weil jeder Ast der Lungenarterie bei dem reifen Embryo noch weiter als der Ductus arteriosus Botalli ist, so sieht man leicht ein, daß beim Embryo auch schon lange vor der Geburt eine beträchtliche Menge Blut durch die Lungen circulire.

Das Herz des Embryo ist, nach Meckel, in allen seinen 4 Abtheilungen, vorzüglich aber in seinen Kammern verhältnißmäßig fleischiger als beim Erwachsenen, und zwar bei jüngeren Embryonen in einem höhern Grade als bei älteren. Merkwürdig ist es zugleich, daß der rechte Ventrikel, nach Senac, Sömmerring und Meckel, in der ersten Hälfte des Embryolebens wenigstens eben so dicke Wände als der linke hat, und daß noch beim reifen Kinde kein sehr merklicher Unterschied zwischen ihm und dem linken ist. Aber zu dieser Zeit sind auch beide

¹⁾ Meckel, im Archive für die Physiologie, B. II. 428. Senac, Traité du coeur, T. I. p. 62. Roederer, De foetu perfecto, p. 86, und Haller, El. phys. T. VIII. p. 394, geben zwar den arteriösen Gang beim reifen Fötus weiter als die in die Lungen gehenden Äste der Lungenarterie an, aber sie haben unzeitig diese Äste nach gemachter Injection gemessen, und der Ductus arteriosus ist ausdehnbarer.

Ventrikel Körperherzen, und bei ihrer Verbindung durch den Ductus arteriosus, würde, wenn die eine Herzhälfte die andere an Muskelstärke sehr überwöge, das Blut gehindert werden, sich aus der schwächeren Herzkammer gleichzeitig zu ergießen, denn das aus der stärkeren Herzkammer mit größerer Gewalt fortgestoßene Blut würde in die Arterie des schwächeren Ventrikels bringen und das Blut rückwärts drücken.

Nach der Geburt, jedoch nicht zu einer bestimmten Zeit, verschließen sich das ovale Loch, der arterielle Gang, der venöse Gang der Leber, nebst den Nabelgefäßen. Der arterielle Gang schließt sich, nach Haller¹⁾, früher als das ovale Loch. In einem Falle fand er ihn am 56sten Tage nach der Geburt ganz verschlossen, in einem andern am 90sten offen, und da ihn auch andere, von Haller angeführte Beobachter am 50sten, 60sten, 70sten Tage offen fanden, so mag ein anderer von Haller beobachteter Fall, wo der Gang schon 3 Tage nach der Geburt durch eine geronnene polypöse Masse fast verschlossen war, unter die Ausnahmen gehören. Das ovale Loch scheint sich, nach Haller, der Regel nach später als nach Ablauf eines Jahres völlig zu schließen.

Gefäße des Herzens 2).

Sie dienen zur Ernährung des Herzens und vertheilen sich in der Masse seiner Wände. Die Stämme dieser Gefäße liegen an der auswärtigen Fläche des Herzens, und sind von der äußern Haut und von dem Fette bedeckt.

Das Herz besitzt 2 Schlagadern, die Kranzschlagadern, A. coronariae cordis. Beide gehen aus der Aorta, als die ersten Äste

¹⁾ Haller, El. phys. L. XXX. Sect. 1. §. 5.

²⁾ Nicht selten weichen dieselben hinsichtlich der Zahl ab. So sah Rebecinus (Diss. de circulo sanguinis in corde. Lgd. Bat. 1716. 8. p. 6.) nur eine sehr große Kranzarterie aus der Aorta entspringen, die sich gleich nach ihrem Ursprung in 3 Äste theilte. Dasselbe beobachtete Otto (Lehrb. d. pathol. Anat. 1. B. Berl. 1830. p. 306). Andremal finden sich deren drei, wie Winslow (exposition anat. de la struct. du corps humain, Par. 1732. p. 366.), Fiorati (Atti della Accademia di Padova. Tom. III. P. I. p. 38.) und Meckel (pathol. Anat. 2. Bd. 1. Abth. 1816. p. 109.) beobachteten, ja es sollen selbst 4 vorkommen, wie Meckel (Handb. d. Anat. 5. B. S. 74.) einmal sah. Die zwei überjähigen waren bedeutend kleiner, und schienen nichts als früher abgehende Äste zu sein (s. auch Morgagni, Ep. XVIII. §. 4. ep. 48. 34.); oder sie entspringen endlich an ungewöhnlichen Orten: 1. B. hoch oben aus der Aorta (Farre, pathological researches. Lond. 1814. p. 2. ff.), oder einmal aus der Subclavia dextra (Mayer, in Gräfe's und Walscher's Journ. Bd. 10. S. 44.).

Bisweilen ist eine oder die andere ungewöhnlich klein. So fand Barclay (descript. of the arter. of the human body, S. 6.) die rechte so klein, daß sie rechtswärts nicht bis zur Scheidewand reichte, und der umgeschlagene Ast der linken ihren Ort vertrat.

derselben, da, wo sie aus der hintern Herzkammer entspringt, unter einem stumpfen Winkel ab. Die beiden Oeffnungen, mit welchen sie entspringen, liegen nahe an den Endrändern der beiden oberen halbmondförmigen Klappen, eine derselben nahe an der hintern, die andere nahe an der vordern; doch so, daß sie nicht von denselben bedeckt werden, wenn sich diese bei dem Ausflusse des Blutes aus der Herzkammer an die innwendige Fläche des Ostium arteriosum legen.

Die rechte Kranzschlagader, *arteria coronaria dextra*, entspringt von der vordern Seite des Anfangs der Aorta, kommt zwischen dem Anfange der *Arteria pulmonalis* und dem vordern Herzohre hervor, geht geschlängelt an der Grenze der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer, erst an der gewölbten Fläche des Herzens bis zum vordern Rande, dann an diesem zur untern platten Fläche bis an die Stelle, wo die *Vena media cordis* sich ergießt. Hier aber biegt sie sich, so daß sie die genannte Grenze verläßt, und nun geschlängelt, längs dieser Vene, gegen die Spitze des Herzens verläuft. An einigen Herzen bogen sie sich, ehe sie diese Vene erreicht, nach der Spitze zu, und geht dann an der vordern Seite der Vene zu ihr heran; an andern wird sie erst von der Vene von unten bedeckt, bogen sich jenseits der Vene, und geht anfangs an der hintern Seite derselben gegen die Spitze fort.

Auf diesem Wege giebt sie erst Nester zum Anfange der Aorta, zum Anfange der *A. pulmonalis*, zur vordern Nebenkammer, zum vordern obern Theile der hintern Nebenkammer, ferner zum obern Theile der vordern Herzkammer, zum vordern Theile derselben, und so gelangt sie auf die platte Fläche des Herzens, zur *Vena media*, welche sie zur Spitze begleitet.

Das Ende dieser Schlagader theilt sich an der untern Fläche des Herzens unweit der Spitze in einige Nester, deren einer an der Spitze mit dem Ende des vordern Astes der *Arteria coronaria sinistra* zusammenkommt. Die andern Endäste kommen theils am hintern Rande mit andern Nesten der *Arteria sinistra*, theils am vordern Rande mit den Nesten dieser Schlagader selbst zusammen, welche an der obern Seite der vordern Herzkammer gegen die Spitze gehn.

Die linke Kranzschlagader des Herzens, *arteria coronaria sinistra*, entspringt von der hintern Seite des Anfangs der Aorta, kommt zwischen dem Anfange der *Arteria pulmonalis* und dem hintern Herzohre hervor, und theilt sich in 2 oder 3 Nester.

Der vordere, gemeinlich der größte, geht an der hintern Seite des Ursprungs der *Arteria pulmonalis* vorbei, und dann geschlängelt auf der gewölbten Fläche des Herzens gegen die Spitze hin, so daß er allmählig mehr dem vorderen Rande sich nähert, und die Stelle bezeichnet, an welcher der vordere Rand der Scheidewand liegt. Auf diesem Wege giebt er erst dem Anfange der Aorta, dann dem Anfange der *Arteria pulmonalis* kleine Nester, welche mit den Nesten der *Arteria*

dextra zusammenkommen. Ferner giebt er größere Aeste zur vorderen Seite der hinteren Herzkammer gegen den hintern Rand des Herzens, auch kleine Aeste zur vorderen Seite der vordern Herzkammer, welche mit Aesten der dextra zusammenkommen, und kommt endlich an der Spitze mit einem Aste der Arteria dextra, auf eine oder die andere Weise, zusammen.

Der hintere Ast, *ramus circumflexus*, geht an der Grenze der hintern Nebenkammer und der hinteren Herzkammer, längs der *Vena maxima* fort, so daß er der Spitze des Herzens doch näher, als diese, liegt; erst an der oberen Fläche bis zum hintern Rande, dann an diesem umgeschlagen, auf dem hintern Theil der untern Fläche. Auf diesem Wege giebt er Aeste zur hintern Nebenkammer, und zur hinteren Herzkammer, erst an der obern, dann an der untern Seite des Herzens. Das Ende desselben verliert sich gemeiniglich an der untern Fläche unweit der Stelle, an welcher sich die *Vena maxima* ergießt; selten lenkt er sich noch gegen die Spitze des Herzens, längs der *Vena media*, herab.

Zwischen diesen beiden Aesten kommt oft noch ein dritter Ast hervor, welcher sich nach der Gegend der Spitze zu lenkt, gemeiniglich aber unweit seines Ursprungs sich in die Wand des Herzens verbirgt.

Die eigenen Venen des Herzens, *venae cardiaca*e, führen sein Blut größtentheils in die vordere Vorkammer, d. h. in den Hohlvenensack zurück.

Die größte derselben, *Vena coronaria magna* ¹⁾, ist nach Verhältnis der Größe des Herzens von ansehnlicher Weite. Sie sängt an als eine dünne Vene an der gewölbten Fläche des Herzens, in der Gegend der Spitze an, und hängt mit Aesten der *Vena media* an der Spitze zusammen, geht neben dem *Ramus anterior* der *Arteria sinistra* gegen die hintere Vorkammer, dann in veränderter Richtung an der Grenze dieser Vorkammer und der hinteren Herzkammer zum hintern Rande, und dann an der platten Seite des Herzens bis in die Gegend fort, in welcher die Scheidewand der Vorkammern liegt. Auf diesem ganzen Wege wird sie allmählig dicker, und nimmt die kleineren Venen der hintern Vorkammer und der hinteren Herzkammer in sich auf.

Diese Vene ergießt sich in eine große Mündung, *ostium venae magnae*, welche in dem untern hintern Theile des vordern Hohlvenensackes, zwischen der *Valvula Eustachii* und dem *Ostium venosum* der vordern Herzkammer sich öffnet, und an dieser ist die fortgesetzte Haut der Vene als eine dünne halbmondsförmige Klappe, *valvula Thebesii*, so vorgezogen, daß der concave freie Rand derselben, welcher

¹⁾ Galen, de arter. et ven. dissert. c. 2.

zwischen sich und dem entgegenliegenden Rande der Mündung einen Zwischenraum läßt, rückwärts gewandt ist ¹⁾. In einigen Herzen findet man auch diese Klappe durchlöchert und nehförmig. Sie gestattet dem Blute aus dieser und der folgenden Vene den freien Gang ins Herz; hindert aber bei der Systole der Nebenkammer einigermassen den Rückgang aus dieser in die Venen ²⁾.

Auch die Mittelveue des Herzens, *vena media cordis*, ist von ansehnlicher Größe, doch viel kleiner als jene, liegt an der untern platten Fläche desselben, geht von der Spitze, an welcher sie mit Aesten der *Vena magna* zusammenhängt, zu der Grenze der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer hin, so daß ihr Gang die Stelle bezeichnet, an welcher der untere Rand der Scheidewand des Herzens liegt, nimmt von der untern Seite beider Herzkammern kleinere Venen in sich auf, und ergießt sich in die eben beschriebene Mündung der *Vena magna*.

An einigen Herzen fand Hildebrandt eine dritte große Vene, die etwas kleiner war, als die Mittelveue, vom hintern Rande des Herzens an der platten Fläche desselben schräg zur Mündung der *Vena magna* ging, und sich in dieselbe ergoß. Sämmering beschreibt den Fall, wo die mittlere kleinere Herzvene ein von der großen Herzvene getrennter Stamm ist, als den regelmäßigen, und nimmt auch an, daß in der Regel mehrere Venen von mittlerer Größe sich besonders in den Hohlvenenfact öffnen, daß sich namentlich solche von der untern Seite des Herzens kommende Venen an einer Stelle des rechten Vorhofs einmünden, welche der Einmündungsstelle der großen Herzvene gegenüber liegt. Sehr kleine Venen des Herzens öffnen sich an vielen Stellen der Vorkammern und Kammern des Herzens (sogar der linken Kammer), ihre Mündungen nennt man *foramina Thebesii*. Ueber diese Venen haben *H. Torsten*, *Diss. quaestiones selectae physiologicae*. Lugd. Batav. 1774. S. 3. und *Abernethy* in *Phil. Tr.* 1798. P. I. p. 103, und in *Reils Archiv*. B. V. p. 128 geschrieben. *Abernethy* macht darauf aufmerksam, daß bei 5 Lungenlückigen diese Oeffnungen, namentlich in der linken Kammer, sehr groß gewesen wären, so daß die Injections-

¹⁾ Auch diese Klappe hat *Eustachius* entdeckt. S. dess. Schrift de *vena sine pari*. Antigr. 10. p. 263, 264, und Tab. VIII. f. 6. XVI. f. 3. *Thebesius* hat sie nachher genauer beschrieben.

Ad. Chr. Thebesius, de circulo sanguinis in corde, L. B. 1708. 4. 716. 8. Lips. 1730. 4.

Casp. Fried. Wolff, de officio venae coronariae magnae in act. acad. Petropolit. 1777. P. I.

Petr. Tabarrani, de eodem in Atti di Siena. VI.

²⁾ Ueber die Abweichungen der Herzvene in ihrer Endigung sehe man *Otto's pathol. Anat.* 1830. p. 347, nach.

Die große Kranzvene des Herzens mündet in seltenen Fällen statt in das rechte Herzohr, in das linke ein (*Wessel Handb. d. mensch. Anat.* III. 67.). *Lemaire*, (*Bullet. d. sc. méd.* V. 1810) sah zwei Kranzvenen in die Lungenvenen treten; und in einem von *Murray* (*Reue schwed. Abhandl.* 2. Bd. 1784. p. 288) beschriebenen Falle schloß die große Kranzvene ganz, die mittleren hingegen, welche nach dem stumpfen Rande des Herzens gehen, öffneten sich in die linke obere Hohlvene; dagegen eine dritte von der untern Fläche des Herzens kommende Vene sich in einen Ast ergoß, der ganz klein war und sich an der Stelle in den rechten Vorhof öffnete, wo sich gewöhnlich die *Cava superior* einmündet.

Einmal sah sie *Le Cat* (*Mém. de Paris* 1738. hist. p. 62.) in die linke Schläffelbeinevene sich einmünden.

masse, wenn er die Arterien und Venen des Herzens anfüllte, daselbst deutlich hervorträufelte. Bei Gesunden war das nicht der Fall, und er glaubt daher, daß die Foramina Thebesii dazu dienen, daß das Blut bei Hindernissen einer regelmäßigen Circulation sich nicht in dem Fleische des Herzens anhäuft.

Die kleineren Venen des Herzens haben an verschiedenen Orten eine verschiedene Lage.

Die meisten kleineren Venen der hinteren Nebenkammer und der hintern Herzkammer gehen, wie gesagt, in die Vena magna, einige kleinere Venen beider Herzkammern an der untern Fläche derselben in die Vena media über.

Die meisten kleineren Venen der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer ergießen sich in die vordere Nebenkammer selbst.

Die Venen des Herzens haben in der Regel keine Klappen ¹⁾, wie auch der leichte Uebergang eingespritzter Flüssigkeiten aus der Vena magna oder media in die übrigen beweiset ²⁾.

Die Saugadern des Herzens kommen an der auswendigen Fläche desselben in Stämmen zusammen, welche längs den Blutgefäßen desselben hin, und nach oben zu den Saugaderdrüsen gehn, welche hinter und über dem Bogen der Aorta, und hinter der Arteria pulmonalis liegen. In diesen kommen sie mit den Saugadern der Lungen zusammen.

Nerven des Herzens.

Das Herz empfängt viele, aber sehr feine Nerven, nervi cardiaci, welche an beiden Seiten aus Fäden zusammengesetzt werden, die von den Gangliis cervicalibus des Nervus sympathicus magnus, vom Nervus gl. ossopharyngeus und vom vagus kommen ²⁾.

¹⁾ S. jedoch Morgagni ep. anat. XV. n. 21., welcher Klappen in diesen Venen gefunden hat.

²⁾ Alb. de Haller, resp. Henr. Christ. Reymann, de vasis cordis propriis. Goett. 1737. 4. In oper. min. I. p. 2.

Ejusd. iteratae de vasis cordis observationes. Goett. 1739. 4. Ibid.

³⁾ Die Beschreibung dieser Nerven wird erst unten im Buche von den Nerven folgen, wo auch die Schriften sollen aufgeführt werden.

Behrend's (diss. qua demonstratur, cor nervis carere. Mogunt. 1792. 4.) behauptete, daß das Herz gar keine Nerven habe. Indessen hat nicht allein Scarpa (tabulae neurologicae ad illustrandum historiam anatomicam nervorum cardiacorum etc. Ticin. 1794. Fol.) die Herznerven vortreflich beschrieben und abgebildet, sondern es ist auch Sommering's und Behrend's Meinung nicht, dem Herzen die Nerven ganz abzusprechen; sie behaupten nur, daß die sogenannten Herznerven sich nicht in der Fleischmasse des Herzens, sondern in seinen Schlagadern, arteriae coronariae, verbreiten. Scarpa sagt aber §. 14: »in voluntariis musculis haud aliter ac in corde perpetua est nervorum cum arteriis societas, communis ratio divisionis, distributionisque cet. und §. 10: »nervorum surculi arteriarum coronarium ramos in cordis carnem alte delitescentes comitantur... ultra quam sedem repente in tantam subtilitatem extenuantur, ut exquisitissimis etiam adhibitis vitris, aciem visus eludant.« Sommering sagt da-

Von den
Gefäßen des kleinen Kreislaufs im Einzelnen.

Durch die Schlagadern dieses Systems geht das Blut aus der vordern Herzkammer in die Lungen, durch die Venen desselben kommt es aus den Lungen zum hinteren Vorhofe des Herzens zurück.

Die Lungenarterie, arteria pulmonalis.

Der Hauptstamm aller Schlagadern des Lungen-systems wird Arteria pulmonalis genannt. Ihr Durchmesser ist ungefähr um $\frac{1}{6}$ kleiner als der Durchmesser der Aorta, im Embryo größer. Die häutige Masse ihrer Wand ist beträchtlich dünner und schwächer, als die der Aorta. Sie entspringt aus dem obersten Theile der Lungenkammer der rechten oder vordern Herzkammer, geht erst schräg rückwärts, auch etwas nach in die Höhe, und krümmt sich dann noch mehr rückwärts. Bis hier liegt sie weiter links und tiefer, als der vordere Theil des Bogens der Aorta, am Anfangstheil sie von vorn verbirgt.

Nun, nachdem sie etwa einen Weg von 2 Zollen gemacht hat, theilt sie sich in einen rechten und in einen linken Ast, deren jeder an und unter seinem Aste der Luftröhre, zugleich aber etwas weiter nach vorn liegt. Siemlich von der Mitte zwischen beiden Ästen steigt ein ungefähr Linie dicker rundlicher Strang, schief nach links zur concaven Seite des Bogens der Aorta empor. Beim Embryo und bei Neugeborenen befand sich hier ein offener Canal, ductus arteriosus Botalli, durch welchen Blut aus der Lungenarterie in die Körperarterie überging. Der rechte Ast, welcher länger und weiter ist, geht schräg rückwärts und rechts, unter dem Bogen der Aorta, und unter dem Bogen der Vena azygos nach, hinter der Vena cava superior und vor dem rechten Luftröhrenast vorbei, und theilt sich gemeiniglich in 3 Äste, die in den rechten Brusthautsack und zu den 3 Lappen der rechten Lunge gehen. Der linke, welcher kürzer und enger ist, geht ferner rückwärts und zugleich nach links, tiefer liegend, als der Bogen der Aorta, und theilt sich gemeiniglich in 2 Äste, die in den linken Brusthautsack und zu den 2 Lappen der linken Lunge gehen.

Die Äste der Arteria pulmonalis begleiten die Luftröhrenäste. Jeder derselben theilt sich baumsförmig in kleinere Zweige, die sich in die

wegen in seiner Recension dieses Werks in den Götting. gelehrten Anz. 1795. No. 147. Man kann die Endigung der Nerven in den wirklichen Muskeln aufs deutlichste in des Brustfleisch verfolgen, welches aber am Herzen unmöglich ist.“

dextra zusammenkommen. Ferner giebt er größere Aeste zur vorderen Seite der hinteren Herzkammer gegen den hintern Rand des Herzens, auch kleine Aeste zur vorderen Seite der vordern Herzkammer, welche mit Aesten der dextra zusammenkommen, und kommt endlich an der Spitze mit einem Aste der Arteria dextra, auf eine oder die andere Weise, zusammen.

Der hintere Ast, *ramus circumflexus*, geht an der Grenze der hintern Nebenkammer und der hinteren Herzkammer, längs der *Vena maxima* fort, so daß er der Spitze des Herzens doch näher, als diese liegt; erst an der oberen Fläche bis zum hintern Rande, dann an diesem umgeschlagen, auf dem hintern Theil der untern Fläche. Auf diesem Wege giebt er Aeste zur hintern Nebenkammer, und zur hinteren Herzkammer, erst an der obern, dann an der untern Seite des Herzens. Das Ende desselben verliert sich gemeinlich an der untern Fläche unweit der Stelle, an welcher sich die *Vena maxima* ergießt; selten lenkt es sich noch gegen die Spitze des Herzens, längs der *Vena media*, herab.

Zwischen diesen beiden Aesten kommt oft noch ein dritter Ast hervor, welcher sich nach der Gegend der Spitze zu lenkt, gemeinlich aber unweit seines Ursprungs sich in die Wand des Herzens verbirgt.

Die eigenen Venen des Herzens, *venae cardiaca*e, führen kein Blut größtentheils in die vordere Vorkammer, d. h. in den Hohlvenensack zurück.

Die größte derselben, *Vena coronaria magna* ¹⁾, ist nach Verhältniß der Größe des Herzens von ansehnlicher Weite. Sie fängt erst als eine dünne Vene an der gewölbten Fläche des Herzens, in der Gegend der Spitze an, und hängt mit Aesten der *Vena media* an der Spitze zusammen, geht neben dem *Ramus anterior* der *Arteria sinistra* gegen die hintere Vorkammer, dann in veränderter Richtung an der Grenze dieser Vorkammer und der hinteren Herzkammer zum hintern Rande, und dann an der platten Seite des Herzens bis in die Gegend fort, in welcher die Scheidewand der Vorkammern liegt. Auf diesem ganzen Wege wird sie allmählig dicker, und nimmt die kleineren Venen der hintern Vorkammer und der hinteren Herzkammer in sich auf.

Diese Vene ergießt sich in eine große Mündung, *ostium venae magnae*, welche in dem untern hintern Theile des vordern Hohlvenensackes, zwischen der *Valvula Eustachii* und dem *Ostium venosum* der vordern Herzkammer sich öffnet, und an dieser ist die fortgesetzte Haut der Vene als eine dünne halbmondförmige Klappe, *valvula Thebesii*, so vorgezogen, daß der concave freie Rand derselben, welcher

¹⁾ Galen, de arter. et ven. dissert. c. 2.

weisen sich und dem entgegenliegenden Rande der Mündung einen Zwischenraum läßt, rückwärts gewandt ist ¹⁾. In einigen Herzen findet man auch diese Klappe durchlöchert und nehförmig. Sie gestattet dem Blute aus dieser und der folgenden Vene den freien Gang ins Herz; hindert aber bei der Systole der Nebenkammer einigermassen den Rückgang aus dieser in die Venen ²⁾.

Auch die Mittelvene des Herzens, *vena media cordis*, ist von unähnlicher Größe, doch viel kleiner als jene, liegt an der untern platten Fläche desselben, geht von der Spitze, an welcher sie mit Aesten der *Vena magna* zusammenhängt, zu der Grenze der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer hin, so daß ihr Gang die Stelle bezeichnet, an welcher der untere Rand der Scheidewand des Herzens liegt, nimmt von der untern Seite beider Herzkammern kleinere Venen in sich auf, und ergießt sich in die eben beschriebene Mündung der *Vena magna*.

In einigen Herzen fand Hildebrandt eine dritte große Vene, die etwas kleiner war, als die Mittelvene, vom hintern Rande des Herzens an der platten Fläche desselben schräg zur Mündung der *Vena magna* ging, und sich in dieselbe ergoß. Sommering beschreibt den Fall, wo die mittlere kleinere Herzvene von der großen Herzvene getrennter Stamm ist, als den regelmäßigen, und nimmt auch an, daß in der Regel mehrere Venen von mittlerer Größe sich besonders in den Hohlvenensack öffnen, daß sich namentlich solche von der untern Seite des Herzens kommende Venen an einer Stelle des rechten Vorhofs einmünden, welche der Einmündungsstelle der großen Herzvene gegenüber liegt. Sehr kleine Venen des Herzens öffnen sich an vielen Stellen der Vorkammern und Kammeru des Herzens (sogar der linken Kammer), ihre Mündungen nennt man *foramina Thebesii*. Ueber diese Venen haben *R. Torsten*, *Diss. quaestio-um selectae physiologicae*. Lugd. Batav. 1774. S. 3. und *Abernethy* in *Phil. Tr.* 1798. P. I. p. 103, und in *Reils Archiv*. B. V. p. 128 geschrieben. *Abernethy* macht darauf aufmerksam, daß bei 5 Lungenluchtigen diese Oeffnungen, namentlich in der linken Kammer, sehr groß gewesen wären, so daß die Injections-

¹⁾ Nach diese Klappe hat *Eustachius* entdeckt. *S. dess. Schrift de vena sine pari*. Anfigr. 10. p. 263, 264, und Tab. VIII. f. 6. XVI. f. 3. *Thebesius* hat sie nachher genauer beschrieben.

Ad. Chr. Thebesius, de circulo sanguinis in corde, L. B. 1708. 4. 1716. 3. Lips. 1739. 4.

Casp. Fried. Wolff, de officio venae coronariae magnae in act. acad. Petropolit. 1777. P. I.

Petr. Tabarrani, de eodem in Atti di Siena. VI.

²⁾ Ueber die Abweichungen der Herzvene in ihrer Endigung sehe man *Otto's pathol. Anat.* 1830. p. 347, nach.

Die große Kranzvene des Herzens mündet in seltenen Fällen statt in das rechte Herzohr, in das linke ein (*Meckel Handb. d. menschl. Anat.* III. 67.). *Le mair*, (*Bullet. d. sc. méd.* V. 1810) sah zwei Kranzvenen in die Lungenvenen treten; und in einem von *Murray* (*Neue schwed. Abhandl.* 2. Bd. 1784. p. 288) beschriebenen Falle fehlte die große Kranzvene ganz, die mittleren hingegen, welche nach dem stumpfen Rande des Herzens gehen, öffneten sich in die linke obere Hohlvene; dagegen eine dritte von der untern Fläche des Herzens kommende Vene sich in einen Ast ergoß, der ganz klein war und sich an der Stelle in den rechten Vorhof öffnete, wo sich gewöhnlich die *Cava superior* einmündet.

Einmal sah sie *Le Cat* (*Mém. de Paris* 1738. hist. p. 62.) in die linke Schlüsselbeinvene sich einsetzen.

masse, wenn er die Arterien und Venen des Herzens anfällte, daselbst deutlich hervorträpfele. Bei Gesunden war das nicht der Fall, und er glaubt daher, daß die Foramina Thebesii dazu dienen, daß das Blut bei Hindernissen einer regelmäßigen Circulation sich nicht in dem Fleische des Herzens anhäuse.

Die kleineren Venen des Herzens haben an verschiedenen Herzen eine verschiedene Lage.

Die meisten kleineren Venen der hinteren Nebenkammer und der hintern Herzkammer gehen, wie gesagt, in die Vena magna, einige kleinere Venen beider Herzkammern an der untern Fläche derselben in die Vena media über.

Die meisten kleineren Venen der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer ergießen sich in die vordere Nebenkammer selbst.

Die Venen des Herzens haben in der Regel keine Klappen ¹⁾, wie auch der leichte Uebergang eingespritzter Flüssigkeiten aus der Vena magna oder media in die übrigen beweiset ²⁾.

Die Saugadern des Herzens kommen an der auswendigen Fläche desselben in Stämmen zusammen, welche längs den Blutgefäßen desselben hin, und nach oben zu den Saugaderdrüsen gehn, welche hinter, und über dem Bogen der Aorta, und hinter der Arteria pulmonalis liegen. In diesen kommen sie mit den Saugadern der Lungen zusammen.

Nerven des Herzens.

Das Herz empfängt viele, aber sehr feine Nerven, *nervi cardiaci*, welche an beiden Seiten aus Fäden zusammengesetzt werden, die von den Gangliis cervicalibus des Nervus sympathicus magnus, vom Nervus gl. ossopharyngeus und vom vagus kommen ²⁾.

¹⁾ S. jedoch *Morgagni ep. anat. XV. n. 21.*, welcher Klappen in diesen Venen gefunden hat.

²⁾ *Alb. de Haller, resp. Henr. Christ. Reymann, de vasis cordis propriis. Goett. 1737. 4. In oper. min. I. p. 2.*

Ejusd. iteratae de vasis cordis observationes. Goett. 1739. 4. Ibid.

³⁾ Die Beschreibung dieser Nerven wird erst unten im Buche von den Nerven folgen, wo auch die Schriften sollen aufgeführt werden.

Behrends (*diss. qua demonstratur, cor nervis carere. Mogunt. 1792. 4.*) behauptete, daß das Herz gar keine Nerven habe. Indessen hat nicht allein Scarpa (*tabulae neurologicae ad illustrandum historiam anatomicam nervorum cardiacorum etc. Ticin. 1794. Fol.*) die Herznerven vortreflich beschrieben und abgebildet, sondern es ist auch *Sömmerings* und *Behrends* Meinung nicht, dem Herzen die Nerven ganz abzuspochen; sie behaupten nur, daß die sogenannten Herznerven sich nicht in der Fleischmasse des Herzens, sondern in seinen Schlagadern, *arteriae coronariae*, verbreiten. Scarpa sagt aber §. 14: »in voluntariis muscularibus haud aliter ac in corde perpetua est nervorum cum arteriis societas, communis ratio divisionis, distributionisque cet. und §. 10: »nervorum surculi arteriarum coronarium ramos in cordis carnem alte delitescentes comitantur... ultra quam sedem repente in tantam subtilitatem extenuantur, ut exquisitissimis etiam adhibitis vitris, aciem visus eludant.« *Sömmering* sagt da-

Von den
Gefäßen des kleinen Kreislaufs im Einzelnen.

Durch die Schlagadern dieses Systems geht das Blut aus der vordern Herzkammer in die Lungen, durch die Venen desselben kommt es aus den Lungen zum hinteren Vorhofe des Herzens *und.*

Die Lungenarterie, arteria pulmonalis.

Der Hauptstamm aller Schlagadern des Lungenystems wird Arteria pulmonalis genannt. Ihr Durchmesser ist ungefähr um $\frac{1}{6}$ kleiner als der Durchmesser der Aorta, im Embryo größer. Die häutige Masse ihrer Wand ist beträchtlich dünner und schwächer, als die der Aorta. Sie entspringt aus dem obersten Theile der Lungenkammer der rechten oder vordern Herzkammer, geht erst schräg rückwärts, auch etwas *hinauf* in die Höhe, und krümmt sich dann noch mehr rückwärts. Bis hier liegt sie weiter links und tiefer, als der vordere Theil des Bogens der Aorta, *von* dem Anhangstheil sie von vorn verbirgt.

Nun, nachdem sie etwa einen Weg von 2 Zoll gemacht hat, theilt sie sich in einen rechten und in einen linken Ast, deren jeder an und unter seinem Aste der Luftröhre, zugleich aber etwas weiter nach vorn liegt. Siemlich von der Mitte zwischen beiden Ästen steigt ein ungefähr 1 Linie dicker rundlicher Strang, schief nach links zur concaven Seite des Bogens der Aorta empor. Beim Embryo und bei Neugeborenen befand sich hier ein offener Canal, ductus arteriosus Botalli, durch welchen Blut aus der Lungenarterie in die Körperarterie überging. Der rechte Ast, welcher länger und weiter ist, geht schräg rückwärts und rechts, unter dem Bogen der Aorta, und unter dem Bogen der Vena azygos nach, hinter der Vena cava superior und vor dem rechten Luftröhrenast vorbei, und theilt sich gemeiniglich in 3 Äste, die in den rechten Brusthautsack und zu den 3 Lappen der rechten Lunge gehen. Der linke, welcher kürzer und enger ist, geht ferner rückwärts und zugleich *hinauf*, tiefer liegend, als der Bogen der Aorta, und theilt sich gemeiniglich in 2 Äste, die in den linken Brusthautsack und zu den 2 Lappen der linken Lunge gehen.

Die Äste der Arteria pulmonalis begleiten die Luftröhrenäste. Jeder derselben theilt sich baumförmig in kleinere Zweige, die sich in die

gegen in seiner Recension dieses Werks in den Götting. gelehrten Anz. 1795. No. 127. Man kann die Endigung der Nerven in den willkührlichen Muskeln aufs deutlichste in des Muskelfleisch verfolgen, welches aber am Herzen unmöglich ist.“

kleineren Ästchen der Lungen begeben. Die kleinsten Zweige endlich gehen zu der Oberfläche der mit Luft erfüllten Lungenbläschen, und verwandeln sich in ein sehr feines und dichtes Haargefäßnetz, das die innere Oberfläche derselben bilden hilft. Aus ihm nehmen die kleinsten Lungenvenen ihren Anfang. Es gelingt nicht selten, Flüssigkeiten aus den Lungenarterien in die Lungenvenen, und umgekehrt aus den Lungenvenen in die Lungenarterien hinüber zu treiben. Reisseisen gebrachte hierzu Haufenblase mit kaltem geriebenem Bleiweiß geärdt. Selten werden dadurch die Haargefäße vollständig erfüllt, sehr leicht gehen dünne Flüssigkeiten in die Lufröhrenäste über, was täglich schon sah ich diese Nege am Lieberkühnischen Präparate in der anatomischen Sammlung in Berlin. Einige Äste der Lungenarterie begeben sich auch zu den Lufröhrenästen, und stehen da mit nicht ganz engen Ästen der ernährenden Arterien der Lungen, den Bronchialarterien, in Verbindung, und noch kleinere endlich gehen zu dem serösen Ueberzuge der Lungen ¹⁾.

Die Lungenvenen. Venae pulmonales ²⁾.

Die kleinsten Ästchen der Lungenvenen, mit denen die Lungenbläschen netzförmig überzogen sind, kommen in größeren und immer größeren

¹⁾ Die Lungenarterie hat nicht leicht Abweichungen in ihrem Ursprunge und Verlauf. Folgende Verschiedenheiten kommen daher nur selten, meistens bei Mißgeburten, vor.

Zuweilen sind ihre 2 Zweige Äste der Aorta, und der Stamm setzt dann entweder gänzlich, oder er geht ungetheilt als Ductus arteriosus in die Aorta. Zuweilen geht es außer dem Stamme der Lungenarterie noch eine 2te, aus dem rechten Ventrikel entspringende Arterie. In sehr seltenen Fällen erhalten die Lungen außer der Lungenarterie eine dicke Arterie aus der Aorta descendens, die wohl für eine erweiterte Bronchialarterie gehalten werden muß. Häufiger kommt die Lungenarterie an einer tiefer liegenden Stelle des rechten Ventricels hervor. Es kommt auch vor, daß sie aus dem linken Ventrikel entspringt, während die Aorta aus dem rechten hervorgeht, oder daß sie mit beiden Ventriceln in Verbindung steht, wenn die Scheidewand am breiten Ende des Herzens ein Loch hat. Es steht auch wohl ein Ast der Lungenarterie in sehr seltenen Fällen mit einem Aste der Aorta in Verbindung, z. B. der linke Ast mit der linken Arteria subclavia, der rechte mit der Arteria anonyma. Zuweilen ist die Aorta descendens die Fortsetzung der Lungenarterie, nachdem sie die Lungenäste abgegeben hat. Auch entspringt in seltenen Fällen aus der Lungenarterie, oder aus dem Ductus arteriosus die linke Subclavia oder Carotis, oder der Ductus arteriosus entspringt besonders aus der rechten Kammer.

Man sehe die von Meckel und von Otto gegebene Literatur über diese Fälle in deren Handbüchern der pathologischen Anatomie.

²⁾ Zuweilen kommen auf der rechten Seite (unstreitig weil die Lunge dafelbst 3 Lappen hat) 3 Lungenvenen in den linken Vorhof, so daß dann 5 Lungenvenen vorhanden sind. Noch viel seltener finden sich 3 auf der linken Seite, oder 3 auf beiden Seiten zusammen 6, oder 4 auf der einen Seite, und 2 auf der andern. Während, wie S. 3. Meckel bemerkt, auf der rechten Seite leichter die Zahl der Lungenvenen größer wird, so findet das entgegengesetzte auf der linken Seite Statt. In den seltener oft vorkommenden Fällen nämlich, wo nur 3 Lungenvenen vorhanden sind, sind die eine Lungenvene der linken Seite. S. 3. Meckel hat die Literatur über die vorhandenen Beobachtungen dieser Abweichungen gesammelt. Anat. B. III. 369. Meckel als 4 Lungenvenen fand J. F. Meckel, Mem. de Berlin 1750. p. 167. Haller, de part. c. h. fabr. II. 123. Portal, Mém. de l'ac. roy. d. sc. de Paris, 1771. p. 74. Sandifort, Obs. anat. pathol. L. III. p. 18.

Weniger als 4 fanden Löseke, observ. anat. Berol. 1754. p. 26. Portal a. a. O. Haller a. a. O. Pohl, de venis. Lipsiae p. 11. Sandifort a. a. O.

Äste zusammen. Die größten Äste sammeln sich endlich in die Stämme der 4 Lungenvenen. Nämlich von jeder Lunge kommen 2.

Die Lungenvenen gehen einwärts, also einander entgegen, die von der rechten Seite links, die von der linken rechts, und so ergießen sie sich alle in den Lungenvenensack, atrium sinistrum. Die linke ober Lungenvene liegt unter dem linken Aste der Arteria pulmonalis, die rechte obere unter und vor dem rechten Aste derselben. Die linke untere liegt tiefer, als die rechte untere. Beide untere Lungenvenen liegen höher, als der unterste Theil der hinteren Vorkammer ¹⁾.

Die Venae pulmonales zusammen sind ein wenig enger als die beiden Äste der Arteriae pulmonalis zusammen, obwohl bei den Venen anderer Theile es sich umgekehrt verhält. Dieser Umstand bewirkt, wie oben S. 87 gezeigt worden ist, daß das Blut auch ohne die Klappen, welche in vielen andern Venen befindlich sind, regelmäßig durch die Lungenvenen fortfließt.

Nach Aurivillius ²⁾ (n. 8. p. 19.) ist das Verhältniß der Durchmesser Höhlens = 11 : 12; nach Haller (elem. phys. III. p. 169.) = 3 : 5, oder 16 : 25, 3 : 4 u. s. w.

Von den Gefäßen des großen Kreislaufs des Bluts im Einzelnen.

Durch die Schlagadern dieses Systems erhalten alle ³⁾ Theile aus der linken oder hintern Herzkammer ihr Blut; durch die Venen desselben kommt es aus allen Theilen zur rechten oder vordern Vorkammer des Herzens zurück.

Von den Schlagadern des großen Kreislaufs. Arteria Aorta ⁴⁾.

Der Hauptstamm wird Arteria Aorta genannt. Die häutige Masse ist beträchtlich dicker und stärker, als die der Arteria pulmonalis.

¹⁾ Weit seltener als die oben erwähnten Abweichungen kommen die vor, wo sich eine, mehrere oder alle Lungenvenen in die obere Hohlvene, oder in den rechten Vorhof öffnen. Wir ist selbst ein Fall vorgekommen, wo sich eine sehr große Vene aus der linken Lunge in die Vena jugularis communis der linken Seite begab, die unstreitig für eine sehr vergrößerte Vena bronchialis zu halten war. Einen solchen Fall auf der nämlichen Seite, wo eine große Vene aus der linken Lunge in die V. subclavia ging, beschreibt W. S. Weber (in *Medell's Archiv* 1829. Heft 1.) und bildet ihn ab.

²⁾ Samuel Aurivillius, de inaequali vasorum pulmonalium et cavitatum cordis amplitudine. Goetting. 1750. 4.

³⁾ Denn auch die ernährenden Arterien der Lungen gehören zum großen Kreislaufe.

⁴⁾ Eine kleine besondere Abhandlung hierüber hat neuerlich J. N. Bayer, praes. Fr. Tiedemann, Diss. de ramis ex arcu aortae prodeuntibus. Salzburg 1817. 4. c. tab. lith. herausgegeben.

Sie entspringt oben aus der hintern Herzkammer, namentlich an den 3 Stellen, an welchen ihre 3 halbmondsförmigen Klappen liegen, wird, in dem sie aus derselben hervorkommt, etwas weiter, sinus Valsalvae¹⁾, geht dann hinter dem Anfangstheile der A. pulmonalis schräg rechts hinan und aus dem Herzbeutel heraus, krümmt sich dann in einem Bogen, arcu aortae, der seine Convexität aufwärts richtet, zum Rückgrate hin. Dieser ganze Bogen lenkt sich allmählig schräg von vorn nach hinten, und zugleich von rechts nach links; der vordere Theil desselben steigt hinan, der hintere Theil desselben geht wieder hinab. Der vordere Theil des Bogens liegt über dem Herzen zwischen der Vena cava superior (die neben ihm rechts und weiter hinten befindlich ist) und der A. pulmonalis

Zweites beobachtete man, daß die Aorta aus der rechten, die Lungenerien aus der linken Hälfte des Herzens entsprang. Einen solchen Fall beschreibt und bildet ab *Wedel* (*Leon. anat. path. fasc. II. Tab. IX. f. 1.*) aus einem Falle beim Menschen beobachtete ihn *Baillie* (*Engravings, Fasc. I. fig. 1, 2.*), *Fox* (*Pathological researches. Essay I. London 1814. fig. 14.*), neuer bei einem zweimonatlichen, dieser bei einem halbmonatlichen Kinde, und *Wiatar* (*System of anatomy. Pennsylvania, vol. I. Gött. gel. Anz. 1817. fasc. 177. p. 1783.*)

Die Literatur mehrerer Fälle s. b. *Otto, path. Anat. 1. Bd. S. 303 Num. 43.* Einigemal sah man die Aorta aus beiden Ventrikeln entspringen. Das beobachtete *J. B. Sandifort* bei einem 12jährigen Knaben (*Obs. anat. path. Lib. I. cap. 1. p. 29 et 36.* — *Ejusd. mus. anat. Vol. I. sect. V. n. VII. p. 234. 241.*), Eben dies fand er bei einem Fötus, und führt noch einen gleichen Fall an, den *Louis* bei einem achtfähr. Mädchen fand (*Ibid. Lib. III. c. 1. p. 17 und Lib. IV. cap. X. p. 107.*) *Revin* sah sie ebenfalls an ihrer Mündung sehr weit aus beiden Ventrikeln kommen (*med. comm. year 1794. Dec. II. Vol. IX.*). Eben so *Burns* (*Herzst. p. 320.*)

Zweites wird auch ihr Verlauf abnorm, so, daß sie z. B. bei normaler Lage bei Eingeweide (nicht immer bei Verletzung derselben, wie ein von *Fox* in *London. med. and phys. Journ. Juni 1824* beobachteter Fall beweist, wo sie wie gewöhnlich links an der Wirbelsäule herabließ), über den rechten Luftröhrenast sich krümmte, und rechts an der Wirbelsäule herablaufend, erst mehr oder weniger weit unten sich nach der gewöhnlichen Oeffnung im Zwerchfelle hinlenkt. Fälle dieser Art beobachteten *Klinkosch, Pr. d. anat. foet. cap. monstr. Prag 1766. p. 15.* — *Abernethy* in *Phil. trans. 1793. p. 59.* — *Fiorati*, in *Saggi di Padova, Tom. I. p. 69.* — *Sandifort*, *museum anat. Vol. I. 273. II. Tab. 97. f. 1. 2.* — *Cailliot*, in *Bull. de l'école de méd. 1807, p. 24.* — *Obel*, in *Bull. d. sc. méd. par Grappon. II. 1808. p. 65.* — *Legallois*, in *Bull. de la soc. de méd. 1800. p. 99.* — *Wedel* *Hdb. d. path. Anat. 2. 1. S. 97.* — *Rudolphi*, in *Bernhard D. de arter. e corde prod. aberr. Berol. 1818. 4.* (abgebildet bei *Liebmann, tab. art. IV. fig. 9.*) — *Bréschet*, in *Répert. gén. d'anat. Tom. II. p. 14.* — *Otto*, *seltn. Beob. II. S. 69.* — *Erstner* ist ein anderer von *Otto* (*path. Anat. I. S. 305. No. 11.*) beschriebener Fall, nämlich daß die Aorta descend., die aus der Lungenerie entsprang, nach Abgabe der linken subclavia zwischen dem Schlunde und zweiten Rückenwirbel nach rechts lief, und sich unten wieder links zum Zwerchfelle wendete.

Manchmal ist der Stamm der Aorta an seinem Ursprunge einfach, spaltet sich aber einige Zoll weit davon in zwei, wovon der eine vor, der andere hinter dem Luftröhrenstamme verläuft, die sich darauf zur absteigenden Aorta verbinden. Einen merkwürdigen Fall dieser Art beschreibt *Hommel* (*Commerc. nor. 1737. Tab. II. fig. 1.*)

¹⁾ Valsalva (*diss. posth. II. p. 131.*) unterscheidet drei Sinus der Aorta; 2 an der vordern Seite an den Ursprüngen der A. coronariae, den 3ten (sinus maximus) an der hintern Seite. An diesem entstehen nach seiner Meinung die Aneurysmata.

(die neben ihm links und weiter vorn liegt,) und krümmt sich über den rechten Ast der A. pulmonalis hinüber. Der hintere Theil des Bogens krümmt sich über den linken Ast der Luftröhre hinüber, und das hintere Ende des Bogens liegt dann hinter dem linken Aste der A. pulmonalis, an der Mittelwand des linken Brusthautsackes. Der höchste mittlere Theil dieses Bogens liegt ungefähr vor dem 2ten Brustwirbel. Das hintere Ende des Bogens erreicht die vordere Fläche des 5ten Brustwirbels; liegt aber hier nicht in der Mitte, sondern an der linken Seite desselben.

Der übrige ziemlich gerade Theil der Aorta ¹⁾ liegt meistens gerade an der vordern Fläche des Rückgrates.

In der Brust geht die Aorta im Cavum Mediastini posticum an der linken Seite der vordern Fläche der Brustwirbel bis zum Hiatus aorticus des Zwerchfells hinunter, und liegt da erst links neben, dann hier unten auch hinter der Speiseröhre. In der Gegend des 9ten Brustwirbels lenkt sie sich mehr nach der Mitte.

Dann tritt sie durch den Hiatus aorticus des Zwerchfelles in die Bauchhöhle, und geht an der vordern Fläche der Bauchwirbelbeine, erst zwischen den Schenkeln des Zwerchfelles, und dann neben der Vena cava inferior, die weiter nach rechts liegt, herab. Endlich erreicht sie die vordere Fläche des 4ten Bauchwirbels, und endigt sich hier, indem sie sich in ihre beiden letzten Hauptäste, die Arterias iliacas, theilt.

Auf dem Wege von ihrem Ursprunge aus dem Herzen bis zu ihrem Ende giebt die Aorta folgende Aeste:

Indem die Aorta aus dem Herzen hervorkommt, giebt sie alsbald die beiden Arteriae coronariae cordis, welche zum Herzen zurückgehen.

Aus der obern Seite des Bogens der Aorta kommen gemeiniglich drei aufwärts gehende Aeste, welche von der rechten Seite gegen die linke so auf einander folgen:

a. A. anonyma, der gemeinschaftliche Stamm der

1) A. subclavia dextra und

2) A. carotis dextra.

b. A. carotis sinistra.

c. A. subclavia sinistra.

Da der Bogen eine schräge Lage hat, so liegt auch die A. anonyma

¹⁾ Den herabgehenden Theil der Aorta nennt man Aorta descendens, zum Unterschiede vom aufsteigenden Anfangstheile derselben, Aorta ascendens. Anfänger haben hier die irrige Bezeichnung zu vermeiden, als ob es zwei verschiedene Aorten gäbe.

174 Ursprung der Aeste am Bogen der Aorta u. d. d. Abweichung
am meisten nach rechts und nach vorn, die Subclavia sinistra
meisten nach links und nach hinten 1).

1) Nicht eben selten ist der Ursprung der Arterien aus dem Bogen der Aorta Aweigen unterworfen.

Zuweilen sind zwar auch nur drei Stämme da, aber die Schlüsselbeinarterien entspringen einzeln für sich, während beide Karotidsadern einen gemeinschaftlichen Stamm haben. Die linke Schlüsselbeinarterie liegt dann in der Mitte, die rechte ober der linken Seite. Dies beobachtete Waller, dessen Fall Ziedemann (tab. Taf. II. fig. 8.) abbildet, und ähnliche Beobachtungen machten Hunsald (mém. Paris 1737. p. 20. No. 7.), Fommel (comme. c. nor. 1737. p. 162.), Bhaner (de thyr. ima. §. 12.), Redel (Epist. ad Haller III. 141.), Wal (mém. de Berlin 1785. III. fig. 3.) und S. F. Redel d. j. (tab. an. p. fasc. II. tab. X. fig. 2.).

Merkwürdig ist hier der von Ziedemann abgebildete Fall (Tab. II. fig. 9. und fig. 1.), welchen einmal Waller (museum anat. p. 237) beobachtete. Die rechte Subclav. vertebr. carotis und die linke carotis hatten einen gemeinschaftl. Stamm die Vertebr. sinistra und subcl. sinistra, entspringen getrennt. In einem andern hatten die subcl. dextra, carot. dextra, und subcl. sin. einen Stamm, subcl. sin. und vert. sin. waren getrennt.

Einen ähnlichen Fall hat auch Sandifort, Obs. anat. path. Lib. IV. p. 1 auf einem weiblichen Körper beschrieben.

In einigen Fällen lag der gemeinschaftliche Stamm für beide Carotiden in der Mitte, die subclav. dextra und subcl. sinistra entspringen zu beiden Seiten (Ziedem. tab. anat. III. fig. 2. tab. III. f. 10.); in andern die anonyma ad d. car. sin. subcl. sin. und vert. sin. Ähnliche Fälle haben Winslow (S. 36 und Redel (path. Anat. 2. 1. Abth. S. 109.).

Die Fälle, wo eine Vermehrung der Aeste zu bemerken ist, sind häufiger als wo eine Verminderung derselben Statt findet.

A) Am häufigsten übersteigt die Zahl der entspringenden Arterien die Norm um eine, so daß der Stämme alle 4 aus dem Bogen hervortreten.

Diese Abweichung wird aber auf verschiedene Weise hervorgerufen; und zwar a. dadurch, daß die linke Wirbelarterie, eigentlich ein Stamm der Schlüsselbeinarterie, unmittelbar aus dem Bogen der Aorta entspringt. Schon Waller bemerkte, daß diese Art der Vertheilung die häufigste sei (Klein. phys. II. p. 161.).

Merkwürdig hierbei bleibt es, daß gerade vorzugsweise die linke Wirbelarterie es ist, und nur höchst selten die rechte, die diesen abweichenden Ursprung darbietet. In achtzehn Fällen dieser Art, die Redel gesehen, entspringt in keinem die rechte, immer die linke Wirbelarterie aus der Aorta.

Ultrigens entspringt sie fast immer zwischen der Carotis und Schlüsselbeinarterie. Unter den vielen Fällen, die Redel habe, fand er nur in einem einzigen die linke Wirbelarterie mehr nach außen liegend, als die Schlüsselbeinarterie (rathol. Anat. S. 1. Abth. S. 109.). Manchmal ist bei diesem ungewöhnlichen Ursprunge der linken Vertebralis doch nicht die Zahl der Stämme vermehrt, indem häufig dann die linke Karotidsader ein Ast der anonyma wird. (Redel Handb. 3. S. 81.)

b. Geht hierher der, jedoch seltener, Ursprung der inneren Brustarterie (mammaria interna) der einen oder der andern Seite, oder einer Brustdrüsenarterie (art. thymica), oder einer untern Schilddrüsenarterie (art. thyroidea inferior) [Neubauer (de art. thyr. §. 8. Tab. 2. fig. 2. citirt v. Ziedemann, tab. II. fig. 11.), Huber (acta helvet. VIII. p. 83.), Waller (mém. de Berlin 1785. Tab. 3. fig. 2.), Loder (Pr. de var. arter. Jenae 1761. p. 4.), Herd (diss. exh. obs. quaed. ad e. h. partium structuram. Marb. 1812. p. 1) und Ziedemann (expl. tab. art. p. 44)], oder der Ursprung der untern, oder untern Schilddrüsenarterie (art. thyr. inf. s. ima media), oder einer hintern Brustarterie (art. pericardiacae post.) aus dem Bogen der Aorta.

c. Wenn statt des angegebenen Stammes auch die rechte Schlüsselbeinarterie, oder jede besonders, wie die der linken Seite, aus dem Bogen der Aorta entspringt. Heister (comp. anat. p. 123 not.) in einem Weide. Winslow (Epos d'anat. III. 364.), Ballay (Journ. de med. 1758. April.), Renbun (de art. thyr. §. 14.), Herin (Edinb. med. comment. Dec. 2. Vol. 9.

Die Carotides geben dem Kopfe, namentlich dem Gesichte, der harten Hirnhaut und dem vordern Theile des Gehirns; die Sub-

Ryan (de quibusd. arter. aberr. p. 3.), Meckel (path. Anat. Bd. 2. Abth. I. S. 107.), Zagorsky (mém. de Pétersb. Tom. I.), Fleischmann (Zeichn. Nr. 236.) Tiedemann (tab. art. III. 3.). Dabei nimmt die rechte Schlüsselgulsader entweder an der Stelle der Innominata den gewöhnlichen, oder einen abweichenden Ursprung und Verlauf.

a) So entstand sie z. B. entweder zwischen der rechten und linken Kopfsulsader, (Tiedemann tab. art. III. f. 4. Huber, Acta helvet. VIII. p. 75 fig. 4.); ß) oder zwischen der linken Kopf- und Schlüsselgulsader (Tiedemann, tab. art. III. fig. 3. nach Walter, mém. de Berlin 1785. p. 62. Tab. III. fig. 5. und fig. 6. nach Walter ebendas. Tab. III. fig. 4.); γ) oder noch unterhalb der linken Schlüsselgulsader als der letzte Stamm der linken Seite. Dies beobachteten z. B. Boehmer (Hall. Diss. II. 452.), Heister (comp. anat. II. no. 64. p. 123.), Winslow (expos. anat. III. §. 19.), Palfyn (anatomie chirurg. II. 240.). In einem von Otto (seltene Beob. I. 100.) beobachteten Falle entsprang sie ganz links unter der linken subclavia an der hinteren Seite der Aorta, und krümmte sich hinter dem Schlunde, zwischen ihm und dem Rückgrate rechts zu ihrem Arme. Dasselbe Verhalten zeigt an 2 Präparaten M. F. Weber (in Meckel's Archiv, 1829, S. 8.) an, und etwas abweichend, doch ähnlich ist der von Wagner (Heusinger's Zeitschr. f. d. org. Phys. III. 340) beschriebene Fall, wo aus dem Bogen die Subclavia dextra als vierter Stamm entsprang, der zwischen Schlund und Wirbelsäule zum rechten Arme trat; manchmal indessen verläuft sie auch zwischen Speiseröhre und Luftröhre, oder vor dieser zum rechten Arme. Eine reichhaltige Literatur über diese Verschiedenheiten findet sich bei Otto (pathol. Anat. Berl. 1830. S. 307 ff.). In dem von Mourro beobachteten und von Burns (Herzkrankh. p. 122) erzählten Falle, drängte sie sich in schräger Richtung zwischen der Luftröhre und dem Schlunde durch.

Es ist aber dieser regelwidrige Verlauf besonders in sofern wichtig, als nach den Beobachtungen mancher Aerzte derselbe zu Dysphagie Veranlassung geben soll, während andre, wie Koberwein, Otto und Fleischmann, keine Erscheinungen von gehindertem Schlingen hievon wahrgenommen haben.

2) Fünf Stämme entspringen aus dem Bogen:

a. wenn bei dem besonderen Ursprunge der rechten Schlüssel- und Kopfsulsader noch eine oder die andere der angegebenen untergeordneten Pulsadern aus der Aorta entspringt: Meckel (tab. anat. path. Fasc. II. Tab. X. f. 1.) bildet einen solchen Fall ab. Hier entspringen nämlich die Carot. dextra, sinistra, vertebralis sin., Subclavia sin. und Subclav. dextra von einander getrennt.

Tiedemann, (tab. art. IV. fig. 1.) sah die rechte Schlüsselbein- und Kopfsarterie, die linke Kopfsarterie, die linke Wirbelarterie und die linke Subclav. aus dem Bogen entspringen. Auch Vetsche (syllog. obs. §. 44.) und Eoder (l. c.) beobachteten dies, und Koberwein (de vasor. decursu abnormali), welchen Fall Tiedemann fig. 2. abbildet, sah die rechte und linke Kopfsarterie, die linke Wirbelarterie, die linke Subclavia und zuletzt die rechte Subclavia aus der Aorta entspringen, die hinter jenen Aesten und hinter der Luft- und Speiseröhre zum rechten Arme verlief.

In einer weiblichen Leiche, etwa 40 Jahr alt, fand Otto (seltne Beob. 2. Hft. 60 f.) 5 Stämme, die von links nach rechts so auf einander folgten: 1) carotis sinistra, 2) dextra, 3) vertebralis dextra, 4) subclavia dextra, und 5) ganz hinten nach dem Rückgrate zu, fast aus der Aorta descendens die Subclavia sinistra, die zwischen der Wirbelsäule und dem Schlunde zum Arme lief.

Wagner (in Heusinger's Zeitschr. III. 339) fand die Anordnung von rechts an so: Carot. dextra und sinistra, subcl. sinistra, vertebralis sinistra und subclavia dextra, die zwischen Schlund und Wirbelsäule zum rechten Arme ging.

b. Wenn bei dem gewöhnlichen Ursprunge der drei Hauptstämme noch 2 der untergeordneten untergeordneten Aeste aus dem Bogen entspringen.

So entsprang in dem von Boehmer (de quat. et quinq. ram. ex arcu aortae prod. in Hall. coll. diss. anat. II. p. 451 sq.) noch die mammaria dextra und die vertebralis sinistra, (vgl. Tiedemann, tab. art. IV. fig. 3.) oder die untere Schilddrüsenarterie aus dem Bogen, wie Meckel (Hdb. d. Anat. III. S. 83.) zweimal sahe.

176 Ursprung d. Aeste am Bogen d. Aorta u. dessen Abzweigungen der Brust, den Armen und dem hintern Theile des Blutes.

3) Sechs Aeste entspringen aus dem Bogen.

Diese Abweichung gehört unter die sehr seltenen. Liedzemann fand in dem Körper eines vierzigjährigen Mannes, und bildet sie Tab. art. I. Die Arterien folgten so auf einander: 1) rechte Schlüsselbeinarterie, 2) rechte Kopfarterie, 3) rechte Kopfarterie, 4) linke Kopfarterie, 5) linke Wirbelarterie, 6) linke Schlüsselbeinarterie. Eine ähnliche Abweichung giebt F. Müller, Prosectio hagen. an. (S. bei Meckel in f. Hdb. der Anat. III. S. 84.) Hier die rechte Kopf- und Schlüsselbeinarterie abgetrennt, zwischen ihnen die rechte Wirbelarterie, und eben so zwischen der linken Kopf- und Schlüsselbeinarterie die linke Wirbelarterie. Auch Penada, (Saggio terzo di osservaz. patol. anat. P. 1. 45.) hat eine ähnliche Beobachtung. Der ungenannte Stamm war in gleicher Art da, aber zugleich entsprangen beide Wirbelarterien aus dem Bogen. Fälle von Verminderung der aus dem Aortenbogen entspringenden Aeste:

1) Zwei Stämme entspringen aus dem Bogen;

a. wenn die linke Kopfpulsader aus dem ungenannten Stamme entspringt die linke Kopfpulsader ganz nahe am Anfangstheile des ungenannten und selbst gemeinschaftlich mit ihm, so daß sich der ungenannte Stamm in die linke Kopfpulsader und den eigentlichen ungenannten Stamm gewöhnliche Richtung und Theilung hat, spaltet.

Diese Abweichung, von älteren Anatomen als die Norm beschrieben, wurde in neuerer Zeit oft beobachtet. Vesche (synth. obs. anat. Hal. 1) fand sie bei einem Weibe. Neubauer (de art. thyr. §. 11.) zweifelt nicht, und einmal bei einem neugeborenen Kinde. Huber (acta helvet. bei einem vierjährigen Mädchen und bei einem 12 Tage alten Knaben. Annot. p. 3. F. Meckel (Epist. ad Haller. III. p. 140.) Malacarne Chir. II. 128), Walter (mém. de Berlin 1785. p. 61), Wurn (de quatuordecim arteriarum in c. h. distrib. Edinb. 1812. p. 2 (tab. anat. path. Fasc. II. Tab. 10. fig. 11. Handb. d. path. Anat. II. S. 31.)). Auch Liedzemann (expl. tab. art.) hat diese gefunden, besonders in Marburg, Würzburg und Heidelberg. (s. dess. Taf. und eben so W. S. Weber (in Meckels Archiv 1829. S. 8).)

Die aus dem gemeinschaftlichen Stamme entspringende linke Kopfarterie immer in schräger Richtung zwischen dem Griff des Brustbeins und der Brustdrüse aufwärts, eine Anordnung, die bei der Bronchotomie höchst nützlich ist.

b. Wenn die linke Kopf- und Schlüsselbeinpulsader mit einem kurzen gemeinschaftlichen Stamme aus dem Bogen der Aorta entspringen, gemeinschaftlicher Stamm für die linke Kopf- und Schlüsselbeinpulsader vorhanden, Abweichung wurde zweimal von Malacarne (osservazione in Chirurgia 1784. Tom. II. p. 119) und einmal von Biumi beobachtet (osservaz. anat. p. 133). Auch Liedzemann (expl. tab. art. p. 16.) sah einen Fall dieser Art. Sammlung in Berlin.

c. Wenn 2 Stämme vorhanden sind, deren einer sich in die beiden anderen in die beiden Schlüsselbeinpulsadern theilt, wobei diese Pulsadern einen unregelmäßigen Verlauf haben. (Liedzemann, tab. art. II. fig. 4.)

Eine Spalte im Stamme der Aorta, die hierher gezogen werden kann, malacarne (Observaz. in Chirurgia, Torino 1784. Tom. I. und von Biumi (observaz. anat. p. 133.) beobachtet. Meckel (tab. anat. Tab. 7. f. 3.) bildet den Fall von Malacarne ab. Sie war zwar an ihrer Basis einfach, zeigte aber schon hier durch Gestalt, Größe und Klappenzahl Neigung zu sich. Nach Abgabe der Kranzarterien theilte sie sich, drei Linien über der Herzspalte in 2 Aeste, deren jeder 18 Lin. hielt, und die sich, nachdem sie vier Zoll einander getrennt, herabgestiegen waren, zum Durchmesser von 14 Lin. vereinigten. Aus jedem entsprang erst die äußere, dann die innere Carotis ihrer Seite. Die Aorta entsprang an der Vereinigungsstelle, eigentlich aus dem rechten, um die linke Seite. (Auch Liedzemann, tab. art. IV. fig. 7. bildet die

An der untern Seite des Bogens, in der Gegend der Subclavia sinistra, kommt der Ductus arteriosus aus der Arteria pulmonalis in die Aorta, der bei Erwachsenen in ein Band verwandelt ist.

Bei ihrem Durchgange zwischen den 2 Brusthautsäcken giebt die Aorta von ihrer hintern Oberfläche die Arterias intercostales zu den Zwischenrippenräumen, die Bronchiales zu den Lungen und die Oesophageas zur Speiseröhre ic.

An diese Bildung schließt sich eine von Hammel (commerce. nor. 1737. p. 162.) beschriebene und abgebildete an. Die Aorta stieg, über 2 Zoll hoch, ungetheilt in die Höhe, spaltete sich aber dann in einen vordern engeren, und einen hintern weiteren Ast, zwischen denen die Speise- und Luftröhre durchging, die sich dann zur absteigenden Aorta vereinigten. Die linke Carot. und Subclav. entsprangen aus der hintern, die rechte aus der vordern Aorta. (Abgebildet bei Meckel, Icon. anat. path. fasc. II. Tab. IX. f. 4. und Tiedemann, tab. art. IV. fig. 6.)

Einen dritten Fall beobachtete Jos. Faup. Bertin, traité des maladies du coeur. p. 433.

d. Wenn die rechte Schlüsselbeinpulsader ein rechter Stamm ist, und die beiden Kopf- und die linke Schlüsselbeinpulsader aus einem links liegenden gemeinschaftlichen Stamme hervorkommen.

Einen Fall dieser Art theilt Jagorsky mit (Acta Petrop. 1809. I. p. 384. Tab. 1.), den auch Tiedemann (tab. art. IV. fig. 8.) abbildet.

3) Die Verminderung bis auf einen Stamm gehört zu den seltensten Abweichungen.

Einen Fall dieser Art beobachtete Klinz (Abhandlungen der Josephin. med. chirurg. Akad. Wien 1787. 1. Bd. S. 271. Taf. VI. Fig. 1. 2.) in dem Leichname eines Soldaten. Die Aorta bildete hier eigentlich keinen Bogen, sondern sie theilte sich, sobald sie aus der linken Herzkammer entsprungen war, in einen aufsteigenden und einen absteigenden Ast, von denen jener 2 Zoll hoch, ungetheilt, gerade in die Höhe ging, und dann sich in den ungenannten Stamm, die linke Kopf- und Schlüsselbeinarterie spaltete. (Man findet ihn auch abgebildet bei Tiedemann, tab. arter. Tab. II. fig. 3. und Meckel, Tabulae anat. pathol. Fasc. II. Tab. IX. fig. 4.)

Wahrscheinlich gehört hierher auch ein von Haller (Elem. phys. II. p. 162.) angeführter Fall, wo bei einem Kinde die Aorta, ohne einen Bogen zu bilden, sich sofort nach ihrem Austritte aus dem Herzen spaltete.

Zuweilen entspringen die Stämme ungewöhnlich nahe an einander, oder ungewöhnlich weit von einander. Im ersten Falle nähert sich die linke Carotis dem ungenannten Stamme; — oder sie ist davon entfernt, dagegen der linken Subclavia näher gerückt, oder zuweilen sind auch alle 3 Stämme so an einander gerückt, daß sie auf den ersten Blick bloß einen Stamm auszumachen scheinen. Rückwärts des zweiten Falles fand Meckel (Handb. d. Anat. 3. S. 86) eine merkwürdige Anordnung. Die linke Kopfpulsader war in einem etwa 2jährigen Kinde von dem gemeinschaftlichen Stamme etwa $\frac{1}{2}$, die linke Subclav. von der linken Carot. fast einen ganzen Zoll entfernt, der Bogen ungewöhnlich spitz, die linke Carot. aus dem Winkel entspringend.

Bisweilen findet auch eine Verwechslung der Ursprungsstelle Statt, so daß 1) von rechts nach links die linke Kopfpulsader und Schlüsselbeinpulsader, und zuletzt der ungenannte Stamm entsteht. (Klinz, Gefäßl. 495.)

2) oder die rechte Kopf- und Schlüsselbeinpulsader entspringen einzeln, dagegen die linke Seite mit einem gemeinschaftlichen Stamme;

3) die rechte und linke Schlüsselbeinpulsader entspringen einzeln, beide Kopfpulsadern aber mit einem gemeinschaftlichen Stamme;

4) beide Kopfpulsadern entspringen mit einem gemeinschaftl. Stamme, beide Schlüsselbeinpulsadern getrennt;

5) Die rechte Subcl. und beide Kopfpulsadern haben einen gemeinschaftl. Stamm, die linke Subcl. bildet den 2ten, und den 3ten macht eine oder die andere untergeordnete Pulsader.

Sobald sie durch den Hiatus aorticus des Zwerchfelles durch gekommen ist, giebt sie dem Zwerchfelle die Arterias phrenicas.

Dann schiebt sie in der Bauchhöhle, da, wo sie zwischen den Enden des Zwerchfelles liegt, erst die A. coeliaca, nicht weit unter die mesenterica superior, dann die renales zu beiden Seiten, weiter unten nicht weit von ihrer Endigung die mesenterica inferior. Die Arteriae spermaticae entspringen in der Gegend zwischen mesenterica superior und inferior, höher oder tiefer, die lumbales in derselben Gegend, indem sie von oben nach unten auf einander gehen. Die coeliaca und die mesentericae gehen vorwärts in die Peritonealhöhle, zu Magen, Leber, Milz, Pankreas und zu den Samen; die renales gehen an beiden Seiten fast quer, wenig abwärts den Nieren; die lumbales von ihrer hintern Seite zu den hintern Enden der Bauchmuskeln und zu den Rückenmuskeln u., die spermaticae schräg auswärts hinab zu gewissen Geschlechtstheilen.

Endlich theilt sich die Aorta, indem sie sich endigt, an der vordern Fläche des 4ten Bauchwirbels in die beiden schräg auswärts und wärts gehenden Arterias iliacas, welche den Eingeweiden des Beckens dem vordern Theile der Bauchmuskeln und den Beinen bestimmt. Zwischen beiden kommt noch in der Mitte die Arteria sacra media aus der Aorta herab.

Diese Aeste der Aorta sind von verschiedener Dicke.

Die dickeren sind: die iliacae, subclaviae, carotides, mesenterica superior, coeliaca, renales, mesenterica inferior.

Die dünneren: die phrenicae, coronariae Cordis, lumbales, intercostales, bronchiales, oesophageae, sacra media, spermaticae. Die nur einmal vorhandenen gehören Organen an, die auch nur einmal vorhanden sind.

A e s t e d e r A o r t a .

Arteriae Carotides.

Die beiden Arteriae carotides sind dem oberen Theile des Halses dem Kopfe bestimmt, und etwas dünner, als die Arteriae subclaviae.

Die rechte entspringt gemeinschaftlich mit der Subclavia dieser aus der A. anonyma, die linke aber aus dem Bogen der Aorta. Die rechte liegt weiter nach rechts; die linke weiter nach links; die rechte geht daher anfangs vor der Luftröhre, dann sich weiter rechts unten an der rechten Seite der Luftröhre hinauf; die linke geht gleich anfangs

in der linken Seite der Luftröhre hinauf. Uebrigens sind im Allgemeinen beide Carotides einander ähnlich, und es ist daher nur nöthig, eine derselben zu beschreiben.

Die Carotis steigt von ihrem Ursprunge, anfangs im obern Theile der Brust, dann am Halse neben der Luftröhre, bis zu der Gegend des Kehlkopfes hinauf. In der Brust liegt sie hinter der quergehenden Vena iugularis sinistra; am Halse liegt jede neben der Vena iugularis interna ihrer Seite ein wenig näher nach innen und vorn, und vor dem Nervus vagus, indem sie mit beiden durch Zellgewebe verbunden ist. Sie wird am Halse ganz vom Platysma, theils auch vom Musculus sternocleidomastoideus und vom Musculus omohyoideus, wo diese Muskeln sich mit ihr kreuzen, bedeckt. Oberhalb der Stelle, wo sie vom M. sternocleidomastoideus bedeckt wird, wird sie nur vom Platysma und von der Haut bedeckt. Hier kann man ihr Klopfen durch die Haut deutlich fühlen, und wenn es stark geschieht, deutlich sehen.

Sie geht ziemlich gerade hinauf, doch zugleich flach geschlängelt, und allmählig lenkt sie sich etwas mehr nach außen und hinten hin.

Bis zu der Gegend des Kehlkopfes giebt sie keinen Ast; ein oder das andere unbeträchtliche Aestchen ausgenommen, das man in einigen Körpern zu nahen Theilen gehend antrifft.

Wenn sie bis neben den Kehlkopf hinaufgekommen ist, so theilt sie sich in 2 Hauptäste. Diese Theilung liegt an der nämlichen Stelle, ein Mensch mag einen langen oder einen kurzen Hals haben. Von dem unteren Rande der Kinnlade dagegen scheint sie bei Neugeborenen entfernter zu liegen, unstreitig weil bei ihnen der Zahnjellenrand allein ausgebildet ist, der die Bahnwurzeln einschließende Theil dagegen noch fehlt, und weil der Ast des Unterkiefers sehr niedrig ist ¹⁾. Bis zur Theilungsstelle kann sie Carotis communis heißen.

I. Carotis facialis s. externa, die äußere Kopfschlagader. Diese geht in der Richtung des Stammes ferner hinauf, ist dem vordern Theile des Halses, dem Gesichte, der Hirnschale, den äußeren Theilen derselben und der harten Hirnhaut (aber nicht dem Gehirne selbst) bestimmt.

II. Carotis cerebralis s. interna, die innere Carotis. Diese geht mehr rückwärts und aufwärts hinauf: ist dem vordern Theile des Gehirns, dem Auge und der Stirn bestimmt.

Beide sind in der Dicke wenig verschieden; wenn die facialis die thyreoidea speist, so ist sie ein wenig dicker, als die cerebralis; wenn die thyreoidea aus der Carotis communis kommt, so ist die facialis etwas dünner, als die cerebralis ²⁾.

¹⁾ Allan Burns, surgical anatomy of the head and neck. Edinburgh 1812. Aus d. Engl. von G. Ed. Dohlfhof, unter dem Titel: Bemerkungen über die chirurgische Anatomie des Kopfes und Halses, mit Num. und 10 Kpft. Halle 1829. 8. p. 349.

²⁾ Sie theilt sich zuweilen nicht an der gewöhnlichen Stelle in ihre beiden Hauptäste, son-

I. Carotis externa oder facialis, die äußere Kopf- schlagader ¹⁾.

Die Carotis facialis geht von der Gegend des Kehlkopfes, ein wenig auswärts und rückwärts, bis hinter den hintern Rand des Halses der untern Kinnbacke, vor dem Processus mastoideus und vor dem Ohrknorpel (wo sie von der Parotis bedeckt wird) in die Höhe, und endigt sich mit der Theilung in ihre beiden letzten Aeste. Sie liegt auf diesem Wege an der innern Seite des Nervus hypoglossus, des hintern Bauches des M. digastricus und des M. stylohyoideus, und giebt folgende Aeste: 3 nach vorn: 1) Arteria thyreoidea superior 2) lingualis 3) maxillaris externa; 3 nach hinten: 4) pharyngea 5) occipitalis 6) auricularis posterior, und 2 obere Endäste: 7) temporalis 8) maxillaris interna.

1. Arteria thyreoidea superior, die obere Schilddrüsenarterie ²⁾.

Sie entspringt von der innern Seite der Carotis facialis, ~~hinter~~

hern weiter abwärts. Auf der rechten Seite liegt zuweilen die Theilungsstelle kaum in der Entfernung eines Pollers von dem ungenannten Stamme, oder an verschiedenen Orten zwischen dieser und der gewöhnlichen Theilungsstelle. Morgagni (de sed. et caus. Lib. III. epist. 29. art. 20); Burns, von den Herzkrankheiten. Aus dem Engl. 1813. p. 328, und Ryan (Diss. de quarundam arteriarum in c. h. distich. Edinb. 1812. p. 4.).

Bisweilen theilt sich auch ihr Stamm erst über dem obern Rande des Schilddrüsenknorpels in der Nähe des Untertiefers. Dabei ist der Stamm der äußeren Kopf- oder Angesichtspulsader sehr kurz, und zerfällt auf einmal, wie buschelförmig, in seine Aeste (Münz, Gefäßlehre, Taf. VI. f. IV. 6.), oder er fehlt fast ganz, so daß die Aeste gleich aus dem gemeinschaftlichen Stamme entspringen, und dieser nur als innere Kopf- oder Halspulsader fortrifft. (Burns, Herzth. 327. Surgical anatomy, Edinb. 1811. p. 45.) In einem Falle war die Carotis ein kurzer dicker Stumpf, der dem Stamme der Schilddrüsenarterie gleich, und aus dessen oberem Ende eben so die großen Aeste entsprang. In einem andern Falle gab dieselbe, statt sich zu theilen, Seitenäste ab, bis sie beträchtlich über den Winkel der Kinnlade hinaufgestiegen war; der Basis des griffelförmigen Forts. gegenüber theilte sie sich dann in 2 Aeste, wovon einer die innere Carotis, die andere der gemeinschaftliche Stamm der Temporal- und Maxillararterie war.

Die Carotis interna fehlte einmal ganz (Eode, med. chir. Bibliothek, Bd. X. S. 401.), und Morgagni (de sed. et caus. ep. 49. 18.) sah sie beide bei einem sehr alten Manne in der Mitte ihrer Länge ein paarmal gewunden wie eine Schnur. Noch gehört hierher der ungewöhnliche Ursprung größerer oder kleinerer Zweige aus dem gemeinschaftlichen Stamme der Carotis. Oft entspringt aus ihm die obere Schilddrüsenpulsader. (Münz, Gefäßl. Tab. VI. fig. 4. 2.) Bisweilen auch die untern Schilddrüsenpulsader, oder auch ein oder der andere Zweig an den Schilddrüsen.

Abweichungen des Anfangstheiles von seiner gewöhnlichen Richtung nach rechts oder links, mehr oder weniger geschlängelter Verlauf, oberflächlichere oder tiefere Lage in ihrem Aufsteigen aus der Brusthöhle, ungleiches Verhältnis der Dicke des rechten und linken Stammes, sind ebenfalls keine sehr seltene Erscheinungen.

¹⁾ Eine vortreffliche Abbildung eines von Fr. Schlemm meisterhaft gearbeiteten Präparats, welches die oberflächlichen Arterien des Kopfes darstellt, nebst einer Beschreibung derselben, enthält dessen Schrift: Arteriarum capitis superficialium icon nova; aet. Tabb. duae. Berolini 1830. Fol.

²⁾ Sie entspringt nicht selten aus der gemeinschaftlichen Kopfarterie höher oder tiefer an

nähe bei dem Ursprunge derselben aus der Carotis communis. Sie ist nach Verhältniß ihres Stammes und des Theiles, zu dem sie geht, von sehr ansehnlicher Dicke, und desto dicker, je dünner die A. thyreoidea inferior ist. Sie geht erst eine sehr kurze Strecke aufwärts und einwärts, krümmt sich dann einwärts, und ferner abwärts zu ihrem Lappen der Schilddrüse hin. Ihre Aeste sind folgende:

a. Muskeläste von unbestimmter Zahl, dem Musculus hyothyreoideus, sternothyreoideus, sternohyoideus, omohyoideus u. angehörend; nach vorn kommen auch kleine Aestchen zur Haut. Ein Zweig oder einige kleine Zweige gehen auch nach hinten zum Constrictor infimus Pharyngis.

b. Aeste, die in die Schilddrüse gehen. Diese haben theils besondere Stämme, theils solche, die ihnen mit den Muskelästen gemein sind. Sie haben nach unten mit den Aesten der A. thyreoidea inferior, auch nach der andern Seite mit den Aesten der gleichen Schlagader von der andern Seite Gemeinschaft.

Sowohl aus den Muskelzweigen, als aus den Drüsenzweigen kommen Aestchen zur äußeren Fläche des Schildknorpels.

c. Arteria laryngea ⁵⁾. Sie geht zwischen dem obern Rande des Schildknorpels und dem Zungenbeine durch den M. thyreoehyoideus

tehalb der Theilung derselben, selbst einen Zoll tiefer (Burns, Herzthn. S. 329. Meckel, path. Anat. 2. Bd. 1. Abth. S. 112. Barclay, a description of the arteries, p. 13.), und zwar zuweilen zugleich mit der Zungenarterie mittels eines gemeinschaftlichen Stammes (Burns, Herzthn. S. 329. Barclay, on arteries, p. 13.).

Die der einen oder andern Seite fehlt bisweilen ganz, und wird durch die entsprechende stärkere untere oder obere Schilddrüsenpulsader durch die der andern Seite ersetzt, oder sie ist dünner im Verhältniß zur andern. (Münz, Gefäßlehre, Tab. VI. f. 5. p. 498.)

Aber sie ist auch gar nicht selten doppelt, aber beide Gefäße entspringen dann in nur geringer Entfernung über einander. Der vordere geht dann gleich rückwärts an den hintern Theil der Schilddrüse, oder erst von vorn über den vordern Zweig rückwärts, wodurch er oberflächlicher zu liegen kommt. (Münz, Tab. VI. f. IV. 3.) Bei diesem Zerfallen trennt sich häufig der Kehlkopfast vom Schilddrüsenaste, und ist immer der obere Stamm.

Ofters nimmt der aus ihr kommende Kehlkopfzweig seinen Ursprung aus einem andern Aste der äußeren Kopfpulsader (nach Meckel, Handb. d. Anat. 3. S. 92. in dem Verhältniß wie 1 : 8), meist aus der lingualis (Münz, Gefäßl. Tab. VIII. f. 1. 8.), oder höher aus dem Stamme der Angesichts-pulsader selbst (ibid. Tab. VI. f. IV. 5.), nach Hildebrandt auch aus der Pharyngea.

⁵⁾ Haller, Icon. anat. fasc. 2. p. 4. sah sie 5mal, und Tiedemann (expl. tab. 28. p. 78. not. e.) oft aus dem Stamme der äußeren Kopfarterie entspringen. J. F. Meckel behauptet, daß sich die Fälle, in welchen sie gemeinschaftlich mit der A. lingualis aus einem Stämmchen der Carotis externa entspringe, zu den, wo sie aus der A. thyreoidea käme, wie 1 zu 7 verhielten. Handb. III. S. 94.

In der Regel dringt sie zwischen dem Zungenbeine und Schildknorpel in den Kehlkopf. Sehr selten geht sie zwischen dem Schild- und Ringknorpel ein, wie Sabatier (traité d'anat. Par. 1781. III. p. 151) und Murray (descript. arter. Lips. 1794. p. 11.) angeben, oder durch ein ungewöhnliches Loch des Schildknorpels. (Sämmering V. p. 126.)

hindurch (selten durch ein eigenes Loch in dem obern Theile des Schilddrüsennorpels) in die Wände der Höhle des Kehlkopfes, und vertheilt sich zum Schilddrüsennorpel, zu den giefbeckenförmigen Knorpeln, zu dem Ringknorpel, zu dem Kehlkopfdeckel, zu der Kehlkopfschleimhaut und zu dem vorderen Theile des Schlundes.

2. Arteria lingualis, die Zungenarterie ¹⁾.

Sie ist dicker, als die vorige, auch ein wenig dicker als die *maxillaris externa*, wenn nicht diese die *A. sublingualis* giebt. Sie entspringt höher als die *thyreoidea*, und steigt geschlängelt einwärts hinauf, über das große Horn des Zungenbeins, und wird dann vom *Musculus hyoglossus* bedeckt. Auf diesem Wege giebt sie kleine Aeste zu den nahen Muskeln der Zunge und des Zungenbeins. Einer ihrer Aeste, *ramus hyoideus*, verbindet sich mit dem von der andern Seite über dem obern Rande des Zungenbeins.

Ferner giebt sie folgende Aeste:

a. *Arteria dorsalis linguae*, die Arterie des Zungenrückens. Diese geht aufwärts zu dem hinteren Theile der obern Fläche der Zunge, giebt daselbst eine Menge Aeste, welche auf der obern Fläche der Zunge sich netzförmig vertheilen; rückwärts auch einige Aeste zum Kehlkopfdeckel.

b. *Arteria sublingualis*, Unterzungenarterie. Sie geht unter der Zunge am *Musculus geniohyoideus* vorwärts bis hinter das Kinn, giebt Aeste dem *Musculus genioglossus*, *geniohyoideus*, *mylohyoideus*, der *Glandula submaxillaris*, hat hinter dem Kinn mit der *submentalis* Gemeinschaft und ist in einigen Körpern ein Ast der *A. maxillaris externa*.

c. *Arteria profunda linguae s. ranina*, die Seitenzungenarterie. Diese ist die Fortsetzung des Stammes, und viel dicker, geht aufwärts und vorwärts in die Fleischmasse der Zunge, und geschlängelt in verschiedenen bis zur Spitze fort, wo sie sich mit der von der andern Seite verbindet. Auf ihrem ganzen Wege giebt sie Seitenäste, die sich in viele kleine Aestchen vertheilen, welche in der Zunge verbreitet sind.

3. Arteria maxillaris externa, die Antlitzarterie ²⁾.

Sie entspringt nahe über der *lingualis*, da, wo die *Carotis interna* und unter dem Winkel der untern Kinnbacke liegt, und geht, bedeckt

¹⁾ Sie entspringt bald höher bald tiefer aus der äußeren Kopfarterie, in seltenen Fällen höher als die äußere Kieferarterie, öfter bildet sie mit der äußeren Kieferarterie einen gemeinschaftlichen Stamm. Haller (*Icon. anat. fasc. II. p. 5.*) sah dies in 7 Körpern 7mal. Liedemann (*explic. tab. art. p. 80.*) sah es 10mal, und Burns (*Herzshn. 330.*) erwähnt dieses Ursprungs.

²⁾ Verschiedenheiten finden sich hinsichtlich des Ursprungs, der Größe, des Verlaufs und der Verzweigung sehr häufig.

Ofters bildet sie vor ihrem Uebergange über den Unterkiefer ins Gesicht starke Krümmungen, welche dann in dieser Gegend sehr oberflächlich liegen. (Wunz, *Geschichte, Tab. VI. fig. IV. 8.*) Ofters verläuft sie als stärkere Arterie mehr oder weniger gewunden bis zu dem innern Augenwinkel (ebd. *Tab. VI. f. II. 9 — 10*)

am hintern Rande des *M. digastricus*, eine kurze Strecke aufwärts, fließt mit dieser aus einem gemeinschaftlichen Stamme, und giebt folgende kleinere, sehr veränderliche Äste:

a. Äste, welche zum hintern Bauche des *M. digastricus*, zum *stylohyoideus* gehen. b. *Arteria palatina adscendens*, die aufsteigende Gaumenarterie, steigt zwischen dem *M. styloglossus* und *stylopharyngeus* hinauf, giebt Äste zu diesen Muskeln, zum Gaumenvorhange, zur Mandel, zum hintern Theile der Zunge. c. Einen oder einige besondere Äste zur Mandel. d. Einen oder einige besondere Äste zum Gaumenvorhange. e. Zu den *M. M. pterygoideis*. (In einigen Weibern kommen diese Äste (c. d. e.) alle aus dem Stamme der *A. maxillaris externa*, in andern einer oder der andere aus der *A. palatina adscendens*.) f. *Ramus Glandulae submaxillaris*, einer der 2 Äste zur Kinnspeicheldrüse; aus dem Stamme der *A. maxillaris*, oder aus der *A. submentalis*.

Der Stamm der *A. maxillaris externa* geht hierbei in einer Furche an *Glandula submaxillaris*, von der sie bedeckt wird, weiter, und giebt die *A. submentalis*.

1. *Arteria submentalis*, die Unterkinn-Arterie ¹⁾. Sie geht an der innern Seite des untern Randes der untern Kinnspeicheldrüse zwischen dem *M. mylohyoideus* und dem vordern Bauche des *digastricus* vorwärts und allmählig gekrümmt einwärts, giebt Äste dem *M. mylohyoideus*, dem andern Bauche des *M. digastricus*, auch durchbohrende Äste, welche durch das *latysma myoideus* dringen und in die Haut gehen, theils auch am untern Rande der untern Kinnspeicheldrüse heraufkommen, und mit den Ästen der *A. facialis*, auch des *Ramus mentalis posterior* der *A. maxillaris interna* Gemeinschaft haben. Das Ende der *A. submentalis* hat mit dem Ende der *A. lingualis*, und an einer andern Stelle mit dem Ende der *A. submentalis* der andern Seite und mit der *A. coronaria labii inferioris* Gemeinschaft, oder kommt gar mit der *Arterie* der andern Seite in einem Bogen zusammen.

Die *A. sublingualis* ist in manchen Körpern ein Ast der *A. maxillaris externa*, und besonders der *submentalis*, weicht von dieser aufwärts ab, legt sich auf den *M. mylohyoideus*, geht am *M. geniohyoideus* vorwärts etc.

2. Der Antlitzast, *ramus facialis*, krümmt sich nun auswärts, nach dem untern Rande des Astes der untern Kinnspeicheldrüse, und geht an diesem Rande zu der äußern Fläche desselben hinauf. Gemeinlich ist am Knochen ihre Stelle durch einen flachen Eindruck bezeichnet. Sie wird

hiervon verliert sie sich schon in der Gegend der Oberlippe und des untern Theiles der Nase (ibid. Tab. V. f. I. 3. 6.) und ihre oberen Zweige werden dann durch Zweige der Schläfen-, Unterangenhöhlen- und die der *A. ophthalmica* ersetzt. So fand Burns, *Herzkrankheiten* p. 350, daß die über die Kinnspeicheldrüse gehende *A. maxillaris*, die so dünn wie ein Zwirnsfaden war, nur zur Unterlippe ging, und daß die *A. transversa faciei* der *Temporalis* wie der Ast einer Krähnenfeder war und deren Stelle vertrat.

¹⁾ Fr. Schlemm, *Diss. de arteriarum praesertim faciei anastomosibus*. Berlini 1821. 4. e. tab. aen. Fol. p. 3.

hier bloß vom Platysma und von der Haut bedeckt, so daß man außen ihr Klopfen deutlich fühlen kann. Sie giebt Aeste zum Masseter, Aeste zum M. triangularis und quadratus menti, die sich mit Aesten der A. coronaria inferior und des Ramus mentalis der A. maxillaris interna verbinden; Aeste zum Zahnfleisch der untern Kinnbacke; Aeste zum Buccinator, die mit dem Ramus buccalis der A. maxillaris interna Gemeinschaft haben; Aeste zu den M. M. zygomaticis, dem Levator anguli oris. Die drei größeren Aeste, welche sie schickt, sind die beiden Arteriae coronariae Labiorum, Kranzarterien der Lippen, und die angularis. Entweder entsteht erst die A. coronaria inferior besonders, dann die coronaria superior und die angularis aus dem übrigbleibenden Stamme; oder sie schickt erst einen gemeinsamen Stamm beider A. A. coronariae, so daß der Stamm als A. angularis übrig bleibt.

a. Arteria coronaria Labii inferioris, Kranzarterie der Unterlippe. Sie geht einwärts, am Rande der Unterlippe bis zur Mitte derselben, wo sie sich mit der der andern Seite vereinigt; giebt abwärts Aeste zum M. triangularis und zum M. quadratus Menti, und aufwärts zum M. orbicularis.

b. Arteria coronaria Labii superioris, Kranzarterie der Oberlippe. Sie geht ein- und schräg aufwärts am Rande der Oberlippe bis zur Mitte derselben, wo sie sich mit der gleichen von der andern Seite vereinigt. Sie giebt aufwärts Aeste zum untersten Theile der äußern Nase, abwärts Aeste in den M. orbicularis. Ein Ast geht mit einem gleichen Aste von der andern Seite zum Septum mobile in die Nase hinein.

c. Arteria angularis, Augenwinkelarterie. Diese geht schräg einwärts bis zu der Gegend unter dem innern Augenwinkel und zum obern Theile der äußern Nase hinauf, so daß sie innerhalb der Musculi zygomatici, und außerhalb der übrigen Wangenmuskeln liegt. Sie giebt auf diesem Wege Aeste den Muskeln, an denen sie vorbeigeht, den zygomaticis, dem Levator anguli oris, dem Levator Labii superioris, dem Levator alae Nasi, dem orbicularis Palpebrarum, und der äußern Fläche der äußern Nase. Sie verbindet sich unterweges mit Aesten der A. infraorbitalis, der transversa faciei, und kommt endlich mit der nasalis, aus der ophthalmica, zusammen. Am Rande des Nasenflügels geht ein kleiner Ast derselben bis zur Spitze der Nase fort, der mit dem nämlichen Aste von der andern Seite zusammenkommt. Auch verbinden sich andere Aeste auf dem Rücken der Nase mit den Aesten von der andern Seite. Ein kleines Nestchen dringt gemeinlich durch ein Loch des Nasenbeins in die Nasenhöhle.

Die oberflächlichen Aeste der A. maxillaris externa geben zugleich Ramos cutaneos für die Haut der untern Kinnbacke, der Wangen, der Lippen, der Nase, des untern Augenlides.

4. Arteria pharyngea, die Schlundkopfarterie ¹⁾.

Sie ist der kleinste Ast der Carotis facialis.

¹⁾ Sie entspringt bisweilen aus der Theilungsstelle der gemeinschaftlichen Kopfarterie, oder

Sie entspringt von der hintern Seite der Carotis facialis, tiefer in der Gegend der lingualis, oder höher in der Gegend der occipitalis, und steigt neben dem Schlunde einwärts hinauf. Sie giebt Aeste zum Seitentheile und zum hintern Theile des Schlundes, zum Gaumenvorhange, zur knöchernen Trompete, zu den vordern Nackenmuskeln, zum Ganglion cervicale superum u., auch ein oder das andere kleine Nestchen, das durch das Foramen thyloideum anterius, oder durch das Foramen iugulare zur harten Hirnhaut geht. Ein Nestchen dieser Ader hat gemeinlich mit dem Aste der A. maxillaris externa Gemeinschaft, der durch den Canalis Vidianus rückwärts geht.

5. Arteria occipitalis, die Hinterhauptarterie ¹⁾.

Sie entspringt aus der Carotis facialis von der äußern hintern Seite, in der Gegend, wo von der innern die maxillaris externa und die lingualis entspringen. Sie geht, bedeckt vom hintersten Theile des M. digastricus, nachher vom obersten Theile des sternocleidomastoideus, und des trachelomastoideus, unter dem Processus mastoideus des Schläfenbeins, und dann über dem Processus transversus des Atlas, rückwärts, aufwärts und auswärts, indem sie jenen Muskeln einige Aeste giebt. So gelangt sie an den untern Seitentheil des Hinterkopfs, und geht an demselben, bedeckt vom Musculus splenius Capitis, schräg rückwärts und einwärts.

Bisweilen giebt sie unter dem Processus mastoideus die A. styromastoidea, die aber in manchen Körpern aus der A. auricularis posterior kommt. Dann entspringt ein zum Nacken gehender Ast, Ramus cervicalis, der sich zu dem M. splenius Capitis, dem trachelomastoideus, im complexus, dem biventer cervicis und dem cucullaris verbreitet. Ein mehr in die Tiefe dringender Ast desselben tritt zwischen dem M. trachelomastoideus und dem M. complexus zu den tiefer liegenden Nackenmuskeln, den reclus und levator. Dieser Ast verbindet sich, nach Schlemm, durch sehr dünne Zweige mit der A. vertebralis und cervicalis ascendens ²⁾.

Da, wo die A. occipitalis hinter dem Processus mastoideus hinauf, am Foramen mastoideum vorbeigeht, schickt sie gemeinlich

von der Hinterhauptarterie (Hildebrandt), oder von der oberen Schilddrüsenarterie. (Niedemann, explic. tab. art. p. 80.) Auch Haller (icon. anat. fasc. II. p. 4.) sah einen solchen Ursprung. Sehr selten entspringt sie sogar aus dem Anfange der inneren Kopfpußader.

Bisweilen finden sich 2. Schlundkopfsarterien, von denen eine aus dem Winkel der Carotiden, die andere aus der äußeren Kopfarterie, entweder unter- oder oberhalb der Zungenarterie, ihren Ursprung nimmt (Niedemann, l. c.), oder eine entspringt aus der äußeren Kopfpußader, die andere aus einer der untergeordneten Arterien, oder aus der inneren Kopfpußader. Bisweilen fehlt sie ganz, und wird durch Aeste der laryngea, lingualis und der Maxillaris externa ersetzt. (Hildebrandt.)

¹⁾ Niedemann (expl. tab. art. p. 80.) sah sie 2mal aus der inneren Kopfarterie entspringen. Einen ähnlichen Fall erzählt Haller (icon. fasc. II. p. 2.). Die der rechten und linken Seite haben oft ungleiche Dicke. Sie ist in der Regel dünner, wenn die hintere Ohrpußader sehr stark ist.

²⁾ Schlemm sah einmal eine Verbindung der A. occipitalis und vertebralis durch einen sehr dicken Ast, wobei es das Ansehen hatte, als sei die A. occipitalis zu einem

eine Arteria meningea postica durch ein Foramen mastoid zum hintern Theile der harten Hirnhaut hinein. Auch jene Rami neri, welche die pharyngea giebt, sind in einigen Fällen Aeste der A. occipitalis.

Dann theilt sie sich in der Nähe des Querfortsatzes des Atlas in Aeste, mit denen sie sich endigt.

a. Der obere aufsteigende Ast geht zwischen dem Ende des M. cucullaris des splenius Capitis geschlängelt am Hinterhaupte zum Scheitel hinauf, theilt sich in mehrere Zweige, schickt meistens einen kleinen Ast durch ein Foramen mastoidale zur Diploë, oder zu der harten Hirnhaut hinein, und anastomosirt theils eines mehr seitwärts emporsteigenden Zweiges mit der A. temporalis der auricularis posterior mittels des mehr in der Mitte in die Höhe gehenden Astes mit der nämlichen Arterie der andern Seite, und mit der A. frontalis und temporalis.

b. Der untere absteigende Ast ist dünner als der obere, an einigen Orten viel dünner, geht zwischen dem Musculus cucullaris und dem complexus nach vorwärts, giebt seine Aeste dem obern Theile der Nackenmuskeln, die sich an der Linea semicircularis superior befestigen, und hat Gemeinschaft mit dem obern Aste der andern Seite.

6. Arteria auricularis posterior, die hintere Ohrarterie

Sie ist in einigen Körpern ein Ast der A. occipitalis, in andern ein Ast der Carotis facialis selbst, und entspringt dann von der andern Seite desselben, höher als die occipitalis. Sie ist der dünneren der Carotis facialis, doch ist sie dicker; wenn sich ihre Aeste gewöhnlich weit zum Scheitel hinauf erstrecken. Sie geht beinahe über den hinteren Bauch des M. digastricus nach hinten, und den (zwischen dem Aste des Unterkiefers und dem processus mastoideus gelegenen) Theil der Parotis hindurch, giebt dann in der Nähe des processus styloideus die A. stylomastoidea, geht hierauf schräg rückwärts hinter dem äußern Ohre hinauf, giebt kleine Aeste zur Parotis, zum hintern Theile des äußern Ohres, die mit den andern auricularibus Gemeinschaft haben; auch Aeste zum hintern Theile der Scapula und zu dem Theile derselben, der sich über dem äußern Ohre befindet. Diese haben nach vorn mit der A. temporalis, nach hinten mit der A. occipitalis Gemeinschaft. In einigen Körpern erstrecken die obern Aeste dieser Arterie nur bis etwas über das äußere Ohr, in andern höher, bis zum Scheitel hinauf.

Die Arteria stylomastoidea, die Griffellocharterie, ist eine dünne, aber ihres Ganges wegen merkwürdige Ader. Sie entspringt unter dem Processus mastoideus aus der A. auricularis posterior, oft auch aus der occipitalis, tritt durch das Foramen stylomastoideum in den Fallopischen Gang, und geht in demselben bis zu dem Aste der A. meningea media, der durch den Hiatus des Felsenbeins

großen Theile aus der A. vertebralis entsprungen. Art. capitis superf. icon, p. 5.

¹⁾ Entspringt nicht selten aus der occipitalis nach Haller (Icon. anat. fasc. II. p. 5.)

denselben Gang tritt, und der *A. stylomastoidea* entgegenkommt ¹⁾. Sie giebt Ästchen in den Gehörgang, verbindet sich mit einem Äste der *Arteria temporalis*, und bildet mit ihm die Arterien des Paukenfells, schiebt in die Paukenhöhle zu den Gehörknöcheln, zu den *cellulis mastoideis* und in den äußern Gehörgang Zweige.

Wenn nun endlich die *Carotis facialis* diese Äste abgegeben hat, so befindet sie sich zwischen dem *Processus mastoideus* und dem hintern Rande des Ästes der untern Kinnbacke, und ist von der *Parotis* bedeckt. Sie giebt hier kleine Äste in die *Parotis* und zum *Masseter*, theilt einen ansehnlichen *Ramus paroticus*, und endiget sich dann, so 2 Äste sich theilend, in die *A. temporalis* und die *A. maxillaris interna*.

7. Arteria temporalis, die Schläfenarterie.

Diese Schlagader ist, nach *Schlemm*, etwas dünner als die *A. maxillaris interna*, steigt, anfangs von der *Parotis* bedeckt, vor dem *Tragus* und dem knorpeligen Theile des Gehörganges, hinter dem *Processus condyloideus* der untern Kinnbacke hinauf, und liegt dann an der äußern Fläche der *Aponeurosis temporalis* hinter der Wurzel des *Processus zygomaticus*. Ehe sie so weit hinauf gelangt, giebt sie noch einige kleine Ästchen in die *Parotis*; ferner *Ramulos articulares* zum *Kinnbackengefäße*, durch die *Fissura Glaseri* einen *Ramulus acusticus* in die Pauke, und einen andern in den *Meatus auditorius* zum *Paukenfelle*, der mit dem Äste aus der *A. stylomastoidea* den *Aberkranz* des *Paukenfelles* zusammensetzt. Diese *Ramuli acustici* kommen gemeinlich mit jenen *Ramulis articularibus* aus einem keimen Stamme. Dann giebt sie folgende Äste:

Arteria transversa faciei, die quere Antlitzarterie ²⁾. Diese geht quer vorwärts, unter dem *Jochbogen*, am obern Theile der äußern Fläche des *Masseters*, und kommt so auf die obere Gegend der Wange. Anfangs ist sie von der *Parotis* bedeckt, nachher begleitet sie den Speichergang der *glandula Parotis*. Sie giebt Äste in die *Parotis*, in den *Masseter*, die *Musculus zygomaticus*, in den untern Theil des *M. orbicularis palpebrarum* u. und hat Gemeinschaft mit der *A. maxillaris externa* und der *infrorbitalis*. Selten ist sie so groß, daß sie den obern Theil der Wange bis zum

¹⁾ *Schlemm* beobachtete einmal, daß sich die *A. stylomastoidea* daselbst nicht mit der *A. meningea media*, sondern mit einem Äste der *A. carotis cerebralis* verband. *N. a. D.* p. 5.

²⁾ Die *A. transversa faciei* ist in ihrem Verlaufe so unbeständig, daß sie oft an demselben Kopfe sich auf beiden Seiten nicht gleich verhält.

Sie kommt hiaweilen so groß vor, daß sie alle Zweige zur Oberlippe und Nase abgiebt, (siehe *Haller*, icon anat. fasc. III. p. 12. *Burns* Herzkrankh. p. 330.) zuweilen ist sie aber auch so klein, daß sie sich bloß in die Augentiefenschließer vertheilt.

Hiaweilen entspringt sie ehe die Theilung der *A. carotis* in die *A. temporalis* und *maxillaris interna* Statt gefunden hat, und also aus dem Stamme der *A. carotis ext.* *Sömmering* sieht diese Art des Ursprungs sogar als den regelmäßigen Fall an. Allein nach *J. F. Meckel's* Handb. d. Anat. III. 107, und nach mehreren Anatomen, die er citirt, ist ihr Ursprung aus der *Temporalis* der häufiger vorkommende Fall.

obern Theile der äußern Nase ohne die A. angularis versorgt, da dann die A. maxillaris externa kurz über der labialis superior sich endiget ¹⁾.

b. Arteria auricularis inferior, ein kleiner Ast, der rückwärts zum untern Theile des äußern Ohres geht.

c. Arteria auricularis anterior, ein größerer Ast, der vor dem äußern Ohre hinaufsteigt, und dem vordern Theile desselben Aeste giebt, welche mit der auricularis posterior und superior Gemeinschaft haben. In dem gen Körpern kommt sie aus der transversa faciei.

d. Arteria temporalis media, mittlere Schläfenarterie, von manchen auch A. temporalis profunda genannt. Sie entspringt an dem oberen Theile des Anfanges des Jochfortsatzes, tritt unter die aponeurosis temporalis, und steigt am hinteren Theile des Musculus temporalis empor.

Wenn der Stamm der A. temporalis die äußere Fläche der Aponeurosis des Schläfenbeins erreicht hat, so theilt er sich in 2 Endäste:

a. Arteria temporalis frontalis s. anterior, vordere Schläfenarterie. Diese geht im obern Theile der Schläfe schräg vorwärts gegen den obersten Theil der Stirne hinauf, giebt ihre Aeste dem vordern Theile der Schläfe, weiter oben dem vordern Theile ihrer Hälfte des Scheitels und hat Gemeinschaft mit der A. frontalis aus der A. ophthalmica.

b. Arteria temporalis occipitalis s. posterior, hintere Schläfenarterie. Diese geht schräg rückwärts hinauf, giebt ihre Aeste dem hintern Theile der Schläfe, dem hintern Theile ihrer Hälfte des Scheitels, dem obern Theile des Ohres, und hat Gemeinschaft mit der A. auricularis posterior und der A. occipitalis.

8. Arteria maxillaris interna, die innere Kieferarterie ²⁾.

Diese Schlagader ⁴⁾ lenkt sich hinter dem Aste des untern Kinnbackenbeins über dem Ligamentum laterale desselben nach innen, und steigt etwas geschlängelt gegen den obern Theil der Fissura sphenomaxillaris oder pterygopalatina schräg einwärts vorwärts hinauf.

Auf diesem Wege geht sie meistens zwischen beiden Musculis pterygoideis durch, giebt eine tiefe Ohrarterie, Ramulus acusticus, an der innern Seite des Processus condyloideus entspringt, und rückwärts durch die Fissura Glaseri in die Haut zum Musculus mallei externus geht, und kleine Aeste zum Kinnbackengelente. Dann kommen aus ihr folgende Aeste:

¹⁾ In dem Arterienetze des Gesichtes fließt das Blut vorzüglich durch die A. maxillaris ext., transversa faciei, infraorbitalis und ophthalmica zu. Ist die eine groß, so ist die andere kleiner.

²⁾ Geschieht diese Theilung erst sehr spät, so giebt sie, nach Schlemm, zuvor eine Arterie, die sich über die Schläfen zur Außenseite des M. orbicularis palpebralis wendet, und mit der A. lacrymalis transversa faciei anastomosirt, und die Schlemm Zygomatico-orbitalis, Liedemann A. temporalis anterior nennt.

³⁾ In einem Präparate, das Münz besitzt, entstand sie erst über dem Jochbogenfortsatze des Schläfenbeins aus der Schläfenpulsader. (Gefäß. S. 499.)

⁴⁾ Just. Godofr. Günz, Commentatio de arteria maxillari interna. Lips. 1743. 4.

a. Arteria meningea media s. symphysis inferior frontalis etc.

Diese Schlagader geht der harten Hirnhaut des größten Theils des Schädels, des Hirns etc. Sie geht zum Foramen spinosum der Wirbelsäule des Keilbeins innerwärts und verbindet sich mit dem Musculus pterygoideus externus mit der Arteria, und durch des genannten Gefäß in die Hirnhaut zur harten Hirnhaut zu verlaufen, und ein zweites Ästchen der innern Fläche der Schuppe des Schläfenbeins abgibt, und stellt sich in einem kleinen mit einem andern 2^{ten} Ästchen, die beide in der harten Hirnhaut durchdringung verlaufen, und zur Art. Stamm an der innern Fläche der Hirnhaut fortsetzen, welche die mit im vordern und dem der harten Hirnhaut enthaltenen Ästchen, als Stamm derselben betr.

Ein Ästchen, Ramulus accessorius, dieser Schlagader geht vom Stamme derselben rückwärts auf die weiche Fläche des Gehirns und durch den Hiatus in den halbröhren Gang der A. stomatodentales entgegen. In einigen Körpern ist diese Ästchen, und stellt sich in 2 oder 3 kleineren in den halbröhren Gang geht, deren größtes sich zur harten Hirnhaut theilt.

b. Ramus temporalis profundus, die tiefe Schläfenarterie, wird vom Musculus temporalis bedeckt, und vertheilt sich in dem untern Theile desselben, theils auch im M. pterygoideus externus. Zwischen geht ein Äst derselben durch einen Kanal des Jochbeins in die Augenhöhle, zur Periorbita, zum Sette der Augenhöhle, und giebt in einigen auch einen Äst zur Drüsenröhre.

Die Rami pterygoidei für die Musculus pterygoideos entspringen in einigen Körpern theils aus der A. temporalis profunda, theils aus der A. maxillaris inferior, in andern eine oder beide besonders aus dem Stamme der A. maxillaris interna.

In manchen Körpern sind zwei Rami temporales profundi da.

c. Arteria maxillaris inferior s. alveolaris inferior s. dentalis inferior, die Unterkieferarterie oder die untere Zahnarterie. Diese geht mit dem Nervus maxillaris inferior zwischen den Musculus pterygoideis vorwärts herab, tritt durch das Foramen maxillare posterius in den Kanal des Unterkiefers, und geht in demselben bis zum Foramen mentale, und dann ferner bis unter die Zahnhöhle des oßen Vorderzahns fort.

Ehe die A. maxillaris inferior in diesen Canal tritt, giebt sie einen Äst zum Musculus pterygoideus internus, und die A. mylohyoidea, welche, von dem Foramen maxillare posterius an, in einer Furche der innern Seite des Ästes der untern Kinnbacke schräg vorwärts herab zum Musculus mylohyoideus geht, und mit der A. submentalis Gemeinschaft hat.

Die A. maxillaris inferior selbst giebt aus dem Canale, in dem sie sich befindet, einzelne Äeste aufwärts für die einzelnen Bahne. Jeder Bahn erhält aus ihr so viel Äeste, als seine Wurzel Zinken hat; zu den

1) In manchen Körpern ist noch eine A. meningea media accessoria da, welche nahe bei dieser entspringt, der Trompete, dem Musculus circumflexus des Gaumens etc. Nachschon giebt, und durch das Foramen ovale des Keilbeins zur harten Hirnhaut geht.

Zähnen, welche mehr Zinken haben, kommen entweder eben so viel einzelne Aeste, oder ein Ast, der sich in eben so viele Aeste theilt ¹⁾. Jeder Ast geht durch ein Loch in der Zahnhöhle, und ein Loch an der Spitze der Wurzel in die Höhle des Zahns, und verbreitet sich in dem in der Höhle jedes Zahns liegenden Zahnsäckchen, nicht in der harten Zahnschubstanz.

Wenn diese Schlagader an das Foramen mentale gelangt ist, giebt sie aus demselben einen Ast (Ramus mentalis) hervor, welcher dicker ist, als ihre ferner im Canale fortgehende Fortsetzung, und sich in der Mitte der vordern Fläche des Kinnes zum Musculus quadratus, triangulatus und zur Haut vertheilt, indem er mit den Aesten des Ramus facialis und des Ramus submentalis der A. maxillaris interna Gemeinschaft hat.

d. Arteria buccalis s. buccinatoria, die Backenarterie ²⁾. Diese geht zum Musculus Buccinator, vertheilt sich in demselben, und in den benachbarten Theilen der Mundmuskeln und der Haut, und hat Gemeinschaft mit den Aesten der A. infraorbitalis und der maxillaris externa.

e. Arteria alveolaris superior s. dentalis superior, die Oberkieferarterie oder die obere Zahnarterie. Diese giebt einen Ast zum Zahnfleische der obern Kinnbacke; dann geht ihr Ramus dentalis, als ihre Fortsetzung, durch das Foramen alveolare des obern Kinnbackenbeins in eine Rinne, die im Körper des obern Kinnbackenbeins am Sinus maxillaris liegt, und giebt einzelne Aeste zu den Zähnen; wenigstens zu den 5 hintern Zähnen.

Die folgenden letzten Aeste der A. maxillaris inferior entspringen im obern Theile der Fissura spheno-maxillaris.

f. Arteria infraorbitalis, die Unteraugenhöhlen-Arterie. Diese geht durch den Canalis infraorbitalis schräg vor- und abwärts zum Angesichte, und kommt daselbst aus der vordern Oeffnung dieses Canales bei dem Levator anguli Oris hervor. Ehe sie in diesen Canal tritt giebt sie kleine Aeste zur harten Hirnhaut und durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle zur Periorbita, und zum Fette; auch hat sie mit der A. palpebralis inferior Gemeinschaft.

Aus dem Canale giebt sie kleine Aeste in den Sinus maxillaris hinab, deren einer Zweige für die Zähne giebt, welche mit der A. alveolaris Gemeinschaft haben, oder allein zu den 3 vordern Zähnen gehen.

Wenn sie endlich aus ihrem Canale ins Angesicht kommt, so vertheilt sie sich in den Muskeln der Wange, den Zygomaticis, dem Levator anguli Oris, dem Levator labii superioris, und hat Gemeinschaft mit der A. transversa faciei und mit der A. angularis.

g. Arteria palatina descendens s. palatina superior s. pterygo

¹⁾ Hunter, Natural history of the human Teeth. London 1766. Platte XII.

²⁾ Bisweilen kommt sie nicht aus dem Stamme, sondern aus dem Ramus temporalis profundus, oder dem maxillaris inferior.

palatina, die absteigende Gaumenarterie oder die obere Gaumenarterie, oder endlich die Flügelgaumenarterie. Sie geht aus der Fissura sphenopalatina nebst einem oder 2 Nebenästen derselben durch den Canalis pterygopalatinus maior durch die beiden Canales pterygopalatinos minores schräg vorwärts hinab. Sie und diese Nebenäste kommen so zum Gaumenvorhange, vertheilen sich in demselben und haben Gemeinschaft mit der A. palatina ascendens aus der maxillaris externa.

Aus ihr entspringt die Arteria palatina anterior, vordere Gaumenarterie, welche in der Gaumenhaut unter dem knöchernen Gaumen vorwärts geht, mit der andern in einen Bogen zusammenkommt, aus dem ein Ast in das Foramen palatinum anticum hinaufgeht, welcher sich in diesem Loche in 2 Aeste theilt, deren jeder durch seine obere Oeffnung dieses Loches auf die obere Fläche des Gaumens hinauf kommt, und daselbst sich in der Nasenhaut vertheilt.

Die Arteria pharyngea suprema s. pterygoidea s. Vidiana ist ein kleiner Ast, der aus der A. maxillaris interna selbst, oder aus der pterygopalatina kommt, durch den Canalis Vidianus rückwärts zu den Muskeln des Gaumenvorhangs und zum obersten Theile des Schlundes geht.

h. Arteria sphenopalatina s. nasalis, Keilbeingaumen-Arterie oder die hintere Nasenarterie. Diese geht quer einwärts durch das Foramen sphenopalatinum zum hintern obern Theile der Schleimhaut der Nase und zur Scheidewand derselben. Wenn 2 Foramina sphenopalatina da sind, so theilt sie sich in 2 Aeste, deren je einer durch eins dieser Löcher geht.

II. Carotis cerebialis, die innere Kopfarterie, oder die vordere Hirnarterie ¹⁾.

Die Carotis cerebialis ²⁾ geht ungefähr neben dem Kehlkopfe von der Carotis communis so ab, daß sie im Hinaufsteigen ein wenig schräg rückwärts und auswärtwärts weicht. Sie steigt zum Canalis caroticus hinauf, macht unter demselben erst eine oder einige meistens schwache Krümmungen, gemeinlich so, daß sie sich abwärts und einwärts, und dann wieder aufwärts biegt. Nun tritt sie in den Canalis caroticus, geht nach der Richtung desselben erst aufwärts, und krümmt sich dann so, daß sie schräg vorwärts und einwärts geht, und kommt so in die Höhle der Hirnschale. Sie geht ferner in der Rinne neben den

¹⁾ Abweichend entspringen aus ihrem Stamme bisweilen ein oder der andere stärkere Zweig, die Schlundkopfpulsader, oder die Hinterhauptpulsader. Bisweilen geht ihr Stamm anfangs dicht an der äußern hintern Seite der äußern Kopfpulsader aufwärts, und erst in der Nähe des Winkels des Unterkiefers unter einer plötzlichen starken Krümmung rückwärts an die äußere Oeffnung ihres Kanals des Schläfenbeins über, wo dann die Carotiden in dieser Gegend stärkere Pulsationen zeigen.

²⁾ Einen sonderbaren Fall, wo die Carotis cerebialis auf einer Seite ganz fehlte, findet man beschrieben in des Hrn. Prof. Lode Bibliothek, 10. B. S. 401.

Processibus clinoidis posterioribus des Keilbeins schräg auftritt in den Sinus cavernosus, krümmt sich in demselben, von Blute desselben umgeben ¹⁾, neben dem Sattel wieder vorwärts, dann zwischen dem Processus clinoidis anterior und medius der aufwärts, zugleich etwas rückwärts und einwärts, durch die Lax interna der harten Hirnhaut in die Höhle derselben, so daß sie in das Foramen opticum gelangt, und erreicht dann sofort die Oberfläche des Gehirns. Sie geht also im Ganzen von ihrem Ursprung zur Grundfläche des Gehirns in einem Schlangengange.

Aus dem Canalis caroticus giebt sie ein kleines Nestchen vorwärts, da mit der A. Vidiana verbindet. Auf dem Wege vom Canalis caroticus bis Foramen opticum giebt sie 2 oder 3 kleine Nester (arteriae sinus cavernosi ceptaculi), welche sich in der harten Hirnhaut, in der Glandula pituitaria, im Sehnerven, im 4ten, 5ten und 6ten Hirnnerven, und zum grauen Hügeltheilen.

Hinter dem Foramen opticum giebt sie die Arteria ophthalmica und hierauf theilt sie sich über dem Foramen opticum an der Oberfläche des Gehirns in 4 Nester: ²⁾

1) Ramus communicans s. posterior ³⁾.

2) Ramus choroideus.

3) Ramus externus s. Arteria Fossae Sylvii.

4) Ramus anterior s. Arteria Corporis callosi ⁴⁾.

In einigen Körpern kommt der Ramus communicans erst aus dem Me, und dann theilt sich dieser in den Ramus externus und anterior; in a

¹⁾ Bei einigen Säugethieren, Hunden, Kühen, Schafen u. ist im Sinus cavernosus das sogenannte Rete mirabile, da die Carotis sich in mehrere Nester theilt, die wieder mit einander verbinden, und endlich wieder in einem Stamme zusammenfließen.

²⁾ Nicht immer ist ihre Anordnung symmetrisch, sondern nach Haller (Icon. anat. VII, p. 6.), was auch Meckel (Handb. d. Anat. 3. S. 129) bestätigt fand, setzen dadurch unsymmetrisch, daß die beiden großen mittlern Pulsadern bloß an rechten, die kleinere vordere bloß aus der linken Carotis entspringen.

Bisweilen entsteht auch auf ähnliche Weise bloß die linke vordere Pulsader an linken innern Kopfpulsader, die 3 übrigen dagegen kommen aus der rechten. Meckel (Handb. d. Anat. 3. S. 130) sah dies einmal.

Selten geht an der Vereinigungsstelle der beiden Balkenpulsadern an der Seite ein großer hinterer Ast ab, und der vordere Vereinigungsast wird der Stamm des vordern Theils der Balkenpulsader, welcher sich nach einem kurzen Laufe in 2 große Nester, einen rechten und einen linken, spaltet; oder beide entspringen aus einem gemeinschaftlichen Stamme, ohne einen Ast nach hinten abzugeben. (Meckel's Handb. d. Anat. 3. S. 128.)

³⁾ Bisweilen ist sie ein Ast der vordern Hirnpulsader, seltener, wenn die hintere Hirnpulsader aus der innern Kopfpulsader entsteht, stammt sie aus der Zapfenpulsader.

Eine außerordentliche Seltenheit ist ihr gänzlicher Mangel. Einmal fand er Barclay, wo durch Injection der Kopfpulsader keine Flüssigkeit in die Wirbelpulsader, und aus dieser eben so wenig in die Kopfpulsader drang. (On arteries, p. Siehe Meckel's Handb. d. Anat.)

⁴⁾ Ueber die feinere Verzweigung dieser Arterien sehe man S. Th. Sommer (de administrationibus anatomicis), Denkschriften d. königl. Acad. d. Wissenschaften München für das Jahr 1808.

Körpern theilt sie sich erst in diese 2 Neste, und der Ramus communicans kommt aus dem Ramus externus.

Ramus communicans, der Verbindungszweig.

Dieser geht an der Grundfläche des Gehirns schräg rückwärts, einwärts, an der äußern Seite der Eminentia caudicans und unter dem Pedunculus cerebri hin, so daß er mit dem von der andern Seite convergirt, und vereinigt sich mit der A. cerebri profunda aus der A. basilaris. Unterwegs giebt er Seitenäste in die benachbarten Theile des untern Theiles des Gehirns.

Arteria choroidea, Adernekarterie ¹⁾.

Sie geht etwas nach außen und hinten, längs dem hinteren Rande des Sehnervenursprungs über den vorderen Theil des Hirnschenkels weg zur Höhe, und verbreitet sich theils in die Gefäßhaut des vordern Theils des hintern Hirnlappens, theils in den Sehhügel, theils bringt sie auch die Spalte des untern Horns des Seitenventrikels zur innern Oberfläche des Gehirns und zum Plexus choroideus.

Arteria fossae Sylvii, Arterie der Quersfurche des großen Gehirns, oder mittlere Hirnarterie.

Diese ist als Fortsetzung des Stammes anzusehen, geht an der Grundfläche des Gehirns schräg auswärts, legt sich in die Fossa Sylvii zwischen den vordern und hintern Lappen des großen Gehirns, und giebt theils rückwärts zum hintern, vorwärts zum vordern Lappen, und endigt sich am Ende der Fossa mit Aesten, welche sich zu der obern Fläche des Gehirns hinauf erstrecken. Bemerkenswerth ist, daß mehrere beträchtliche Aeste in der Fossa Sylvii nahe an der Grundfläche tief in das Mark des Gehirns eindringen, und sich im Sehhügel und gestreiften Körper theilen.

Arteria corporis callosi, Balkenarterie oder Arterie der Längensfurche des großen Gehirns, oder vordere Hirnarterie.

Diese geht an der Grundfläche des Gehirns, zwischen dem 2ten und 3ten Nerven, schräg vorwärts und einwärts, so daß sie mit der andern Seite convergirt, giebt Aeste dem 2ten und 1sten Nerven, und erreicht die innere Seite der Grundfläche des vordern Lappens. Dann geht aus der Arterie ein kurzer quergehender Ast (ramus communicans arteriarum

¹⁾ Siehe Wedels Handb. der menschlichen Anat. B. 3. S. 126, welcher eben so wie Sabatier, Bonger und Wichat fand, daß dieser Ast ein beständiger sei.

corporis callosi) in die der andern Seite über, so daß beide Arteriae corporis callosi durch denselben Gemeinschaft haben. Aus diesem Ramus communicans geht bisweilen ein kleiner Ast zum Ventriculo tertius u. hinauf.

Beide Arteriae corporis callosi laufen dann parallel vorwärts, krümmen sich aufwärts, ferner rückwärts, legen sich auf das Corpus callosum und gehen auf demselben parallel nach hinten hin. Jedem derselben giebt auf diesem Wege Neste zum vordern Lappen, zum Corpus callosum, und zu ihrem Hemisphaerium des großen Gehirns.

Arteria ophthalmica, Augenarterie.

Sie entspringt von der vordern Seite der Carotis cerebralis da, wo dieselbe, aus dem Sinus cavernosus kommend, die innere Platte der harten Hirnhaut durchbohrt hat, und sich nun in der Höhle der harten Hirnhaut, unter der Grundfläche des Gehirns hinter dem Foramen opticum befindet. Von ihrem Ursprunge geht sie durch das Foramen opticum unter dem Nervus opticus, und etwas weiter nach unten liegend, selten über denselben schräg vorwärts, abwärts und außen in die Augenhöhle. Ehe sie in die Augenhöhle tritt, giebt sie kleine Neste durch die harte Hirnhaut, und bisweilen einen größeren, den man Arteria meningea nennt. Auch schickt sie kleine Neste zum Nervus opticus. In der Augenhöhle giebt sie folgende Neste, bei denen es aber in Rücksicht ihres Ursprungs aus dem Stamme, oder aus Aesten desselben, und der Ordnung, in welcher sie entspringen, so viele Verschiedenheiten giebt, daß sich darüber nichts festsetzen läßt, und daß man genöthigt ist, dieselben nach der Ordnung aufzuführen, in welcher die Theile liegen, zu welchen sie sich begeben. In dieser Rücksicht kann man die Neste, welche sich zum Augapfel und zu dessen Muskeln, und die, welche sich zu andern Theilen begeben und wenigstens mit manchen ihrer Zweige zur Augenhöhle hinausgehen, unterscheiden.

a. Arteriae ciliares posticae, hintere Blendungsarterien. Unter diesem Namen werden diejenigen kleinen Schlagadern belegt, welche die Sklerotika durchbohren, zur Aderhaut, zum Corpus ciliare und zur Iris gehen. Ehe sie die Sklerotika durchbohren, geben sie kleine Aeste an die auswendige Fläche derselben.

Gemeiniglich sind 2 dickere Stämme derselben da, deren einer oben und außen, der andere nach innen und unten liegt. Sie entspringen beide oder nur eine aus dem Stamme der A. ophthalmica, wenn letzteres ist, die andere aus dem Ramus muscularis inferior

¹⁾ Schon Ingrassias hat den Ursprung der ophthalmica genannt (comm. in Gal de ossib. p. 80.)

gehen geschlängelt neben dem Sehnerven vorwärts, dem sie kleine Aestchen geben, und theilen sich, gemeinlich ohnweit dem Augapfel, in mehrere Aeste.

Neben dieser dickeren Arterie liegen einige dünnere, welche aus der A. ophthalmica, oder aus dem unteren Augenmuskelaeste, oder aus der Thränenarterie u. kommen, auch neben dem Sehnerven, aber gehen vorwärts.

Am hintern Theile des Augapfels theilen sich diese Arteriae ciliares posticae in viele Aestchen, deren einige, welche dicker sind (15, 18, 0 u.) die Sklerotika an ihrem hintern Theile, andere dünnere dieselben hier vorn durchbohren und auch an der äußern Oberfläche der Sklerotika mit Aesten der Arteriarum ciliarium anticarum zusammenkommen.

Einige Zweige gehen zu der Stelle, an welcher sich die harte Scheibe des Sehnerven mit der Sklerotika verbindet, theilen sich daselbst in Aestchen, und bilden einen Aderkreis, welcher den Eingang des Sehnerven in die Sklerotika umschließt. Aus diesem Aderkreise kommen Aestchen, welche die Sklerotika durchbohren, zum hintersten Theile der Aderhaut. So gelangen die meisten Zweige zur Aderhaut, vertheilen sich in ihr in kleinere und kleinere Aeste, welche vorwärts gehen und sich unter sehr kleinen Winkeln unter einander verbinden. An dem vordern Theile der Aderhaut treten sie an die innere Fläche derselben, so daß sie auswendig von den Venis vorticosis bedeckt werden.

Sehr viele gehen endlich in das Corpus ciliare über. In jedem Proccessus ciliaris laufen längs desselben viele Aeste, vielfältig mit einander verbunden, vorwärts bis zum stumpfen Ende desselben fort, an welchem sie sich endlich in kurzen Bögen umschlagen und rückwärts gehen. Einige von ihnen erreichen den vordersten Theil der Aderhaut, der vom Musculus ciliaris bedeckt wird, theilen sich in ihm in Aeste, gehen jedoch nicht in einen eigenen Kreis zusammen, sondern endigen sich in dem von den vorderen Ciliararterien gebildeten Gefäßkreise der Iris.

b. Arteriae ciliares anticae, die vorderen Blendungsarterien. Diese sind entweder Aeste der A. ophthalmica selbst, oder des Ramus supraorbitalis, oder der Augenmuskelaeste, oder endlich anderer Aeste der A. ophthalmica, kommen zum vordern Theile der Sklerotika, und theilen sich daselbst in mehrere Aeste. Einige dieser Aeste vertheilen sich an der auswendigen Fläche der Sklerotika: die meisten aber gehen durch die Sklerotika hindurch in den Musculus ciliaris, und vorwärts zum Umfange der Iris auf die vordere Fläche derselben. Dicht am Umfange der Iris theilt sich jede derselben in 2 oder 3 Aeste, die sich mit einander verbinden und den größeren Kreis der Iris zusammensetzen, zu welchem auch einige längere Aeste der hinteren Blendungs-

arterien hinzustoßen. Wenige kleine Aeste gehen aus diesem Kreise rückwärts zur Oberhaut. Viele Aeste aber, welche Fortsetzungen der Stämme sind, oder welche aus dem Bogen des größeren entspringen, gehen, wie Strahlen, convergirend gegen den Rand der Sehe. Einige derselben kommen gerade und ohne Verbindung mit dem Rand der Sehe; einige verbinden sich, meist 2 und 2 weit der Sehe in Bogen. Diese Bogen machen zusammen den innern Kreis aus, der aber nicht ganz ist, weil nicht alle diese sich mit einander verbinden. Von diesen Bogen gehen dann Aeste mit denen des großen Kreises, die ohne Verbindung hieher kommen, convergirend zum Rande der Sehe hin. Beim Embryo, so lang das Sehloch noch durch die Pupillarmembran verschlossen ist, steht dieser kleine und die kleinen Arterien laufen im Mittelpunkte der Membran zusammen; man findet bei Neugeborenen Ueberbleibsel dieser Gefäße, welche über das Sehloch gehen ¹⁾.

c. Arteria centralis, die Centralarterie der Markhaut ²⁾. Die Sehnerv in der Höhle der Hirnschale dünne Aestchen von der Cerebralis erhält, so erhält er auch in der Augenhöhle kleine Aeste der A. ophthalmica und ihren Ramis ciliaribus. Die A. centralis ist ein besonders benannter dünner Ast der A. ophthalmica, der dicker ist, als jene dünneren Aestchen. Sie entspringt aus der A. ophthalmica selbst, in einigen Körpern eher, als die übrigen Aeste derselben, aber aus einem Ramus ciliaris; oder aus einer untern Augenmuskelarterie derselben. Sie dringt, den Sehnerven Aeste gebend, schief vorwärts in den Sehnerven in dessen Mitte, geht dann in der Axe desselben, so daß sie einen röhrenförmigen Canal, porus opticus, ausfüllt, in den Augapfel hinein. Sie giebt der inwendigen Fläche der Nervenhaut Zweige; ein bei Kindern ganz deutlicher Ast aber geht mitten durch den Augapfel bis zur Mitte der vordern Fläche desselben, wo die hintere Fläche der Linsenkapsel daran anliegt, vorwärts. Hier zertheilt er sich in Aeste, welche sich divergirend zur Linsenkapsel begeben, und an ihrer äußeren Wand nach der Mitte zu laufen und unter einander anastomosiren ³⁾.

d. Arteriae musculares. Diese sind theils Aeste der A. oph

¹⁾ Jacob, Inquiries respecting the anatomy of the eye; in Medico-chirurg. transactions, Vol. XII. p. II. p. 487. Fiedemana, in d. Zeitschrift für Oculistik, B. II. Darmstadt 1827. 4. p. 336.

²⁾ Albin, Annot. acad. Lib. I. Wrisberg, Novi commentarii soc. reg. Goetting. 1772. Tab. I. Fig. 2, 3. Blumenbach, Comm. de oculis Heucaethi Goettingae 1786. c. fig. et Inst. physiol. Goetting. 1787. Tab. 2.

³⁾ Wrisberg, Novi commentarii soc. reg. Goetting. 1772. Tab. I. fig. 4. 5. merring, Icones oculi humani.

nica selbst, theils Aeste anderer Aeste derselben, z. B. der Supraorbitalis. Gemeinlich sind 2 größere A. musculares da, eine superior und eine inferior, welche dem M. rectus inferior, dem rectus externus, dem obliquus inferior, auch der Beinshaut Aeste giebt, und mit Aesten der A. infraorbitalis Gemeinschaft hat.

e. Arteria lacrymalis, die Thränenarterie. Sie entspringt gemeinlich aus dem Stamme der A. ophthalmica, im Hintergrunde der Augenhöhle, entweder allein, oder gemeinschaftlich mit einem Muskelzweige; in einigen Körpern aus der A. meningea media, wo sie dann durch die Fissura orbitalis superior oder durch ein eignes Loch in die Augenhöhle kommt. Sie geht unter dem M. rectus superior nach außen und nach vorn, und giebt mehrere Aeste, deren merkwürdigste folgende sind: einen Ast oder 2 Aeste zu den Augenmuskeln, die an der äußern und untern Seite des Augapfels liegen, einen (welcher jedoch selten fehlt) durch einen engen Canal, der von der Superficies orbitalis des Jochbeins zur Superficies malaris desselben geht, in die Schläfengrube, wo er mit der A. temporalis profunda Gemeinschaft hat, einen der schräg auswärts zur Thränenbrüse hinaufgeht, und sich in derselben vertheilt, kleine Zweige zum Musculus orbicularis palpebrarum, und sich mit den Augenliederarterien verbindet.

f. Arteria supraorbitalis, Oberaugenhöhlen-Arterie. Diese geht aufwärts und einwärts, giebt Aeste dem M. trochlearis, dem Rectus superior, dem Rectus internus, dem Levator Palpebrae superioris, der Beinshaut; geht dann durch den Einschnitt oder das Loch des Stirnbeins zur Stirne hinauf, und vertheilt sich, vom M. frontalis bedeckt, auf der Stirne mit einem Aste, der nach innen, und einem, der nach außen hinaufsteigt.

g. Arteriae ethmoideae, Siebbeinarterien. Sie gehen einwärts in den Foraminibus ethmoideis. Wenn nur ein solches Foramen da ist, so ist auch nur eine solche Schlagader, und zwar die vordere da.

Diese geht über den N. patheticus hinter der Rolle des M. trochlearis in das vordere Foramen ethmoideum, giebt Aeste den vorderen Siebbeinzellen, den Stirnhöhlen, kommt in die Höhle der Hirnschale über die Siebplatte, giebt Aeste der harten Hirnhaut dieser Gegend, geht durch ein Loch der Siebplatte, oder schon getheilt durch zwei Löcher in den vordern Theil der Nase hinab, und vertheilt sich in der Schleimhaut der Scheidewand. Die hintere ist unbeständig und kleiner, entspringt weiter hinten, als jene, giebt Aeste dem M. rectus internus, dem Patheticus, und durch das hintere Foramen ethmoideum den hintern Siebbeinzellen zc. Ihre Aeste verbinden sich mit den Aesten der A. sphenopalatina und der Ethmoidea anterior, und werden, wenn sie fehlt, durch dieselben ersetzt.

Wenn die A. ophthalmica alle diese Aeste abgegeben hat, so geht sie an der innern Seite der Augenhöhle über dem Ligamento palpebrali interno in die Höhe gegen den innern Augenwinkel zu, und giebt an demselben zuletzt folgende 4 Aeste:

h. Arteria palpebralis superior, die obere Augenliederarterie. Sie entspringt nicht selten mit der inferior aus einem gemeinschaftliche Stamme. Sie geht in der Nähe des Augenwinkels zur Caruncula lacrymalis und zum obern Augenliede, wo sie in einem mit dem Rande des Tarsus parallelen Bogen nach der Mitte desselben läuft, und giebt der Haut dem obern Augenliede, der obern Hälfte des M. orbicularis ober. Sie bildet mit den ihr entgegenkommenden Aesten der Nasenarterie und des Augenbraunzweiges der Stirnarterie, oder mit einem Aste der A. transversa faciei einen einfachen oder doppelten Augenliedbogen.

i. Arteria palpebralis inferior, die untere Augenliederarterie. Diese Arterie steigt einwärts am Ligamentum palpebrale internum neben dem Saccus lacrymalis zum unteren Augenliede hin und in einem mit dem Rande des Tarsus parallelen Bogen nach der Mitte desselben, und giebt der Haut des untern Augenliedes, der untern Hälfte des M. orbicularis, und dem Thränensacke Aeste. Sie bildet mit den ihr entgegenkommenden Zweigen der A. infraorbitalis, lacrymalis und nasalis, oder mit der transversa faciei, nach Schlemm, den untern Augenliedbogen, arcus tarseus inferior.

k. Arteria nasalis, die Nasenarterie. Diese geht einwärts zur äußern Nase, giebt ein Aestchen durch ein Loch des Nasenbeins in den vordern Theil der Nase, vertheilt sich auf dem obern Theile der äußern Nase, und kommt mit der A. angularis zusammen.

Bisweilen kommen die eben genannten Arteriae palpebrales oder doch die inferior aus der Verbindung dieser A. nasalis mit der angularis.

l. Arteria frontalis, die Stirnarterie ¹⁾, geht nach innen neben dem foramen supraorbitale am M. frontalis aufwärts zur Stirne, und vertheilt sich im obern innern Theile des M. orbicularis, im M. frontalis, in der Haut der Augenbraune und der Stirne.

Arteriae Subclaviae ²⁾.

Die beiden Schlüsselbeinpulsadern, arteriae subclaviae sind dicke Aeste der Aorta, welche aus der obern Seite des Bogens der

¹⁾ Sie giebt nicht selten, wie Schlemm bemerkt, die A. supraorbitalis. Sommering sah einen Ast der A. lacrymalis zu diesem Loche gehen. Zuweilen ersetzt ein Ast der A. temporalis zur Stirne herabgehender Ast die Stelle der A. supraorbitalis.

²⁾ Wenn, wie schon bei der Aorta angegeben worden ist, bisweilen beide A. A. subclaviae aus dem Aortenbogen kommen, so befindet sich die rechte entweder an der am meisten zukommenden Stelle rechts, nach außen von der Kopfpulsader, oder, seltener ist, die rechte Schlüsselbeinpulsader entspringt weiter nach der linken Seite, sogar zuweilen unter allen am meisten nach links, unterhalb der linken Schlüsselbeinpulsader. Sie schlägt sich dann hinter den übrigen Stämmen (seltener unmittelbar, häufig zwischen Luftröhre und Speiseröhre, am häufigsten zwischen dieser und den Halswirbeln nach der rechten Seite zu ihrer Extremität. (Siehe Keil's Hdb. S. 6. 131.)

selben entspringen, aufwärts und auswärts gehen, und der Brust, dem Halse, dem hintern Theile des Gehirnes und den Armen bestimmt sind. Sie sind ohngefähr eben so dick, als die Carotides.

Die rechte entspringt höher, nämlich mit ihrer Carotis aus der *A. anonyma*, die linke aber besonders aus dem Bogen selbst. Die linke entspringt also tiefer, und steigt daher viel steiler aufwärts als die rechte. Uebrigens sind im allgemeinen beide *A. A. subclaviae* einander ähnlich, und es ist daher nur nöthig, eine derselben zu beschreiben.

Die *Arteria subclavia* steigt von ihrem Ursprunge im obern Theile der Brust so schräg aufwärts, daß sie sich allmählig auswärts krümmt, und gelangt so hinter das Schlüsselbein. Sie geht dann hinter dem *M. scalenus anticus*, vor dem *medius*, also in der Spalte zwischen beiden Muskeln in die Höhe, und in einem Bogen über die erste Rippe hinüber in die Achselhöhle, und wird nun *Arteria axillaris* genannt.

Von ihrem Ursprunge an geht sie hinter der quer herüber gehenden *Vena jugularis sinistra* hinauf; wo sie die *M. M. scalenos* erreicht, liegt sie hinter der *Vena jugularis interna* und der *Vena subclavia* ihrer Seite.

Mittelbar oder unmittelbar entstehen aus ihr: 1) *Arteria vertebralis*, 2) *mammaria interna*, 3) *thyreoidea inferior*, 4) *cervicalis adwendens*, 5) *cervicalis superficialis*, 6) *transversa colli*, 7) *transversa scapulae*, 8) *cervicalis profunda*, 9) *intercostalis superior*.

In einigen Körpern entsteht auch aus ihr, ehe sie noch die *Vertebralis* giebt, die *Pericardiaca superior posterior*. Die linke *A. subclavia* schickt bisweilen die *Bronchialis sinistra*.

1. *Arteria vertebralis*, die Wirbelarterie ¹⁾.

Sie entspringt aus der *A. subclavia*, von der hintern Seite derselben, in der Gegend des ersten Brustwirbels. Sie ist der dickste Ast

¹⁾ Von ihrem Ursprunge aus dem Bogen der Aorta ist oben S. 174 gehandelt worden. Bisweilen dringt sie in das Loch des Querfortsatzes des 5ten, 6ten, 7ten, ja des 8ten Halswirbels, sehr selten aber in das des 7ten. *Bichat* (an. descr. IV. p. 193.), *Liedemann* (expl. tab. ant. p. 108.) und *Mecel* in seinem Handbuche der Anat.

Henkel (Zweite Sammlung med. u. chir. Anmerk. S. 10. Fig. 4.) und *Huber* (Act. helvet. VIII. p. 73.) fanden in 2 verschiedenen Fällen zwei Wirbelarterien, von denen die eine an der gewöhnlichen Stelle, die andere aus dem Aortenbogen entsprang. Im *Huber'schen* Falle war die normale kleiner, vereinigte sich aber mit der anderen in der Gegend des 5ten Halswirbels, und trat in die Öffnung seines Querfortsatzes. Im *Henkel'schen* Falle waren 2 Wirbelart. an der linken Seite, von denen die kleinere am gewöhnl. Orte, die größere aus der Aorta entsprang. (Den *Huber'schen* Fall bildet *Liedemann*, tab. art. III. fig. 9. ab.)

Auch *Mecel* (path. Anat. 2. Bd. 2. Abth. S. 110.) sah die Wirbelarterie in zwei zerfallen, die beide von der Schlüsselpulsader kamen, von denen die eine in die Öffnung des Querfortsatzes des vorletzten, die andere in die vom 3ten Halswirbel trat, wo sich beide bald vereinigten.

Sie ist auch nicht selten auf einer Seite sehr klein, und dafür auf der andern desto größer.

Bisweilen entspringen aber auch beide aus dem Aortenbogen, wie *Mecel* (*Reitsch. Med.* VI. 561) sah.

der A. subclavia. Nahe bei ihrem Ursprunge wird sie von einem gespaltenen Faden des Nervus sympathicus magnus umschlungen. Sie geht rückwärts und aufwärts, tritt in der Regel in das Loch des Querfortsatzes des 6ten, seltener in das des 7ten Halswirbels, noch seltener in das des 5ten, steigt dann flach geschlängelt durch die Querfortsätze der folgenden obern Halswirbel bis zum Epistropheus hinauf. Unter dem kürzeren Querfortsatze des Epistropheus krümmt sie sich einwärts, geht durch das Loch desselben aufwärts, krümmt sich wieder zu dem längeren Querfortsatze des Atlas auswärts, geht durch das Loch desselben senkrecht aufwärts, krümmt sich über demselben durch den Ausschnitt oder das Loch desselben wieder einwärts, endlich, die harte Hirnhaut durchbohrend, wieder aufwärts und vorwärts, und so durch das große Loch des Hinterhauptbeins neben und vor der Medulla oblongata in die Höhle der Hirnschale hinein ¹⁾.

Auf diesem Wege giebt sie durch die Zwischenräume der Wirbel kleine Äste zur harten Hirnhaut des Rückenmarks, auch zum Rückenmark selbst, welche mit den Arteriis spinalibus Gemeinschaft haben, kleine Äste zum Ganglion cervicale supremum, kleine Äste zu den Nackenmuskeln, und gemeinlich dicht unter der Hirnschale einen größeren Ast zu den Nackenmuskeln, und einen Rammeningeus posticus durch das große Hinterhauptloch zur harten Hirnhaut des Hinterkopfes.

Wenn die A. vertebralis durch das große Loch des Hinterkopfs in die Höhle der Hirnschale gekommen, so geht sie vor der Medulla oblongata schräg einwärts und vorwärts hinauf, gelangt an den hinteren Theil der untern Fläche der Brücke des Gehirns, und vereinigt sich daselbst mit der von der andern Seite in einen Stamm, welcher Arteria basilaris heißt.

Höchst selten wird sie dreifach. Einen Fall dieser Art beschreibt H. Wedel (in Medek's Arch. 1828. S. 170. Tab. VII. fig. 4.) aus einem 36jährigen Mann. Die beiden Hauptzweige, mit welchen sie entsteht, kamen unmittelbar aus der subclavia der rechten Seite, $\frac{1}{2}$ Zoll von einander entfernt; der tiefere, auf ungewöhnliche Weise aus der vorderen Fläche der Schlüsselbeinarterie entspringend, übertraf an Stärke den normalen, aus der hintern Wand des Stammes zum Loche des 6ten Querfortsatzes übergehenden Zweig, mit dem er sich dicht über dem 5ten Querfortsatze vereinigte; zu beiden kam nun, eine Linie höher, die dritte kleinere aus der unteren Schilddrüsenarterie, und alle 3 gingen vereint vom 4ten Querfortsatze an den normalen Weg.

Eine Abweichung der rechten sah Otto (seltene Beob. 2. Heft. 61.). Sie entsprang als erster Ast der Subclavia dextra, war nur $\frac{1}{3}$ so dick als gewöhnlich und als die linke, lief vor den Querfortsätzen des 7ten, 6ten und 5ten Halswirbels, die keinen Canal für sie hatten, in die Höhe, und trat erst beim 4ten Halswirbel in den Canal.

In einem Falle, den Otto (path. Anat. 1. S. 509. Anm. 7. nach einer Abbildung im anat. Mus. der Josephsacademie in Wien) anführt, ward sie in ihrem obersten Theile vom Nervus hypoglossus durchbohrt.

Ein besondres Programm über diese Arterien schrieb Aug. Fried. Waller. Progr. de vasis vertebralibus. Lipsiae 1730. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. II. p. 759.

¹⁾ Der Nutzen der Biegungen bei dieser Ader und bei der Carotis cerebialis ist vielmal der, den Andrang des Blutes gegen das Gehirn zu schwächen, und der, die Arterie bei der Bewegung des Kopfs vor einer Dehnung in die Länge zu sichern.

Ehe die *A. A. vertebrales* zu dieser Vereinigung gelangen, giebt die einwärts und abwärts die *Arteria spinalis anterior*, und kleine Aeste in die Furche zwischen dem hintern Rande der Brücke und den *truncibus pyramidalibus*. In einigen Körpern giebt sie selbst auch die *A. spinalis posterior*.

Die *Arteria spinalis anterior*, die vordere Rückenmarkarterie, geht nach innen und unten, beide Stämme convergiren an der vordern Fläche der *Medulla oblongata*, gehen durch das große Loch des Hinterkopfes und dann ferner an der vordern Fläche des Rückenmarkes hinab, vereinigen sich höher oder tiefer, zertheilen sich wieder und vereinigen sich wieder zu einer nur einmal vorhandenen Arterie. So steigt sie geschlängelt in der Mitte der vordern Fläche des Rückenmarks bis zum Ende desselben, und dann ferner mitten zwischen den Nerven der *Cauda equina*, von einer Fortsetzung der weichen Hirnhaut wie mit einer Scheide umgeben, bis zum Steißbeine hinab.

Sie giebt auf diesem ganzen Wege dem Rückenmarke Aeste, welche mit den von den *A. vertebralibus intercostalibus lumbaribus* hinkommenden Arterien *spinalibus* Gemeinschaft haben.

Arteriae spinales posteriores entspringen auch oft aus der *Arteria cerebelli posterior*, nachdem sich diese auf die hintere Fläche der *Medulla oblongata* herumgeschlagen hat, gehen an derselben convergierend nach innen und unten, durch das große Hinterhauptloch, und dann ferner an der hinteren Fläche des Rückenmarks bis zum Ende desselben in der Nähe des 2ten Lendenwirbels hinab, und verbinden sich mit einander durch Seitenäste.

Arteria basilaris, die Hirngrundarterie.

Diese merkwürdige unpaare Schlagader geht in der Mitte der untern Fläche der Brücke bis zum vordern Rande derselben hinter die *Eminentias canaliculatas* vorwärts fort, und schießt außer einer Menge kleiner Arterien, die in die Brücke selbst eindringen, auf jeder Seite folgende größere Aeste:

a) *Arteria cerebelli inferior*. Sie entspringt aus der *A. basilaris* an jeder Seite nahe am hintern Theile der Brücke, oder aus jeder *A. vertebralis*, ehe sie sich mit der andern *vertebralis* vereinigt hat, geht auswärts, rückwärts und abwärts, am hintern Theile der untern Fläche der Brücke und des *Cerebellum*, und giebt hier auswärts und rückwärts Aeste. Die Fortsetzung des Stammes oder ein besonderer größerer Ast krümmt sich zwischen dem *Cerebellum* und der *Medulla oblongata* herum auf die hintere Fläche der *Medulla oblon-*

gata, giebt hier dem Cerebellum Aeste, zuweilen scheidt sie auch die Arteria spinalis posterior.

b) Arteria cerebelli superior. Sie entspringt aus der A. basilaris, an jeder Seite am vordern Theile der Protuberantia annularis geht auswärts und rückwärts, zum vordern Theile und zur oberen Fläche des Cerebellum, und theilt sich hier in mehrere Aeste, welche mit den Aesten der A. cerebelli inferior anastomosiren. Zuweilen sind, statt einer, an jeder Seite 2 kleinere da.

c. Arteria cerebri profunda. Endlich spaltet sich die A. basilaris am vordern Theile der Brücke in 2 Arterias cerebri profundas, die durch den 3ten Hirnnerven von der vorhergehenden Arterie geschieden sind, und verbreitet sich an die Hirnschenkel und an den Trichter, nimmt den communicirenden Ast von der Carotis auf, verbreitet sich, nachdem sie sich um die Hirnschenkel herumgeschlagen hat, theils an den Bindungen des hintern Theils des großen Gehirns (und communicirt hier mit der Balkenarterie und mit der A. fossae Sylvii) theils zu den in den Ventrikeln und an den am großen Eingange derselben gelegenen, Theilen, zu den Vierhügeln, Sehhügeln, zum Plexus choroideus, zu den Wänden des Seitenventrikels ¹⁾. Beim Neugeborenen, wo die Blutgefäße der weißen Gehirnssubstanz weit sichtbar sind, überzeugt man sich, daß diese Arterie von den Wänden des Seitenventrikels aus in die Marksubstanz des Gehirns mit unzähligen Aesten eindringt, die der Richtung der Markfasern folgen, und sowohl bis in die Nähe der Oberfläche gelangen, ohne sich mit den Arterien der Corticalsubstanz zu verbinden, als auch mit den Quersfasern des Balkens in den Balken übergehen. Jede von ihnen krümmt sich vor der Arteria cerebelli superior auswärts, und dann um den Hirnschenkel aufwärts, wo sie anfangs diesem, nachher dem Plexus choroideus, dem Ventriculus tertius dem Ventriculus lateralis, dem Septum pellucidum, dem Fornix und dem hinteren Theile der Halbkugeln des großen Gehirns Aeste giebt

Ein besonderer kleiner Zweig der A. basilaris selbst, oder einer ihrer Aeste, ist die Arteria auditoria interna, welche auswärts geht, um mit den Nervis acusticis in den Meatus auditorius internus tritt Sie theilt sich daselbst in die Arteria cochleae, welche in die Schnecke

¹⁾ Nicht ganz mit Recht nennt man die vordere Gehirnarterie arteria corporis callosi denn sie gehört vielmehr der Corticalsubstanz der Bindungen des vorderen Theils des Gehirns an, und nur wenige und kleine Zweige endigen sich im Balken. Dagegen ist die A. cerebri profunda die wichtigste Arterie für die Markfasern des großen Gehirns, und es ist sehr merkwürdig, daß kein sichtbares Zusammenstoßen zwischen den in der Rindensubstanz und den in der Medullarsubstanz zertheilten Nerven wahrzunehmen wird.

und in die Arteria vestibuli, welche in den Vorhof und in die Bogengänge geht.

Circulus Willisii.

Jede Arteria cerebri profunda nimmt, wie schon gesagt worden, ohnweit ihres Ursprungs aus der basilaris an der äußern Seite der Eminentia candicans einen Ast, der schräg rückwärts und einwärts aus der Carotis cerebri zu ihr kommt, auf.

So entsteht also durch die Verbindung der Arteriarum vertebra-
lium und Carotidum an der Grundfläche des Gehirns ein merkwürdiger Siebenedel, welches Circulus Willisii heißt, und aus folgenden Schlagadern besteht:

1. 2. Die beiden Arteriae cerebri profundae, in welche die A. basilaris sich spaltet.

3. 4. Die beiden Rami communicantes, deren jeder aus der A. Carotis cerebri in die A. cerebri profunda geht.

5. 6. Die beiden Arteriae corporis callosi.

7. Der Ramus communicans, welcher die beiden Arterias corporis callosi verbindet.

2. Arteria mammaria interna, die Brustarterie ¹⁾.

Sie entspringt aus der A. subclavia von der vordern untern Seite derselben, ist dünner als die A. vertebralis, geht vorwärts, und krümmt

¹⁾ Unter die, jedoch seltener vorkommenden, Abweichungen dieser Arterie gehören:

1) ihr Ursprung aus dem ungenannten Stamme.

[Fälle dieser Art haben Neubauer (de thy. ima. P. 10.) und Walter, (mém. de l'ac. d. Berl. 1785. Tab. I.), und Liebemann giebt (Tab. art. IV. fig. 10.) eine Abbildung.]

Oder 2) aus dem Bogen der Aorta selbst. (Siehe S. 175.)

Oder 3) höher aus der Schilddrüsenpulsader. So sah sie Huber (Act. helvet. VIII, p. 92.) einmal aus der unteren Schilddrüsenpulsader abgehen, und Liebemann (expl. tab. art. p. 120.) sah diesen Ursprung zweimal.

Oft entspringt sie aber gleich mit dem Anfangstheile der unteren Schilddrüsenpulsader.

Zweimal sah sie Wanj (Gefäßlehre, Landsh. 1821. 8. S. 535) aus dem Anfangstheile der Achselpulsader entspringen, einmal bald nach dem Durchgange der Schließpulsader zwischen den Rippenhaltern, einmal noch weiter davon entfernt; von hier lief sie über die erste Rippe vor dem vorderen Rippenhalter in die Brusthöhle zurück, an die Seite des Brustbeins, und setzte von hier an regelmäßig ihren Verlauf fort.

Einmal bildete sie (an einem Präparate in Kopenhagen) drei, wohl 3 Zoll parallel neben einander herablaufende Gefäße, deren beide äußere nur durch einen kleinen Querschnitt sich verbanden. (Otto path. Anat. 1. Bd. S. 308.) In einem andern Falle gab sie einen starken äußeren Ast, der über die 4 ersten Rippen lief. (Otto. seltne Beob. Hft. 2. S. 62.)

Eine merkwürdige Abweichung, die bei Rippenbrüchen, bei der Operation eines Empyems u. s. w. leicht zu gefährlichen inneren Blutungen Veranlassung geben kann, sah

sich zugleich abwärts, geht dann neben dem Brustbeine hinter den Knorpeln der wahren Rippen, fast senkrecht und parallel mit der der andern Seite, bis zum 6ten Rippenknorpel hinab.

Ehe sie die hintere Fläche der Rippenknorpel erreicht, giebt sie Äste, deren merkwürdigste diese sind:

a) Rami thymici, kleine Arterien zur Thymusdrüse. Ein oder 2 Äste, die zur Thymus gehen, und bei dem neugeborenen Kinde, bei welchem die Thymus groß ist, sichtbar, beim Erwachsenen aber sehr klein sind oder fehlen, sobald die Thymusdrüse, wie häufig nach dem 12ten Jahre der Fall ist, verschwindet.

b) Arteria bronchialis anterior, eine vordere Luftröhrenarterie, die nur zuweilen vorhanden ist.

c) Arteria pericardiaco-phrenica, die obere Zwerchfellarterie. Diese kleine Arterie kommt aus der A. mammaria selbst, oder aus einer A. thymica, geht, in Begleitung des Nervus phrenicus, am Herzbeutel bis zum Zwerchfelle herab, giebt ihre Äste der Thymus, der Mittelhaut, dem Herzbeutel, dem Zwerchfelle, den daselbst liegenden Lymphdrüsen, und anastomosirt mit den untern Zwerchfellarterien.

Indem sie hinter den Knorpeln der wahren Rippen hinabgeht, giebt die A. mammaria interna folgende Äste:

a) Rami intercostales, vordere Zwischenrippenarterien, die an ihrer äußeren Seite entspringen und an den Intercostalmuskeln, von der Brusthaut bedeckt, verlaufen. Zu jedem Zwischenraume zwischen 2 Rippen geht wenigstens eine Arterie, die am unteren Rande jeder Rippe, hinget; oft kommen zu ihm (vorzüglich an den mittleren Rippen) 2 Arterien, so daß eine am oberen und eine am unteren Rande jeder Rippe hinläuft und sich mit den Ästen der hinteren Zwischenrippenarterien verbindet. Die für den 8ten, 7ten und 6ten Zwischenraum kommen nicht unmittelbar aus dem Stamme der Mammaria, sondern aus dem äußeren Endaste derselben.

b) Rami sternales, kleine Äste, die von der dem Brustbeine zugekehrten Seite der A. mammaria entspringen, zur Weinhaut des Brustbeins, zum M. triangularis desselben gehen, und durchbohrend Zweige, rami perforantes, zwischen den Rippenknorpeln der 1sten

Otto (seltne Beob. 2. 62.). Es entsprang nämlich aus der rechten Mammaria oberhalb wo sie sich zum Brustbeinrande herüberbog, ein anomaler Ast, der vom oberen Rande der ersten Rippe, innerlich an der Brustwand, zwischen dieser und dem Brustfel schräg nach unten und außen über die 4 ersten Rippen lief. Er gab Äste den Intercostalmuskeln, ward unten dünner, und mündete sich am unteren Rande der 4ten Rippe in die Intercostalarterie.

Heister (obs. med. Hall. coll. Diss. anat. VI. 725.) sah sie in einem Kinde von 3 Jahren doppelt.

2ten, 3ten, 4ten u. Rippe zu dem Musculus pectoralis major, zur Mamma und zur Haut der Brust schicken. Auch manche Aeste der vorderen Zwischenrippenarterien durchbohren die Muskeln und gelangen zur Haut und zur Milchdrüse der Frauen.

c) Ramus phrenico-pericardiacus, der sich zum vorderen mittlern Theile des Zwerchfells und mit aufsteigenden Aesten zum untern Theile des Herzbeutels vertheilt, und zuweilen ein Ast des Ramus musculophrenicus ist, oder auch bisweilen ganz fehlt.

Wenn endlich die A. mammaria interna die Gegend des sechsten Rippenknorpels neben dem Processus ensiformis erreicht hat, so entzweit sie sich, indem sie sich in 2 Aeste theilt.

a) Ramus musculo-phrenicus, der äußere Endast, geht schräg abwärts an der Gränze der Brusthöhle über die Befestigung des Zwerchfells an den Rippenknorpeln nach außen, vertheilt sich im vordern äußern Theile des Zwerchfells, und im angränzenden Theile des Musculus rectus, transversus, obliquus externus und der Haut, und giebt dem 6ten und 7ten, zuweilen auch dem 8ten Spatium intercostale, Ramos intercostales.

b) Ramus epigastricus, der innere Endast. Dieser geht unter dem Knorpel der 7ten Rippe zum Musculus rectus hinab, vertheilt sich an dessen hinterer, theils mit kleineren durchbohrenden Aesten an dessen vorderer Fläche, und hat mit der Arteria epigastrica Gemeinschaft, die ihm von unten entgegenkommt. Ein Ast desselben geht zuweilen oben durch ein Loch des Processus ensiformis, oder unter ihm durch zur Haut des weißen Streifes hinab; er ist auf der rechten Seite öfter als auf der linken vorhanden, und erstreckt sich daselbst zu dem Ligamentum suspensorium der Leber.

3 bis 7. Einige vordere Hals- und Nackenarterien ¹⁾.

Es folgen nun 5 leicht zu verwechselnde Arterien, von denen oft mehrere aus einem gemeinschaftlichen Stamme entspringen, 2 mehr senk-

¹⁾ Ueber die A. thyreoidea ima hat Joh. Ernst Neubauer eine Diss. geschrieben, resp. Erdmann descriptio anatomica arteriae innominatae et thyreoideae imae, c. II. Tab. aen. Jenae 1772. 4. recus, in Neubaueri opera anatomica collecta, ed. G. C. Hinderer. Francof. et Lips. 1786. 4. p. 269 — 318.

Sie entspringt bisweilen aus dem ungenannten Stamme. So fand es Ziedemann (tab. art. Tab. IV. fig. 11.) im Leichname eines Knaben. Diese oft vorkommende Abweichung sahen auch Haller (Icon. anat. Fasc. 8. p. 60. not. 30.), Neubauer (de thyr. ima §. 6.), Huber (Acta helvet. VIII. p. 83.), Soder (obs. angiol. p. 4.) und Sommering (de corp. hum. fabr. V. p. 125. not. 9.). Ziedemann (l. c. p. 58.) sah sie viermal. Auch Münz (Gefäßl. S. 145) sah dies bei einem Kinde. Sie entsprang aus dem Theile des ungenannten Stammes, der eigentlich der Kopfschlagader angehört. Bisweilen entspringt sie aus dem Stamme der Kopfarterie, der in der Regel keine Aeste abzugeben pflegt. Diese Abweichung sahen Nicotai (de directione vasor. p. 28. not. 9.), Haller (Elem. phys. III. p. 403.), Vink (van de bloed vaten p. 50.), Böhmer (Diss. de confluxu trinum cavar. in dextro cordis atr. Hal. 1763.), Wedel (Epist. ad Haller.

recht in die Höhe steigende und 2 mehr in querer Richtung verlaufende. Die Arteria thyreoidea inferior liegt dicht neben der A. carotis communis, geht vorzüglich zur glandula thyreoidea in die Höhe, und die Cervicalis ascendens, die fast immer mit der A. thyreoidea gemeinschaftlich entspringt, steigt ziemlich senkrecht vor den Musculus scalenis empor, beide Arterien haben daher eine mehr senkrechte Richtung, und die folgenden unterscheiden sich daher von ihnen dadurch, daß sie eine mehr quere Richtung haben. Die Cervicalis superficialis ist selten ein besonderer Ast der A. subclavia, sondern entweder ein Ast der Cervicalis ascendens oder der A. transversa colli, sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie unten quer über die 3 Musculos scalenos zu den Nackenmuskeln geht, die A. transversa colli geht hinter dem Scalenus anterior in einiger Entfernung vom Schlüsselbeine in quere Richtung zu den Nackenmuskeln und zum hintern Rande des Schulterblatts, und liegt also etwas tiefer als die vorher genannte Arterie, endlich die A. transversa scapulae geht immer sehr nahe hinter dem Schlüsselbeine in die Fossa suprascapularis und infraspinata des Schulterblatts, und entspringt häufiger als die A. transversa colli

Vol. II. p. 258.), Huber (Acta helvet. VIII. 84.), Reubauer (de thyr. ima §. 7.). Tiebemann (l. c. p. 60.) sah dieses zweimal. Weckel bildet sie tab. anat. path. fasc. II. Tab. X. fig. 3. ab.

In einem Präparate, das Burns (Herzkrankh. S. 331.) beschreibt, entfiel beide thyreoidea imae als ein Stamm aus der rechten Subclavia, und anstatt den vorderen und hinteren Theil der Drüse zu umfassen, dringen sie an der Seite der Luftröhre tiefer herab, als die Drüse liegt, und nachdem sie dann die vordere Fläche der Luftröhre erreicht haben, theilen sie sich in 2 Aeste, wovon der rechte längs der Luftröhre herabgeht, der linke innerhalb des Ringknorpels hinaufsteigt.

Zuweilen sind 2 untere Schilddrüsenart. zugegen, von denen eine am gewöhnlichen Orte, die andere aus der gemeinschaftlichen Kopfarterie entspringt. Burns sah einmal einen gemeinschaftlichen Stamm der rechten und linken Seite aus der rechten Schlüsselbeinpulsader entspringen.

Zuweilen kommt eine 3te unterste Schilddrüsenpulsader (art. thy. media ima) vor. Sie entspringt aus einem oder dem andern gemeinschaftlichen Stamme der Kopfarterien gewöhnlich gleich am Anfangstheile desselben, oder aus dem ungenannten Stamme der rechten Seite, oder aus dem Bogen der Aorta selbst, oder sie entsteht mit dem gleichnamigen der entgegengesetzten Seite durch einen Stamm aus der Schlüsselbeinpulsader.

Manchmal ist sie nur auf einer Seite vorhanden, giebt kleine Zweige an den unter der Schilddrüse befindlichen Theil der Luftröhre, an den unteren Theil der Schilddrüse, bisweilen auch einige Zweige rückwärts an den Schlund und an einige benachbarte Muskeln. Ein Verlauf, der beim Luftröhrenschnitt gefährlich werden kann.

Sie ist bisweilen sehr groß, ersetzt die fehlende oder dünnere thy. inferior einer, oder selbst beider Seiten. Eine sehr dicke unterste Schilddrüsenpulsader, während die unteren Schilddrüsenpulsadern sehr dünn waren, beobachtete Mann bei einem Kinde. (Gefäßt. 536. Tab. XIII. f. VI.)

Häufiger kommt diese Abweichung nach Weckel (Handb. d. Anat. 3. 152.) auf der rechten als auf der linken Seite vor. Huber (acta helv. VIII. 84.) sah diese Ader viermal auf der rechten, und nur einmal auf der linken; so sah auch Reubauer die rechte aus der Aorta, ebendieselbe Ramsay (Edinb. med. and surg. journ. Vol. VIII. 281 — 283. Taf. I. fig. 2.) aus dem rechten ungenannten Stamme, 2 oder zweimal aus der Aorta zwischen der rechten Kopf- und Schlüsselbeinpulsader entspringen.

einem gemeinschaftlichen Stamme mit der Thyreoidea inferior. nun häufig mehrere von diesen Arterien gemeinschaftlich entzugen, so herrscht bei den Anatomen auch hinsichtlich ihrer Namen nicht geringe Sprachverwirrung. Der mehreren von diesen Ästen gemeinschaftliche, aus der A. subclavia entspringende, aufwärts gehende kurze Stamm ist bei Kindern zuweilen so dick, als die Fortsetzung der A. subclavia, und auch bei Erwachsenen ist er sehr dick, wenn nicht die Thyreoidea inf., die Cervicalis ascendens, die Cervicalis superficialis und die Transversa scapulae (wie das meistens der Fall gemeinschaftlich aus ihm entspringen, sondern noch mehr, wenn unter ihnen, was seltener vorkommt, auch die Transversa colli aus hervorkommt, oder wenn, was noch seltener beobachtet wird, sogar die mamma interna aus diesem gemeinschaftlichen Stamme hervorkommt. Wir wollen nun diese Äste einzeln betrachten:

3) Arteria thyreoidea inferior, die untere Schilddrüsenarterie. Sie geht neben der Carotis geschlängelt hinauf, wendet sich hierauf zu ihrem weg nach der Luftröhre und dem Kehlkopfe hin, giebt der Luftröhre einen Ast oder mehrere Äste, dem untern Theile des Kehlkopfs die Arteria thyreoidea inferior, und zuweilen dem M. longus colli einen Zweig, vertheilt sich in dem untern Theile der Schilddrüse, und hat mit der A. thyreoidea superior, auch mit der inferior der andern Seite Gemeinschaft.

4) Arteria cervicalis ascendens, die aufsteigende Nackenarterie. Sie entspringt fast immer mit der thyreoidea inferior gemeinschaftlich, geht vor dem Musculus scalenus anticus, neben dem Nervus phrenicus, an der Seite der untern Halswirbel hinauf, und vertheilt sich zu dem M. scalenus anticus und medius, zum Longus colli, Rectus capitis anticus major und zum Levator Scapulae.

5) Arteria cervicalis superficialis, die oberflächliche Nackenarterie. Sie entspringt gemeiniglich aus einem gemeinschaftlichen Aste der Arteria subclavia und zwar entweder mit der A. cervicalis, oder mit der Transversa Colli.

Sie geht am äußern Rande des M. scalenus anticus schräg auswärts, und vertheilt dann ihre aufwärts und abwärts gehenden Äste zu den Muskeln: scalenis, zum Omohyoideus, Levator scapulae, Cucullaris, Transversus cervicis, Spinalis cervicis, Splenius capitis und Splenius colli, Complexus, Biceps u. s. w.

Arteria transversa colli, die quere Nackenarterie oder die Schulterblattarterie. Gewöhnlich ist sie ein unmittelbarer Zweig der A. subclavia. Indessen entspringt sie bisweilen auch aus einem gemeinschaftlichen Aste der Arteria subclavia mit der A. transversa scapulae, und dieser gemeinschaftliche Ast in einigen Körpern aus der Arteria subclavia besonders, in andern gemeinschaftlich mit der Cervicalis ascendens, mit der Cervicalis superficialis und mit der Thyreoidea inferior. Sie geht, tiefer liegend, als die Cervicalis superf.,

208 Arteria cervicalis profunda und intercostalis superior

vor dem Musculus scalenus anticus auswärts und rückwärts, gibt aufsteigende Äste den Musculus scalenis, dem Omohyoideus, dem Levator scapulae, dem Cervicalis descendens, dem Trachelomastoideus, dem Splenius capitis, dem Cucullaris, dem Supraspinatus und der Haut dieser Gegend, auch in den Plexus nervorum brachialium. Der längste Zweig derselben, der Namen Arteria dorsalis scapulae führt, geht am hinteren Rande des Schulterblatts herab zwischen der Anfügung des M. serratus anticus major und der des M. rhomboideus, und giebt diesen Muskeln so dem M. serratus post. sup. Zweige, und verbindet sich mit der Subscapularis. Nicht selten ist sie ein Ast der folgenden Arterie.

7) Arteria transversa scapulae s. dorsalis scapulae, obere oder quere Schulterblattarterie ¹⁾. Sie geht tiefer, als A. transversa colli, vor dem M. scalenus anticus, oder zwischen dem Scalenus anticus und medius durch, giebt diesem kleine Äste tritt an den obern Rand des Schulterblattes, und meistens durch daselbst befindliche Incisura scapulae in die Fossa supraspinata giebt Äste dem M. supraspinatus, geht zwischen dem Condylus scapulae dem Acromium hinab in die Fossa infraspinata zu dem M. infraspinatus und hat Gemeinschaft mit der A. subscapularis.

8. Arteria cervicalis profunda, die tiefe Nackenarterie

Sie entspringt von oben von der hinteren Seite der Arteria scapularis unter allen bis jetzt genannten Ästen am weitesten nach außen und ist der dünnste Ast derselben. Sie geht aufwärts, vertheilt sich den Musculus scalenis und den Intertransversariis cervicis. In manchen Körpern giebt sie einen ansehnlichen Ast (Arteria vertebralis accessor) welcher neben der A. vertebralis durch die kleineren, weiter nach außen liegenden Löcher der Querfortsätze der Halswirbel hinaufsteigt, aber die Hirnschale nicht erreicht, sondern höchstens über dem Querfortsatze des vierten Halswirbels endigt, entweder indem er in die A. vertebralis übergeht, oder indem er sich kleine Äste vertheilt.

9. Arteria intercostalis superior, obere Zwischenrippenarterie.

Sie entspringt von der hinteren und unteren Seite der A. scapularis, geht etwas auswärts zu der inwendigen Fläche der obern Rippen herab, giebt zuweilen Äste dem Musculus scalenus posterior, an deren Seite auch der Speiseröhre, in einigen Körpern die Arteria bronchialis superior oder die inferior, immer aber einen, 2, seltener 3 hintere Zwischenrippenarterien für den 1sten, 2ten, seltner auch für den 3ten Zwischenrippenraum, in welchem jede bogenförmig am unteren Rande der Rippen vorn läuft und sich mit den vorderen Zwischenrippenästen der Mamma

¹⁾ Sehr oft entspringt sie gemeinschaftlich mit der A. transversa colli, oder mit Thyreoidea inferior. Ziedemann sah sie einmal aus der A. mammaria folgen. Tab. art. explic. p. 84.

²⁾ Sehr häufig hat sie und die intercostalis superior einen gemeinschaftlichen Stam-

ma verbindet, und sich überhaupt eben so wie die unten beschriebenen Arteriae intercostales inferiores verhält.

Arteria axillaris, die Achselschlagader ¹⁾.

Die Arteria axillaris ist der fortgesetzte Stamm der A. subclavia, indem dieselbe nämlich zwischen dem Musculus scalenus anticus

Sehr häufig geschieht die Theilung der Armarterie nicht in der Armbuge selbst, sondern weit höher, ja selbst in der Achselgrube. (Abbild. s. bei Liedemann, tab. art. Tab. XIII—XVIII. Meckel, Tab. anat. pathol. fasc. III. tab. 11. Münz, Arterien, Taf. IX.) Eine besondere Abhandlung über diesen Gegenstand gab:

H. r. Liedemann, Beobachtungen über die hohe Theilung der Armschlagader in die Speichen- und Ellenbogen-Schlagader. Denkschriften d. Akad. d. Wiss. zu München. Bd. 6. S. 5 ff.

Andreas Laurenti (hist. anat. corp. hum. Fref. 1600. Fol. p. 105.) scheint ihrer zuerst Erwähnung zu thun. Er und auch Bidloo (vid. Idonis Wolff observationes chir. mod. Quedlinb. 1704. 4.) beschreiben sie, aber fälschlich, als normal.

In der That kann man wohl noch 32 verschiedene Beobachter aufzählen, die die hohe Theilung schriftlich angemerkt haben, und es wird wohl kaum ein Anatom sein, dem sie nicht vorgekommen ist. Desto auffällender ist es, daß Pet. Camper (demonstr. anat. path. Lib. 1. p. 15.) die hohe Theilung der Armarterie in Zweifel zog. Diese hohe Theilung der Armpulsader kommt bisweilen, jedoch nicht immer an beiden Armen zugleich vor, ungeachtet Crew (comm. nor. 1737. p. 187.) diese Abweichung nie auf beiden Seiten zugleich gesehen zu haben versichert.

Häufig finden sich bei dieser Abweichung die sogenannten Vasa aberrantia, Aeste, die aus der oberen Gegend der Armpulsader entstehen, und sich entweder in ihr unteres Ende, oder in einen Ast der Vorderarm-pulsadern, namentlich in die Speichen-pulsader einsetzen.

So entsteht an der Insertionsstelle des Deltamuskels oft ein Gefäßzweig, der größer ist als der Kiel einer Krähenfeder, und der sich immer an Armgelenke verliert. Harris (Herzsch. S. 342) sah fünf Fälle dieser Art, worunter 2 besonders bemerkenswerth sind. Im ersten gab das von einer Stelle der Arterie zur andern gehende Gefäß vor seiner Vereinigung mit der Speichenarterie, die eine Strecke weit zurückließ, um es aufzunehmen. Den größern anastomosirenden Ast ab. Im zweiten Falle entstand dieser Ast von der Armpulsader, und das abweichende Gefäß gab auf ihrem Wege bloß Zweige an die Muskeln.

Alle abweichenden Gefäße verlaufen gewöhnlich parallel mit der großen Arterie, doch in Berührung mit ihr und werden von der Binde bedeckt.

Bei weitem am gewöhnlichsten ist die Speichen-pulsader das höher abgehende Gefäß, der fortlaufende Stamm dagegen der gemeinschaftliche Stamm der Ellenbogen- und Zwischenknochen-pulsader; indessen ist der hohe Ursprung der Ellenbogen-pulsader, wenn er gleich weniger häufig ist, keineswegs eine seltene Erscheinung. Wenn sich die A. axillaris in die A. radialis und ulnaris theilt, so verlaufen sie, nach Münz, bisweilen am Oberarme und am Vorderarme, meistens sehr oberflächlich, unmittelbar unter der Haut außerhalb der Fascia und über der sehnigen Ausbreitung des M. biceps. Geht aber die Theilung nicht in der Achselhöhle, sondern tiefer, so verlaufen die Arterien meistens, wie wohl nicht immer, unter der sehnigen Ausbreitung des M. biceps.

Beide Gefäße weichen aber unter diesen Umständen von ihrer gewöhnlichen Richtung häufig ab. Die Radialis lief in einigen Fällen, die Münz beobachtete, eine kürzere oder längere Strecke weit, anfangs an der Ellenbogen-seite des Oberarms, und die Ellenbogen-pulsader lag an ihrer Radialseite; höher oder tiefer, der Ellenbogenbuge näher, streifte sich dann die Speichen-pulsader mit der Ellenbogen-pulsader, und ging über hier an die Speichen-seite. (Münz, Gefäßl. Taf. IX. f. 1. 3. 4.)

Zuweilen ist das Verhältnis der Dicke beider umgekehrt, so daß die Speichen-pulsader die stärkere ist, und dann entspringt aus ihr auch die Zwischenknochen-pulsader, bisweilen auch die zurücklaufende Ellenbogen-pulsader (Münz Taf. IX. f. 5.) Später aber, wenn Kreuzung Statt findet, kehrt sie zu ihrem normalen Verhältnisse zurück.

und medius hervorgetreten ist, geht sie unter dem Schlüsselbeine, zwi-
 schen in der Mitte desselben und über der ersten Rippe, und folglich an
 unter dem M. subclavius und pectoralis minor und major in die
 Achselgrube. Sie macht einen Bogen und hat auf der 1sten Rippe den
 Plexus brachialis nach oben und außen, die Vena subclavia nach
 unten und innen neben sich liegen. Von der Stelle an, wo sie unter
 dem Schlüsselbeine hervortritt, erhält sie den Namen Arteria axillaris
 und behält ihn, bis sie dahin, wo sich der Pectoralis major und minor
 endigen, gelangt, denn hier bekommt die vom M. biceps bedeckte Ar-
 terie den Namen Arteria brachialis.

Sie kann da, wo sie über die 1ste Rippe hinweggeht, am leichtesten durch
 Druck, den man hinter der Mitte des Schlüsselbeins abwärts hervorbringt,
 zusammengedrückt werden, eine Operation, welche dann nöthig ist, wenn der Arm
 am oder im Gelenke amputirt werden soll. Um sie zu unterbinden, kann man
 leichter durch einen Einschnitt am vorderen als am hinteren Rande des Schlüssel-
 beins entblößen. Ihre merkwürdigsten Zweige sind folgende:

1. Arteriae thoracicae externae, die äußeren Brustarterien, sind 2 oder 3 in ihrem Ursprunge sehr veränderliche Zweige der
 Axillaris. Wo ihrer 3 vorhanden sind, unterscheidet man die

a) Arteria thoracica externa superior s. prima, erste äußere
 Brustarterie, sie geht, bedeckt vom Musculus pectoralis major, schief
 abwärts einwärts, giebt Aeste diesem Muskel, dem Pectoralis minor
 dem Serratus anticus major, der Haut und der Mamma.

b) Arteria acromialis, Schulterbrustarterie. Sie ist in einige
 Körpern ein Ast der Arteria axillaris selbst, in anderen der thoracicae
 inferior. Sie geht, bedeckt vom M. pectoralis major, unter dem
 Schlüsselbeine auswärts, giebt Aeste zu dem M. serratus anticus major
 zum Acromium, nach dem Schultergelenke und zum Deltoidem. Außer
 den genannten Zweigen entstehen noch einige unbestimmte
 kleinere Arterien in der Achselhöhle, die zum M. subscapularis und
 den Achseldrüsen, oder zu anderen benachbarten Muskeln gehen.

c) Arteria thoracica externa inferior, 2te oder untere äußere
 Brustarterie, A. mammaria externa. Sie entspringt weiter nach außen,
 kommt aber zuweilen aus der A. subscapularis. Sie ist tiefer als die
 obere geht ebenfalls schräg abwärts einwärts, tiefer als die obere und als die
 untere Rand des M. pectoralis major, giebt Aeste diesem Muskel, dem
 Serratus anticus major, den Intercostalibus, der Haut und der
 Mamma.

2. Arteria subscapularis, oder scapularis inferior, Unter-
 schulterblatt-Arterie.

Sie ist der dickste, oder wenigstens einer der dicksten Aeste der Arteri-

A. subscapularis, A. A. circumflexae humeri, A. brachialis. 211

axillaris, geht am äußern Rande des Schulterblatts hinab abwärts und rückwärts, und giebt ihre Aeste dem Musculus subscapularis, dem Serratus anticus major, dem Teres minor, dem Teres major, dem Latissimus dorsi.

a) Ein sehr langer Zweig derselben, den man mit Meckel die lange äußere Brustpulsader nennen kann, A. thoracica externa longa, geht zwischen dem M. serratus anticus major und dem M. latissimus dorsi längs der äußeren Wand der Brusthöhle herab, versieht diese Muskeln mit Zweigen, und vertritt häufig die Stelle der oft fehlenden thoracica externa inferior.

b) Ein 2ter sehr dicker Ast derselben (Arteria circumflexa scapulae) schlägt sich am Caput longum des Anconaeus um den Hals des Schulterblattes herum, zu dessen hinterer Fläche, vertheilt sich auf derselben von den Muskeln bedekt, und verbindet sich in der Fossa infraspinata mit den Aesten der A. transversa Scapulae.

3. Arteria circumflexa humeri anterior, vordere Kranzarterie des Armes.

Diese kleine Arterie geht unter dem Kopfe des Oberarmknochens vorwärts und dann gekrümmt auswärts, von dem Musculus coracobrachialis und dem Caput breve M. bicipitis bedekt, gegen das Caput longum dieses Muskels fort, giebt einen Ast abwärts zum Knochen, der zwischen dem M. pectoralis major und dem M. deltoideus hinabgeht, und endiget sich theils mit Aesten, die in das Caput longum M. bicipitis, theils mit Aesten, die zum Schultergelenke gehen.

4. Arteria circumflexa humeri posterior, hintere Kranzarterie des Armes.

Diese ist viel dicker, als die anterior, gemeinlich wenig dünner, als die A. subscapularis. Sie geht unter dem Kopfe des Oberarmknochens zwischen ihm und dem Anconaeus longus rückwärts und dann gekrümmt auswärts, größtentheils vom M. deltoideus bedekt, giebt Aeste dem M. teres major, dem Anconaeus longus und externus, dem Teres minor, dem Deltoideus und dem Schultergelenke zc. Sie wird vom Nervus axillaris begleitet.

Das Schultergelenk wird mit einem Netze feiner Schlagäberchen umgeben, welches von vorn von der A. circumflexa anterior, von hinten von der A. circumflexa posterior herkommt.

Arteria brachialis, die Armarterie ¹⁾.

Die Arteria brachialis ist der fortgesetzte Stamm der Arteria axillaris. Sie geht an der innern Seite des Oberarmes, neben dem in-

^{1) Ab. Haller resp. Adolph Bernh. Winkler, Diss. de arteria brachii. Gött. 1745. 4.}

nern Rande des M. biceps, zur innern Seite des Ellenbogengelenks hinab, giebt auf diesem Wege kleinere Aeste dem M. coracobrachialis dem Biceps, dem Brachialis internus und der Haut, und außerdem auch einen oder einige Aeste, welche am Ellenbogen mit Aesten der Oberarm-Arterien zusammenstoßen und collaterales genannt werden; mit einem Worte, sie verbreitet sich zu den an der vorderen Seite des Oberarmes gelegenen Theilen. Sie schickt aber auch eine wichtige Arterie, die an der hinteren Seite des Oberarmes gelegenen Theilen Blut zu führt, nämlich: die

Arteria profunda brachii, die tiefe Armschlagader.

Sie geht in dem zwischen den 3 M. anconaeis und dem Oberarmknochen befindlichen Zwischenraume in Begleitung des Nervus radialis hinab, lenkt sich an dem M. anconaeus longus schräg nach wärts, hinter den Oberarmknochen und nach der äußern Seite desselben zu. Sie liegt dann zwischen dem M. anconaeus externus und dem M. brachialis internus, geht zwischen diesen Muskeln hinab und giebt über dem Ursprunge des M. supinator longus ihre letzten Aeste

Aeste der Arteria brachialis und brachialis profunda.

Arteria collateralis radialis prima. Diese ist in manchen Theilen eine Fortsetzung der A. profunda brachii; in andern kommt sie aus der A. brachialis besonders. Sie geht am äußern Winkel des Oberarmknochens hinab, giebt Aeste dem M. anconaeus externus dem Supinator longus, dem Extensor radialis longus, dem hinteren Theile des Ellenbogengelenks, und hat Gemeinschaft mit der A. recurrens radialis, auch mit der andern A. collateralis radialis.

Arteria collateralis radialis secunda. Diese giebt Aeste dem M.

Chr. Gottl. Ludwig, Progr. de variantibus arteriae brachialis ramis in anevrysmatis operatione attendendis. Lipsiae 1767. 4.

Joh. Fr. Meckel, über den regelwidrigen Verlauf der Armpulsadern. Meckel's Archiv. Bd. 2. S. 117.

Hiaweilen ist der Anfangstheil des Stammes der Oberarmpulsader ungewöhnlich dick, und es entstehen aus ihm erst Zweige, die in der Regel schon aus der Achselpulsader hätten entstehen sollen. Hierher gehört besonders der Fall, wo die Unterschulterblattspulsadern und die Kranzadern des Oberarmes aus ihr entspringen. In 5 Fällen 2mal am rechten (1mal sehr tief), und 1mal am rechten und am linken Arme zugleich sah Müng (Gefäßlehre, p. 537.) die Unterschulterblatt- und Kranzpulsadern des Oberarmes gleich am Anfangstheile der Oberarmpulsader entspringen. (Taf. IX Fig. 5.) In einem andern Falle theilte sich der Stamm der Oberarmpulsader in einiger Entfernung von seinem Anfangstheile in 2 Hauptäste (ibid. fig. 6.), wovon der eine als tiefe Oberarmpulsader einen Muskelzweig an den Biceps, die Kranzpulsadern des Oberarmes und die sonst etwas tiefer aus der einfachen Oberarmpulsader entspringende eigentliche tiefe Armpulsader abgab; die starke Kranzpulsader lief gleich der Insertion der Sehne des Latiss. dorsi und Teres major aufwärts, und verzweigte sich dann auf die gewöhnliche Art.

supinator longus, geht zwischen ihm und dem Brachialis internus gegen den Condylus externus des Oberarmknochens hinab, giebt auch diesen beiden Muskeln und dem Ellenbogengelenke Aeste, und hat Gemeinschaft mit der A. recurrens radialis. Sie ist gewöhnlich ein Ast der Arteria brachialis.

Arteria collateralis ulnaris prima. Diese entspringt zuweilen aus der A. profunda brachii, zuweilen aus der A. brachialis selbst. Sie geht neben dem Ligamentum intermusculare internum, an der innern Seite des M. anconaeus internus, gegen den Condylus internus hinab, giebt Aeste diesem Muskel, dem M. anconaeus longus, und hat Gemeinschaft mit der A. recurrens ulnaris, auch mit der andern A. collateralis ulnaris. — Bisweilen geht sie unmittelbar in die A. recurrens ulnaris über, so daß sie mit dieser eine Arteria communis ausmacht, welche aus der A. brachialis in die A. ulnaris geht.

Arteria nutritia magna ossis brachii entspringt aus der A. brachialis unter dem Musculus coracobrachialis, giebt Aeste dem M. brachialis internus u. und tritt dann durch ein großes Foramen nutritium in das Oberarmbein.

Arteria collateralis ulnaris secunda. Diese entspringt meistens von dem Stamme der A. brachialis ohnweit des Ellenbogengelenks am M. brachialis internus, giebt Aeste diesem Muskel, und einen größern Ast, der durch das Ligamentum intermusculare internum durchgeht und über dem Condylus internus des Oberarmknochens mit der A. recurrens ulnaris Gemeinschaft hat.

Endäste der Arteria brachialis.

Je näher die Arteria brachialis dem Ellenbogengelenke kommt, desto mehr verbirgt sie sich unter dem Biceps, indem sie sich nach dem Condylus externus des Oberarms hinlenkt. Endlich tritt sie an der Beugseite des Ellenbogengelenks unter die Aponeurose, welche sich von der Flechse des M. biceps ausbreitet, und theilt sich am M. pronator teres in ihre beiden Hauptäste, in einen dickeren, die Ellenbogen-Arterie, Arteria ulnaris, und in einen dünneren, die Speichenarterie, Arteria radialis. Diese Theilung geschieht gemeiniglich am Ellenbogengelenke, oder wenig höher, selten schon weiter oben am Oberarme.

1. Arteria ulnaris oder cubitalis, Ellenbogenarterie ¹⁾.

Die Arteria ulnaris geht unter dem obersten Theile des Pronator teres und der Flexores schräg abwärts gegen die Ulna fort, giebt die:

¹⁾ Nach die Ellenbogenpulsader entspringt, wie ich oben bemerkte, zuweilen höher oben, u. zwar
 1) aus der Achselpulsader, wie Mayer, Burns, Ryan, Mouro, Barclay, Fleischmann, Redel und Eiedemann (a. d. a. D.) beobachteten, oder
 2) seltner aus der Oberarmarterie. Diese Abweichung ward bemerkt von Pettsche, Vogt, Sandifort und Redel (l. citatis). Eiedemann (expl. tab.

sen Muskeln Aeste, und giebt ohnweit des obern Endes der Ulna die A. interossea, die Zwischenknochenarterie.

Die Arteria recurrens ulnaris entspringt aus der Arteria ulnaris, zuweilen bevor, zuweilen aber nachdem die A. interossea abgegeben worden ist, geht rückwärts, bedeckt vom Flexor ulnaris und von dem Flexor sublimis, gegen den Condylus internus hin auf, und hat mit den A. A. collateralibus ulnaribus Gemeinshaft. In einigen Körpern geht sie unmittelbar in die A. collateralis ulnaris prima über.

Die Fortsetzung des Stammes der Arteria ulnaris lenkt sich gegen die Ulna, und geht längs der innern vordern Fläche derselben, bis zu ihrem untern Ende zwischen dem Flexor ulnaris und dem Flexor sublimis hinab. Sie giebt auf diesem Wege diesen Muskeln, und dem Flexor profundus Aeste.

In der Nähe des untern Endes der Ulna scheidet sie den dünnen Ramus dorsalis, der unter der Flechse des Flexor ulnaris auf der Rückenseite der Handwurzel tritt, dem Abductor digiti minimi einen Ast giebt, und dann zum Rete carpeum dorsale beiträgt.

Die Fortsetzung des Stammes oder der Ramus volaris geht an der innern Seite des Os pisiforme weiter zur Hohlhand herab, trägt zum Rete carpeum volare bei, giebt Aeste dem Flexor digiti minimi, dem Abductor desselben, und theilt sich dann unter dem Hamulus des Hakenknochens in 2 Aeste.

a. Ramus sublimis. Dieser ist dicker, geht, von der Aponeurosis palmaris bedeckt, gekrümmt gegen das Latus radiale der Hand, bildet den Arcus volaris sublimis, und kommt in demselben mit dem Hohlhandzweige, Ramus volaris, der Arteria radialis zusammen.

b. Ramus profundus. Dieser ist dünner, senkt sich in die Tiefe, so daß er von den Flechsen der Flexorum bedeckt wird, und bildet die

art. 174.) sah diese Anordnung am rechten Arme eines 12jährigen Knaben. Die Ellenbogenpulsader verlief zwischen der Haut und der Sehnenbinde des Armes. Müller (Gefäßlehre) beobachtete einmal 2 härtere Ellenbogennebenpulsadern.

Einen ganz ungewöhnlichen Verlauf beobachtete Burns (Krankheiten, S. 38. Fiedemann, tab. art. XVII. fig. 1.) In 3 weiblichen Leichen theilte sich die Oberarmarterie nicht eher, als in der Nähe des Armgelenkes. Sobald sie sich getheilt hatte, durchbohrte die Ellenbogenarterie, statt unter den Beugemuskel der Handwurzel herabzugehen, die Fascia, und befestigte sich an die Vena basilica, mit welcher sie zum Handgelenke herabstieg. Ein Fall, der bei Venäsection leicht gefährlich werden kann.

In der Regel giebt die Ellenbogenarterie, wenn sie hoch entspringt, den großen anastomosirenden Ast ab, der, um nach dem hinteren Theile des innern Gelenkhöckers des Oberarmbeines zu gelangen, die Sehnenbinde durchbohrt. In diesem Falle müssen die beiden Zweige des dem Laufe der Interossea folgenden Gefäßes, welches, wenn die Ellenbogenarterie unter der Haut läuft, widernatürlich groß ist, die Stelle der beiden zurücklaufenden Ellenbogenarterien vertreten haben. (Burns, Herzk. S. 340.)

Arcus volaris profundus mit dem Rückenweige, *Ramus dorsalis*, der *Arteria radialis*, welcher zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers vom Handrücken in die Hohlhand kommt. Nicht selten ist aber der Hohlhandzweig der *A. radialis* sehr klein, so daß beide Hohlhandbögen, der *Arcus sublimis* sowohl, als der *Arcus profundus*, durch eine Vereinigung der Zweige der *A. ulnaris* mit dem zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers durchgehenden Aste des *Ramus dorsalis* und der *A. radialis* gebildet werden.

Die *Arteria interossea*, die Zwischenknochenarterie ¹⁾, entspringt aus der *A. ulnaris*, selten aus dem Theilungswinkel der *A. brachialis*, so daß diese sich in 3 Aeste theilt, und sehr selten aus der *Radialis*, wenn die *Ulnaris* schon am Oberarme allein entspringt. Sie geht gerade abwärts, und theilt sich ohnweit ihres Ursprungs aus der *A. ulnaris* in 2 Aeste.

a. *Arteria interossea dorsalis s. externa*. Diese geht durch das *Ligamentum interosseum* auf die Rückenseite desselben, giebt die *Arteria recurrens interossea*, welche hinaufgeht, dem gemeinschaftlichen Kopfe der *Latensorum*, dem *M. anconaeus parvus* und dem *Supinator brevis* Aeste giebt, und an der äußern Seite des *Olecranon* mit der *A. collateralis radialis* Gemeinschaft hat.

Dann geht sie an der Rückenseite des *Ligamentum interosseum* herab, zwischen dem *Extensor ulnaris* und dem *Extensor communis digitorum* herab, giebt diesen Muskeln, ferner dem *Extensor Digiti minimi*, dem *Abductor longus* und den *Extensoribus pollicis* Aeste.

Am untern Theile des Unterarms hat sie mit kleineren, die Zwischen-

¹⁾ Sie entspringt zuweilen aus der Oberarmarterie (*Arteria brachialis*).

Dieses ward beobachtet von Ludwig (l. c.) in dem Körper einer Frau, von Sabatier, Hildebrandt, Monro, Barclay und Tiedemann, der sie jedoch nur einmal sah. Zweimal beobachtete sie Wüny (Gefäßlehre, p. 539. T. XIII. f. VII.) einmal am linken Arme eines Mannes, einmal am linken Arme eines Kindes.

Außerdem ward auch zuweilen eine ungewöhnliche oberflächliche Zwischenknochenarterie bemerkt. Der tiefliegende Ast ist dann sehr klein, und ehe er den vieredigen Muskel erreicht, fast ganz verschwunden, der oberflächliche Ast hingegen, der zwischen dem gespaltenen Fingbeuger und dem Speichenhandwurzelbeuger hingehet, so groß, wie die Speichen- oder Ellenbogenarterie. Hat der letztere Ast nun in unverminderter Größe das Ringband erreicht, so geht er mit den Sehnen der Beugemuskeln unter denselben zur inneren Handfläche, wo er zuweilen einen Verbindungszweig an die Ellenbogenarterie abgiebt, häufiger aber ein besonderer Stamm wird, der seine Aeste an die Innenseite des Daumens, an die beiden Seiten des Zeigefingers und an die Speichenseite des Mittelfingers vertheilt. Hierauf hat dieses ungewöhnliche Gefäß über dem Handgelenke eine eben so oberflächliche Lage wie die Speichenarterie, und kann wie diese leicht verlegt werden. Einen Fall dieser Art bildet Tiedemann ab (tab. art. XVI. fig. 2.). Einen ähnlichen Fall hat Haller (Icon. anat. fasc. VI. p. 33.) beobachtet; auch Ludwig (de var. art. brach. ram. p. 9.), Sabatier (traité d'anat. T. III. p. 69.), Wurns (Herzstn. p. 348.) und Barclay (l. c. p. 120.) haben diese Anordnung der Zwischenknochen-Pulsader beschrieben.

Hildebrandt bemerkte einst zwei *A. A. interossea* internas, eine, welche dicht am *Lig. interosseum* blieb, die andere, welche unter dem *Flexor sublimis* und *profundus*, ferner unter dem *Lig. carpi proprium* hindurchging.

Knochenhaut durchbohrenden, Ästen der Arteria interossea interna Gemeinschaft; auch, wenn sie so weit herabreicht, mit dem Ramus dorsalis der A. interossea interna, einem großen durchbohrenden Zweige.

Zuweilen ist sie ungewöhnlich kurz und dünn, so daß sie sich nur auf den obern Theil des Unterarms beschränkt.

b. Arteria interossea interna s. volaris. Diese bleibt an der Hohlarmseite des Ligamentum interosseum, geht an demselben hinab, giebt dem Ligamentum interosseum, dem Pronator quadratus, dem Flexor profundus und dem Flexor pollicis longus Aeste, auch eine Arteria nutritia radii. Am untern Theile des Unterarms durchbohren einsege ihrer Zweige das Ligamentum interosseum, und gelangen zu den Muskeln an der Rückenseite dieses Bandes, welche mit Zweigen der A. interossea externa Gemeinschaft haben. Wenn die A. interossea externa kürzer ist, so sind diese durchbohrenden Zweige größer.

Am untern Ende des Ligamentum interosseum geht die Fortsetzung des Stammes an der Superficies volaris der Handwurzel hinab, und trägt zum Rete carpeum volare bei. In einigen Körpern geht sie bis unter das Ligamentum Carpi proprium hinab, zum Arcus volaris sublimis, oder giebt, wenn kein Arcus da ist, die mittleren Ramos digitales.

Ein Zweig lenkt sich aber zwischen der Ulna und dem Radius auf die Rückenseite der Handwurzel, und giebt mit den dasigen Ästen der Ulnaris und Radialis das Rete carpeum dorsale.

2. Arteria radialis, die Speichenarterie ¹⁾.

Die Arteria radialis ist dünner, als der Stamm der A. ulnaris oben ist, bevor die A. interossea abgegangen worden. Sie ist der Fortsetzung

¹⁾ Nach dem Vorhergehenden ist der Ursprung dieser Arterie folgenden Verschiedenheiten unterworfen.

1) nämlich nimmt sie ihren Ursprung aus der Axillaris. So sahen sie Heister, am rechten Arme einer Frau, Böhmer, am rechten Arme eines Mannes, Ludwig, am rechten Arme einer Frau (die Armschlagader verlief auf die gewöhnliche Weise, und bildete in der Armbuge eine große Anastomose mit der Speichenarterie); Sandifort, am rechten Arme; Mayer, Ryan, an 5 Armen; Joh. Fr. Wedel (Arch. II. S. 127.) in 3 Fällen. Fiedemann (expl. tab. art. p. 186.) in 8 Fällen, bald auf der rechten, bald auf der linken Seite. In allen diesen Fällen verläuft sie entweder innerhalb der Sehnenbinde des Armes, oder sie durchbohrt diese und steigt unter der Haut mit der Speichenhautvene herab. Wunz (Gefäßlehre, p. 537.) sah sie 2mal am rechten Arme eines Mannes, und 1mal am Arme eines Kindes (Tab. VII. p. 6.).

2) Sie entspringt aus der Armpulsader, eine Abweichung, die am häufigsten vorkommt. Sie ward beobachtet von Heister, Möbius, Crew, Petsche, Eschenbach, Winkler, Schmiedel, Haller, Hebenstreit, Ludwig, Vallaeus, Penchionati, Sandifort, Sommering, Monro d. Jüng., Burns, Barclay, Wedel (tab. anat. path. fasc. II. tab. 11. fig. 5. 7.) und Fiedemann an den angeführten Stellen. Sie ist unter diesen Verhältnissen entweder von der Sehnenbinde des Armes bedeckt, oder sie verläuft zwischen dieser und der Haut mit der Speichenhautvene.

Zuweilen giebt die Radialis bald nach ihrem Ursprunge die flache Hohlhandart

eben aber entweder gleich, oder doch wenig von derselben verschied. Sie geht längs dem Radius, an der innern Seite desselben, zwischen dem Supinator longus und dem Flexor radialis hinab.

An ihrem oberen Theile giebt sie die Arteria recurrens radialis, die, vom Supinator longus bedeckt, gegen den Condylus externus ausgeht, diesen Muskel und dem Brachialis internus und dem Ellenbogen-Neste giebt, und mit den Arteriis collateralibus radialibus Anastomose hat.

Ferner giebt sie in ihrem Fortgange Nester dem Supinator longus, dem Extor radialis longus, dem Pronator teres, dem Flexor pollicis longus, dem Extor radialis, dem Flexor sublimis, dem profundus, dem Pronator quadratus der Haut.

Am untern Ende des Radius liegt sie an der innern Seite desselben neben dem Processus styloideus, dicht unter der Haut, so daß man hier den Puls derselben deutlich fühlen kann.

Wie ab, die lang, klein und in einigen Fällen gewunden ist, und in der Richtung der nach dem Rücken der Speiche sich wendenden Speichenarterie nach unten geht. Liedermaun (l. c. Tab. XVII fig. 2.) bildet einen solchen Fall ab. Die Speichenarterie wendet sich nämlich in der Mitte der Speiche zum Rücken der Hand, und zwar oberflächlich verlaufend über den langen Rückwärtswender, die, äußeren Speichenmuskeln, den Abzieher und die Strecken des Daumens.

Dieser Verlauf bewirkt, daß am gewöhnlichen Orte kein Puls bemerkt werden kann. Dasselbe ist der Fall, wenn, wie Otto (path. Anat. I. S. 309.) anführt, die Radialis ganz fehlt. Er beobachtete dies bei einer bejahrten Frau; von der Radialis war nur die Recurrens und ein Paar kleine Muskeläste vorhanden, der herablaufende Stamm fehlte ganz, dafür war die Interossea größer, und gab auch den Handrückenast, den sonst die Radialis giebt.

Manchmal finden sich statt einer, 2 Speichenebenpulsadern. Münz (Gefäßlehre, S. 539. Taf. IX. f. 5.) sah sie einmal mit einem gemeinschaftlichen stärkeren Stamme, öfters jede besonders, höher oder tiefer aus der Armpulsader, einmal sogar die eine aus der tiefer aus der Armpulsader kommenden Krampfsader des Oberarmes entspringen. (Taf. IX. f. V. 4.)

Einen höchst sonderbaren Verlauf der A. radialis beobachtete Otto (setzte Beobachtungen 28 Hft. S. 62.). Sie entsprang sehr hoch oben, war aber ungewöhnlich dünn, nur etwa 1 Linie stark, und lag tief, nicht weit vom Hauptstamme, und stieg ohne Nester abzugeben, bis zur Ellenbogenbeuge, wo sie von innen her einen Verstärkungsaft bekam, der dicker als sie selbst in einem rechten Winkel aus der Brachialis entsprang; die nun viel stärker gewordene Radialis nahm nun den gewöhnlichen Verlauf. Aus der Brach. aber entsprang, außer der Ulnaris und Interossea, ein 3ter Ast, der in der Mitte der innern Seite des Vorderarms zwischen dem tiefen und oberflächlichen Fingerbeuger und unter dem Lig. carpi volar. propr. herabließ, seine Richtung gegen den Daumen nahm, sich in die Art. poll. ulnar. radial., ind. und eine 3te spaltete, die ganz oberflächlich unter der Haut in der Mitte zwischen Daumen und Zeigefinger nach dem Handrücken lief.

Der Hohlhandzweig der Speichenpulsader zum oberflächlichen Hohlhandbogen entspringt öfter schon höher als gewöhnlich am Vorderarme aus der Speichenpulsader, so, daß diese sich schon höher in 2 Nester, in den Hohlhand- und Rückenast der Hand theilt. (Münz) Gefäßl. S. 540.) Oft fehlt auch dieser oberflächliche Hohlhandzweig gänzlich oder größtentheils. (Ibid. Taf. III. f. 2.)

Außerdem ist noch zu bemerken, daß wenn die Speichenarterie hoch oben am Arme entspringt, sie gewöhnlich nach der Hand geht, ohne mit der Ellenbogenarterie zu anastomosiren; in einigen Fällen jedoch sah Burns (Herzst. S. 341.) daß jene von dieser am Ellenbogengeleite einen ganz kleinen Zweig empfing. Wo die Speichenarterie klein ist, da vertritt ein Zweig der Ellenbogenarterie die Stelle der zurücklaufenden Speichenarterie.

Unter dem untern Ende des Radius theilt sich die Arteria radialis in 2 Aeste.

1) Ramus volaris, der Hohlhandzweig. Dieser ist viel dünner, als der Rückenweig, zuweilen ungewöhnlich dünn. Er giebt dünne Aeste zum Rete carpeum volare, geht dann neben dem Ligamentum Carpi proprium volare hinab, giebt zuweilen die Arteria vola radialis pollicis, und geht dann zwischen den Fasern des Abductor brevis, oder ganz von diesem Muskel bedeckt, selten an der auswendigen Fläche dieses Muskels, in die Vola zum Arcus volaris sublimis.

2) Ramus dorsalis, der Rückenweig. Dieser ist viel dicker, und lenkt sich, bedeckt von den Flechsen des Abductor longus und Extensor minor pollicis auf den Rücken der Handwurzel, giebt seinen Ramus carpeus dorsalis zum Rete carpeum dorsale. Ein Zweig desselben geht zwischen den Flechsen der beiden Extensorum radialis hinab.

Dann geht er zwischen dem Os metacarpi des Daumens und des Zeigefingers weiter hinab, und giebt 3 Arteriae digitales dorsales, die radialis pollicis, die ulnaris pollicis, und die radialis indicis die beiden letztgenannten gemeiniglich aus Einem Stamme. Die Fortsetzung des Ramus dorsalis geht zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers in die Hohlhand über ¹⁾, von

¹⁾ Der Hohlhandzweig der A. radialis und ulnaris liegt in manchen Fällen bei sehr Uebergange in die Hohlhand sehr oberflächlich. Er ist zuweilen sehr dick (Wunderl. u. Krankh. S. 324.) und bildet mit der A. ulnaris den oberflächlichen Arcus sublimis auf eine solche Weise, daß jener Ast einen beträchtlichen Theil desselben ausmacht, noch eine Fingerarterie zum Zeigefinger schickt. Bisweilen wird der Arcus vola sublimis von dem oberflächlichen Hohlhandaste der A. ulnaris und von dem am Mittelhandknochen des Daumens in die Hohlhand kommenden Handrückenaste der A. radialis gebildet, wo dann zuweilen der Hohlhandast der A. radialis sehr klein ist, oder ganz fehlt, so daß alle Arterien des Daumens, und zuweilen sogar der des Zeigefingers von jenem Handrückenaste der A. radialis entspringen.

Bisweilen tritt in den Arcus volaris sublimis eine sehr dicke Fortsetzung der A. interossea ein.

Bisweilen fehlt der Arcus volaris sublimis ganz, und der Hohlhandast der Radialarterie und der Radialarterie gehen, ohne sich unter einander zu verbinden, in die Fingerarterien über, wobei dann der Ast der Ulnararterie meistens der größeren Hauptzweig der Finger Zweige giebt.

Bisweilen giebt ein Ast der A. interossea des Vorderarms, der hoch oben, und auch tiefer unten entspringt, und den Medianerven begleitet, gemeinschaftlich mit der Radialarterie, oder auch allein, die Fingerarterien an den einander zugewendeten Rändern des Daumens und des Zeigefingers, wo dann auch der Arcus volaris sublimis fehlen kann.

Bisweilen kommen die Fingerarterien dieser Finger aus dem Aste der Radialarterie, welcher sich zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers vom Handrücken in die Hohlhand hereinschlägt. Da nun bald die vom Rücken in die Hohlhand kommende Fortsetzung der Radialarterie sehr dick, und der Volarzweig derselben sehr dünn ist, bald die A. A. interossea des Vorderarms in die Hohlhand starken Zweigen übergehen, und dafür der in dieselbe kommende Ast der Ulnararterie oder der Radialarterie dünn ist, so ändert sich die Ordnung, in welcher die Fingerarterien

beht dann den *M. interosseus externus* des Zeigefingers, giebt ihm und dem *Abductor pollicis* Nefte, und geht in den *Arcus volaris profundus*, zuweilen auch in den *Arcus volaris sublimis* über.

Allgemeine Bemerkungen über die Vertheilung der aus dem Bogen der Aorta emporsteigenden Arterien.

Die *A. carotis* führt dem Kopfe sammt dem vordern Theile des hin eingeschlossenen Gehirns und dem oberen Theile des Halses, die *A. subclavia* dem Gehirne und Rückenmarke, dem übrigen Theile des Halses und dem Arme Blut zu. Zugleich bringt diese letztere durch die in der vordern Seite des Rumpfes der Länge nach herabsteigende *Arteria mammaria interna* eine durch enge Nefstchen vermittelte Verbindung des obersten und des untersten Theiles der Aorta hervor, denn am Bande verbindet sich die aus der *A. cruralis* entsprungene *A. epigastrica* mit der *A. mammaria interna*. Die der Länge nach am Rumpfe verlaufenden Arterienäste sind sehr merkwürdig. Es giebt nur an den 2 entgegengesetzten Seiten des Rumpfes solche Arterien, nämlich die genannten Arterien an der vordern Wand der Brust- und Bauchhöhle, nicht weit von der Mittellinie, und die aus der *Vertebrae* entsprungene *Arteriae spinales anteriores* und *posteriores* in der Rückgrathhöhle. Alle andern aus der Aorta für die Wände der

rien bald mehr aus diesen, bald mehr aus jenen Zweigen entspringen, so mannichfaltig ist, das sich die Varietäten kaum alle aufzählen lassen. Da die Arterien, welche an den einander zugekehrten Rändern der Finger in der Hohlhand verlaufen, ihr Blut aus dem *Arcus volaris sublimis*, und meistens zugleich auch durch communicirende Nefte aus dem *Arcus volaris profundus* zugeführt erhalten, so ändert sich auch das Verhältniß, in welchem sie mehr Blut aus jenem als aus diesem Gefäßbogen zugeführt erhalten, mannichfaltig ab, so das es Fälle giebt, wo sie fast allein aus dem tiefen Gefäßbogen entspringen.

Eine ähnliche Bewandnis hat es mit den Gefäßen des Handrückens. Je nachdem die *A. interossea* mehr zu der Bildung des *Reto carpeum dorsale* beiträgt, tragen die Handrückensäste der *A. radialis* und *ulnaris* dazu weniger bei. Je kleiner die aus diesem *Reto carpeum* entspringenden 3 *A. A. interossea dorsales* (die 3 kleinern Mittelhandarterien des Handrückens) sind, welche zwischen den Mittelhandknochen der 4 kleinern Finger verlaufen, je mehr sie Blut durch die, am Anfange dieser Zwischenräume liegenden, durchbohrenden Nefte, an die Arterien der Hohlhand abgeben, und je kleiner folglich die aus ihnen entspringenden, auf dem Rücken der Finger zu jeder Seite derselben gehenden Fingerarterien sind, desto mehr tragen die von der Hohlhandseite auf die Rückenseite am Anfange der Finger sich herüberschlagenden Nefte zur Bildung dieser Arterien bei. —

Eine ältere Abhandlung über die Arterien der Hand rührt von *Andr. Pitzler*, *peculiaris arteriarum situs in manibus*. *Ephemer. nat. cur. Centur. IX. et X. p. 329. her.*

220 Uebersicht über die Neste der Carotis u. Subclavia.

Brust- und Bauchhöhle und für das Rückgrat dieser Gegend entspringen, später zu beschreibenden Arterien, die Zwischenrippen- und Lendenarterien, *A. A. intercostales* und *lumbales*, haben eine quere Richtung, erstrecken sich einerseits an den Wänden des Bauches und der Brust wärts gekrümmt bis zu den Nesten der genannten 2 vordern Längsarterien, *A. A. mammae internae*, andererseits, in die Rückgratsdurch die Intervertebrallöcher einbringend, zu den hintern Längsarterien, *Spinalarterien, A. A. spinales*.

Für den Hals und Kopf sind die 2 wichtigsten der Länge nach verlaufenden, und in der Schädelhöhle sich vereinigenden Arterien die *A. carotis* und die *A. vertebralis*. Die *Carotis* ist eine oberflächlich verlaufende, *Vertebralis* eine tiefe, im *Vertebralkanale* vor der Zusammendrückung schützte Arterie. Die *Vertebralis* gehört dem hinteren Theile des gro ßen Gehirns, dem kleinen Gehirne und dem verlängerten Marke, die *Carotis* dem vordern Theile des großen Gehirns an. Am und im Gehirne vereinigen sie beide zusammen, nicht nur durch den *Circulus arteriosus Willisii* an der Grundfläche, sondern auch durch viele zum Theil beträchtliche Nester an der Oberfläche der Rindensubstanz des hintern Hirnhirns und an der innern Seite der Halbkugeln des großen Gehirns, endlich aber auch in den Hirnventrikeln selbst, wohin die Endäste der *vertebralis* (die *A. A. profundae cerebri*) durch die Mitte der gro ßen Querspalte der Ventrikel, die *A. choroidea* der *Carotis* von dem obersten Theile dieser Spalte aus gelangt. Die *Vertebralarterie* gelangt bekanntlich durch das große Hinterhauptloch in den Schädel, und tritt wo sie an dem unpaaren markigen Theile des kleinen Gehirns, *p. Varolii*, hinläuft, selbst von beiden Seiten her in eine unpaare *Art. A. basilaris*, zusammen. Die Arterien für die graue Rindensubstanz des kleinen Gehirns, die *A. cerebelli inferior* und *superior*, bilden Gefäßkränze um das kleine Gehirn, die von der untern Seite derselben anfangen, und sich auf der oberen schließen. Durch diese Verteilung und Vereinigung der Arterien wird bewirkt, daß keinem Theile des Gehirns, weder der Rindensubstanz, noch der Marksubstanz (welche letztere ihre besonderen Arterien größtentheils von den Ventrikeln aus erhält), jemals das Blut gänzlich fehlen kann, selbst in dem Falle, wenn 1 oder 2 der zuführenden Blutgefäße Blut zuzuführen gehindert würden, 1 oder 2 jede von ihnen kann zu allen Stellen des Gehirns Blut führen. *Vertebralis* ist außerdem noch interessant, weil sie die queren Rückgratsarterien durch die Intervertebrallöcher des Halses und die lumbalen Rückgratsarterien, *A. A. spinales*, hergiebt. In der Schädelhöhle springt auch aus ihr die in den *Meatus auditorius internus* mündende Arterie des innersten Ohres.

Die durch den *Canalis caroticus* in die Schädelhöhle eingehende *Carotis cerebralis* ist den vorn in der Schädelhöhle, den in der Augenhöhle und den in dem obern Theile der Nasenhöhle gelegenen Theilen bestimmt, und erstreckt sich auch äußerlich bis auf die Stirn. Für das Gehirn giebt sie 2 Arterien, die vorzüglich Arterien der grauen Rindensubstanz sind; nämlich eine in die Längsfurche, *A. corporis callosi*, und eine in die Quersfurche, die *A. fossae Sylvii*. Für den oberen Theil der Augen- und Nasenhöhle und für die Stirn ist der durch das *Foramen opticum* gehende Zweig, die *A. ophthalmica* bestimmt. Die Aeste derselben gehen durch das *Foramen ethmoidale*, in die Nase, oben an der großen Oeffnung der Augenhöhle zur Stirn, inwendig aber führen sie dem Augapfel mit seinen Hülfswerkzeugen Blut zu.

Die *Carotis facialis* führt fast ganz allein den knöchernen Wänden des Schädels, seinem äußern und innern häutigen Ueberzuge, dem Antlitze und dem oberen Theile des Halses Blut zu. Dem Hinterkopfe und Nacken durch die *A. occipitalis*, dem Seitentheile des Kopfs durch die *Auricularis post.* und *Temporalis*, dem Antlitze durch die *Maxillaris externa* und *interna*, endlich dem obern und vordern Theile des Halses, namentlich den mit dem Zungenbeine zusammenhängenden Theilen, der Zunge, dem Kehlkopfe nebst der Schilddrüse und dem Schlunde, *pharynx*, durch die *A. lingualis*, *thyreoidea sup.* und *pharyngea*.

Die Antlitzarterien verlaufen wieder entweder mehr in den Höhlen oder mehr an der Oberfläche des Kopfes. Die *A. maxillaris interna* nämlich ist die Arterie für die Höhlen, und ihre Zweige gehen durch viele verborgene Spalten und Löcher. Sie liegt nämlich unter dem Jochbogen und in der *Fissura sphenomaxillaris*, durch welche die Augenhöhle und die Schläfengrube verbunden sind, versteckt, und von hier aus bringt ihr Ast, die *A. meningea media*, durch das *Foramen spinosum* in die Schädelhöhle, wo sie die größte ernährende Arterie des Knochens ist; die *Arteria pterygo-palatina* bringt durch Canäle dieses Namens in die Mundhöhle, die *Spheno-palatina* durch einen Canal dieses Namens seitwärts in die Nasenhöhle, ihr Ast, die *Arteria infraorbitalis* bringt in den Boden der Augenhöhle, und nebst der *Alveolaris sup.* in die seitlichen Nebenhöhlen der Nase und in die Sehnöhlen, die *Alveolaris inferior* endlich gelangt in den Zahncanal und in die Zahnhöhlen der Unterkinnlade. Außerdem kommen auch noch kleinere Aeste ins innere Ohr. Alle diese Höhlenarterien dringen durch gewisse Löcher zur Oberfläche hervor, und treten mit der an der Oberfläche liegenden äußeren Antlitzarterie und mit den Seitenarterien des Kopfes in Verbindung. Die *Ophthalmica* bringt zur Augenhöhle oben her-

222 Uebersicht über die Aeste der Carotis. u. Subclavia.

aus und seitwärts in die Schläfengrube durchs Jochbein; die tiefe A. ligarterie bringt durch das Foramen infraorbitale und mentale nach außen, und verbindet sich mit den Gesichts- und Schläfenarterien.

Die Arterien für die am Zungenbeine hängenden 3 Organe, für die Zunge, den Kehlkopf, für die Schilddrüsen und für den Pharynx, haben mehr einen queren Verlauf.

Rechnet man von den oben ausführlich beschriebenen Aesten der Subclavia die zum Kopfe aufsteigende Vertebralis und die zum Bauche herabsteigende Mammaria, und noch die sehr kleine Intercostalis prima weg, so bleiben nur die dem Halse bestimmten Zweige übrig, die Thyreoidae inf. für den vordern und untern Theil des Halses, die Cervicalis ascendens für den Seitentheil des Halses und die Transversa scapulae und colli für den hintern Theil des Halses oder den Nacken. Diese letzteren 2 Arterien bilden mit den Arterien in der Achselhöhle Gefäßstränge um das Schulterblatt herum. Die A. transversa colli um den hintern Rand des Schulterblattes, die A. transversa scapulae um die Fossa supra- und infraspinata.

Außerdem, daß von der Achselhöhle aus von der A. axillaris die großen Muskeln des Arms, welche vom Rumpfe kommen, mit Zweigen versehen werden, versieht die Subscapularis das Schulterblatt auf seiner vordern Seite und Rückenseite. Die kleine vordere und die große hintere Kranzarterie des Oberarms bilden um den Kopf desselben einen Kranz.

Der mittlere und untere Theil des Oberarms hat 2 Stämme, von welchen die denselben benachbarten Theile ihr Blut beziehen: der obere Stamm der Armarterie, der auf der Beugeseite, die tiefe Armarterie, die auf der Streckseite im Zwischenraume zwischen den 3 zusammenstoßenden Köpfen des M. triceps liegt.

Am Ellenbogen entstehen mehrere dieses Gelenk umgebende Gefäßstränge durch Zweige, die von der A. brachialis und von der A. brachialis profunda hinabsteigen (Arteriae collaterales), und von den Arterienstämmen des Vorderarms heraufsteigen (Art. recurrentes).

Am Vorderarme zerfällt die Armarterie oben in die 2 Stämme, die unten den Vorderarm wieder verlassen und zur Hand weitergehen. Sie werden nach den 2 Knochen des Vorderarms, an welchen sie auf der Hohlarmseite verlaufen, A. radialis und ulnaris genannt. Die A. ulnaris giebt einen Stamm, von welchem 2 tiefere Vorderarm-Arterien, A. interosae, die beim Vorderarme fast ganz verbleiben, entspringen, und zwischen den 2 Vorderarmknochen (die eine auf der Hohlarmseite, die andere auf der Rückenseite des Ligamentum interosseum) verlaufen. So giebt es also am Vorderarme 4 Blutgefäßstämme, von wel-

den die Theile am Vorderarme ihr Blut beziehen, 2 oberflächlichere und 2 tiefere, die *A. radialis*, *ulnaris*, *interossea dors.* u. *inteross. vol.*

Die Achselarterie liegt an der Beugeseite des Achselgelenks, und eben so die Armarterie an der Beugeseite des Ellenbogengelenks; die Handarterien dagegen gehen zur Hand, die sich vorwärts und rückwärts fast im gleichviel beugen kann, nahe an den 2 Seitenrändern über. Auf diese Weise sind diese Stämme vor einer schädlichen Dehnung gesichert.

Die Rückenseite der Hand hat viel kleinere Arterien als die Hohlhandseite. Denn es liegen die zur Hand übergehenden größeren Arterienstämme mehr auf derjenigen Seite, nach welcher zu die Hand mehr als nach der Rückenseite gebogen werden kann. Auch bedurfte die Rückenseite nur kleinerer Arterien, weil sie weniger fleischig ist, als die Hohlhandseite.

Von der *A. ulnaris* geht nur ein sehr kleiner Zweig, *ramus dorsalis*, etwas über der Handwurzel, unter dem *M. Flexor carpi ulnaris* weg, zum Rücken der Handwurzel, ein viel größerer zwischen dem *Os pisiforme* und zwischen dem *Ligamentum carpi volare proprium* und dem *Palmaris brevis* in die Hohlhand, welcher letztere theils den auf den Sehnen der Beugemuskeln liegenden *Arcus volaris sublimis*, theils den unter ihnen liegenden *Arcus volaris profundus* bildet, welcher in der Regel auch mit den durchbohrenden, zwischen 2 Mittelhandknochen vom Handrücken in die Hohlhand bringenden Aesten der Mittelhandarterie des Handrückens in Verbindung steht.

Von der *A. radialis* geht zwar auch nur ein schwächerer Zweig, *ramus volaris*, bedeckt vom *M. abductor* und *flexor pollicis brevis*, an dem *os naviculare* zur Hohlhand, und hilft daselbst den *Arcus volaris sublimis* bilden, und der viel stärkere *Ramus dorsalis* zum Handrücken, aber dieser Rückenast geht größtentheils selbst wieder zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers in die Hohlhand, und hilft dort den *Arcus volaris profundus*, zuweilen auch den *sublimis* bilden. Hieraus sieht man, daß die fleischigere Hohlhand größere Arterien als der Handrücken empfängt. Zugleich erkennt man, auf wie vielfache Weise die verschiedenen zur Hand und zu den Fingern übergehenden Arterien unter einander anastomosiren, und dadurch dem Nachtheile vorbeugen, der sonst leicht von einem Drucke entstehen könnte, welchem die Hand und die Finger nicht selten ausgesetzt sind.

Die *A. radialis* und *ulnaris* anastomosiren unter einander sowohl auf dem Handrücken als in der Hohlhand. Auf dem Rücken der Handwurzel wird aus dünnen Aesten dieser 2 Arterien und aus den hinzukommenden kleineren Aesten der *A. interossea* ein Gefäßnetz,

rete carpeum dorsale, gebildet, welches an den zwischen den 4 kleineren Metacarpusknöcheln gelegenen 3 Zwischenräumen mit den tiefen Arterien der Hohlhand zusammenhängt und 3 A. interossee, Mittelhandarterien, giebt, welche den Muskeln gleiches Namens angehören, und außerdem gabelförmig in 2 Fingerarterien, Art. digitales dorsales gespalten werden, welche auf dem Handrücken an den einander zugewendeten Rändern der 4 kleineren Finger verlaufen, wo sie sich mit Aeste vermischen, die von den Fingerarterien der Hohlhand zu ihnen übergehen. In der Hohlhand bildet der dicke Ramus volaris sublimis der A. ulnaris, und der dünne Hohlhandzweig der A. radialis, den zwischen den Sehnen der Beugemuskeln und der Aponeurosis palmaris liegenden Arcus volaris sublimis. Der Ram. vol. profundus der A. ulnaris stößt in dem unter den Sehnen der Beugemuskeln gelegenen Arcus volaris profundus mit dem zwischen dem Mittelhandknöchel des Daumens und des Zeigefingers durchgehenden Rückenast der A. radialis zusammen. Aus ihm gehen die Arteriae interossee der Hohlhand hervor, welche theilweis, zuweilen auch alle, mit den Fingerarterien in Verbindung stehen, und immer die M. M. interossei und einige kleine Muskeln des kleinen Fingers und des Daumens mit Blut versorgen. Die Arterien der einander zugewendeten Ränder der Finger entspringen an der Hohlhandseite gabelförmig aus dem Arcus volaris sublimis, stehen aber auch meistens mit Aesten des Arcus volaris profundus in einiger Verbindung, die sich noch an der gabelförmigen Spaltung mit ihnen vereinigen. Jeder Rand eines Fingers hat eine Arterie, die Arterien der beiden Ränder, die je Finger, vornehmlich die 4 kleineren Finger, einander zuehren, entspringen meistens aus einem gemeinschaftlichen Stämmchen, die am abgewendeten Rande des Daumens und des kleinen Fingers einzeln. An der Spitze, zum Theil auch an den beiden andern Gliedern der Finger vereinigen sich die 2 A. volares der Finger durch Anastomosen mit einander, auch gehen Aeste auf den Fingerrücken, welche sich mit den Fingerarterien des Fingerrückens verbinden.

Aeste des absteigenden Theils der Brustaorta, Aorta thoracica descendens.

Die Arterien, welche von der durch die Brusthöhle und durch die Bauchhöhle verlaufenden Aorta entspringen, lassen sich in solche einteilen

welche den Wänden dieser Höhlen angehören, und in die, welche den in den Höhlen befindlichen Organen bestimmt sind.

Weil nun das Herz seine Blutgefäße schon vom Anfange der Aorta erhält, und die Lungen eine eigenthümliche Arterie besitzen, so giebt es der Brusthöhle keine großen Organe, die von der Aorta descendens Blutgefäße bekommen könnten, und es entspringen daher daselbst, über einigen Arterien für die in die Lungen dringenden Luftröhrenäste und für die Speiseröhre, keine von ihrer vordern Seite, wohl aber hinten auf jeder Seite 10 Zwischenrippenarterien für die Wand der Brust.

Vordere Aeste der Aorta in der Brusthöhle.

Arteriae bronchiales, Luftröhrenarterien,

kennt man die Arterien, welche sich an den 2 Aesten, in die sich die Luftröhre spaltet, verbreiten, mit ihnen in die Lungen eindringen, und daselbst theils zur Ernährung der Lungen, theils zur Absonderung des Dunstes in dem Brustfellsacke und in der Schleimhaut der Luftröhre beitragen. Sie sind aber sowohl ihrer Zahl als ihrem Ursprunge nach bei verschiedenen Menschen so verschieden, daß sich kaum eine einfache Regel darüber aufstellen läßt. Im Allgemeinen läßt sich nur sagen, daß 1 oder 2 oder 3, selten 4 solche Arterien von der vordern Seite der absteigenden Aorta nahe unter ihrem Bogen entspringen, daß gewöhnlich die rechte Bronchialarterie größer ist und aus einem Stamme entspringt, der ihr mit der ersten von der Aorta kommenden Zwischenrippenarterie, *A. intercostalis*, gemeinschaftlich ist, und daß diese oft nicht nur dem einen, sondern beiden Luftröhrenästen Zweige giebt, und in diesem Falle zuerst zum linken, und dann zum rechten Luftröhrenaste ihren Zweig schickt. Auf der linken Seite entspringen oft 1 oder 2 Bronchialarterien aus der Aorta selbst ¹⁾.

Die rechte Bronchialarterie schickt nicht selten der Speiseröhre einen Zweig, und den an den Luftröhrenästen befindlichen Lymphdrüsen, Glan-

¹⁾ *Haller, De arteriis venisque bronchialibus et oesophageis. Gottingae 1743. Coll. Disp. anat. select. Vol. III. Gottingae 1746. 4. p. 4. et 5. — Derselbe, Iconum anatomiarum c. h. Fasc. III. Gottingae 1747. Fol. p. 36. Er fand, als er den Verlauf der Bronchialarterien 25mal untersuchte, in 15 Fällen, daß die Arteria bronchialis dextra zugleich mit der ersten aus der Aorta kommenden (in den 3ten, oder 4ten, oder 5ten Zwischenraum gehenden) *A. intercostalis* entsprang. Von der linken Bronchialarterie sah er, daß sie in den meisten Fällen aus der Aorta ihren Ursprung nahm, und zwar, wenn sich die rechte Bronchialarterie mit zu dem linken Luftröhrenaste erstreckte, eine, wenn das nicht der Fall war. Da nun auch bisweilen eine *A. bronchialis* aus der *A. subclavia* oder *A. mammaria interna* entspringt, so sind dann die genannten untern Bronchialarterien steiner, oder es spritzt die eine oder die andere ganz.*

dulae bronchiales, mehrere kleine Zweige zu; doch erhalten diese Dufsen nicht selten auch eine Arterie aus der A. mammaria oder subclavia. An jenem Aste der Luftröhre windet sich meistens nicht bloß ein Zweig der Bronchialarterie hin, sondern mehrere. Wenn ein Thier mehrere Bronchialarterien erhält, so anastomosiren sie unter einander. Haller und Reiffseisen ¹⁾ beobachteten auch eine Verbindung der Bronchialarterien mit kleinen, jedoch noch sichtbaren Nerven der Lungenarterie, welche sich zu der Luftröhre begaben. Bis zu den Lungenbläschen selbst gelang es Reiffseisen nicht, die Bronchialarterien zu verfolgen. Sie drangen in die faserige Haut der Luftröhrenzweige ein, und gelangten zur Schleimhaut derselben.

Außer den an den Luftröhrenästen hinlaufenden Zweigen schicken die Bronchialarterien nach Reiffseisen's Untersuchung zahlreiche Seitenäste ²⁾ zu andern Theilen der Lungen hin. Schon an der Stelle, wo die Bronchien in die Lungensubstanz eintreten, gehen beträchtliche Äste ab, welche unter der die Lungen überziehenden Haut im Zellgewebe verlaufen. In dem Einschnitten jedes Lungenflügels hinlaufen, und sich in vorzüglich an der Oberfläche sehr großes Netz von Haargefäßen verbinden und daselbst mit den Haargefäßen der Lungenarterien zusammenstoßen. Die Bronchialgefäße sind daher die ernährenden Gefäße der Lungen.

Arteriae oesophageae.

Außer den andern Schlagaderästen, welche die Speiseröhre entspringen 1, 2, 3, oder mehrere Arteriae oesophageae aus der Aorta selbst, im Cavum mediastini posticum, von der vordern Oberfläche derselben, theils höher, theils tiefer. Sie sind alle dünne Schlagadern, je mehrere aber da sind, desto dünner sind sie.

In manchen Körpern kommt eine dieser Schlagadern mit einer Arteria bronchialis aus Einem Stamme.

Sie vertheilen sich alle an der Speiseröhre, namentlich in dem Zellgewebe zwischen der eigenen Haut und der Fleischhaut; geben aber auch gleich der Brusthaut und dem Herzbeutel Nerven.

Arteriae pericardiacae.

Außer den bisher genannten Nerven, welche die Aorta schickt, in dem Cavum mediastini posticum hinabgeht, giebt sie in einigen Körpern noch einige besondere Arterias pericardiacas zum und hinterm Theile des Herzbeutels.

¹⁾ Haller, El. Phys. III. p. 155. Reiffseisen, über den Bau der Lungen. Tab. IV. Fig. 5. ee.

²⁾ Reiffseisen, über den Bau der Lungen. Berlin 1822. Fol. Tab. V. a.

Hintere Aeste der Aorta in der Brusthöhle.

Arteriae intercostales inferiores, untere Zwischenrippenarterien.

Es giebt überhaupt 11 Paar Intercoalararterien. Von diesen sind 1, oder 2, oder 3, selten 4 obere Aeste der A. intercostalis superior, welche aus der A. subclavia entspringt.

Die Arteriae intercostales inferiores sind dünne Aeste der Aorta, welche, im Cavum mediastini posticum, von der hinteren Seite der Aorta entspringen, und es sind ihrer daher an jeder Seite so viele, als Spatia intercostalia von der oberen Zwischenrippenarterie nicht mit Blut versorgt sind, also etwa 8 bis 10. In einigen Körpern ist auf einer Seite eine mehr als auf der andern, wenn nämlich die A. intercostalis superior an einer Seite einen Ast weniger als auf der andern giebt. Zuweilen entspringt eine oder die andere mit einer nächsten aus einem gemeinschaftlichen Aste. In einigen geht ein Ast aus einer in eine benachbarte über.

Die obern der aus der Aorta entspringenden Zwischenrippenarterien gehen schräg aufwärts und auswärts, die übrigen quer auswärts, jede zu ihrem Spatium intercostale. Hier giebt jede Arteria intercostalis, unweit ihres Ursprungs, am hintern Theile ihres spatium intercostale ihren

1. Ramus dorsalis. Dieser selbst scheidet einen Ramus muscularis, welcher rückwärts durch den hintersten Theil seines Musculus intercostalis internus und externus durchgeht, sich in diesem und dem nächsten Theile der Rückenmuskeln vertheilt; und einen Ramus spinalis, der einwärts durch sein Foramen intervertebrale in den Canal des Rückgrats tritt, zum Rückenmarke geht, und mit den Arteriiis spinalibus Gemeinschaft hat.

2. Die Fortsetzung des Stammes tritt in den Zwischenraum beider Rippen auswärts, geht an der Rinne des untern Randes der obern Rippe seines Zwischenraums vorwärts, und scheidet einen dünnern Ast, der in der Nähe des obern Randes der untern Rippe seines Zwischenraums verläuft. Beide gehen längs den Rippen gekrümmt auswärts, und dann vorwärts, an der innern Fläche ihres innern Intercostralmuskels, inwendig von der Brusthaut bedeckt. Sie geben Aeste den Intercostralmuskeln, der Brusthaut, zum Theil dem Zwerchfelle, auch durchgehende Aeste nach außen zu den Muskeln, die an der äußern Fläche der Brust liegen, welche mit den Arteriis thoracicis externis Ge-

228 Zweige der Aorta im Unterleibe: A. A. lumbales.

meinschaft haben. An den vordern Theilen der Rippen kommen sie mit den Ramis intercostalibus der A. mammaria interna, an den vordern Theilen der untern Rippen mit den Aesten des Ramus musculo-phrenicus dieser Schlagader zusammen.

An der rechten Seite gehen die Arteriae intercostales inferiores hinter der Vena azygos fort. Nicht selten gehen Zweige aus dem Zwischenraume über eine Rippe oder über 2 weg zu einer benachbarten Intercostalarterie und communiciren mit ihr. Immer communicirt die erste aus der Aorta entspringende mit der A. intercostalis superior.

Aeste des im Unterleibe verlaufenden Theiles der Aorta Aorta abdominalis.

Die aus diesem Abschnitte der Aorta entspringenden Arterien lassen man in 3 Classen theilen; denn entweder gehören sie den Seitenwänden der Bauchhöhle an, Lendenarterien, Arteriae lumbales, welche mit den Intercostalarterien viel Aehnlichkeit haben und, wie diese, mehr von der hintern Seite als alle übrigen Aeste entspringen, oder gehören den in der Unterleibshöhle gelegenen Eingeweiden und der Zwerchfelle an, und entspringen vorn oder an der Seite der Aorta, oder endlich sie sind die in das Becken tretenden Endzweige der Aorta.

Arterien für die Seitenwände der Bauchhöhle, Arteriae lumbales, Lendenarterien. -

Die Arteriae lumbales sind dünne Aeste der Aorta, welche ziemlich weit nach hinten vor den Körpern der Lendenwirbel paarweise entspringen. Ihrer sind, wenn man die unterste mitzählt, welche aus der A. sacra media oder der hypogastrica, und also nicht unmittelbar aus der Aorta entspringt, 5; wenn man aber nur die rechnet, welche unmittelbar aus der Aorta kommen, meistens 4.

Jede Arteria lumbalis geht auswärts und hinter dem Psoas weg. Die oberen gehen auch hinter den Schenkeln des Zwerchfells nach außen. Unweit ihres Ursprungs giebt jede einen Ramus spinalis, der durch das benachbarte Foramen intervertebrale in den Canal des Rückgrats tritt, zum Rückenmarke geht, und mit den Arteriis spinalibus Gemeinschaft hat. Dann entspringen Muskelzweige für den M. longissimus dorsi, den Sacro-lumbaris, den Quadratus lumborum, den Psoas. Di

Fortsetzung des Stammes geht immer aufwärts, und verzweigt sich im *lunulus transversus*, *obliquus internus* und *obliquus externus*, theils auch in der Haut des Bauchs, und hat mit den untersten Ästen der *A. mammaria externa*, mit den Ästen der *A. epigastrica* u. Gemeinschaft.

Das oberste Paar giebt auch Äste der *Pars lumbalis* des Zwerchfells, und den Nebenriern.

Auch die Bauchhaut erhält Äste von ihnen.

Zuweilen entspringen mehrere, vorzüglich von den weiter unten genannten Leidenarterien, aus einem gemeinschaftlichen Stamme.

Arterien für die in der Unterleibshöhle gelegenen Organe.

Diejenigen Äste der Unterleibsarterie, welche sich zu Organen erstrecken, die nur einmal vorhanden sind, sind selbst unpaare, namentlich die *Coeliaca*, welche zum Magen, zur Leber, zur Milz, zum Pankreas und zum Netz geht; ferner die *A. mesenterica superior*, die zu den dünnen Därmen und zur rechts gelegenen Abtheilung des Dickdarms geht; endlich die *A. mesenterica inferior*, welche zur links gelegenen Abtheilung des Dickdarms sich erstreckt. Alle 3 entspringen von der Mitte der vorderen Seite der Aorta, und laufen vorwärts und aufwärts. Die Nebenriern, die Nieren und die (beim Embryo in früherer Zeit auch in der Bauchhöhle liegenden) Hoden (oder bei dem weiblichen Geschlechte die Eierstöcke) sind doppelt vorhanden, und ihre Arterien entspringen paarweise. Das Zwerchfell, welches aus 2 symmetrischen Hälften besteht, und keine über die Mittellinie laufende Muskeln besitzt, hat meistens auch 2 Arterien, von welchen wenigstens die der einen Seite nicht unmittelbar aus der Aorta, sondern aus der *Coeliaca* zu entspringen pflegt. Indem die Aorta durch den *Hiatus aorticus* in die Unterleibshöhle tritt, giebt sie den neben ihr liegenden *Leidensarterien* und dem Fette, in welchem der *Ductus thoracicus* liegt, einige kleine Äste.

Arteriae phrenicae inferiores 1/2.

Die *Arteriae phrenicae inferiores* sind die tiefsten Arterien des Zwerchfells, die zur unteren Oberfläche desselben gelangen.

¹⁾ Die ersten für anatomischen Zweckes sind die *Arteriae phrenicae inferiores* (p. 22.) mit Einbezug zu einem von *Arteriae phrenicae inferiores* (p. 22.) und *Arteriae phrenicae superiores* (p. 22.)

In 23. Banden enthalten die *Arteriae phrenicae inferiores* sind die *Arteriae phrenicae inferiores* (p. 22.) und die *Arteriae phrenicae superiores* (p. 22.)

Ihrer sind gemeinlich 2, seltener entspringen indessen beide an einem Stamme, der, wenn er ja vorhanden ist, öfter aus der A. coeliaca, als aus der Aorta unmittelbar kommt. Auch wenn 2 Arterien phrenicae vorhanden sind, entspringen sie beide häufiger aus der A. coeliaca, als aus der Aorta. Indessen kommt es auch sehr oft vor, daß eine (die rechte oder die linke) aus der A. coeliaca, und die andere aus der Aorta entspringt, und zwar jene aus der A. coeliaca kommende zuweilen gemeinschaftlich mit der Coronaria ventriculi. Seltene Ausnahmen sind es, wenn die coeliaca aus der Nierenarterie oder gemeinschaftlich mit der Coronaria des Magens aus der Aorta entspringt. Hiaweilen entspringt die linke aus der A. coronaria ventriculi, selten eine aus der A. renalis zc. Bei Haller, Bichat, J. F. Meckel d. j. und Ziedemann sind die Fälle häufiger, wo eine von beiden, oder beide aus der Coeliaca entspringen, als beide aus der Aorta entstehen. Aus der Aorta selbst entspringen sie gemeinlich dicht unter der untern Fläche des Zwerchfelles.

Beide steigen aufwärts hinauf zur untern Fläche des Zwerchfells theilen sich in einen äußeren, der Pars costalis, und in einen inneren der Pars lumbalis angehörenden Zweig. Auf der rechten Seite wird das Foramen venae caevae von zusammenschließenden Nerven dieser 2 Zweige mit einem Gefäßbogen umgeben, und ein durchbohrender Ast geht durch dieses Loch in die obere Fläche des Zwerchfelles, und zum unteren Theile des Herzbeutelcs.

Außerdem gelangt der innere Zweig der rechten und linken Zwerchfellschlagader zur oberen Oberfläche, und diese beiden Zweige haben wohl auf dieser als auf der untern Fläche des Zwerchfells mit einer Gemeinschaft.

Auf der obern Fläche verbinden sie sich auch mit den Ramis phrenicis Arteriarum mammarium internarum, an der Pars lumbaris mit den Lumbis, an der Costalis mit den Intercostalibus, an der untern Seite des Zwerchfells schickt die Zwerchfellschlagader, ehe sie sich theilt, auch Aeste zur Milz, Niere, und auf der rechten Seite kleine Aeste zur Leber.

Arteria coeliaca ¹⁾.

Die Arteria coeliaca ist ein dicker unpaarer Ast der Aorta, welcher dem Magen, dem Netze, dem Zwölffingerdarne, der Leber, d

Coeliaca, und die Aorta die linke; zweimal entsprang die rechte aus der Coronaria ventr. major, und die linke aus der Aorta; zweimal gab die Aorta die rechte ab, die linke die Coeliaca; einmal entsprang die rechte aus der Renalis, die linke aus der Aorta; einmal endlich fanden sich vier Arterien, von denen zwei die Aorta, zwei die Coeliaca abgab.

Zu diesen Abweichungen fügt Ziedemann eine neue (expl. tab. art. p. 22) welche bildete nämlich mit der Kranzarterie des Magens einen besondern Stamm, aus der Aorta entsprang.

¹⁾ Sehr oft sah sie Otto (seltne Beob. I. 101.) variiren. Dreimal fehlte sie gänzlich, indem ihre drei Aeste unmittelbar und von einander getrennt aus der Aorta entsprangen. Mehrmals hatte sie nur 2 Aeste, indem die Hepatica aus der Mesent. sup. oder die Coronaria ventriculi aus der Aorta selbst kam, was schon vor ihm J. F. Meckel, pathol. Anat. B. II. 1. Abtheil. S. 121, beobachtete.

Einmal theilte sie sich in 4 Aeste, in die 3 gewöhnlichen und die Gastro-epiploica dextra, die gleiche Dicke wie die Coronaria hatte, und etwa einen Zoll von ihrem Ursprunge aus der Coeliaca sich durch einen gleichdicken Ast mit der Hepatica verband, so daß beide mit diesem Verbindungsast ein regelmäßiges Dreieck bildeten.

Pankreas und der Milz, mit einem Borte, allen über dem Mesocolon transversum gelegenen Eingeweiden bestimmt ist. Sie ist dünner als die Arteria mesenterica superior. Sie entspringt vor dem 12ten Brustwirbel, wo die Aorta durch den Hiatus aorticus des Zwischfelles in die Bauchhöhle gekommen ist, und sich noch zwischen den Schenkeln derselben befindet, von der vordern Seite der Aorta, und geht hinter dem obern Theile des Magens schräg vorwärts abwärts und rechts in die Höhle der Bauchhaut hinein.

Der Stamm derselben ist nur kurz, und giebt in einigen Körpern eine A. phrenica.

Ungefähr einen Zoll weit vom Ursprunge theilt sich der Stamm gewöhnlich in 3 Äste:

1) A. coronaria ventriculi major; 2) splenica; 3) hepatica.

In einigen Körpern entstehen alle 3 Äste an Einer Stelle, in andern entsteht erst die A. coronaria allein, in andern erst die splenica allein. In einigen entspringt erst die A. coronaria allein, und dann theilt sich doch die übrige coeliaca in 3 Äste, indem 2 hepaticae vorhanden sind.

1. Arteria coronaria ventriculi sinistra, die linke Kranzader des Magens, oder die Magenarterie.

Sie ist der dünnste Ast der A. coeliaca, selten kommt sie aus der Aorta selbst.

Sie geht vorwärts und links gegen das linke Ende des obern Randes des Magens. In einigen Körpern giebt sie die A. phrenica sinistra; in einigen giebt sie einen dünnen Ramus pancreaticus zum Pankreas hinab; in einigen einen dünnen Ramus splenicus, der zum obern Theile der Milz geht.

Wenn sie die Stelle, wo der Magen mit der Speiseröhre zusammenhängt, erreicht hat, so giebt sie einen oder einige Ramos oesophageos, die aufsteigend sich am untern Theile der Speiseröhre vertheilen, und mit den andern Arteriis oesophageis Gemeinschaft haben.

Wedel fand sie (path. Anat. 2. Bd. 1. Abth. S. 120.) nicht selten in 2 oder 3 Äste unregelmäßig gespalten; so z. B. bei einem Knaben in einen etwas größeren, obern, mehr links gelegenen, aus dem die Milz- und Magenarterien kamen, und einen rechten kleineren, aus dem die Leber- und linke Magenarterie entsprang. Morgagni (de sed. et caus. morb. ep. LXX. c. 9.) beobachtete dasselbe. In einem andern Falle entsprangen alle drei Arterien getheilt aus der Aorta.

Bei einem Manne hatte sie zwar die drei gewöhnlichen Äste, aber der dritte, der gewöhnlich zur Leber geht, ging an die rechte Nebenniere. Den Ast an die Leber gab die Mesent. sup. ab, aus der nun auch die anderen Äste hervorgingen (Petsche b. Haller, Diss. anat. VI. p. 776.).

Jo. Nicol. Weifs, resp. Jo. Sigism. Leincker, Diss. de arteriis viscerum propriis. Altorf. 1744. 4.

Aug. Fr. Walther, Progr. quod arteriae coeliacae tabulam in anatomes studio desideratam sistit. Lipsiae 1729. 4. In Halleri coll. Diss. anat. Vol. III. p. 11.

Am Lobulus Spigeli der Leber giebt sie, zwischen diesem und dem Lobus sinister, einen dünnen Ast in die Leber (ramus hepaticus) zum linken Ende der Fossa transversa. In einigen Körpern ist dieser Ast ansehnlicher, wenn der Ramus sinister der A. hepatica kleiner ist.

Dann geht sie, einfach oder in 2 Aeste getheilt, am concaven Rande des Magens rechts gegen den Pylorus fort, kommt mit der Arteria coronaria dextra zusammen, und geht in einem Arcus continuus in sie über, indem auch diese entweder einfach oder in 2 Aeste getheilt ihr entgegenkommt. Auf diesem Wege giebt sie zur vordern und zur hintern Fläche des Magens abwärts Aeste, welche mit den Magenästen der Arteria gastro-epiploica sinistra Gemeinschaft haben, und auf diesen Oberflähen des Magens ein Netz bilden.

2. Arteria splenica s. lienalis, die Milzarterie.

Sie entspringt aus der Arteria coeliaca, ist dicker, als die Coronaria sinistra, und bisweilen dicker, bisweilen dünner als die Hepatica. Sie krümmt sich links, und geht geschlängelt gegen die Milz, hinter dem Magen, längs dem obern Rande des Pankreas fort, und liegt in dem Zwischenraume zwischen dem Magen und der Milz an dem Ligamentum gastro-lienale und dem Omentum gastro-colicum.

Sie giebt unterweges viel dünne Aeste dem Pankreas. Auch findet man in einigen Körpern Aestchen, welche zur hintern Wand des Magens gehen. Links kommt aus dem Stamme selbst oder aus dem untern Hauptaste desselben ein ansehnlicher Ast, die Arteria gastro-epiploica sinistra, die linke Magenetzschlagader. Diese krümmt sich vorwärts zu dem convexen Bogen des Magens hinab, und dann nach rechts an der Grenze zwischen dem großen Netze und dem Magen fort. Er giebt abwärts Ramos epiploicos in das Omentum, aufwärts Ramos gastricos zum convexen Bogen und zu beiden Flächen des Magens, welche mit der A. coronaria sinistra Gemeinschaft haben. Das Ende dieser Ader hat mit der A. gastro-epiploica dextra, sowohl am Magen als im Omentum, Gemeinschaft, und kommt im Omentum mit ihr in einem Bogen zusammen.

Ferner entstehen theils aus dem Stamme unweit der Milz, theils aus den Ramis lienalibus desselben die Arteriae ventriculi breves, 3, 4 oder 5 zum Saccus coecus des Magens gehende Aeste, die mit den andern Arterien am linken Theile des Magens Gemeinschaft haben.

Dünne der Milz theilt sich die Arteria splenica in ihre Ramos lienales, gemeiniglich erst in 2 Hauptäste, dann in mehrere Aeste, welche durch den Hilus der Milz in die Milz hineintreten.

3. Arteria hepatica, die Leberarterie 1).

Die Leberarterie ist desto dünner, je dicker die Leberäste aus der A. mesenterica superior und aus der A. coronaria ventriculi major ab. Sie geht rechts gegen den hintern Theil der Leber zu, bedeckt im kleinen Netze, weiter vorn und weiter links liegend, als die Vena portarum, giebt in einigen Körpern erst die Arteria coronaria ventriculi dextra, die manche auch die pylorica nennen, und theilt sich dann in 2 Äste, die A. gastro-duodenalis und die A. hepatica.

1) Die Arteria coronaria ventriculi dextra, die rechte Kranzarterie des Magens, kommt bisweilen aus dem Stamme der Arteria hepatica, weilen aus einem gemeinschaftlichen Aste mit der A. gastro-duodenalis, in andern aus dem Ramus hepaticus, geht gegen das rechte Ende des concaven Bogens des Magens, tritt hinter dasselbe, und dann, einfach, oder in 2 Äste getheilt, am concaven Rande des Magens nach links, und kommt dort der Arteria coronaria sinistra in einem Bogen zusammen. Auf dem Wege giebt sie zur vordern und zur hintern Fläche des Magenswärts Äste, welche mit den Magenästen der A. gastro-epiploica extra Gemeinschaft haben.

2) Arteria gastro-duodenalis, die Magen-Zwölffingerdarmschlagader. Diese geht hinter dem Pylorus schräg rechts hinab, giebt Ramos ilioricos zum Pylorus, duodenales superiores zum obern Theile des Zwölffingerdarms, und theilt sich dann in 2 Äste. a) A. pancreatico-duodenalis, die Zwölffingerdarms-Bauchspeicheldrüsenarterie. Diese geht zwischen dem Zwölffingerdarme und dem dicken Ende des Pantreas hinab, giebt jenem an seinem mittlern und untern Theile Zweige, diesem einen Ast, welcher quer links in dasselbe hineingeht. b) A. gastro-epiploica dextra, die rechte Magenetzschlagader.

1) Seltner entspringt sie als ein besonderer Stamm aus der Aorta. (Sandifort obs. anat. path., Lib. II, p. 126.)

Bisweilen ist sie ein Ast der oberen Gefäßspeiser. Meckel (path. Anat. 2. Bd. 1. Abth., S. 120.), Haller (Icon. anat. Fasc. VIII, p. 36.)

Es giebt zuweilen mehrere Leberarterien, von denen eine am gewöhnlichen Orte entspringt, die andere aus der größeren Magenarterie, oder aus der oberen Gefäßschlagader. Meckel (path. Anat. 2. Bd. 1. Abth., S. 120.) sah sie von 3 verschiedenen Stellen kommen. Die größte, vom Stamme der Mesent. superior, vertheilte sich an die rechte Seite der Leber, die zweite, kleinere, von der Coeliaca, ging in den mittlern Theil der Pforte, die dritte, noch kleinere, von der Cor. vent. sin., ging in die Gube des venösen Ganges.

Die linke Leberarterie entspringt nicht selten aus der großen Magen-Schlagader. (Ziedemann, expl. tab. art. p. 230.) Petsche (Haller Diss. VI. 776.) Ein andermal kam dieser 2te Ast von der Mesenterica sup., begleitete mit einigen Ästen die Pfortader, und gab 2 Arterias cysticas.

Eine ältere Abhandlung über diese Arterien ist von Jo. Locquet, Diss. de arteria hepatica, Lgd. Bat. 1693. 4. S. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. VII. p. 507. sq.

Diese ist dann die Fortsetzung der A. gastro-duodenalis, und kommt links abwärtsgehend unter dem Pylorus hervor. Sie geht im großen Netz unter dem convexen Bogen des Magens der A. gastro-epiploica sinistra entgegen, hat mit derselben Gemeinschaft, und kommt endlich in einem Bogen mit ihr zusammen. Sie giebt abwärts Zweige zum Netz und aufwärts Zweige zu beiden Flächen des Magens, welche mit der A. coronaria dextra Gemeinschaft haben.

3) Die Fortsetzung der Arteria hepatica, der Leberast, geht hinter dem kleinen Netze schräg rechts hinauf, giebt bisweilen die Arteria coronaria dextra, tritt unter den hintern Theil der untern Fläche der Leber, und theilt sich in 2 Äste. Der rechte Ast ist gemeinlich dicker, doch desto dünner, je dicker der Ramus hepaticus aus der A. mesenterica superior ist. Selten fehlt er ganz, und wird durch den Ramus hepaticus der A. mesenterica ganz ersetzt. Er geht unter dem Tuberculum papillare, der Leber und unter dem linken Aste der Pfortader rechts, giebt die Arteria cystica zur Gallenblase, Äste zum Lobus quadratus und zum Lobus dexter, und zu dem Lobulus Spigelii.

Die Arteria cystica geht rechts zum Halse der Gallenblase, ein Ast davon läuft an der oberen, an der Leber anliegenden, ein Ater an der untern Fläche der Gallenblase hin. Aus beiden erhält auch die Leber noch Ästchen.

Der linke Ast ist dünner, und desto dünner, je dicker der Ramus hepaticus aus der A. coronaria sinistra ist. Er giebt bisweilen die A. coronaria ventriculi dextra, geht unter dem linken Theile der Pfortader zum linken Theile der Fossa transversa, giebt einen Ast zum Lobulus quadratus, einen zum Lobulus Spigelii, und vertheilt sich in dem Lobus sinister. Zuweilen sind drei Äste der eigentlichen A. hepatica, nämlich noch ein Ramus medius vorhanden.

Arteria mesenterica superior, die obere Gefäßschlagader¹⁾.

Die Arteria mesenterica oder auch mesaraica superior ist ein dicker unpaarer Ast der Aorta, welcher fast dem ganzen dünnen Darm und der rechten Hälfte des dicken Darmes bestimmt ist. Sie entspringt

¹⁾ Selten bildet sie einen gemeinschaftlichen Stamm mit der Eingeweidepfortader. Haller (icon. anat. fasc. VIII. p. 35. no. 11.) sah diese Anordnung einmal, Beckel fünfmal (Handb. d. Anat. Th. II. p. 215.), die Galen, Nicolan u. a. als Komplex beschrieben hatten.

Welfe (Hall. Coll. Diss. anat. VII. 155.) fand sie in zwei, dicht nebeneinander entspringende, Stämme zerfallen.

In den an ihr bemerkten Varietäten gehört auch der gänzliche Mangel der großen Anastomose zwischen der oberen und untern Gefäßarterie, die Vicq. d'Azyr (Mémoires de l'acad. des sc. 1776. p. 220.) einmal beobachtete; der aufsteigende Ast der untern, und der mittlere Grimmdarmast der oberen krümmten sich gegen ihren Ursprung zurück, und anastomosirten nur durch kleine Zweige mit einander.

vor dem ersten Bauchwirbel, oder vor der Verbindung des ersten Bauchwirbels und des letzten Brustwirbels, zwischen den Schenkeln des Zwerchfelles, dicht unter der Arteria coeliaca, von der vorderen Seite der Aorta, und ist etwas dicker, als die A. coeliaca.

Sie geht hinter dem obern Stücke des Zwölffingerdarms und dem Pankreas, dann vor dem untern Stücke des Zwölffingerdarmes, hinter dem Mesocolon transversum schräg vorwärts herab, krümmt sich ferner in einem großen Bogen, welcher seine convexe Seite links und seine concave rechts wendet, abwärts und nach dem rechten Darmbeine zu. Unweit ihres Ursprunges giebt sie gemeiniglich einen dünnen Ramus hepaticus zum rechten Lappen der Leber. In manchen Körpern ist er ziemlich dick, gemeilen so dick, daß er größtentheils oder ganz statt der Arteria hepatica dextra dient. Ferner giebt sie, indem sie am Zwölffingerdarme und dem Pankreas vorbeigeht, Ramos duodenales und pancreaticos, welche mit den Ästen der Arteria pancreatico-duodenalis Gemeinschaft hat.

1. Dünndarmäste. Aus der convexen Seite des gekrümmten Stammes entspringen die Arterien für den Dünndarm, aus der concaven Seite die für den Dickdarm. Jene sind weit zahlreicher, diese reduciren sich auf 2 oder 3 Stämme. Man kann 10 bis 16, und wenn man auch noch die letzten und kleinsten abgehenden Zweige zählt, sogar bis 20 Dünndarmäste, zählen, Arteriae jejunales und ileae für den Krummdarm (jejunum et ileum). Die oberen dieser Äste am Anfange des Jejunum sind kürzer, die folgenden länger, die untersten am Ende des Ileum wieder kürzer. Sie gehen alle divergirend zwischen den beiden Platten des Gefäßes, gegen den Dünndarm, und kommen (auch die oberste jejunalis mit der aus der coeliaca abstammenden pancreatico-duodenalis) in Bogen zusammen. Aus diesen Bogen entstehen wieder Äste, welche ferner gegen den Darm fortgehen, und sich wieder in Bogen verbinden u. s. w., so daß Bogen der ersten, 2ten, theils auch der 3ten u. Ordnung entstehen, welche ihre convexe Seite dem Darne zuwenden. Je näher die Bogen dem Darne liegen, desto kleiner werden die Äste, und desto enger die Zwischenräume der Bogen. Dem Mesenterium geben sie nur dünne Ästchen ab. Aus den letzten Bogen gehen die Äste zum Darne selbst, so daß einige (anteriores) an der einen Seite des Darms, andere (posteriores) an der andern Seite des Darmes fortgehen, der auswendigen Haut und den Fleischfasern feine Ästchen geben, zwischen den Fleischfasern in das zwischen der Fleischhaut und der eigenthümlichen Haut gelegene Zellgewebe eindringen, und sich in dieser in dünnere und neßförmig verbundene Äste zertheilen. Von diesen Ästen gehen ferner Äste in das zwischen der eigenthümlichen und der inwendigen Haut befindliche Zellgewebe, und zertheilen sich auch hier, so, daß die feinsten Enden derselben einen Theil der Rotten ausmachen. Sie kommen an der Stelle des Darms, die

dem Mesenterium entgegengekehrt ist, von beiden Flächen des Darm in dem zwischen der eigenthümlichen und der Fleischhaut gelegenen Zellgewebe zusammen.

2) Dickdarmäste. Von der concaven Seite des Bogens kommen 2 oder 3 Äste, welche dicker als die Arteriae jejunales und ileae sind.

a. Arteria colica media. Diese entspringt oben, indem die Arteria mesenterica superior hinter der Lamina inferior des Mesocolon transversum hervortritt, geht am Mesocolon transversum gegen das Colon transversum vorwärts, und theilt sich in 2 Äste von welchem sich der linke links in einem langen flachen Bogen nach dem Colon sinistrum hinkrümmt und sich mit dem aufsteigenden Aste der Arteria mesenterica inferior vereinigt; der rechte krümmt sich rechts und kommt in einem Bogen mit dem aufsteigenden Aste der Arteria colica dextra zusammen.

b. Arteria colica dextra. Diese entspringt tiefer, zuweilen nicht aus der Arteria mesenterica superior unmittelbar, sondern entweder aus der Arteria colica media, oder aus der Arteria ileo-colica. In manchen Fällen geben die beiden Aern einen Ast her, so daß diese beiden Äste die beiden Äste der Arteria colica dextra ersetzen.

Sie geht am Mesocolon dextrum gegen das Colon dextrum und theilt sich in 2 Äste, von welchen der aufsteigende aufwärts geht und mit dem Ramus dexter der Arteria colica media in einem Bogen zusammenkommt, der absteigende Ast sich abwärts krümmt, um mit dem Ramus ascendens der Arteria ileo-colica in einem Bogen zusammenkommt.

c. Arteria ileo-colica. Diese entspringt unten. Sie geht am Mesocolon dextrum gegen den untersten Theil des Colon dextrum und theilt sich in 2 Äste, von welchen der aufsteigende sich aufwärts krümmt, und mit dem Ramus descendens der Arteria colica dextra in einem Bogen zusammenkommt; der absteigende Ast sich abwärts krümmt, und mit der letzten Arteria ilea in einem Bogen zusammenkommt.

Wisweilen entspringt aus dem obersten Theile der Arteria mesenterica superior noch ein besonderer Ast, der Arteria colica sinistra superior heißen kann. Er geht gegen den ersten obersten Theil des Colon sinistrum, und giebt einen aufsteigenden Ast, der mit dem linken Aste der Arteria colica media, und einen absteigenden Ast, der mit dem Ramus ascendens der Arteria mesenterica inferior in einem Bogen zusammenkommt. Der letztgenannte Bogen ist dann viel kürzer, als wenn keine solche Arteria colica sinistra superior da ist.

Aus allen diesen Schlagaderästen entspringen nun Aern für die Därme. Aus denen der Arteria colica media für das Colon transversum, aus denen der Arteria colica dextra für den obern Theil des Colon dextrum, aus denen der Arteria ileo-colica für den untern Theil

des Colon dextrum, für das Intestinum coecum (rami coecales), den Appendix vermiformis (rami appendicales) und den letzten Theil des Ileum.

Die Vertheilung der Aeste, welche zum Colon gehen, ist im Allgemeinen eben so beschaffen, als die Vertheilung derer, welche zum Jejunum und Ileum gehen. Nur sind hier die Unterschiede: 1) daß da, wo das Mesocolon einfach ist, diese Adern nicht zwischen 2 Platten fortgehen, 2) daß die Bogen länger und flacher, auch der Bogenreihen weniger, und die Zwischenräume größer sind, 3) daß die Aeste an dem Darne selbst sich unter kleineren Winkeln vertheilen.

Bei sehr kleinen menschlichen Embryonen ¹⁾ bis zum Ende des 3ten Monats, nützlich deutlich bei Thierembryonen, findet man bisweilen eine kleine Schlagader (arteria omphalo-mesenterica), welche aus einem der Aeste der A. mesenterica entspringt, die zum engen Darne, und durch den Nabel zum Nabelkäschen geht. Haller ²⁾ fand einmal eine solche Arterie bei einem Neugeborenen, die sich am Nabel in 2 Aeste theilte, deren einer mit dem Urachus zur Blase ging, der andere durch den Nabel in den Nabelstrang zu gehen schien.

Arteria mesenterica inferior, die untere Gefäßschlagader ³⁾.

Die Arteria mesenterica inferior ist ein unpaarer Ast der Aorta, welcher dem linken Theile des Colon und dem Mastdarme bestimmt ist. Sie entspringt unweit des Endes der Aorta, also viel tiefer als die superior. Sie ist viel dünner als die A. mesenterica superior, auch dünner als die coeliaca.

Sie entspringt von der vordern Seite der Aorta, und geht schräg vorwärts, links und abwärts in die Höhle der Bauchhaut hinein. Ihr aufsteigender Ast oder die Arteria colica sinistra theilt sich in 2 Aeste, der eine krümmt sich im Mesocolon sinistrum aufwärts, kommt in einem großen Bogen (arcus mesentericus magnus) mit dem Ramus sinister der A. colica media, oder, wenn die A. mesenterica superior eine A. colica sinistra schießt, mit dieser zusammen, und giebt Aeste für das Colon sinistrum. Der absteigende Ast, oder die A. haemorrhoidalis interna, krümmt sich im Mesocolon sinistrum abwärts, giebt noch einige Aeste dem untersten Theile des Colon sinistrum, und geht dann zum Mastdarme hinab.

¹⁾ J. F. Meckel, Handbuch d. Anat. Th. 3. p. 222.

²⁾ Haller, icon. anat. III. p. 49.

³⁾ Detscher, (synl. obs. anat. select. §. 76.) sah eine seltne Abweichung ihres Ursprunges an einem Präparate, wo die rechte Niere fehlte. Die Aorta nämlich, nachdem sie die rechte Nierenarterie abgegeben hatte, spaltete sich in 2 gleich große Aeste; vom linken entsprang die Mesent. infer., und unter dieser vereinigten sich die beiden Stämme wieder durch einen Quersast.

Fleischmann (Leichenöffnungen, S. 259.) fand in einem Kinde keine untere, aus der Aorta entspringende Gefäßarterie, sondern der linke Grimmdarm und der Mastdarm erhielten ihre Gefäße aus der oberen Gefäßschlagader.

Die Vertheilung und Verbindung der zum Grimmdarme gehörenden Äste im Mesocolon, und ihre Vertheilung zum Darm ist so, wie oben von den Ästen der Mesenterica superior zum Colon und ihm um angegeben worden ist. Da die A. pancreatico-duodenalis a Zwölffingerdarme mit dem 1sten Aste der A. mesenterica superior, die Äste der A. mesenterica sup. aber unter einander, und die A. colica media derselben mit der Colica sinistra aus der A. mesenterica inferior, endlich alle Äste der A. mesenterica inf. unter einander, dem Bogen zusammenhängen, so giebt es längs der Gedärme eine Reihe von Bogen, die ununterbrochen unter einander zusammenhängen. Dieser Zusammenhang durch Bogen scheint hier den Zweck zu haben, daß alle Abschnitten des Darmcanals successiv von den benachbarten Stellen mit Blut zugeführt werden kann.

Arteriae renales ¹⁾, die Nierenarterien ²⁾.

Ihre Zahl, der Ort ihres Ursprungs aus der Aorta und ihre Vertheilung sind veränderlich. Gemeinlich sind ihrer 2, eine rechte und

¹⁾ Sie heißen auch Arteriae emulgentes, von emulgere sc. urinam, nach einer alten Vorstellung.

²⁾ Die Nierenpulsadern bieten rücksichtlich der Zahl, des Ursprungs und der Vertheilung viele Verschiedenheiten dar, das man beinahe häufiger in irgend einer Beziehung den abnormen, als in allen Beziehungen den normalen Zustand beobachtet. Fälle der Art findet man aufgezeichnet bei *Eustachius* (Tab. anat. Tab. III. fig. 1. 2. 3. Tab. XII. A. 9. 10.), *Boehmer* (exerc. acad. praef. p. 11. resp. *Meuser* Diss. de urinase et excretionibus multitudinem arteriarum largiore. Halae 1763. 4.), *Hall* (Elem. physiol. VII. p. 260. Icon. anat. fasc. III. p. 52.), *Wecel*, *Handb. d. Anat.* 3. 227. ff. *Path. Anat.* 2. Bd. 2. Abthl. S. 114. Icon. anat. path. Tab. X. fig. 4 und 5.), *Otto* (*pathol. Anat.* 1. Bd. S. 310.) u. s. w.

¹⁾ Die Zahl derselben ist sehr häufig größer. Den Uebergang zu dieser Anzahl macht die sehr frühe Theilung der einfachen Nierenpulsader in ihre Äste, die oft auf der einen Seite Statt findet, während auf der anderen schon ein wirkliches Zerfallen beobachtet wird.

Was die Zahl der Arterien selbst anlangt, so variiert diese von 2 bis 5. Zu findet man sehr oft.

Drei Arterien fand *J. B. Wecel* (*path. Anat.* 1. c. p. 114.) häufig: so bei einem Weibe auf der linken Seite; auf der rechten war bloß eine, umgekehrt bei einem Knaben auf der rechten Seite 3, auf der linken nur eine.

Heister (*obs. miscell. med. vid. Halleri coll. Diss. anat.* VI. 725.) sah deren 4 auf der linken Seite in einem 3jährigen Knaben, und auch *Wecel* (*l. c. path. Anat.*) führt mehrere Fälle der Art an, ja in einem Falle, den *Otto* (*sch. Beob.* I. 101.) sah, spalteten sie sich gleich nach ihrem Ursprunge aus der Aorta in viele Äste.

Was nun die Stelle des Ursprungs und den Verlauf der vervielfachten Nierenarterien anlangt, so sind hierüber die Bemerkungen *Wecel's* (*pathol. Anat.* 1. c. 118 ff. *Handb. d. menschl. Anat.* 3. III. p. 227. sq.) nachzusehen.

²⁾ Den Ursprung der Nierenarterien anlangend, so entspringen sie nicht immer seitlich aus der Aorta, denn *Portal* *J. B.* (*Cours d'anatom. médicale.* Tom. III. p. 290.) sah sie mit einem gemeinschaftlichen Stamme aus der vorderen Fläche der Aorta in der Nähe der obern Gefäßarterie entstehen.

Häufig, auch namentlich bei angeborener abweichender Lage der Nieren, entspringen ihre Arterien unregelmäßig, *J. B.* tiefer unten aus der Aorta, aus der Iliaca communis

die rechte, eine linke für die linke Niere. In einigen Körpern sind jedoch an einer oder an beiden Seiten 2, seltener 3, noch seltener 4. Je mehr ihrer sind, desto dünner sind sie.

Sie entspringen zu beiden Seiten der Aorta, gemeiniglich in der Gegend der obern Bauchwirbel, wenig tiefer als die Arteria mesenterica superior, oder neben derselben. Selten entspringen sie viel tiefer, in der Gegend der untersten Bauchwirbel, oder gar eine aus der Arteria hypogastrica. Wenn 2 oder mehrere da sind, so entspringt die 2te tiefer als die erste.

Die linke geht zwar gemeiniglich ein wenig abwärts, indessen weichen doch beide unter einem Winkel ab, der wenig kleiner als ein rechter ist. Je tiefer aber eine Arteria renalis entspringt, desto weniger geht sie abwärts; wenn sie tiefer entspringt als der Hilus ihrer Niere, so geht sie aufwärts, und dann unter einem stumpfen Winkel von der Aorta ab.

Wegen der Lage der Aorta nach der linken Seite, ist die rechte Nierenarterie länger, die linke kürzer. Die rechte geht hinter der Vena cava inferior vorbei. Die Nierenarterien sind nach Verhältniß der Größe der Nieren von ansehnlicher Weite.

Jede Arteria renalis giebt, indem sie zu ihrer Niere fortgeht, einen oder den andern dünnen Ast (Arteria adiposa) zum Fette ihrer Niere, einen dünnen Ast (Arteria suprarenalis) zu der ihr benachbarten Nebenniere, in einigen Körpern auch einen dünnen Ast zur Pars lumbaris des Zwerchfells. Zuweilen kommt auch eine oder die andere Arteria spermatica aus der Arteria renalis, und die linke giebt bisweilen Aestchen zum Pankreas.

Jede Arteria renalis theilt sich näher an der Niere, oder entfernter von derselben, in 2, 3, oder mehrere Aeste, die dann durch den Hilus in die Niere hineintreten.

Arteriae spermaticae internae, die Samenarterien 1).

Sie sind sehr dünn und zugleich von ansehnlicher Länge.

Sie entspringen meist aus der Aorta selbst, gemeiniglich in der Ge-

gend der Hypogastrica und selbst der Sacralis media, wie Otto (path. Anat. I. 512. No. 7.) beobachtete, einmal auf der rechten und einmal auf der linken Seite. Auch sah er einmal für die linke tiefergelegene Niere eine Arterie aus der rechten gemeinschaftlichen Hüftarterie ihren Ursprung nehmen. Eben so variiert die Vertheilung derselben, indem die Aeste oft an andern Stellen als am Hilus renalis in die Niere eindringen.

1) Sie zeigen in Ursprung und Zahl häufige Abweichungen. Meist sind ihrer 2, die aus der Aorta kommen, oder eine, die sich bald theilt. Nicht selten entspringt eine höher als die andere, bald die linke, bald die rechte.

Oft kommt eine aus der Nierenarterie, oder Nebennierenpulsader (Hall. icon. anat. fasc. III. p. 60.), oder gar aus der Beckenpulsader (Mayer, Beschreibung d. Blutgef. 180.), die andre aus der Aorta.

Bisweilen sind sie auf einer oder der andern Seite doppelt. (Hall. l. c. Morgagni, de sed. II. p. 348. Hunter, med. comment. p. 76. Pohl, obs. aniol. p. 12. Nicolai, de direct. vasor. §. 13. Huber, obs. anat. vid. Hall. anat. Diss. Vol. I. p. 307. Otto, seltne Beob. I. S. 101.)

Sie waren in 2 Fällen auf beiden Seiten doppelt. In einem Falle stieg die linke, die viel weiter unten aus der Aorta kam, in die Höhe, und lief zwischen den beiden Verzweigungen der Samen- und Nierenvene wie durch eine Schlinge herab. (Otto, seltne Beob. I. 101. ff.)

240 Art. spermaticae internae. Art. suprarenales.

gend zwischen der Arteria mesenterica superior und inferior, höher oder tiefer, doch öfter höher, nicht weit von den renalibus, von der vordern Seite derselben, und gehen, indem sie schräg abwärts und auswärts gehen, von ihr unter einem spitzigen Winkel ab. Seiten entspringt eine tiefer als die A. mesenterica inferior, oder gar eine aus der A. hypogastrica. Meistens entspringen sie nicht weit von einander, oft jedoch die eine etwas tiefer als die andere.

In manchen Fällen entspringen eine, oder beide, aus der Arteria renalis ihrer Seite; selten aus einer suprarenalis aortica.

Jede Arteria spermatica geht dicht an der auswendigen Fläche der Bauchhaut, vor dem Psoas und dem Ureter, unten vor dem Vasis iliaticis, geschlängelt hinab, und tritt mit der Vena spermatica vor dem Psoas in den Funiculus spermaticus zusammen. Unten giebt sie kleine unbeständige Aeste zur Nebenniere, zum Nierenfette, zum Harn gange, zur Bauchhaut; die rechte auch zur Leber. Aus jeder kommt gemeinlich eine Arterie, welche unter der Niere auswärts geht, dann am äußern Rande der Niere sich aufwärts krümmt, so daß sie die Niere umzingelt, und sich in dem die Niere umgebenden Zellgewebe vertheilt.

Im männlichen Körper geht jede Arteria spermatica auswärts und vorwärts zum Bauchringe ihrer Seite hinab, tritt durch denselben in die Scheidenhaut des Samenstrangs, und geht in dieser zum Hodensacke hinab.

Im weiblichen Körper bleiben die Arteriae spermaticae in der Bauchhöhle; jede Arteria spermatica geht nämlich mit der Vena spermatica u. zum breiten Mutterbande ihrer Seite hinab, in demselben zum Ovarium, und vertheilt sich theils in diesem, theils in der Gebärmutter und der Trompete.

Bisweilen findet man an einer oder an beiden Seiten eine Arteria spermatica interna secundaria, die aus der Aorta selbst, oder der A. renalis, oder aus der A. suprarenalis entsteht. Der Fortgang derselben ist im Ganzen dem der A. primaria gleich.

Arteriae suprarenales, die Nebennierenarterien.

Zu den Nebennieren, welche aus den Arteriis phrenicis und aus den renalibus Aeste erhalten, kommen gemeinlich auch dünne Schläge, abern aus der Aorta selbst, die man zum Unterschiede von jenen, Arteriae suprarenales aorticae nennt.

Bisweilen erhalten auch die Harngänge, welche aus den Arteriis renalibus, spermaticis, hypogastricis Aeste erhalten, eine und die andere dünne Arteria ureterica aus der Aorta. Auch die Fascia renalis erhält in manchen Fällen dünne Aeste aus der Aorta selbst.

Ein Paar ältere Schriften über diese Gefäße sind:

Cromwell Mortimer, an account of some uncommon anastomoses of the spermatic vessels in a woman. In Philos. transact. Vol. XXXVI. 1729. p. 373.

George Martin, reflections and observations on the seminal blood-vessels. Med. essays and observ. by a Soc. in Edinb. Vol. III. Pt. I. p. 227.

Endzweige der Aorta.

Die Aorta endigt sich an der vordern Fläche des Körpers des vierten Bauchwirbels, indem sie sich in einen dünnen, in der Richtung, welche die Aorta hatte, fortlaufenden und in 2 dicke Äste theilt, die von einander unter einem spitzigen Winkel abweichen und schräg vorwärts und abwärts herabgehen. Im weiblichen Körper ist der Winkel wegen des breiteren Beckens ein wenig größer als im männlichen Körper.

Arteria sacra media, die mittlere Kreuzbeinarterie.

Die Arteria sacra media ist ein unpaarer dünner Ast der Aorta, der rechte, welchen sie giebt, indem sie sich in die beiden Arterias iliacas theilt. Sie entspringt nämlich sehr nahe am Theilungswinkel der Aorta, aber im Theilungswinkel selbst, von der hintern Seite derselben vor dem vierten Bauchwirbel, und geht in der Mitte der vordern Fläche des heiligen Beckens gerade herab, giebt zu beiden Seiten Ramos laterales, welche sich mit den A. sacris lateralibus verbinden, und endiget sich unten im Schließmuskel des Afters.

Arteriae iliacae, die Hüftschlagadern ¹⁾.

Jede Arteria iliaca geht vor und neben dem Psoas ihrer Seite ab, gegen das Ligamentum Fallopii zu. Die linke legt sich alsbald an die äußere Seite der linken Vena iliaca; die rechte bedeckt vorn den Anfang der Vena cava inferior, in welchem die beiden Venae iliacae zusammentreffen, und den obern Theil der linken Vena iliaca, und liegt dann anfangs an der innern Seite der rechten Vena iliaca. Ungefähr in der Mitte des Weges vom 4ten Bauchwirbel bis zum Ligamentum Fallopii theilt sie sich in ihre beiden Hauptäste. Bis hierher heißt sie A. iliaca communis, und giebt nur unbedeutliche Ästchen zur Bauchhaut zum Harn gange, und zum Psoas.

I) Arteria iliaca interna oder hypogastrica, die Beckenarterie, welche einwärts abweicht und dem Becken bestimmt ist.

II) Arteria iliaca externa oder cruralis s. femoralis, die Schen-

¹⁾ In einer Missgeburt mit Sirenenbildung sah Otto (seiner Beob. 1. Hft. S. 100.) das untere Ende der Aorta die Wirbelsäule verlassen, nach vorn und vor der Gebärmutter und Harablässe herablaufen, und sich hier erst in die Iliacas theilen, die sich in der einzigen Untere Extremität vertheilten. Kurz vor ihrem Ende entsprang aus der Aorta selbst die linke einzig vorhandene Nabelarterie.

Bisweilen theilt sie sich ungewöhnlich hoch in die beiden Hüftschlagadern, die, ehe sie selbst wieder in die 2 untergeordneten Hauptäste zerfallen, durch einen Queraast unter einander verbunden werden. (Petsche, syll. obs. anat. in Halleri Diss. anat. VI. p. 781.)

242 Arteria hypogastrica. Ihre Aeste: die A. iliolumbal

telarterie, welche fast in der Richtung des Stammes weiter fortg und größtentheils dem Beine ihrer Seite bestimmt ist.

Beide Aeste sind im Erwachsenen fast von gleicher Dicke, ist die cruralis etwas dicker. Im Embryo hingegen ist die hypogastrica dicker, weil dann die A. umbilicalis noch offen ist.

Arteria hypogastrica, die Beckenschlagader.

Die Arteria hypogastrica geht schräg einwärts rückwärts in Beckenhöhle hinab, und zwar geht die linke, weil die linke A. ili communis an der äußern Seite der linken Vena iliaca liegt, diese einwärts hinüber.

Sie vertheilt sich im Becken in folgende Aeste, die hinsichtlich ihrer oft gemeinschaftlichen Ursprungs und der Ordnung, in welcher sie stehen, viele Verschiedenheiten zeigen. Sie sind die:

1) Arteria iliolumbalis, 2) sacra lateralis, 3) obturatoria, 4) iliaca posterior, 5) ischiadica, 6) pudenda interna, 7) umbilicalis.

1. Arteria iliolumbalis oder iliaca anterior, die Hüfttendenarterie ¹⁾.

Sie entspringt aus der A. hypogastrica unweit des Ursprungs derselben, selten aus der A. iliaca communis, oder aus der Cruralis, oder der Iliaca posterior.

Sie geht hinter dem Psoas, zwischen dem letzten Bauchwirbel und dem heiligen Beine auswärts, giebt einen Ramus ascendens zum Musculus quadratus lumborum, zum Psoas etc., der mit den unteren Arterien lumbaribus Gemeinschaft hat, und theilt sich dann in einen oberflächlichen und in einen tiefen Zweig.

Jener geht an der innern Fläche des Darmbeins, unweit der Crista, auf dem M. iliacus internus auswärts, und dann vorwärts giebt unterwegs Aeste dem M. quadratus lumborum, dem Psoas, dem M. M. transversus, dem M. M. obliquus abdominis und dem iliacus internus. Sein Ende ist mit der A. circumflexa Ilii Gemeinschaft.

Dieser geht, bedeckt vom Musculus iliacus internus, auf die innere Fläche des Darmbeins, giebt Aeste dem Muskel, dem Darmbein Arterias nutritias, unter denen gemeiniglich eine durch ihre Dicke sich auszeichnet, welche in das große Foramen nutritium geht.

¹⁾ Zuweilen entspringt sie, wie Liedemann (expl. Tab. art. p. 246.) anführt, aus der gemeinschaftlichen Hüfttendenarterie, oder aus der Schenkelarterie, oder aus der Cruralis; selten aus der alten Leisten- oder endlich aus der mittleren Kreuzbeinarterie. Oft sind 2 kleine Hüfttendenarterien vorhanden.

2. Arteria sacra lateralis 1).

Sie entspringt aus der A. hypogastrica, selten aus der Iliaca posterior oder der Iliolumbalis.

Sie geht an der vordern Fläche des heiligen Beins, parallel mit der A. sacra media und mit der Sacra lateralis der andern Seite, neben den Foraminibus sacralibus anterioribus herab, und giebt theils Zweige, welche sich auf der vordern Fläche des heiligen Beins vertheilen, und mit den Seitenzweigen der A. sacra media anastomosiren, dann Zweige zum Rückgrate, welche durch die Foramina sacralia anteriora in den Canal des heiligen Beins zur Cauda equina u. gehen, und endlich Rückenzweige, welche rückwärts durch die Foramina sacralia posteriora hinausgehen und sich an der hintern Fläche des heiligen Beines vertheilen.

3. Arteria obturatoria 2).

Sie entspringt in der Regel aus der Arteria hypogastrica, oder aus dem Aste derselben, indessen, wie in der Note ausführlicher gezeigt wor-

¹⁾ Sehr oft sind 2 zugegen, von denen die eine aus der Beckenpulsader, die andere aus der Gefäß-, Hüftenden- oder Sigbeinpulsader kommt. (Hildebrandt und Tiedemann, expl. tab. art. p. 248.)

Nicht selten entspringt sie aus der Hüftpulsader. (Tiedemann, expl. Tab. art. p. 296.)

²⁾ Die Kenntniß der bei ihr vorkommenden Abweichungen ist von großer Wichtigkeit bei den in der Praxis so oft vorkommenden Bruchoperationen. Meist entspringt sie aus der Beckenpulsader, entweder unmittelbar aus dem vorderen oder hinteren Stamme, oder aus einem ihrer Aeste, aus der Gefäß-, Hüftenden-, Hüft- oder gemeinschaftlichen Schaampulsader.

Sehr oft entspringt sie aus der Art. epigastrica, oder bildet mit derselben ein gemeinschaftliches Stämmchen. Die Länge desselben ist 2 Linien bis $1\frac{1}{2}$ Zoll. Haller (Icon. fasc. 4. p. 32 not. 9.) sah dies 9mal, und wohl die meisten neueren Anatomen.

S. Cloquet (l. c.) sah sie unter 250 Leichen 56mal zu beiden Seiten aus der Epigastrica entspringen, 21 mal in Männern, 35 mal in Weibern. In 28 Körpern entsprang sie auf der einen Seite aus der Beckenpulsader, und auf der andern aus der Epigastrica.

H. K. Hesselbach (l. c. S. 26. und Bericht von der Königl. anatomischen Anstalt zu Würzburg, Studienjahr 1818 bis 1819, 8.) sah diesen Ursprung unter 32 Leichen 9mal an der rechten, und 10mal an der linken Seite. Unter 157 Leichen, welche von ihm im Jahre 1819 in dieser Hinsicht untersucht wurden, kam der gefährliche Verlauf des Stammes der A. obturatoria oder eines Astes mit der A. epigastrica verbindenden Querszweigs an dem vorderen Rande der Lücke für die Schenkelgefäße 8mal vor.

In sehr seltenen Fällen wird sie durch die Vereinigung von einem Aste der Hypogastrica und einem großen Aste der Epigastrica gebildet. Diese Anordnung beschreibt Portal (anat. méd. III. 322.), und Hesselbach (l. c.) hat sie dreimal beobachtet und abgebildet (Taf. 3.).

Hiisweilen kommt sie aber aus der äußeren Hüft- oder Schenkelschlagader. Diesen Ursprung sah Tiedemann (expl. tab. art. p. 288.) an der linken Seite eines Mannes von 30 Jahren, während die rechte aus der unteren Bauchdeckenader entsprang. Er beobachtete denselben Fall in einer Frau von 40 Jahren auf beiden Seiten, und in einem Knaben auf der rechten Seite. Otto (seltn. Beob. I. 102.) sah sie auch aus

244 Art. hypogastrica. Ihre Aeste d. A. iliaca posterior.

den, auch sehr oft (zugleich mit der A. epigastrica) aus der A. cruralis. Im ersteren Falle krümmt sie sich abwärts, vorwärts und einwärts zum obern äußern Winkel des Foramen ovale des Beckens giebt gemeinlich einen oder 2 Aeste zur Harnblase, Aeste zur Prostata zum Levator ani, zum Obturator internus, und einen Ast, der an der hintern Fläche des Schambeins einwärts gehend mit dem von der andern Seite zusammenkommt. Dann giebt sie dünne Aeste zur Membrana obturatrix, tritt durch den Ausschnitt des Foramen ovale heraus, und vertheilt ihre Aeste zum Obturator externus, zum Schenkelgelenke; zum M. pectinaeus, zu den Adductoribus, indem sie mit der A. circumflexa interna femoris Gemeinschaft hat.

4. Arteria iliaca posterior s. glutaea superior, die Gefäßschlagader.

Sie ist der dickste Ast der Arteria hypogastrica, welcher bisweilen einen oder mehrere der Aeste giebt, die der Regel nach unmittelbar aus der A. hypogastrica entspringen.

Sie geht rückwärts, durch den obern Theil der Incisura ischiadica, unter dem M. glutaesus medius, über dem M. pyriformis mit dem Nervus ischiadicus, von dessen beiden Wurzeln sie umfaßt wird, zum Becken hinaus.

Im Durchgange giebt sie dem untern Theile der innern Fläche des Darmbeins eine oder mehrere Arterias nutritias.

Wenn sie zwischen dem M. glutaesus medius und dem M. pyriformis hinten herauskommt, so giebt sie kleine Aeste einwärts an die hintere Fläche des heiligen Beins, kleine Aeste auswärts zu den unteren Enden der M. M. glutaeorum und zum hinteren Theile des Schenkelgelenkes, und theilt sich dann in 2 Aeste, von welchen sich der oberflächliche zu den M. M. glutaesis und dem pyriformis vertheilt, der tiefe aber einen Ast an die äußere Oberfläche des Darmbeins zu

der Cruralis entspringen, und unter dem Gallopischen Bande durch in die Beckenhöhle bringen; ein bei Operation des Schenkelbruchs sehr gefährlicher Lauf.

Den ungewöhnlichen Ursprung aus der äußeren Hüft- oder Schenkelgelenkader innerhalb des Beckens sahen *Licoutaud* (anat. méd. 496.), *Sömmering* (Gefäßlehre 272.), *Monro* (morbid anatomy of the human gullet, stomach and intestines. Edinb. 1811. p. 430.), *Burns* (Herkunft. 553.).

J. Cloquet (rech. anat. sur les hernies de l'abdomen. Par. 1817.) sah ihn unter 250 Leichen in 2 Männern und 4 Weibern wahr.

J. K. Hesselbach (über den Ursprung und Verlauf der unteren Bauchdeckschlagader und der Hüftbeinlochschlagader mit G. K. E. Hamb. 1819. 4.) sah ihn unter 32 Körpern in dreien.

Selten entspringt sie aus der Iliaca externa außerhalb des Beckens unter dem Poupartischen Bande. Dieser Abweichung erwähnt *Monro* (morbid anat. of the human gullet etc. p. 430.), ferner sahen sie *Burns* (Herkunft. 559.) und *Otto* (festne Beob. 1. Heft. 102.); *Kiedemann* (l. c. p. 288.) fand sie einmal in einem weiblichen Körper.

M. glutaeus medius und minimus, und einen andern in die Gegend des großen Trochanter schickt, wo er sich theils im M. glutaeus minimus vertheilt, theils die sogenannte Arteria profundissima ilii giebt, welche zwischen der äußeren Fläche des Darmbeins und dem M. glutaeus minimus vorwärts geht, und mit der A. circumflexa externa femoris Gemeinschaft hat.

5. Arteria ischiadica s. glutaea inferior, die Sitzbeinschlagader.

Sie ist einer der dicksten Aeste der A. hypogastrica, entspringt bald besonders, bald mit der A. iliaca posterior gemeinschaftlich.

Sie geht im hintern Theile des Beckens abwärts, giebt meist einen Ramus vesicalis zur Harnblase, kleine Aeste zum Mastdarme, und geht dann unter dem M. pyriformis, über dem Ligamentum spinosum ruckwärts zum Becken hinaus.

Sie giebt dann aufwärts Aeste zu den M. M. glutaeis, abwärts zu den M. M. geminis, dem Quadratus femoris, dem Obturator internus und dem Anheftungsteile der Muskeln, die vom Tuber ossis Ischii zum Schenkel hinabgehen, z. B. zum Biceps, Semitendinosus und Semimembranosus. Am Steißbeine geht sie einwärts die Arteria coccygea, welche einwärts zum Schließmuskel des After und zum anliegenden Zellgewebe geht.

6. Arteria pudenda interna s. pudenda communis, die innere Schampulsader ¹⁾.

Diese und die beiden vorigen Aeste sind im Erwachsenen die dicksten Aeste der Arteria hypogastrica. Sie kommt sehr oft mit der A. ischiadica aus einem gemeinschaftlichen Stamme.

Die A. pudenda interna, oder der gemeinschaftliche Stamm derselben und der A. ischiadica, ist im Erwachsenen als die Fortsetzung und das Ende des Stammes der Arteria hypogastrica anzusehen. Noch innerhalb des Beckens entspringen oft von ihr eine oder 2 Blasenarterien, die A. haemorrhoidalis media und die Gebärmutter oder Scheidenarterie. Hierauf geht sie unter dem M. pyriformis durch die Incisura ischiadica major zum Becken hinten heraus, dann durch die Incisura ischiadica minor und zwischen dem Ligamentum spinosum und tuberoso-sacrum zu derjenigen Abtheilung des kleinen

¹⁾ Zuweilen tritt ihr Hauptstamm nicht zwischen den untern Beckenbändern heraus, sondern verläuft längs der Harnblase und Vorsteherdrüse, oder selbst durch diese zum männlichen Gliede, und ist somit beim Steinschnitte äußerst gefährdet.

Es kommt aber diese Varietät so häufig vor, daß schon Vesal und andere ältere Anatomen sie für die Norm ansahen. Burns (Herzlin, S. 350.) machte zuerst auf die Gefahr ihrer Verletzung beim Steinschnitt der Männer aufmerksam, Liedemann (tab. XVI. XXX. fig. 2.) bildet sie ab; Shaw verlor wegen dieser Anomalie einen am Stein Operirten durch Verblutung. (Magaz. d. anal. Lit. d. gef. Heilf. XI. S. 349.)

Beckens hin, welche unter dem Levator ani befindlich ist. Hier liegt sie an der innern Seite des Sigbeins und des Schambeins, und giebt gemeiniglich die Arterias haemorrhoidales externas zum Ende des Mastdarms.

Die Arteria haemorrhoidalis media, die mittlere Mastdarmschlagader ¹⁾, kommt zwar, wie gesagt, gemeiniglich aus der A. pudenda interna, indessen entsteht sie bisweilen auch aus dem gemeinschaftlichen Stamme der A. pudenda interna ischiadica, oder aus der Sacra lateralis, oder aus der umbilicalis.

Sie giebt ihre meisten Aeste dem Mastdarme, welche mit der A. haemorrhoidalis interna und externa Gemeinschaft haben; auch Ramos vesicales zum untern Theile der Harnblase; in Männern kleine Aeste zur Prostata, zum Samenbläschen; in Weibern Aeste zur Mutterseide.

Die Arteria vesicalis infima entspringt in einigen Körpern aus der A. pudenda interna, in andern aus der obturatoria, oder aus der umbilicalis.

Sie giebt ihre Aeste dem untersten Theile der Harnblase, in Männern auch kleine Aeste den Samenbläschen, dem Samengange, der Prostata und der Harnröhre.

Im männlichen Körper theilt sich endlich die Arteria pudenda interna vor dem Schließmuskel des Afters bei dem M. transversus perinaei in 2 Aeste.

a) Arteria perinaei, Mittelfleischpulsader. Diese geht an der Haut des Perinaei vorwärts, parallel mit der von der andern Seite giebt Aeste den M. M. transversis, dem Accelerator, dem Sustentator, der Haut des Perinaeum, und geht als Arteria scrotalis posterior zu dem hintern Theile des Hodensackes.

b) Arteria penis, Ruthenschlagader. Diese ist dicker; sie geht, bedeckt von den M. M. transversis, zwischen dem Accelerator und dem Sustentator, dann zwischen diesem und dem Corpus cavernosum penis gegen das männliche Glied vorwärts, und unter der Synchondrosis pubis durch, giebt kleine Aeste zu den M. M. transversis, zum Accelerator, zum Sustentator, zur Prostata, und einen ansehnlichen Ast, oder Ast zum Corpus cavernosum urethrae. Sie theilt sich hierauf in 2 Aeste:

Die Arteria dorsalis penis ²⁾ geht auf dem Rücken des Gliedes neben der Vena dorsalis bis zur Eichel fort, giebt viele Aeste in die Fell des Gliedes, und endiget sich in der Eichel mit vielen Aesten. Beide Arteriae dorsales penis gehen parallel, so daß sie die Venen

¹⁾ Bisweilen kommt sie als ein besonderer Ast aus dem Stamme der Beckenpulsader oder aus der Sigbeinpulsader (Ziedemann expl. tab. art. p. 248, 256.), oder aus der seitlichen Heiligbein-Schlagader.

²⁾ Ziedemann (expl. tab. art. p. 314. sq.) sah sie aus der gemeinschaftlichen Schenkeladern an der rechten Seite eines 36jährigen Mannes entspringen. (Taf. 30. fig. 2. Einen diesem ähnlichen Fall bildet er Taf. 33. fig. 1. ab.

Ein andermal entsprang sie aus der ersten äußeren Schampulsader in einem 44 jährigen Manne und in einem Knaben (ebendas.).

Auch sah er in einem 18jährigen Mädchen die Ripsterpulsader auf gleiche Weise aus dem Becken unter den Schambeinen hervortreten. Burns (Herschlin. S. 350. fand diesen Verlauf auch in Männern. Die älteren Anatomen, Vesal, Walderdi, Entwius, Bauhin, Bestling, Hignior, Winslow u. s. w. haben diese Arterien als die Regel beschrieben.

groischen sich haben, und geschlängelt, um bei der Erektion nachgeben zu können.

Die Arteria profunda penis geht mitten in ihrem Corpus cavernosum geschlängelt vorwärts bis zum Ende desselben, und giebt viele Seitenäste zu den Zellen desselben.

Auch im weiblichen Körper theilt sich die Arteria pudenda interna abendasselbst in 2 Äste.

a) Arteria perinaei. Diese geht an der Haut des Perinaeum vorwärts, zum Labium vulvae ihrer Seite, vertheilt sich zur Haut des Perinaeum, des Labium vulvae, der Nymphe, und zum Constrictor vulvae, bis zur Klitoris hin.

b) Arteria clitoridea. Diese geht am unteren Theile der Mutterscheide vorwärts zur Klitoris, giebt Äste der Mutterscheide, den Muskeln, der Klitoris, und vertheilt sich dann mit einem Ramus dorsalis und einem Ramus profundus in der Klitoris eben so, wie die Arteria penis im männlichen Gliede. Sie ist aber viel kleiner als diese, weil die Klitoris viel kleiner ist als das männliche Glied.

In einigen Körpern geht die Arteria pudenda interna erst als Arteria perinaei weiter vorwärts, und giebt dann die A. clitoridea.

7. Arteria umbilicalis, Nabelschlagader ¹⁾.

Sie kommt aus der Arteria hypogastrica, ehe sie die ischiadica und die pudenda, bisweilen auch ehe sie die iliaca posterior und die Obturatoria abgegeben hat. Sie krümmt sich beim Embryo neben der Harnblase, bedeckt von der Bauchhaut hinauf, steigt dann hinten an der vorderen Wand des Bauchs einwärts zum Nabel in die Höhe, und convergirt mit der von der andern Seite so, daß endlich beide Arteriae umbilicales am Nabel dicht zusammen liegen. Beim Embryo sind beide Arteriae umbilicales offen, und gehen durch den Nabel im Nabelstrange zum Mutterkuchen. Diese Arterien sind die dicksten Äste der A. hypogastrica,

¹⁾ Nach Otto (setne Beob. I. 102.) war sie zweimal bei Erwachsenen, obgleich oberhalb der Blase verschlossen, dick und rund bis zum Nabel, und verlief nicht dicht an der Bauchwand, sondern über $\frac{1}{2}$ Zoll von ihr entfernt, nur durch eine breite Falte des Bauchfells mit ihr verbunden. Dasselbe beobachtete auch Reich (Weite, 3. path. Anat. S. 60. No. 47.).

Manchmal fehlt sie, auch bei normalen Kindern, auf einer Seite ganz, wozu als Beleg Otto (path. Anat. I. 312. No. 8.) eine große Zahl von Citaten anführt.

Zuweilen nimmt sie aber auch einen ungewöhnlichen Ursprung, z. B. sie entsteht aus der Iliaca (Breschet, in Repert. T. II. p. 471.), oder aus der Aorta (Hottlinger misc. nat. cur. Dec. III. an. 9. obs. 233.). Andre Citate für diesen Ursprung führt noch Otto (path. Anat. I. S. 312. No. 9.) an.

Dit bildet sie einen gemeinschaftlichen Stamm mit der Nabelpulsader oder mit der mittleren Mastdarmschlagader (Liedem. expl. tab. art. p. 256.).

248 Art. hypogastrica. Ihr Ast b. A. pudenda interna.

und als die Fortsetzung derselben anzusehen. Die anderen Äste der A. hypogastrica sind beim Embryo um sehr viel kleiner.

Nach der Geburt aber wird der Canal der A. A. umbilicalium zuerst am Nabel, und dann allmählig ganz bis zu ihrem Anfangstheile geschlossen. Sie wachsen dann auch nach Verhältniß weniger in der Dicke, sind daher im Erwachsenen nur Stränge, welche nicht mehr hohl, und viel dünner sind als die Arteriae umbilicales im Embryo waren.

Nur der Anfangstheil jeder Arteria umbilicalis, an dem Stamme der A. hypogastrica bleibt offen, und aus diesem kommen Arteriae vesicales, einige Äste zum Mastdarme, in Weibern auch oft die Arteria uterina, und eine vaginalis.

a. Arteriae vesicales, Blasen Schlagadern ¹⁾.

Die Arteriae vesicales, welche aus dem Anfangstheile der A. umbilicalis entspringen, und deren 2 oder 3 sind, gehen aufwärts an den Seitentheil der Harnblase, die eine meistens tiefer, oder 2 höher oben, und vertheilen sich an derselben.

Diese und die übrigen A. A. vesicales geben Äste in das erste, und dann zwischen den Fleischfasern in das zweite Zellgewebe der Harnblase, und verbinden sich daselbst netzförmig mit einander und mit denen der anderen Seite. Eine Menge feiner Ästchen bringt in die eigentliche Haut und bis zur inwendigen Haut.

b. Arteria uterina, die Gebärmutter Schlagader.

Die Arteria uterina entspringt aus dem Anfangstheile der Arteria umbilicalis, giebt der Harnblase noch einen oder 2 Äste, und tritt geschlängelt an den unteren Theil ihrer Seite der Mutter hinauf. Sie giebt absteigende Äste zum Mutterhalse und zum oberen Theile der Scheide, und aufsteigende Äste, welche zwischen den Platten des breiten Mutterbandes zum Seitentheile des Körpers der Mutter hinaufsteigen, und sowohl der vordern als der hinteren Wand der Mutter geschlängelte Äste geben. Ihre Äste haben Gemeinschaft mit den von der anderen Seite; die oberen auch mit den A. A. spermaticis, und gehen zum Theil nach der Trompete hin.

Eine besondere Arteria vaginalis entspringt in einigen weiblichen Körpern aus dem Anfangstheile der A. umbilicalis, in anderen aus der A. uterina, in anderen aus der A. haemorrhoidalis media.

¹⁾ Sehr oft kommt die unterste aus dem vorderen Stamme der Beckenpulsader, oder aus der gemeinschaftlichen Schenkelpulsader, oder aus der Sipbeinarterie, oder endlich aus der mittleren Mastdarpulsader. (Lied e m. expl. tab. art. p. 248.)

Sobald sie unter dem Bunde durchgekommen ist, giebt sie bisweilen auch die Arteria epigastrica superficialis oder cutanea abdominalis, welche zwischen der Haut und dem M. obliquus externus hinaufgeht und zu den Bauchmuskeln und zur Haut des Bauchs in der Gegend des Bauchringes sich vertheilt ¹⁾, bisweilen auch die Arteria circumflexa Ilii externa, äußere Kranzschlagader der Hüfte (A. abdominalis nach Haller), welche auswärts an der äußern Fläche des Darmbeins neben der Crista fortgeht, dem obersten Theile des M. gluteus und der Haut Aeste giebt. Beide Aeste aber sind unbeständig, in einigen Körpern viel dünner und kürzer als in anderen.

Arteria pudenda externa, die äußere Schampulsader ²⁾.

Sie entspringt von der innern Seite der A. cruralis, unweit des Ligamentum Fallopii, unter oder über der A. circumflexa interna, geht einwärts, giebt Aeste den Glandulis inguinalibus, und dann im männlichen Körper dem vordern Theile des Hodensackes (A. A. scrotales anteriores), dem obern Theile des männlichen Gliedes und dem Mons Veneris; im weiblichen dem vordern Theile der Schamlefzen und dem Mons Veneris. Der Ast, welcher zum Mons Veneris geht, entspringt sehr oft aus der A. cruralis selbst, und kann dann A. pudenda externa suprema heißen. Bisweilen ist auch noch eine dünnere, tiefer entspringende A. pudenda externa inferior da.

Einen oder zwei Zoll unter dem Schenkelbogen, Ligamentum Fallopii, selten tiefer, geht der dickste Ast der A. cruralis, die A. femoris profunda ²⁾, hinten und nach innen zu ab, und an der nämlichen Stelle oder ein wenig höher entspringt die A. circumflexa femoris externa, und die A. circumflexa femoris interna ³⁾.

Diese 3 Aeste, aus denen der größte Theil der Muskeln am Oberschenkel (die Gesäßmuskeln ausgenommen) seine Aeste erhält, sind von ansehnlicher Dicke.

¹⁾ Zuweilen fand sich eine 2te Arteria abdominalis interna, welche aus der A. cruralis kam, ehe sie unter dem L. Fallopii durchgeht, und sich an der inwendigen Fläche des M. transversus eben so vertheilt, als jene (externa) an der auswendigen Fläche des obliquus externus. (Hildebrandt.)

²⁾ Einen merkwürdigen, und für die Bruchoperation höchst wichtigen, Verlauf derselben beobachtete Bonn (tab. anat. chir. doctrinam herniarum illustrantes editae a Ger. Sandifort. Lugd. Bat. 1828. Fol. p. 14. Tab. VI.). Nach ihrem Ursprunge aus der Iliaca theilte sie sich in mehrere Aeste, die zum Theil nach den Bauchwänden aufstiegen, theils aber herabsteigend sich in der Tunica dartos verästelten, und zwar gingen sie an der äußeren Seite des Bruches quer über denselben herüber, so daß also eine Verletzung derselben, wenn der Bruch sack der Länge nach eröffnet wurde, nicht zu vermeiden gewesen wäre.

³⁾ Zuweilen entspringen diese Adern auch unter dem Schenkelbogen, oder in seltenen Fällen sogar über ihm. Wenn die A. femoris profunda hoch oben entspringt, so ist sie sehr dick und die A. circumflexa femoris externa und interna sind Aeste derselben; zuweilen entspringt sogar die A. pudenda externa aus ihr. Die A. circumflexa femoris interna ist in den meisten Fällen ein Ast der A. profunda, oft ist es auch zugleich die A. circumflexa femoris externa.

Nach Liedemann kommt die hohe Theilung häufiger bei Weibern als bei Männern vor, auch bei Menschen von kleiner Statur häufiger als bei den von langer.

250 Art. cruralis. Ihr Ast d. A. circumflexa ilium.

Hierauf geht diese Arterie an der innern oder hintern Fläche t M. rectus hinauf, giebt einwärts und auswärts Aeste zu ihm und den h ten Seitenmuskeln des Bauchs, an ihrem untern Theile auch den M. pyramidal und endiget sich am obern Theile des M. rectus mit Aesten, die mit de Ramus epigastricus der A. mammaria interna Gemeinschaft haben.

An ihrem unteren Theile giebt sie einen durchbohrenden Ast, der einwärts zur Haut des Mons Veneris kommt, und andere durchbohrende Aeste zur Haut des Bauchs. In manchen weiblichen Körpern ist die Arteria spermatica externa ein Ast dieses durchbohrenden Astes, und geht dann durch den Bauchring a runden Mutterbände in die Bauchhöhle zur Mutter.

Arteria circumflexa Ilii, die Kranzschlagader des Hüft beins, oder die äußere Bauchdeckenschlagader ¹⁾).

Sie entspringt von der äußeren Seite der A. cruralis, indem sie unter dem Ligamentum Fallopii durchgeht, etwas tiefer als die A. epigastrica und geht gekrümmt vorwärts, auf dem M. iliacus unweit der Crista des Darmbeines hinauf. Sie giebt Aeste diesem Muskel, auch dem trans versus, dem obliquus internus und externus, und hat endlich Gemeinschaft mit der Arteria iliolumbalis, auch an den Bauchmuskeln mit den A. A. lumbalibus.

Nun geht die Arteria cruralis unter dem Ligamentum Fallopii durch, und liegt an der innern Seite des obern Theiles des Schenkels nach vorn her, zwischen dem M. pectinaeus und dem Psoas, wo sie bloß von der Haut und der Fascia lata bedeckt wird.

Sie geht an der innern Seite des Schenkels in der Rinne, die sie zwischen den Abductoren (pectinaeus, adductor longus) und den Streckmuskeln des Unterschenkels (vastus internus, rectus etc.) befindet hinab, und ist 3 Zoll weit vom Schenkelbogen aus nur von der Fascia von Fette, hier und da von Lymphdrüsen und von der Haut bedeckt verbirgt sich dann aber unter dem M. Sartorius, da, wo dieser in jenem erwähnten Rinne zu liegen kommt. Sie lenkt sich auf diese Weise ein wenig rückwärts, und durchbohrt am Anfange des letzten Viertels des Oberschenkelknochens die Sehne des Adductor magnus an der Linea aspera, geht an der hintern Seite des untern Endes des Schenkelknochens zwischen dem M. semitendinosus und biceps hinab, gelang auf diese Weise in die Kniekehle, und erhält den Namen A. poplitea. Die Schenkelarterie geht folglich von der Beugseite des Oberschenkelgelenks zur Beugseite des Kniegelenks.

¹⁾ Der Zweig, der nach dem Nabel in schräger Richtung aufsteigt, ist bisweilen sehr klein; in anderen Fällen hat er aber eine solche Größe, daß der Zweig, der da Ramme des Hüftbeines folgen sollte, fast ganz gegen ihn verschwindet. Dieser erst aufsteigende Zweig kann beim Bauchstich leicht verletzt werden, und einem Fall, wo er ihn begleitende Vene durch den Troikar getroffen ward, erzählt Burns (Scripsit S. 87.).

— Sobald sie unter dem Bande durchgekommen ist, giebt sie bisweilen auch die Arteria epigastrica superficialis oder cutanea abdominalis, welche zwischen der Haut und dem M. obliquus externus hinaufgeht und zu den Bauchmuskeln und zur Haut des Bauchs in der Gegend des Bauchringes sich vertheilt ¹⁾, bisweilen auch die Arteria circumflexa llii externa, äußere Kranzschlagader der Hüfte (A. abdominalis nach Haller), welche auswärts an der äußern Fläche des Darmbeins neben der Crista fortgeht, dem obersten Theile des M. glutaeus und der Haut Aeste giebt. Beide Aeste aber sind unbeständig, in einigen Körpern viel dünner und kürzer als in anderen.

Arteria pudenda externa, die äußere Schampulsader ²⁾.

Sie entspringt von der innern Seite der A. cruralis, unweit des Ligamentum Fallopii, unter oder über der A. circumflexa interna, geht einwärts, giebt Aeste den Glandulis inguinalibus, und dann im männlichen Körper dem vordern Theile des Hodensackes (A. A. scrotales anteriores), dem obern Theile des männlichen Gliedes und dem Mons Veneris; im weiblichen dem vordern Theile der Schamlefzen und dem Mons Veneris. Der Ast, welcher zum Mons Veneris geht, entspringt sehr oft aus der A. cruralis selbst, und kann dann A. pudenda externa suprema heißen. Bisweilen ist auch noch eine dünnere, tiefer entspringende A. pudenda externa inferior da.

Einen oder zwei Zoll unter dem Schenkelbogen, Ligamentum Fallopii, selten tiefer, geht der dickste Ast der A. cruralis, die A. femoris profunda ²⁾, hinten und nach innen zu ab, und an der nämlichen Stelle oder ein wenig höher entspringt die A. circumflexa femoris externa, und die A. circumflexa femoris interna ³⁾.

Diese 3 Aeste, aus denen der größte Theil der Muskeln am Oberschenkel (die Gefäßmuskeln ausgenommen) seine Aeste erhält, sind von ansehnlicher Dicke.

¹⁾ Zuweilen fand sich eine 2te Arteria abdominalis interna, welche aus der A. cruralis kam, ehe sie unter dem L. Fallopii durchgeht, und sich an der inwendigen Fläche des M. transversus eben so vertheilt, als jene (externa) an der auswendigen Fläche des obliquus externus. (Hildebrandt.)

²⁾ Einen merkwürdigen, und für die Bruchoperation höchst wichtigen, Verlauf derselben beobachtete Bonn (tab. anat. chir. doctrinam herniarum illustrantes editae a Ger. Sandisfort, Lugd. Bat. 1828, Fol. p. 14. Tab. VI.). Nach ihrem Ursprunge aus der Iliaca theilte sie sich in mehrere Aeste, die zum Theil nach den Bauchwänden aufstiegen, theils aber herabsteigend sich in der Tunica dartos verästelten, und zwar gingen sie an der äußeren Seite des Bruches quer über denselben herüber, so daß also eine Verletzung derselben, wenn der Bruchsaft der Länge nach eröffnet wurde, nicht zu vermeiden gewesen wäre.

³⁾ Zuweilen entspringen diese Aesten auch unter dem Schenkelbogen, oder in seltenen Fällen sogar über ihm. Wenn die A. femoris profunda hoch oben entspringt, so ist sie sehr dick und die A. circumflexa femoris externa und interna sind Aeste derselben; zuweilen entspringt sogar die A. pudenda externa aus ihr. Die A. circumflexa femoris interna ist in den meisten Fällen ein Ast der A. profunda, oft ist es auch zugleich die A. circumflexa femoris externa.

Nach Lichemann kommt die hohe Theilung häufiger bei Weibern als bei Männern vor, auch bei Menschen von kleiner Statur häufiger als bei den von langer.

Arteria circumflexa femoris externa, die äußere Kranzschlagader des Schenkels ¹⁾.

Die A. circumflexa externa entspringt von der äußern Seite der A. cruralis, oder der A. profunda, geht, vom M. sartorius und dem rectus bedeckt, auswärts und dann vom Tensor fasciae bedeckt rückwärts, giebt Aeste diesen Muskeln und dem Schenkelgelenke.

Arteria circumflexa femoris interna, die innere Kranzschlagader des Schenkels.

Die A. circumflexa interna entspringt von der innern hintern Seite der A. cruralis, oder der A. profunda femoris, giebt Aeste dem M. pectinaeus, dem gracilis, dem Adductor longus, und leitet sich dann, an der innern Seite des obern Theiles des Schenkelknochens, zwischen dem M. pectinaeus und der gemeinen Flechse des M. iliacus internus und Psoas, rückwärts, giebt Aeste diesen Muskeln, den Adductoribus, dem Obturator externus, dem Schenkelgelenke und dem Quadratus femoris.

Arteria femoris profunda, die tiefe Schenkelschlagader.

Die A. profunda femoris entspringt von der hintern Seite der A. cruralis, geht vor dem M. pectinaeus und dem Adductor brevis abwärts einwärts, hinter dem Adductor longus, giebt Aeste diesen Muskeln, dem gracilis, dem vastus externus, und drei, vier oder mehrere Ramos perforantes, unter denen einer oder 2 durch ihre Dicke sich auszeichnen. Diese durchbohren den Adductor magnus, nachdem sie ihm Aeste gegeben haben, und vertheilen sich dann in den hintern Muskeln des Schenkels, dem semimembranosus, semitendinosus und biceps. In einigen Körpern geht selbst der Stamm der A. profunda durch den Adductor magnus.

Wredel (path. Anat. 2. 1. S. 124.) sah diese Anordnung einmal, doch nur in unbedeutendem Grade auf der linken Seite.

Vortal (anat. mé.d. III. 239. p. 187.) sah sie einigemal, und Zagorsky (mém. de Pétersb. 1803 — 6. Métt. Aug. 1811. S. 1343.) sah einen anschaulichen Ast längs der inneren Schenkelpulsader herabsteigen, der sich in die innere Knöchelpulsader einsetzte.

Den Fall, wo sie sich innerhalb des Beckens theilt, fand Burns (Herzlytn. S. 362.) in 3 Körpern, und Liedemann (explie. tab. art. p. 322.) bei einem Weibe auf beiden Seiten.

Otto (seltene Beob. I. 102.) sah ihn mehrmals. Einigemal war die A. femoris profunda nach ihm der Hauptstamm, und beträchtlicher als die eigentliche Schenkelarterie.

¹⁾ Bei einer jungen Person entsprang sie von der äußeren Hüftarterie oberhalb des Ponspart'schen Bandes, ging dann durch das Schenkelloch zu den Muskeln am oberen Ende des Schenkels, und nahm ihren Weg längs der vorderen Seite der Scheide f. d. Krampfgefäße, so daß sie, wäre hier eine Schenkelbruchoperation nöthig gewesen, sehr wahrscheinlich verletzt worden wäre. (Burns, Herzlytn. S. 363.)

Burns (ibid.) beobachtete auch einen Fall, wo sie ein wenig unterhalb des Cruralbogens aus der Schenkelarterie entstand, und quer über die vordere Seite der gemeinschaftlichen Scheide der Vene und der lymphatischen Gefäße wegging.

Der Schenkelknochen erhält aus der Arteria profunda 2 Arterias nutritias, eine obere und eine untere.

Uebrigens sind in der Vertheilung der Aeste dieser 3 Schlagadern mancherlei Verschiedenheiten. Z. B. Rami musculares descendentes, die zum M. cruralis und vastus externus hinabgehen, kommen in einigen aus der circumflexa externa, in andern aus der profunda.

Der fortgesetzte Stamm der Arteria cruralis giebt, ehe er den Adductor magnus durchbohrt hat, Muskeläste zum M. sartorius, vastus internus, cruralis, gracilis, den Adductoribus, auch dünne Ramos perforantes durch den Adductor magnus zu den hintern Muskeln des Schenkels; und wenn er denselben durchbohrt hat, zum M. semimembranosus, semitendinosus, und zum Caput breve bicipitis.

Arteria poplitea, die Kniekehlenarterie.

Die Arteria poplitea geht hinter dem untern Ende des Schenkelknochens, zwischen den Condylis desselben, ferner hinter dem Kniegelenke, hinter dem obern Ende des Schienbeins, zwischen den Condylis desselben, und zwischen den beiden M. gastrocnemiis hinter dem M. popliteus bis zum M. soleus hinab, der sie dann von hinten bedeckt. Sie wird in diesem Fortgange von der Vena poplitea, und an ihrer äußeren Seite von dem Nervus tibialis begleitet, und ist in vielem Maße verborgen.

Sie giebt auf diesem Wege Aeste zum untern Theile des M. biceps, semitendinosus, semimembranosus, zu den obern Enden der M. gastrocnemiorum, zum M. popliteus, und vier dickere Gelenkarterien, Arterias articulares. Gewöhnlich erhält auch jeder M. gastrocnemius einen besonderen dickeren Ast.

1) Die Gelenkarterie, die über dem Knie nach innen gelegen ist, die Superior interna, entspringt von der innern Seite, geht über den Condylus internus des Schenkelbeins einwärts, und dann, bedeckt von der herabgehenden Flechse des Adductor magnus und vom M. vastus internus, vorwärts.

2) Die Gelenkarterie, die über dem Knie nach außen liegt, die Superior externa, entspringt von der äußern Seite, geht über dem Condylus externus des Schenkelbeins, bedeckt vom Caput breve des M. biceps, auswärts, und dann vorwärts.

3) Die Gelenkarterie, die unter dem Knie nach innen gelegen ist, die Inferior interna, entspringt von der innern Seite, tiefer als die Superior interna, geht unter dem Condylus internus des Schienbeins, bedeckt vom M. gastrocnemius internus, einwärts und dann vorwärts.

¹⁾ In einer männl. Leiche entsprang aus ihr ein ungewöhnlicher Ast etwa von der Dicke der Radialis, der in der Kniekehle bis zu ihrem obern Winkel, und dann weiter hinauf bis zur Mitte des Oberschenkels verlief, sich mit mehreren Aesten in dem Semitend. und Semimembr. vertheilte, und so mit den Zweigen der durchbohrenden Arterien anastomosirte. (Dito, seine Beob. II. 63.)

4) Die Gelenkarterie, die unter dem Knie nach außen gelegen ist, die Inferior externa, entspringt von der äußern Seite, tiefer als die Superior externa, geht am Condylus externus des Schienbeins, über dem obern Ende des Wadenbeins, bedeckt vom *M. gastrocnemius externus* und *plantaris*, auswärts, und dann vorwärts.

Alle diese Arteriae articulares vertheilen ihre Aeste am hintern, äußern, innern und vordern Theile des Kniegelenks, an der Kniescheibe, am untern Ende des Schenkelbeins, am obern Ende des Schienbeins und Wadenbeins, und an den Enden der Muskeln, die am Kniegelenke liegen.

Außer diesen 4 Gelenkarterien findet man zuweilen als besondere Stämme eine oberflächlich verlaufende und höher oben abgehende obere innere Gelenkarterie, und eine kleine zur Kniekehle laufende, nur einmal an jedem Fuße vorhandene Gelenkarterie. Diese Arterien sind aber sehr häufig Aeste der benachbarten Gelenkarterien.

Hinter dem obern Ende des Schienbeins, gemeinlich etwas tiefer, als der *M. popliteus* liegt, theilt sich die Arteria poplitea in 2 Aeste, deren einer, welcher zur Vorderseite des Unterschenkels geht, Arteria tibialis antica, der andere, welcher an der Hinterseite desselben bleibt, Arteria tibialis postica heißt.

1. Arteria tibialis antica, die vordere Schienbeinarterie.

Die Arteria tibialis antica geht durch eine kleine Oeffnung am obern Theile des Ligamentum interosseum zwischen dem Schienbein und Wadenbein hindurch, giebt einen Ramus recurrens, der den Anfang des *M. tibialis anticus* durchbohrt, und mit allen vier Kniekehlarterien an der vordern Seite des Knies Gemeinschaft hat, steigt nun an der vordern Seite des Unterschenkels, vor dem Ligamentum interosseum, zwischen dem *M. tibialis anticus* und dem *Extensor hallucis longus* hinab, und schickt zu beiden Seiten viele dünne Aeste zum *M. tibialis anticus*, *Extensor digitorum longus*, *Extensor hallucis longus*, *M. peronaeus longus* und *brevis*, auch zur Haut. Einige dünne Aeste kommen an der vordern innern Fläche des Schienbeins einwärts nach hinten herum, und haben mit den Aesten der *A. tibialis postica*, andere an den *M. M. peronaeis* auswärts nach hinten herum, und haben mit den Aesten der *A. peronaea* Gemeinschaft.

Am untern Ende des Schienbeins geht sie unter dem Ligamentum transversum durch, lenkt sich auf die vordere Fläche des Schienbeins, und giebt 2 Aeste.

Der äußere Ast, die vordere äußere Knöchel Schlagader, Arteria malleolaris anterior externa, geht etwas abwärts, giebt zu der Gegend des äußern Knöchels Zweige, die mit Aesten der *A. peronaea* Gemeinschaft haben, und vereinigt sich dann mit dem Ramus descendens der *A. peronaea* unter dem äußern Knöchel in einem Bogen, aus dem Aeste für den *Extensor hallucis brevis*, und den *Extensor digitorum brevis* entspringen.

Der innere Ast, die vordere innere Knöchelschlagader, Arteria malleolaris anterior interna, geht etwas abwärts, giebt Aeste zu der Gegend des innern Knöchels, die mit den Aesten der A. tibialis postica Gemeinschaft haben. Die vordere äußere Knöchelpulsader, seltener die innere, ist zuweilen ein Ast eines die Knochenhaut unten durchbohrenden Zweiges der A. peronaea.

So gelangt die A. tibialis antica, unter dem Ligamentum cruciatum durchgehend, auf den Rücken des Fußes, und giebt am hintern Theile desselben einen Ast, der einwärts, unter der Flechse des M. tibialis anticus durch, dann als A. dorsalis tibialis hallucis vorwärts geht. Dann geht sie unter dem Extensor hallucis brevis durch, und theilt sich in 2 Aeste:

Die kleinere Arteria tarsea externa, die äußere Fußrückenschlagader, geht unter dem Extensor Digitorum brevis schief auswärts vorwärts gegen das hintere Ende des 5ten Mittelfußknochens, giebt Aeste jenem Muskel und der Haut, und die Arteria dorsalis fibularis der 5ten Zehe, in einigen Körpern auch die 4te, oder auch die 3te Arteria interossea dorsalis.

Die Arteria tarsea interna, die innere Fußrückenschlagader; diese geht unter dem Extensor digitorum brevis über dem 2ten, 3ten (und 4ten) Mittelfußknochen auswärts, und giebt, indem sie zuweilen einen Bogen bildet, 4 Arterias interosseas dorsales. Jede A. interossea dorsalis geht zwischen 2 Mittelfußknochen hin (z. B. die 2te zwischen dem 2ten und 3ten Mittelfußknochen), giebt Aeste zu den da gelegenen M. M. interossei, einen durchbohrenden Zweig, welcher zur Planta hinabgeht, und mit der A. interossea plantaris Gemeinschaft hat, und theilt sich dann, wenn sie den Anfang ihrer beiden Zehen erreicht, in 2 Arterias digitales dorsales, eine für jede Zehe. (Die 2te theilt sich z. B. in Arteria dorsalis fibularis der 2ten, und in die dorsalis tibialis der 3ten Zehe.)

Wenn die A. tarsea interna nicht so weit reicht, so kommt die 4te, oder auch die 3te A. interossea dorsalis aus der A. tarsea externa.

Die 1ste Arteria metatarsa interna, die dickste unter allen, und also die Fortsetzung des Stammes, geht dann zwischen dem Mittelfußknochen der 1sten und der 2ten Zehe vorwärts, schiebt sogleich zwischen der Basis des 1sten und des 2ten os metatarsi einen sehr starken Verbindungszweig zur äußeren Fußsohlen-Arterie, A. plantaris externa, mit der sie den Arcus plantaris zusammensetzt, und zuweilen auch zwischen dem Anfange der 1sten und 2ten Zehe einen Verbindungszweig zur A. plantaris interna der großen Zehe; übrigens vertheilt sie sich wie die andern A. A. interosseae.

256 A. tibialis postica. Ihr Ast b. Art. peronaea.

2. Arteria tibialis postica, die hintere Schienbeinarterie.

Die Arteria tibialis postica bleibt, als die Fortsetzung der A. poplitea, vom M. soleus bedeckt, an der hintern Seite des Unterschenkels, und theilt sich am obern Ende des M. tibialis posticus in 2 Aeste, in die A. peronaea und in die viel dickere Fortsetzung des Stammes.

a) Arteria peronaea, die Wadenbeinarterie ¹⁾.

Die Arteria peronaea oder fibularis geht vor dem M. soleus schräg abwärts auswärts, und dann hinter dem Wadenbeine, neben dem Flexor longus hallucis, an der innern Seite desselben, hinter dem M. tibialis posticus hinab. Sie giebt Aeste diesen Muskeln, dem soleus, dem gastrocnemius externus, den peronaeis, und die Arteria nutritia fibulae.

In der unteren Gegend des Unterschenkels giebt sie einen Ast, der das Ligamentum interosseum durchbohrt, oder unter demselben durchgeht, auf diese Weise vor den Malleolus externus kommt, mit der A. malleolaris externa Gemeinschaft hat, und dem Extensor digitorum longus, und wenn er groß ist, dem äußern Theile des Fußgelenkes Aeste giebt. Aus ihr kommen zuweilen Seitenarterien, die sowohl aus der Tarsae externa, seltener auch die, die aus der Tarsae interna entstehen. In der Gegend der Knöchel steht sie häufig mit der neben ihr herablaufenden A. tibialis postica durch einen queren Ast in Verbindung, steigt dann an der äußern Seite des Calcaneus herab, und stößt in dem diesen Knochen umgebenden Netze mit Aesten der A. tibialis postica zusammen.

Selten ist die A. peronaea so groß, daß sie sich so weit zur Fußsohle herab erstreckt, daß sogar Seitenarterien aus ihr entspringen.

b) Die Fortsetzung der Arteria tibialis postica der hintern Schienbeinarterie.

Die Fortsetzung der Arteria tibialis postica geht an der hintern Seite des Unterschenkels, vor dem M. soleus, hinter dem Ligamentum

¹⁾ Am linken Fuße einer männlichen Leiche vertief die Peronaea ganz gewöhnlich; oberhalb des Knöchels aber bog sie sich schnell nach innen, und senkte sich ganz in den Stamm der Tibialis postica ein, ohne weitere Verbindungen mit den Knöchelarterien zu haben. (Otto, seltne Beob. II. Heft, S. 63.)

Am rechten Fuße entsprang die A. peronaea sehr tief unten, und begab sich zum äußeren Rande der kleinen Bege. (Kiedem. Tab. art. XXXVI. Fig. 3.)

Am rechten Fuße war der Ast der A. peronaea, welcher durch das Ligamentum interosseum am unteren Theile des Unterschenkels nach vorn dringt, so groß, daß die Arterien des Fußrückens von ihm entsprangen, und die A. tibialis antica nur einen viel schwächern Verbindungszweig gab. (Kiedemann, Tab. art. XXXVI. Fig. 2.)

.rt. tibialis postica. Ihre Aeste, die A. A. plantares. 257

interosseum, zwischen dem M. tibialis posticus und dem Flexor digitorum longus hinab, giebt Aeste diesen Muskeln, und an der innern Hälfte des Schienbeins die Arteria nutritia tibiae, die größte Knochen Schlagader im ganzen Körper.

Hinter dem Malleolus internus krümmt sich die Arteria tibialis an der inneren Seite des Calcaneus vorwärts herab, schickt eine kleine A. malleolaris posterior interna, durch die sie mit der A. malleolaris anterior interna Gemeinschaft hat, geht, befestiget von der Scheide des Flexor longus hallucis, über dem Caput longum des Abductor hallucis in die Planta, und theilt sich unter dem hintern Theile des Calcaneus in die größere Arteria plantaris externa und in die kleinere A. plantaris interna.

Arteriae plantares, die Fußsohlenarterien.

Arteria plantaris interna. Diese geht über dem Abductor hallucis gerade vorwärts, giebt ihm, dem Flexor brevis hallucis und der Haut in der Nähe des innern Randes des Fußes Aeste, die mit den Aesten der A. tibialis antica Gemeinschaft haben. Unter dem Mittelfußknochen der großen Zehe giebt sie die Arteria digitalis plantaris tibialis der großen Zehe, oder geht in sie über, und hilft in dieser Falle den Arcus plantaris bilden.

Arteria plantaris externa. Diese viel größere Arterie geht über der Aponeurosis plantaris und dem Flexor brevis digitorum an der untern Fläche des Calcaneus, zwischen der Caro quadrata und dem Flexor brevis digitorum schräg auswärts, und dann neben dem Abductor digiti minimi vorwärts, bis unter den Zwischenraum der Mittelfußknochen der 4ten und 5ten Zehe, giebt Aeste dem Abductor digiti minimi und der Haut, die mit der A. tarsea externa Gemeinschaft haben, krümmt sich dann unter den Mittelfußknochen vor den hintern Enden derselben über den Flechsen des Flexor brevis und longus wieder schräg einwärts und vorwärts, so daß sie mit den durchbohrten Aesten der 4 Arteriae metatarsae des Fußrückens, und vornehmlich mit dem sehr dicken 1sten Aste, der zwischen der Basis des 1ten und 2ten Mittelfußknochens in den hohlen Fuß gelangt, zusammenkommt. Hierdurch wird der Arcus plantaris, zu dessen Bildung auch zuweilen noch eine Verbindung der A. plantaris externa beiträgt.

Aus diesem Bogen entspringen die 4 Arteriae interosae plantares. Jede geht zwischen 2 Mittelfußknochen vorwärts. Wenn sie zum Anfang der beiden Zehen erreicht, zwischen deren Mittelfußknochen sie lag, so theilt sich jede in 2 Art. digitales plantares (s. C. S. 257).

die 2te in die A. digitalis plantaris fibularis der 2ten und die tibialis der 3ten Zehe.)

Die Arteria interossea plantaris prima, welche zwischen dem 1sten und dem 2ten Mittelfußknochen liegt, ist in einigen Körpern auch ein Ast des Arcus plantaris, in andern die Fortsetzung des Stammes der A. plantaris interna, und kommt in einigen Körpern zwischen den Anfängen der 1sten und der 2ten Zehe mit der A. tibialis antica zusammen.

Arteriae digitales plantares, Zehenarterien der Fußsohle

Ihrer sind 10, 2 für jede Zehe, eine interna und eine externa.

Die Arteria tibialis hallucis und die Arteria fibularis digiti minimi entspringen einzeln, die übrigen je 2 aus einer A. interossea plantaris. Die A. tibialis hallucis ist bisweilen eine Fortsetzung der A. plantaris interna, bisweilen eine Fortsetzung des Arcus plantaris. Die A. fibularis digiti minimi ist ein Ast der A. plantaris externa. Die Zehenarterien unterscheiden sich aber von den Fingerarterien der Hohlhand dadurch, daß sie fast alle, oder doch größtentheils von einem Arterienbogen entspringen, der mit dem Arcus volaris profundus der Hohlhand verglichen werden muß. Diese Einrichtung hat den Nutzen, daß sie nicht so sehr dem Nachtheile, welchen der Druck beim Stehen und Gehen hervorbringen könnte, ausgesetzt sind.

Jede Arteria digitalis plantaris geht an der Seite ihrer Zeh parallel mit der andern A. digitalis plantaris derselben Zehe hind und giebt der Haut und den übrigen Theilen der Zehe Aeste, sowohl nach dem Latus dorsale, wo sie mit den A. A. dorsalibus Gemeinschaft haben, als nach dem Latus plantare. An der Superficies plantaris des letzten Gliedes kommen beide A. A. digitales plantares, die tibialis und fibularis, in einem kurzen Bogen zusammen, aus welchem feine Aestchen zu der Spitze der Zehe gehn. Auch kommt am Anfange des Nagels jeder Zehe ein Ramus dorsalis der einen A. digitalis und einem Ramus dorsalis der andern A. digitalis in einem Bogen zusammen, aus welchem feine Aestchen nach der Wurzel des Nagels gehn.

Arteriae digitales dorsales, Zehenarterien des Fußrückens¹⁾.

Dieser sind ebenfalls 10, 2 für jede Zehe, eine tibialis und eine fibularis.

¹⁾ Die Arterien des Fußrückens und der Fußsohle zeigen in der Hinsicht Abweichungen, daß die des Fußrückens zuweilen die stärkeren sind, und am Anfange der Zwischenräume der 5 Mittelfußknochen so große Aeste zur Fußsohle schicken, daß

Die A. tibialis hallucis und die Fibularis digiti minimi entspringen einzeln, jene aus der A. tibialis antica, diese aus dem Ramus tarseus derselben, die übrigen je 2 aus einer Arteria interossea loralis. Die Arteriae digitales dorsales sind aber viel dünner, als die Digitales plantares. Jede derselben geht an ihrer Seite ihrer Zehe aus, verliert sich in der Haut der Zehe, und hat mit der A. plantaris derselben Seite ihrer Zehe Gemeinschaft. Die zwischen dem Mittelfußknochen der großen und der 2ten Zehe verlaufende A. interossea hat in ihrer gabelförmigen Spaltung mit der A. interossea plantaris auch einen durchbohrenden Zweig Gemeinschaft.

Von den Venen des großen Kreislaufes.

Die zwei Hohlvenen, Venae cavae, und ihre Hauptzweige im Allgemeinen.

Nimmt man die der Substanz des Herzens angehörenden Venen aus, so vereinigen sich alle dunkelrothes Blut führende Körpervenen in 2 Hauptstämmen, in der oberen und in der unteren Hohlvene.

Die obere oder herabsteigende Hohlvene, vena cava superior oder descendens, führt das Blut von der oberen Hälfte des Körpers zum Herzen herab, die beträchtlich größere untere oder aufsteigende Hohlvene, vena cava inferior oder ascendens, führt es aus den unteren Theilen des Körpers zum Herzen hinauf. Beide Hohlvenen ergießen das Blut einander entgegenkommend in die vordere, oder rechte Vorammer des Herzens. Weil indessen die herabsteigende, obere Hohlvene zugleich ein wenig ihre Richtung nach vorn nimmt, so machen die Richtungen beider Venen am Herzen mit einander einen stumpfen Winkel. Beide Hohlvenen liegen rechts neben der Körperarterie.

Die 3 Hauptzweige der oberen Hohlader sind theils die beiden venae jugulares communes, die gemeinschaftlichen Drosseladern, durch deren Vereinigung sie hinter dem Knorpel der ersten Rippe entsteht, und welche alles Blut zurückführen, das durch die aus dem Bogen der Aorta entspringenden Arterien im Kopfe, im Halse, in den Armen und an der

A. A. plantares digitales aus ihnen vorzüglich entspringen. Im entgegengesetzten, auch regelwidrigen Falle kommen die A. A. digitales dorsales aus jenen durchbohrenden Zweigen, die aus der Fußsohle zum Fußrücken übergehen.

Die Zehearternen, vornehmlich die der großen Zehe und die an der Großzehe seitlich der 2ten Zehe, und die äußere an der kleinen Zehe sind sehr vielen, jedoch unregelmäßigen Abweichungen unterworfen.

260 Ueber die Vertheilung der Adrpervenen im Allgemei

vordern Wand der Brust und des Bauches (an letzteren Orten durch Arteria mammaria) vertheilt worden war, theils die Vena azygos die unpaare Vene, welche in der Brusthöhle rechts neben der steigenden Aorta liegt, auf eine ähnliche Weise sich über den rechten Luftröhrenast herumkrümmt, als die Aorta über den linken, und das Blut zurückführt, welches die Aorta innerhalb der Brusthöhle breitet. Die obere Hohlvene und ihr erster Hauptzweig begleiten die Aorta stets an der rechten Seite, und bilden wie sie einen Bogen und einen herabsteigenden Theil. Der Bogen und der herabsteigende Theil der V. azygos ist aber viel dünner als bei der Aorta, die Aorta außer dem Blute, das sie an den Wänden der Brusthöhle vertheilt, noch das führt, welches sie zu dem Unterleibe und zu den Füßen bringt, während die Vena azygos dasjenige Blut hauptsächlich aufnimmt, welches von der Aorta zu den Wänden der Brusthöhle geführt worden war. Es ist also in der That das oberste Stück der Vena cava superior, eine Vene, welche den in dem ersten Abschnitte der Aorta zusammenkommenden 2 Arteriis subclaviis und carotibus entspricht, und auf gleiche Weise entspricht der Aorta descendens so weit sie Blut zuführendes Gefäß für die Wände der Brust ist, die Vena azygos.

Die Hauptzweige der unteren Hohlvene sind theils die 2 Hüftvenen, venae iliacae, durch deren Vereinigung die untere Hohlvene zwischen dem 4ten und 5ten Lendenwirbel (etwas tiefer als wo die Aorta sich theilt) entsteht, und die alles Blut, welches am Becken in den Schenkeln durch die Arterien gleiches Namens vertheilt worden ist, zurückführt, theils die Nierenvenen und die Lebervenen, durch welche letztere das Blut in die untere Hohlader gebracht wird, welches 3 große Arterien der Unterleibsaorta, die A. coeliaca, mesenterica superior und die mesenterica inferior, zu den Chylus bereitenden Organen vertheilt haben. Denn dieses Blut wird aus dem Magen, aus dem Darmcanale, aus dem Gekröse, aus der Milz, aus dem Pancreas zum Theil von der Leber (von der Gallenblase) durch die Vena porta zusammengebracht, in die Leber geführt, und endlich von da durch die Lebervenen in die Vena cava inferior geleitet.

Venen an den Wänden des Rumpfs.

Aus dem Vorhergehenden haben wir gesehen, daß längs der vordern Wand der Brust und des Bauches, rechts neben der Aorta, der linken nach große Venenstämme, die Vena azygos und die Vena cava inferior liegen, welche viele querlaufende, zwischen den Rippen und dem Bauche befindliche Venen, venae intercostales und lumbales, die

Rumpf fast ringförmig umgeben, aufnehmen und unter einander verbinden. An der vorderen Wand der Brust und des Bauchs liegen dünne, gleichfalls der Länge nach laufende Venen, die *Venae mammae internae*, die zu der *Vena cava superior* und zu der *Vena jugularis communis sinistra* übergehen, und die *Venae epigastricae*, die zu den Schenkelvenen herabsteigen, und die Arterien gleiches Namens größtentheils doppelt begleiten. Ueber dem Nabel stoßen sie unter einander zusammen. Diese vorderen, der Länge nach laufenden Venen dienen dazu, die vorderen Enden jener den Rumpf quer umgebenden Venen aufzunehmen und unter einander zu verbinden.

Nun ist aber die Wirbelsäule ihrer ganzen Länge nach hinten und auch in ihrem Canale mit Venennehen bedeckt, die ununterbrochen vom Kopfe bis zum Ende des Kreuzbeins reichen, und in denen das Blut nicht der Länge nach, sondern mehr der Quere nach zu fließen scheint, und in der Brust und am Bauche durch die Zwischenrippen und Lendendennen in die *V. azygos* und *cava* kommt. Am Halse und am Kreuzbeine aber, wohin sich die *Vena cava inferior* und die *Vena azygos* nicht erstreckt, liegen besondere, der Länge nach laufende Venen, um aus diesen Venennehen den Abfluß des Bluts zu bewirken; am Halse die Wirbelvenen, *V. V. vertebrales*, die es in die *Vena jugularis communis* führen, am Kreuzbeine die *Vena sacra media* und die *Venae sacrae laterales*, die es in die *Venas iliacas* und in ihren Ast, die *Hypogastrica*, bringen.

Von den Nesten der oberen Hohlvene ¹⁾, *vena cava superior* ²⁾, im Einzelnen.

Vena azygos, *azyga*, *Vena sine pari*, der Stamm der Zwischenrippenvenen ³⁾.

Dieser Venenstamm nimmt das Blut der meisten, zuweilen aller Zwischenrippenvenen auf, und bringt die *Vena cava inferior* mit der

¹⁾ Ueber die *Vena cava superior* hat eine abgesonderte Schrift geschrieben: *Gust. Lauth*, *Spicilegium de vena cava superiore*. Strasb. 1815. 4. Man betrachte auch die von Breschet und die von Langenbeck gegebenen Abbildungen (*Icones anatomicae; Angiologiae Fasc. I.*).

²⁾ Die Fälle von regelwidriger Bildung der Hohlvene findet man bei Otto am vollständigsten aufgezählt (*pathol. Anat.* 1850. S. 347.), z. B. die, wo bei unvollkommener Bildung des Herzens nur eine einzige für den ganzen Körper bestimmte Vene mit dem Herzen in Verbindung stand, so daß keine besondere Lungenvene vorhanden war, oder wo die Körper- und Lungenvenen mit einem und demselben Vorhofe in Verbindung standen, oder wo sich beide Hohladern zu einem einzigen, in den rechten Vorhof schenkenden, Venenstamm vereinigten, oder wo, während die Arterien regelmäßig entspringen, die Hohlvenen in den linken, die Lungenvenen in den rechten Vorhof übergingen, oder endlich wo, wie mehrmals beobachtet worden, und auch Otto (seltene Beob. Heft 2. S. 69.) in 2 Fällen gesehen hat, die linke *Vena jugularis communis* sich, ohne sich mit der rechten zu vereinigen, in das Herz begab, und zwar häufiger in den rech-

Vena cava superior in Verbindung. Die querlaufenden Lendenvenen nämlich ergießen ihr Blut in die Vena cava inferior, stehen aber noch unterwegs mit einem senkrecht emporsteigenden Strange netzförmig verflochtener Venen in Verbindung, welcher vor und hinter den Wurzeln der Querfortsätze der Lendenwirbel liegt, und in welchem sich oft ein vor den

ten, seltener in den linken Vorhof ging, das also 2 obere Hohlvenen vorhanden waren. Eine solche Abweichung beschreibt ausführlich Adolph Murray (neue Abhandlung der schwedischen Academie. 2. Bd. Leipzig. 1784. S. 283. sq.): nachdem sich bei einer 60jährigen Frau die Vena jugularis und subclavia sinistra oberhalb der Schlüsselbeine in ein Gefäß vereinigt hatten, stieg dieses durch den Herzbeutel, links neben dem großen Bogen der Aorta, herunter, und ging an dem linken Rande der zur vordern Fläche des hinteren Herzohres. Hier war es von den eignen Häuten des Herzens bedeckt, und mit dem Deyre so fest verwachsen, daß nicht allein dieses ein Continuum von ihm anzumachen schien, sondern selbst durch Fleischfibern mit demselben verwachsen war. So stieg die Vena cava sinistra niederwärts, und ging quer über die Art. pulm. sinistra, dann über die Ven. pulm. weg. An der Wurzel des Herzohres und an dem untern Rande der Lungenblutader machte das Gefäß eine s-förmige Krümmung, so daß es auf einmal eine transversale Stellung gegen das Herz hielt; es ging nämlich um die Lungenblutader bis an die flache untere Fläche des Herzens, zwischen der Basis desselben und dem linken Sinus, nach dem rechten Sinus hin, wo es an der untern Extremität des Septi auricularum sich öffnete. Der Herzbeutel bedeckte sowohl das Gefäß als den transversalen Fortsatz desselben, und verzeigte beide Theile mit dem linken Sinus und mit der Basis des Herzens, so daß sie nicht ohne Schwierigkeiten getrennt werden konnten.

Böhmer (Fasc. I. obs. anat. und Diss. de confluxu trium cavarum) sah auf ähnliche Weise, wie Murray, bei einem ausgewachsenen Menschen die Vena cava sup. nicht allein doppelt, sondern auch die eine Hälfte sonderbar um das Herz krümmt.

Ähnliche Beobachtungen findet man bei Otto angegeben (pathol. Anat. 1. Bd. Berl. 1830. S. 347. Not. 13.) und 2 Fälle von ihm selbst beobachtet. (Schmalz Beob. 2. Heft p. 69.)

Will. Cheselden (philos. transact. Vol. 23. n. 337.) sah einmal die Vena cava superior rund um die Basis des Herzens gehen, seitwärts der Aorta und der Lungenader hin, um zugleich mit der infer. in die rechte Vorammer auf der hintern Seite einzutreten.

- ⁵⁾ Ueber die Vena azygos haben besondere Abhandlungen geschrieben: Barth. Eustachius, Tractatus de vena, quae ἀζυγος Graecis dicitur et de humerariae venae propagine, quae in flexu brachii ex Galeni sententia venam communem profundam producit. In ej. opusc. anat. Lugd. Bat. 1707. 8. p. 289. — Joh. Maria Lancisi, de vena sine pari epistola, cum epistola de gangliis Patav. 1719. In opusc. Rom 1745. 4. Vid. Morgagni, Adversaria anat. V. p. 75. — Laurentius Heister, de singulari ac pulchra distributione venae azygos sive sine pari. Ephem. nat. cur. Cent. VII. et VIII. p. 369. — Nic. Le Cat, observation sur la veine azygos bifurquée vers la base du coeur. Mémoires de Paris 1738. hist. p. 45. — Charles Guattani, mém. sur une double veine azygos. Mémoires de math. et de phys. Vol. III. p. 512. — J. C. Wilde, de v. azygos trunco duplici. In Commentar. ac. Petrop. Vol. XII. 318. — B. S. Albin, Tabula vasis chyli ferri cum vena azyga arteriisque intercostalibus. Leg. Bat. 1755. Fol. et in Annot. acad. Lib. IV. p. 41. — Haller, in Elementis Phys. VIII. Sect. 1. §. 44 — 46. — Henr. Aug. Wrisberg, observationes anatomicae de vena azyga duplici, aliisque hujus venae varietatibus, c. tab. aen. Gotting. 1778. 4. et in nov. commentar. soc. reg. Gotting. Vol. VIII. 1777 p. 14. et in Comment. med. phys. anat. etc. argumenti Vol. I. Gotting. 1800. 8. p. 127. sq. Eine sehr schöne Abbildung und Abhandlung findet man in Breschet (le système veineux, p. 2.) und eine sehr instructive Abbildung der V. azygos in der von hinten eröffneten Brusthöhle in Langenbeck Icones anatomicae. Angiologiae Fasc. I. Tab. 8.

Querfortsätzen liegender Venenstamm, *vena lumbalis ascendens*, durch seine Größe auszeichnet, der unten mit dem Endaste der *Vena cava inferior* (mit der *Vena iliaca*) in unmittelbarer Verbindung steht, oben aber am Querfortsatze des 1sten Lendenwirbels meistens ununterbrochen in die auf der rechten Seite liegende *Vena azygos* und in die auf der linken liegende *Vena hemi-azygos* übergeht. An jenem Querfortsatze vereinigt sich nämlich die *Vena lumbalis ascendens* unter einem fast rechten Winkel mit der unter der 12ten Rippe verlaufenden letzten Intercostalvene, und setzt einen, fast quer über den Körper des 12ten Brustwirbels hinübergehenden, dann plötzlich sehr senkrecht zwischen dem äußeren und mittleren Zwerchfellschenkel, oder auch durch den Hiatus aorticus neben der Aorta in die Brusthöhle hinaufgehenden Stamm zusammen, der auf der rechten Seite den Namen *Vena azygos*, auf der linken den der *Vena hemi-azygos*, führt.

Die *Vena azygos* geht dann in der Brusthöhle rechts neben dem *Ductus thoracicus* und der Aorta vor den Körpern der Brustwirbel in die Höhe, nimmt in der Gegend des 9ten, 8ten, oder auch des 7ten Brustwirbels, seltener noch höher oben, die *Vena hemi-azygos* auf, bildet in der Gegend des 4ten Brustwirbels einen Bogen, der in gewisser Beziehung mit dem Bogen der Aorta verglichen werden kann, weil er auf eine ähnliche Weise über den rechten Luftröhrenast hinweggeht, als der Bogen der Aorta über den linken, und öffnet sich an der hinteren Seite der *Vena cava superior*, ungefähr auf dem halben Wege derselben vom Schlüsselbeine zu dem rechten Vorhofe des Herzens, nahe über der Stelle, wo dieselbe vom Herzbeutel umgeben zu werden anfängt, und ist daselbst meistens mit einer Klappe versehen.

Man sieht aus dieser Beschreibung, daß, wenn man die zuweilen ziemlich starke *Vena lumbalis ascendens*, die die nämliche Richtung als die *Vena azygos* und *hemi-azygos* hat, und mit ihnen unmittelbar verbunden ist, als einen Theil der *V. azygos* und *hemi-azygos* ansieht, man die *Vena azygos* als eine der Länge nach durch die ganze Bauchhöhle und durch die Brusthöhle gehende Vene ansehen kann, die unten mit der rechten und linken *Vena iliaca* und mit der *Vena cava inferior* unmittelbar in Verbindung steht, oben in der Brusthöhle in die *Vena cava superior* übergeht, und meistens auch mit den 2 Aesten derselben, mit der rechten und linken *Vena jugularis communis* oder mit der *Vena subclavia*, in Communication steht. Zuweilen steht auch das untere Ende der *Vena azygos* und *hemi-azygos* dadurch mit der *Vena cava inferior* in Verbindung, daß es mit einer andern in die *Vena cava inferior* sich öffnenden Vene unmittelbar, oder mittelbar durch einen Nebenast, communicirt, z. B. mit der 1sten queren Lendenvene, mit der Nierenvene, oder mit der Nebenrienenvene.

Die *Vena azygos* nimmt auf der rechten Seite, während ihres

24 Vena azygos. Ihr Ast die V. hemi-azygos.

Verlaufs durch die Brusthöhle, nach und nach die unteren und mittleren Zwischenrippenvenen (ungefähr 8, 9 oder 10 an der Zahl) und nicht selten auch die obersten Zwischenrippenvenen, nachdem sie sich in einen herabsteigenden Stamm vereinigt haben, auf. Indessen fließt auch nicht selten das Blut dieser obersten Intercoastalvenen in die Vena subclavia oder in die Vena vertebralis. In diesem Falle pflegt indessen wenigstens die 1ste in die Vena azygos gehende Zwischenrippenvene mit der in die V. subclavia gehenden obersten Zwischenrippenvene verbunden zu sein.

Die Vena hemi-azygos ¹⁾ nimmt, indem sie in der Brusthöhle links neben der Aorta an den Wirbelkörpern emporsteigt, die unteren Zwischenrippenvenen der linken Seite (meistens 3 oder 4 an der Zahl) auf, und empfängt in den meisten Fällen da, wo sie sich ungefähr am 8ten oder am 9ten Brustwirbel hinter der Aorta unter einem fast rechten Winkel quer hinüber zur Vena azygos beugt, um sich in dieselbe einzumünden, einen sehr beträchtlich dicken, zu ihr senkrecht herabsteigenden Stamm, in welchem sich die mittleren und zuweilen auch die

¹⁾ Die V. hemi-azygos ergießt ihr Blut zuweilen nicht in die Azygos, sondern in die Subclavia, d. h. die V. intercostalis superior nimmt die Stelle der V. hemi-azygos ein (siehe z. B. Fleischmann, Leichenöffnungen. Erlangen 1815. S. 228.) bisweilen steht sie mit den mittleren Zwischenrippenvenen in keiner Verbindung, mehrere Intercoastalvenen der linken Seite sich selbst unmittelbar hinter der Aorta weggehend zur V. azygos begeben, oder weil mehrere derselben zu einem in die V. azygos herabsteigenden Stamm zusammentreten. Niemals aber gehen, wie Breschet behauptet, Venae intercostales einzeln in die V. cava superior. Heister (de singulari et pulchra distributione venae azygos sive sine pari. Ephem. nat. cur. Cent. VIII. p. 369. e. tab.) fand in einem, von der Mutter genommenen Kinde, daß die Vena azygos von der Vena cava sup. einfach entsprang, sich aber dann in 4 Äste spaltete, von denen 2 nach oben und 2 nach unten gingen. Hierbei war außerdem noch das merkwürdig, daß alle Seitenäste doppelt waren, während sie sonst nur einfach sind. Ähnlich sind 2 Beobachtungen von Sandifort (ob. anat. pathol. L. II. p. 126.).

Bekanntlich kommen bei vielen Säugethieren 2 in die Vena cava sup. sich öffnende Venae azygos vor. z. B. bei den Affen, bei denen sie Galen beschrieben hat, beim Schweine und bei der Kuh. Ed. Sandifort, Geseffden, Wrisberg, Lauth und Breschet haben einen solchen Verlauf derselben auch bei Menschen gesehen, und Wrisberg zwar in 3 Fällen, Lauth in 2 in der anatomischen Sammlung in Strassburg aufbewahrten Exemplaren. Breschet, bei dem man die literarischen Nachweisungen hierüber zusammengestellt findet, sagt hinzu, daß schon Vesal, Lancisi und Eustachi diesen Verlauf beobachtet hatten (sur le système veineux p. 9.). Ferner sahen Breschet und Otto auch einen Fall, in welchem sich die V. azygos nicht in die V. cava superior, sondern in die rechte V. subclavia begab, wobei also die rechte Vena intercostalis superior die Stelle der V. azygos vertrat. Dr. S. Weber beobachtete eine solche Einmündung der V. azygos in die linke V. subclavia.

In manchen Fällen mündet sich die Vena azygos in die Vena hemi-azygos ein. Sehr selten geht die untere Hohlader durch die Brusthöhle bis zur oberen, und vertritt dann zugleich die Stelle der V. azygos. In einem solchen Falle ging die V. hemi-azygos in die linke V. jugularis communis. Einen solchen Fall hat auch Dr. S. Weber beschrieben (in Medel's Arch. 1829. S. 8.). Außerst selten sind auch die Fälle, wo sich die V. azygos innerhalb des Herzbeutels, entweder in die V. cava superior, oder sogar in die V. cava inferior öffnet. Die hierher gehörenden Beobachtungen findet man vorzüglich vollständig in Ditto's pathol. Anat. 1830. S. 347, 348 citirt. In einem von Gömmerring erwähnten Falle setzte die V. hemi-azygos ganz.

obersten Zwischenrippenvenen vereinigen. Dieser Stamm ist viel dicker als der, durch welchen die oberen Venae intercostales auf der rechten Seite in die Vena azygos übergehen. Wenn er die 2 obersten V. intercostales nicht selbst aufnimmt, sondern diese ihr Blut nach ein in die V. subclavia oder V. vertebralis gehendes Stämmchen (vena intercostalis superior) nach oben ergießen, so steht er wenigstens mit jenen Venen in Verbindung. Nicht selten begiebt sich aber dieser in die mittleren Zwischenrippenvenen ausgehende Stamm nicht in die V. azygos, sondern unmittelbar in die V. azygos¹⁾.

Die Zwischenrippenvenen, venae intercostales, sind kleine Venenstämme, die zuerst das aus dem Rückgratcanale und das vom Rücken aus in der Nähe der Wirbelsäule zusammenfließende Blut aufnehmen.

Durch ein jedes Zwischenwirbelloch tritt eine Vene aus dem Canale der Wirbelsäule hervor, welche daselbst mit den in diesem Canale befindlichen Venennetzen in Verbindung steht. An dem Zwischenwirbelloche nimmt sie die seitwärts um den Wirbel herumkommenden Venennetze auf, und empfängt dadurch das Blut aus den Venennetzen, welche die hintere Oberfläche des Rückgrats bedecken.

In der Nähe jedes Zwischenwirbellochs kommt nun noch der im Zwischenrippenraume, zwischen dem M. intercostalis externus und sternus liegende Ast, ramus intercostalis, hinzu. Dieser steht vorn meistens mittelst 2 Zweigen mit der V. mammaria interna in Verbindung, und begleitet die Arteria intercostalis auf eine solche Weise, daß er näher am unteren Rande der Rippe hinläuft, als sie, und daß also, und der R. intercostalis, die A. intercostalis in die Mitte kommen²⁾.

Die Intercoastaläste der Intercoastalvenen nehmen nicht unbeträchtliche Aestvenen auf, und hängen oft unter einander zusammen.

Der aus dem meistens dickeren Rückenaste und dem Intercoastalast zusammengesetzte Stamm der Intercoastalvene nimmt bei seinem Uebergange zur V. azygos oder hemi-azygos kleine Venenzweige von der hinteren Oberfläche der Wirbel auf, von welchen manche aus der knorpeligen Substanz des Wirbels hervorkommen, die in dersel-

¹⁾ Lantth sagt, daß er den Stamm der oberen Intercoastalvenen der linken Seite in die V. jugularis communis sinistra, oder auch in die V. thyreoidea, und sogar in die V. phrenica habe übergehen sehen. Haller beschreibt als Regel, daß die rechte und die linke obere Intercoastalvene in die Vena subclavia übergehe, und zwar nach außen neben der V. mammaria; auf der rechten Seite sollen nach ihm seltener Abweichungen von diesem Verlaufe vorkommen, als auf der linken. Auf der linken Seite mündete sie auch einmal gemeinschaftlich mit der V. mammaria, und einmal trat sie in die thyreoidea.

²⁾ Wenn auch die Blutgefäße der Zwischenrippenräume nicht in der Nähe der Wirbelsäule in dieser Lage sind, so nehmen sie doch dieselbe jeder Zeit weiter vorn an.

ben mit den Venen in Verbindung stehen, welche aus dem Rückgrate in die Wirbel eindringen.

Außer den Zwischenrippenvenen, nehmen die Vena azygos und die V. h. azygos an unbestimmten Stellen an ihrer vorderen Seite die gleichfalls der Größe nach sehr unbestimmten kleinen Speiseröhrenvenen, venae oesophageae, die kleinen Herzbeutelvenen, venae pericardiacae, und die Luftröhrenvenen venae bronchiales, ferner Venen von den in der Nachbarschaft gelegenen Drüsen, und zuweilen sogar Venen vom Zwerchfelle auf, durch welche sie mit in die Vena cava inferior sich mündenden Zwerchfellvenen in einige Verbindung kommen. Unter diesen kleinen Venen sind die Bronchialvenen hinsichtlich ihrer Zahl, Größe und Lage vorzüglich veränderlich, weil das Blut, das sie, nach der Ernährung der Lungen und zur Absonderung des Schleims und des Zellwassers gebient hat, aus den Lungen zurückführen sollen, nicht selten in dunkelrothes Blut führende, und sogar in die hellrothes Blut führenden Wege geleitet wird.

Plexus venosi spinales ¹⁾. Rückgratvenennege.

Längs der ganzen Wirbelsäule, sowohl im Canale derselben, als außerhalb, liegen, wie kurz zuvor erwähnt worden, große Venennege, welche sich vom Kopfe bis zum Ende der Wirbelsäule erstrecken, und seitwärts an den Zwischenwirbelscheiben ihren Abzug nach vorn in Venen nehmen, die vorn an der Wirbelsäule, oder seitwärts neben ihr gelegen sind, durch die ihr Blut in die obere und untere Hohlader gebracht wird. Diese der Länge der Wirbelsäule nach laufenden Venen, welche das Blut jener Nege aufnehmen, sind am Halse auf jeder Seite, die V. vertebralis superficialis und profunda, in der Brust die V. azygos und hemi-azygos, im Unterleibe die Vena lumbalis ascendens, im Becken die Vena sacra lateralis und sacra media. Sie bilden zu beiden Seiten der Wirbelsäule 2 Reihen von der Länge nach laufenden Venenstämmchen, von welchen immer das eine da anfängt, wo das andere aufhört, und welche die zahlreichen querlaufenden Venen unter einander verbinden.

Die erwähnten Venennege liegen theils in der Wirbelsäule, an der Wand des Rückgratcanals angeheftet, theils äußerlich am Rückgrate, vorzüglich an seiner hinteren Seite zwischen den Stachelfortsätzen und Querfortsätzen.

Die Venennege des Rückgratcanals, plexus venosi spinales interni. Sie stehen oben mit den Sinibus des Schädels in Verbindung, und haben an den Zwischenwirbelscheiben am Halse durch die Vena vertebralis profunda und superficialis, an den Halswirbels durch die Venae intercostales, an den Lenden durch die Ve-

¹⁾ *Gilb. Breschet, essai sur les veines du rachis: In Concours pour la place de chef des travaux anatomiques vacante à la faculté de médecine de Paris 1819. 4. p. 1 — 18. und sein Hauptwerk: Le système veineux, auf zahlreichen Tafeln.*

lumbales, und am Kreuzbeine durch die Vena sacra lateralis ihren Abfluß.

Sie liegen theils (als *venae spinales internae anteriores*) an der vorderen von den Wirbelkörpern, theils (als *venae spinales internae posteriores*) an der von den Wirbelbogen gebildeten Wand des Rückgratcanals.

Die vorderen Venenneze des Rückgratcanals¹⁾ haben sehr viel Ähnlichkeit mit den an der Grundfläche des Hinterhaupt- und Keilbeins gelegenen *sinubus durae matris*, d. h. mit den Venen des fester angewachsenen Theils der harten Hirnhaut, also mit dem später zu beschreibenden *Sinus occipitalis anterior*, *Sinus cavernosus*, weniger aber mit denjenigen *Sinubus*, welche in den wipprigenden Falten der harten Hirnhaut befindlich sind.

Sie liegen nämlich unbeweglich an dem sehnigen Ueberzuge derjenigen Oberfläche des Rückgratcanals, welche die Wirbelkörper demselben zuehren, und den man theils *Ligamentum longitudinale anterius*, theils, wo er dünner ist, *Knochenhaut der Wirbelsäule* nennt, und befinden sich folglich nicht dicht an der *Dura mater* des Rückgrats, denn diese ist als ein langer cylindrischer Schlauch in dem Rückgratcanale ziemlich frei aufgehangen.

Weil sie aber dafelbst von einer Lage von Sehnenfasern bedeckt werden, so kann man sagen, daß sie wie jene *Sinus* der harten Hirnhaut in dem sehnigen Ueberzuge selbst befindlich sind. Sie haben daher auch die Eigenthümlichkeit, welche alle Venen auszeichnet, die unbeweglich und zwischen wenig nachgebenden Theilen eingeschlossen liegen. Sie haben keine einzelne unterscheidbare äußere Haut, sondern bestehen fast nur aus der durchsichtigen glatten inneren Haut, welche hier die von diesen Venen eingenommenen Zwischenräume unmittelbar zu überziehen scheint.

Was ihre Gestalt und Zahl anlangt, so sind es 2 der Länge nach durch den Wirbelcanal herabgehende Stränge von netzförmig verflochtenen Venen, die an der Mitte jedes Wirbels unter einander communiciren, und also selbst eine Kette von großen Venenkränzen darstellen, von welchen jeder von der Mitte des einen Wirbelkörpers zur Mitte des nächsten reicht. Die Venen, welche jedes dieser Stränge bilden, sind so verflochten, daß sie, wenn sie durch eingespritzte Flüssigkeiten ausgedehnt werden, nur sehr enge Zwischenräume zwischen sich lassen, die zum Theil enger sind, als die Venen selbst, eine Einrichtung, welche ihnen ein ganz eigenthümliches Ansehen verschafft. In den Halswirbeln ist dieses Ansehen am auffallendsten, in den Kreuzwirbeln dagegen haben diese Venen noch am meisten das Ansehen anderer Venen. In Kindern sind diese Netze dichter als in Erwachsenen. Wenn sie in den Halswirbeln dicker als anderswo sind, so darf man deswegen nicht glauben, daß das Blut dahin seinen Abfluß nehme, sondern vielmehr, daß von dort her mehr Blut abzuführen ist. Ueberhaupt fließt das Blut in diesen der Länge des Rückens nach laufenden Strängen nicht hauptsächlich der Länge nach, sondern diese Netze haben vorzüglich ihren Abzug mittels der verlaufenden, durch die Intervertebrallöcher gehenden Venen. An jedem Zwischenwirbelloche stehen diese Netze mit den sogleich zu beschreibenden hinteren Venennezen des Rückgratcanals in Verbindung, und öffnen sich dafelbst in die Wirbelvenen, *Intercostalvenen*, *Lendenvenen* und *Kreuzbeinvenen*. An der Mitte jedes Wirbelkörpers nehmen sie dagegen die aus dem schwammigen Gewebe der Wirbelkörper herausgehenden, ziemlich großen *Knochenvenen* (*veines basi-vertebrales* nach Breschet) auf, die sich im Wirbel horizontal ausbreiten, oft eine Art von Bogen bilden, und durch einige im Rückgratcanale an der Mitte jedes Wirbelkörpers sehr sichtbare große Oeffnungen aus der schwammigen Substanz jedes Wirbelkörpers in den Rückgratcanal gelangen. Manche von den in dem Wirbel zertheilten Venen dringen auch an der vorderen Seite der Wirbelkörper hervor, und legen dadurch die im Wirbelcanale befindlichen Venenneze in einige Ver-

¹⁾ *Plexus veineux rachidiens longitudinaux antérieurs*, oder *grandes veines rachidiennes longitudinales antérieures* (*Venae longitudinales anticae thecae vertebralis*) nach Breschet in seiner Schrift: *Le système veineux*, p. 13.

bindung mit den vor der Wirbelsäule gelegenen Venen. Im Innern der Knochen fehlt diesen Venen die äußere Haut.

Die hinteren Venennege des Rückgratcanals, *venae spinales internae posteriores*¹⁾. Ein Netz von Venen, welches an der harten Rückenmarkshaut und vor den Ligamentis intercruralibus, also hinter dem in seiner harten Haut eingehüllten Rückenmarke liegt, erstreckt sich vom Kopfe bis zum Ende der Wirbelsäule. An den Brustwirbeln besteht es deutlich aus 2 der Länge nach neben einander herlaufenden Venen, die an oder neben jedem Wirbelbogen durch quere, zuweilen ziemlich einfache, oft netzförmig verflochtene Venen unter einander verbunden sind und dadurch eine Kette senkrecht liegender Venenkränze bilden. An den Halswirbeln, Lendenwirbeln und Kreuzwirbeln sind diese Venenkränze nicht so einfach als an den Rückenwirbeln, sondern jeder Kranz besteht aus durch dichte Anastomosen verflochtenen Venen.

In diese Venen gehen zwischen den Querfortsätzen und seitwärts neben den Ligamentis flavis zahlreiche communicirende Zweige von den außerhalb des Wirbelcanals hinten am Rückgrate befindlichen, nun sogleich zu beschreibenden Venennegen. Außerdem empfangen diese Venengeflechte zahlreiche kleine Venen von der weichen und der harten Rückenmarkshaut. Auch stehen sie mit den vorderen Venennegen des Rückgratcanals in vielfacher Verbindung, und ergießen ihr Blut in die aus dem Rückgratcanale durch die Intervertebrallöcher austretenden Venen, die die daselbst austretenden Nerven umgeben.

Venae spinales externae posteriores, venae dorsi spinales nach Breschet²⁾, äußere Venennege an der hinteren Seite der Wirbelsäule. An den Stachelnfortsätzen der Wirbelsäule und an den Querfortsätzen der Bogen befinden sich 2 Venennege, welche die ganze Länge der Wirbelsäule einnehmen und am Halse (*plexus venosus colli posterior*³⁾) dichter und verwickelter, an den Brustwirbeln aber zuweilen hier und da unterbrochen und kleiner sind, die die tiefen Venen des Rückens aufnehmen, mit den Venennegen in dem Wirbelcanale vielfach anastomosiren, und ihren Abzug durch die neben den Zwischenwirbellochern vorbeigehenden Venenäste haben. Da sie von Wirbel zu Wirbel unter einander zusammenhängen, so hat es an manchen Stellen das Ansehen, als verläufen einige Venenstämme dieses Netzes der Länge nach hinter den Querfortsätzen und neben den Stachelnfortsätzen. Indessen scheint das Blut mehr als der Länge nach zu laufen, und diese der Länge nach liegenden Venen sind als zusammengesetzt aus einer Reihe anastomosirender Zweige zu betrachten.

Venae spinales externae anteriores. Vorzüglich am Halse und am Kreuzbeine ist die vordere Oberfläche der Wirbelsäule mit Venennegen bedeckt, die am Halse ihren Abzug in die *Vena vertebralis*, am Kreuzbeine in die *Vena sacra lateralis* und *sacra media* haben. Am Halse nannte sie *Sömmerring Plexus venosi colli anteriores*. Die letzteren führen das Blut der an der vorderen Seite des Halses gelegenen Muskeln zurück, stehen an den Zwischenwirbellochern mit den andern Venennegen der Wirbelsäule und zuweilen auch mit den Venen des Pharynx in Verbindung.

Oberer Theil der oberen Hohlvene.

Der obere Theil der *Vena cava superior*, welcher über der Stell

¹⁾ *Plexus rachidiens postérieurs, oder retia venosa postica thecae vertebralis, verbunden mit den veines longitudinales rachidiens postérieures oder venae longitudinales posteriores thecae vertebralis des Breschet (Système veineux. S. 1 und S. 27.)*

²⁾ *Breschet, le système veineux. p. 28.*

³⁾ *Nach Sömmerring Gefäßlehre. S. 461.*

7. cava superior. Ihr Ast die V. jugularis communis. 269

egt, an welcher sich die Vena azygos von hinten her begiebt, führt, sie schon oben bemerkt worden ist, alles Blut zurück, welches durch die ach oben gehenden 3 großen Aeste des Aortenbogens zum Kopfe, Halse, den Armen, zu der vorderen Wand des Rumpfs und zu einigen in der Brusthöhle gelegenen Theilen vertheilt worden ist. Der Stamm der Vena cava superior entsteht im obersten Theile der Brusthöhle hinter dem Knorpel der obersten rechten Rippe, indem daselbst die rechte gemeinschaftliche Drosselvene, vena jugularis communis dextra, mit der linken zusammenkommt. Weil jede dieser beiden Venen auf ihrer Seite das Blut von den nämlichen Theilen aufnimmt, zu welchen es die A. anonyma der rechten Seite vertheilt, so nennen manche Anatomen diese Venen auch Venae anonymae oder innominatae, oder andere nennen die ganze Vene von dem obersten Theile der Achselhöhle bis zur Vena cava superior, Schlüsselbeinvene, vena subclavia, nicht bloß, wie hier geschieht, den Theil, welcher vom obersten Theile der Achselhöhle bis zur Stelle reicht, wo die Vena jugularis interna aufgenommen wird.

Die rechte und linke gemeinschaftliche Drosselader, vena jugularis communis dextra und sinistra.

Diese beiden Venen sind ihrer Länge und Richtung nach sehr verschieden. Die linke ist nämlich mehr als noch einmal so lang als die rechte, und geht von der Stelle über dem vorderen Theile der ersten linken Rippe fast quer und nur sehr wenig schief nach der Gegend des Knorpels der 2ten rechten Rippe in der Nähe des Herzbeutels hin, und liegt auf diesem Wege über dem Aortenbogen, vor den aus dem Aortenbogen hervorgehenden 3 großen Arterienstämmen und vor der zwischen diesen Arterienstämmen gelegenen Luftröhre und hinter dem vorderen Rande des Brustbeins. Die rechte gemeinschaftliche Drosselader geht fast senkrecht ein wenig vorwärts vor der Stelle über dem Knorpel der 1sten rechten Rippe zu dem nämlichen Orte herab, und vereinigt sich mit der linken, und bildet dadurch die obere Hohlvene. Jede V. jugularis communis wird durch den M. scalenus anterior von dem hinter diesem Muskel liegenden A. subclavia geschieden, und nimmt am Halse emporsteigende Venenstämme, die Wirbelvene, V. vertebralis, die innere Drosselader, V. jugularis interna, und die äußere Drosselader, V. jugularis externa, auf, und setzt sich dann in die zur Achselhöhle übergehende Schlüsselbeinvene, V. subclavia, fort. Es ist aber schon erwähnt worden, daß viele Anatomen diese und die V. jugularis communis zusammengenommen Schlüsselbeinvene nennen.

Kleine Venen, die zuweilen in die Vena cava oder in die Vena jugularis communis gehen.

Das Blut, welches von der vorderen Wand des Rumpfs und von einigen Theilen in der Brusthöhle zurückgeführt wird, fließt theils in den obersten Theil des Stammes der Vena cava superior, theils in die Vena jugularis communis, oder auch in die Aeste derselben.

Die Vena intercostalis superior dextra ergießt sich entweder in die V. subclavia dextra, oder in die V. azygos; die V. intercostalis superior sinistra ergießt sich meistens in die Vena subclavia sinistra, bisweilen in die Vena hemi-azygos.

Die Venae bronchiales, die bei der Ernährung der Lungen mitwirkenden Venen, führen das Blut von den Lungen und Lufttröhren zurück, welches die A. A. bronchiales hingeführt haben. Auch nehmen sie Ramos oesophageos auf. Ihre Größe, Zahl und Endigung ist sehr unbestimmt. Die dextra ergießt sich oft in den obersten Theil der V. azygos, die dextra inferior, wenn sie da ist, in dieselbe, oder in die cava superior; die sinistra in die V. intercostalis superior sinistra, seltener in die azygos, oder in die thyreoidea inferior. Zuweilen fehlt eine oder die andere dieser Venen, weil sich ihre Aeste frühzeitig mit einer von den Venis pulmonalibus vereinigen.

Venae oesophageae.

Die superiores dextrae gehen oft zur V. thyreoidea inferior, zur V. cava, zur azygos, oder zur bronchialis dextra; die sinistrae zur subclavia sinistra, zur hemi-azyga, zur bronchialis sinistra.

Die Venae mammae internae haben mit den Schlagadern den selben Namens einerlei Gang und Vertheilung.

Die dextra ergießt sich in die V. cava sup., oder die jugularis communis dextra; die sinistra in die V. jugularis communis sinistra.

Venae thymicae, Venen der Thymus. Die dextra ergießt sich in die V. cava, oder in die V. jugularis sinistra, oder in die mamma dextra; die sinistra in die jugularis sinistra, oder mamma sinistra.

Venae mediastinae, kleine Venenäste, die am mittlern Theile der Brusthaut vertheilt sind, gehen zur Vena cava, oder zur jugularis communis sinistra, oder zu den mammariis internis, oder zur azygos und hemi-azygos, oder zu den pericardiaco-phrenicis, oder zu den thymicis, oesophageis, bronchialibus u.

Venae pericardiacae ergießen sich in die Ramos pericardiacophrenicos und phrenico-pericardiacos der V. V. mammae internarum, oder in die phrenicas, oesophageas, bronchiales, mediastinas, oder in die jugularis communis sinistra und azygos.

Venae phrenicae superiores von der obern Fläche des Zwerchfelles gehen zu den Ramis pericardiacophrenicis, phrenico-pericardiacis, und musculo-phrenicis der V. V. mammariarum internarum.

Venen des Halses und des Kopfs 1).

I. Die an jeder Seite der Wirbelsäule des Halses liegende Wirbelvene, Vena vertebralis, die der A. vertebralis entspricht, ist die am tiefsten und am meisten verborgen liegende Vene des Halses. Sie ist in der Regel eine doppelte: eine Vena vertebralis superficialis, die oberflächliche Wirbelvene, welche dicker ist und außerhalb der Löcher der Quersfortsätze und hinter ihnen liegt, oft die Hinterhauptblutader, V. occipitalis, aufnimmt und immer mit den oben erwähnten hinteren Venennegen am Rückgrate des Halses in Verbindung steht, und die Vena vertebralis profunda, die tiefe Wirbelvene, welche durch die Löcher der Quersfortsätze der Halswirbel hindurchgeht, neben der A. vertebralis vom großen Hinterhauptloche herabsteigt, und oben mit den Sinus der Schädelhöhle am großen Hinterhauptloche in Verbindung steht. Zuweilen öffnen sich diese beide Vertebralvenen einzeln in die V. jugularis communis, zuweilen öffnen sie sich aber auch, nachdem sie sich zuvor vereinigt haben. Sie nehmen das Blut aus den dem Hinterhauptloche näheren Venen der harten Hirnhaut aus der Schädelhöhle, ferner aus den Negen des Wirbelkanals, und aus den an der hinteren und vorderen Seite der Wirbelsäule gelegenen Venennegen auf.

II. Die an jeder Seite des Halses liegende Vena jugularis interna, innere Drosselvene, wird vom M. sternocleidomastoideus und omohyoideus bedeckt, entspricht der A. carotis, neben welcher sie etwas mehr nach außen liegt. Sie ist mit ihr und mit dem Nervus vagus, der zwischen der A. carotis und dieser Vene liegt, durch Zellgewebe zu einem Fascikel verbunden, so daß man diese 3 Theile sehr leicht gemeinschaftlich aufheben kann, und liegt weder so tief, wie die V. vertebralis, noch so oberflächlich, wie die V. jugularis externa, und ist also die mittlere Vene des Halses. Während indessen die A. carotis communis, mit welcher sie verglichen werden muß, außer den 2 Hauptzweigen, in welche sie sich theilt, gar keine Zweige hat, nimmt die V. jugularis interna meistens unten die mittlere Schilddrüsenvene, V. thyroidea media, und oben die obere Schilddrüsenvene, V. thyroidea superior, auf, mit welcher sich sehr häufig die vom Pharynx kommende V. pharyngea, und zuweilen auch die aus dem Kehlkopfe kommende Vene, Vena laryngea, verbindet. Oben in der Nähe der Stelle, wo sich die A. carotis communis spaltet, vereinigen sich auch 2 Hauptzweige der V. jugularis interna mit einander.

1) Joh. Gottl. Walther, de venis capitis et colli. In ej. obs. anat. Berolini 1775. p. 57.

1. Der obere und hintere große Zweig derselben, welcher das Blut durch das Drosseladerloch, foramen jugulare, aus der Schädelhöhle abführt, und deswegen Gehirnvane, vena cerebialis, heißen kann, kann in aller Rücksicht mit der A. carotis interna oder cerebialis verglichen werden.

2. Der andere, mehr vorn liegende große Zweig derselben, die Antlitzvene, vena facialis communis, liegt unter dem Winkel des Unterkiefers in der Gegend der Theilung der A. carotis communis. Sie hat einen sehr kurzen Stamm, der zuweilen sogar fehlt, denn die beiden großen Zweige treten erst nahe an der Stelle, wo sie sich in die V. jugularis begiebt, zusammen. Sie würde dasselbe Blut zurückführen, welches die A. carotis externa oder facialis vertheilt, und ihr also entsprechen, ginge nicht meistens die obere Schilddrüsenvene in den Stamm der V. jugularis interna, wäre ferner nicht die Stelle, wo sich die Vena lingualis, die Zungenvene, und die Schlundkopfsvene, vena pharyngea, öffnen, sehr veränderlich, und hätten endlich nicht die Hinterhauptvenen ihren Abzug durch die Vena jugularis externa und durch die Vertebralis superficialis. Denn vermöge dieser Einrichtungen fließt nicht alles das Blut durch die Vena facialis communis zurück, welches durch die A. carotis facialis zu den Theilen hingeflossen ist.

In der That ergießen die Vena pharyngea, die Schlundkopfsvene, und die Zungenvene, vena lingualis, ihr Blut bald gemeinschaftlich mit der V. thyreoidea, oder neben ihr in die V. jugularis interna, bald mit der V. submentalis in die Vena facialis anterior oder communis, bald allein in die V. facialis posterior, und nach Meckel sollen sie sich sogar in den aus dem Foramen jugulare heraufsteigenden Zweig der V. jugularis interna münden.

Die beiden Hauptzweige der V. facialis communis, die vordere und hintere Antlitzvene, sind in ihrer Größe sehr veränderlich. Dieses rührt daher, weil sie auch mit der V. jugularis ext. durch diese Verbindungszweige in Communication stehen. Durch diese Verbindungszweige nimmt zuweilen das Blut seinen Abfluß in die V. jugularis externa. Daher erscheint die hintere Antlitzvene sehr oft als ein Ast der V. jugularis externa, und dasselbe findet bisweilen, wiewohl seltener, bei der vorderen Antlitzvene Statt. In diesem Falle stehen jedoch beide Venen immer mit der V. facialis communis auch in Verbindung. Auch scheint es zuweilen an getrockneten, künstlich angefüllten Adern nur so als ginge eine von diesen Antlitzvenen in die V. jugularis externa über, ohne daß es wirklich der Fall ist, dann nämlich, wenn die eingespritzte Flüssigkeit zufälliger Weise diese Nebenwege stärker als die Hauptwege ausgefüllt hat.

A. Die vordere Antlitzvene, vena facialis anterior, entspricht ziemlich der A. maxillaris externa, und läuft hinter ihr vom inneren Augenwinkel an unter dem M. zygomaticus hinweg bis zum Aste des Unterkiefers. Ueber der Nase hängt sie mit der der andern Seite zusammen, und vorzüglich an 2 Stellen verbindet sie sich mit den Venen der Augen- und Schädelhöhle.

Erstlich am inneren Augenwinkel mit der an der Decke und an der inneren Wand der Augenhöhle liegenden Hirnaugevene, vena ophthalmica cerebialis, welche hinten durch die Fissura supraorbitalis mit den Venen der harten Hirnhaut im Schädel, namentlich mit dem Sinus cavernosus ununterbrochen zusammenhängt, so daß wahrscheinlich (was in manchen Krankheitsfällen wichtig zu sein scheint) durch Entziehung von Blut aus den in der Nähe des inneren Augenwinkels gelegenen Venen, z. B. aus den Stirnvenen, unmittelbarer als an vielen andern Stellen des Kopfs ein Abzug von Blut aus dem Gehirne be-
 rücksichtigt werden kann.

Zweitens, durch einen unter dem Wangenbeine an der Fissura orbitalis inferior zur vorderen Gesichtsvene kommenden tiefliegenden Venenzweig, ramus profundus, mit der in der Augenhöhle an der inneren und äußeren Wand liegenden Gesichtsaugenvene, vena ophthalmica facialis. Dieser tiefe, beträchtlich große Venenzweig ist mit den kleinen Communicationszweigen der A. maxillaris externa zu verbinden, welche unter dem Jochbeine hinweg zu den Aesten und Ästen der A. maxillaris interna gehen. Er nimmt auch die Vena infraorbitalis, die Vena sphenopalatina und die Vena alveolaris superior auf, und steht immer mit dem Plexus venosus pterygoideus in Verbindung. Daher ist es zuweilen schwer zu sagen, in welche von diesen Venen sich die in der Nähe der Fissura orbitalis inferior gelegenen Venenäste öffnen.

Da die an der unteren Seite der Augenhöhle gelegene vena ophthalmica facialis, wie später gezeigt werden wird, viele Venen des Auges aufnimmt, und durch die Fissura orbitalis superior mit dem Sinus cavernosus der Schädelhöhle verbunden ist, so entsteht durch diese Venenast eine Communication der Gehirnvenen, der Venen des Auges und der des Gesichts.

Auf dem beschriebenen Wege vom inneren Augenwinkel bis zum Aste der Antlitzvene treten außerdem in die vordere Antlitzvene, vena facialis anterior, nach Walter, die Stirnvenen, venae frontales, welche selbst wieder mit der durch das Foramen supraorbitale hervorkommenden Vena supraorbitalis zusammenhängen, die obere und untere Nasenrückenvene, Vena nasalis superior und inferior, die innere Unteraugenliedvene, vena palpebralis inferior inter-
 medialis, die Nasenflügelvenen, venae alares nasi, die auch mit den Venen der Nasenschleimhaut zusammenhängen, die äußere Unteraugenliedvene, vena palpebralis superior, die äußere Unterlippenvene, vena labialis superior

274 Vena jugularis int. Ihr Ast, die V. facialis poster

rea, welche nicht nur von den Lippen, sondern auch von den Backen- und Wasmuskeln und von der Haut des Mundes Blut aufnehmen, und von welche Kranzweige, *venae coronariae*, in der Mitte der Lippe von beiden Seite mit einander communiciren, endlich besondere kleine Venen von diesen Gesichtsmuskeln; die Unterlippenvenen, *venae labii inferioris*, welche zugleich Zahnfleisch und von den in der Nähe gelegenen Gesichtsmuskeln Blut fortführen von welchen die Kranzweige, *venae coronariae*, gleichfalls in der Mitte von beiden Seiten her mit einander communiciren; die Backenvenen, *venae buccales*, welche auch von der Ohrspeicheldrüse, von in der Nähe gelegenen Lymphgefäßen und vom M. masseter Blut aufnehmen; die Kiefermuskulaturvenen, *venae aetericæ*; die Unterkinnvene, v. *submentalis*, die mit der Zungenvene der Unterkinnlade anastomosirt und der A. *submentalis* entspricht, endlich die Speicheldrüsenvenen, *venae glandulae submaxillaris*. Bisweilen nimmt sie die obere Schilddrüsenvene, die Zungenvene und die Schlundkopfvene auf.

B. Die hintere Antlitzvene, *vena facialis posterior*, ist vor dem Ohre und durch die Ohrspeicheldrüse und hinter dem Ende des Unterkiefers herabsteigt, dicker als die vordere Antlitzvene ist, und ebendasselbe emporsteigenden Ende des Stammes der *Carotis externa* ziemlich entspricht, ist dicker als die vordere Antlitzvene, kommt in Zwischenraume zwischen dem Ohre und dem Aste des Unterkiefers her und liegt in der Substanz der Ohrspeicheldrüse, *glandula parotis*, borgen.

a. In einiger Entfernung vom Aste des Unterkiefers empfängt den tieferen Ast, *ramus profundus*, welcher der A. *maxillaris interna* zu vergleichen ist, indessen nicht alles das Blut zurückführt, diese Arterie vertheilt hat, weil die hinter dem Jochbogen und in Nähe der *Fissura spheno-maxillaris* gelegenen Venen, welche das den Ästen der A. *maxillaris interna* vertheilte Blut zurückführen noch durch eine 2te Vene einen Abzug haben, nämlich durch den tiefen Ast, *ramus profundus*, der *Vena facialis anterior*. Der tiefe Ast der *Vena facialis posterior* kommt von der unteren Kinnhöhlenspalte her, und geht hinter dem Jochbeine und dem Aste der unteren Kinnlade zur hinteren Gesichtsvene. Er gleicht mehr einem Flechte von Venen, als einer einfachen Vene. In dieses Geflecht, *plexus pterygoideus*, gehen die mittlere Hirnhautvene, *vena meningea media*, die die Äste der A. *meningea media*, nach Breschet, mit doppelten Zweigen vertheilt, sich jedoch nicht selten in einen Sinus der harten Hirnhaut ergießt, nicht immer derselbe ist¹⁾, mehrere tiefe Schläfenvenen, *venae temporales profundae*, die aus dem Zahncanale hervortretende Unterkiefervene, *vena alveolaris s. maxillaris inferior*, welche bisweilen doppel ist und manchmal auch in einem eignen Canale unter dem für die Arterien bestimmten Canale läuft, und andere Venen, die den Ästen der A. *maxillaris interna* entsprechen. Mit diesem Geflecht steht aber auch der tiefe Ast, *ramus profundus*, der vorderen Gesichtsvene in Verbindung.

b. Der oberflächliche Ast der hinteren Antlitzvene, *ramus superficialis*, oder der Stamm der Schläfenblutadern steigt vor dem

¹⁾ *Vicq d'Azyr*, Planche XXXV. 19. 20. *Walter*, von den Krankheiten des Gehirns und vom Schlagfluß. Berlin 1785. Tab. I. et II. *Breschet*, Le veineux. Pl. V. XI. XV.

über der Wurzel des Jochbogens und hinter dem Aste des Unterkiefers ab, nimmt die mehr vom vorderen Theile des Kopfs kommende tiefe Schlasvene, vena temporalis profunda, und die mehr vom hinteren Theile desselben kommende oberflächliche Schlasvene, v. temporalis superficialis, nahe an der Wurzel des Jochbogens auf.

Die tiefe Schlasvene, vena temporalis profunda, nimmt mehrere sehr oberflächlich in der Haut der Stirn und der Augenlieder erlaufende Venen auf, ihr Stamm liegt aber unter der Aponeurosis des M. temporalis, und steht daselbst mit den tiefen Schlasvenen des tiefen Astes der hinteren Gesichtsvene in Verbindung.

Namentlich ergießen sich in die tiefe Schlasvene folgende oberflächliche Aeste: die äußere Augenliedvene, vena palpebralis superior externa, und mehrere Stirnvenen, v.v. frontales, von welchen eine über dem Rande der Augenhöhle sehr in querer Richtung läuft.

Die oberflächliche Schlasvene, vena temporalis superficialis, liegt in ihrem ganzen Verlaufe in der Haut. Sie entsteht durch das Zusammenkommen eines hinteren Zweiges, der am Hinterhaupte mit den zur v. jugularis externa und zur v. vertebralis superficialis gehörenden Hinterhauptvenen zusammenhängt, und dann zwischen dem Ohre und der Hirnschale hinget, und eines vorderen Zweiges, der mehr senkrecht vom Scheitel heruntersteigt. Alle an der Haut des Kopfs sich verbreitende Venen hängen untereinander vielfach zusammen.

Außer diesen Endzweigen gehen in den oberflächlichen Ast der hinteren Antevene, oder auch zuweilen in ihren Stamm mehrere vordere oberflächliche Arterien, v.v. auriculares anteriores, eine vom Gehörgange kommende tiefe Ohrvene, v. auricularis profunda, eine vordere und hintere Gelenkvene, v. articularis anterior und posterior, vom Untergelenk und den benachbarten Theilen, die hintere Ohrvene, v. auricularis posterior, vom Ohre und der Ohrspeicheldrüse, endlich die quere Antlitzvene, vena transversa faciei, und mehrere unbenannte Zweige aus der Parotis und der benachbarten Gegend.

III. Die oberflächliche Drosselader, vena jugularis externa, ist die größte Hautvene des Halses und des Kopfs. Sie ist in der Regel weit kleiner als die Vena jugularis interna, und ihr Stamm, welchem ihre Hauptzweige zusammenkommen, ist so kurz, daß er zuweilen ganz zu fehlen scheint und ihre Zweige sich an einem Punkte in die V. jugularis communis einmünden, oder mehrere derselben sich auch einzeln öffnen. So wie aber die meisten großen Hautvenen mit tiefer liegenden Stämmen, so communicirt auch sie an gewissen Stellen mit den beschriebenen tiefer liegenden Venen, und zwar vorzüglich mit den oberflächlicheren Aesten derselben. Unter Umständen, welche oft selten eintreten, geschieht es nun, daß das Blut oder die Flüssigkeit, durch welche die Adern nach dem Tode angefüllt werden, ihren Weg auch diese communicirenden Aeste in die Vena jugularis externa nehmen, und dadurch vielen Venen, welche als Aeste der Vena jugularis

interna betrachtet werden, das Ansehn geben, als wären sie Vena jugularis externa. Die Zweige, welche in dem meisten kurzen Stamme derselben nahe am Schlüsselbeine zusammenkommen, vordere, mittlere und hintere.

1. Die vorzüglichsten vorderen Zweige der rechten und der Vena jugularis externa liegen vorn neben der Mittellinie der Brust und steigen von dem Raume unter dem Kinne bis zum obere des Brustbeins ziemlich senkrecht herab (vena mediana communis), stehen auf diesem Wege und vorzüglich auch in der Halse mit einander durch einen Communicationszweig in Verbindung und gehen dann in querer Richtung dicht über dem Schlüsselbein zu dem sehr kurzen Stamme der Vena jugularis externa über, öffnen sich auch besonders in die Vena jugularis interna oder communis. Zuweilen stehen sie auch in der Mittellinie des Halses der V. jugularis communis sinistra oder mit der aus der V. jugularis communis thyreoidea inferior in Verbindung. Bisweilen ergießen sich in sie unten auch Venen von der Oberfläche des Brustbeins. Mehrere andere unbestimmtere, ein Netzwerk Hautvenen am vorderen Theile des Halses vereinigen sich mit diesen Venen, oder öffnen sich besonders in die Vena jugularis externa. Am Kinne stehen die vorderen Aeste mit den Aesten der V. facialis anterior oder mit dem Stamme der V. facialis communis in Verbindung, an der Schilddrüse und an dem Kehlkopfe vereinigen sich oft mit Aesten der V. jugularis interna und communis. Die ganze vordere Oberfläche des Halses ist von ihnen mit einem, weichen Räume habenden Netzwerke bedeckt.

2. Der vorzüglichste mittlere Zweig der Vena jugularis externa kommt von dem hinter dem Ohre gelegenen Theile des Halses herab, liegt dann auf dem M. sternocleidomastoideus, steht in der Nähe des Winkels der Kinnlade durch einen Communicationszweig mit der Vena facialis anterior, und durch einen andern mit der Vena facialis posterior, zuweilen auch mit der Vena facialis communis in Verbindung, so daß es zuweilen den Anschein hat, als ob es ihr Blut hauptsächlich in die V. jugularis externa ergieße. Dann geht er nicht weit vom hinteren Rande des M. sternocleidomastoideus zu dem sehr kurzen Stamme der V. jugularis externa herab.

Die hinteren Aeste der V. jugularis externa gehen von hinten am Halse herab, und kommen zuweilen sogar von oben herab. Bisweilen gehen die Venen, welche die A. cervicalis

ialis transversa colli und transversa scapulae begleiten, gleichfalls die V. jugularis externa.

Venen einiger Theile des Kopfs, welche mit mehreren der beschriebenen Venenstämme in Verbindung stehen.

Venen in der Schädelhöhle.

Die Venenstämme, in welche das Blut aus dem Gehirne, aus der harten Hirnhaut und aus den Hirnschalenknochen zusammenschießt, haben eine ganz andere Lage als die großen Arterien, welche dem Gehirne das Blut zuführen. Diese liegen innerhalb der harten Hirnhaut und an der Grundfläche des Gehirns; jene liegen zwischen den Platten der harten Hirnhaut und im ganzen Umfange des Gehirns. Aber nicht nur die großen Venen begleiten die ihnen entsprechenden Arterien nicht, sondern dasselbe gilt auch von den meisten kleinen Venen. Indessen werden doch die Arteria fossae Sylvii und die Arteria corporis callosi auf einem Theile ihres Weges von entsprechenden Venen begleitet. Die Venenstämme im Schädel liegen entweder in den in seiner Höhle vorspringenden Falten der harten Hirnhaut, oder in dem an den Knochen gehefteten Theile dieser Haut, und werden Sinus durae matris genannt.

Die in den Falten gelegenen Sinus haben keinen vollkommen kreisförmigen, sondern einen etwas dreieckigen Querschnitt, und sind meistens einfache, nicht in Zweige getheilte, oft sehr dicke Canäle.

Die unter dem angewachsenen Theile der harten Hirnhaut befindlichen Sinus sind kleinere, oft Geflechte bildende Canäle, die mit dem Plexus venosus anterior des Rückgratcanals Aehnlichkeit haben, und auf der Grundfläche des Schädels liegen. Alle Sinus sind unter der harten Hirnhaut oder zwischen ihren Platten befindliche Zwischenräume, welche von der innersten sehr dünnen Haut der Venen ausgekleidet werden. Die harte Hirnhaut sichert hier die Canäle der Venen vor übermäßiger Ausdehnung, und es bedurfte daher dazu der äußeren Weichhaut nicht.

Die Sinus ¹⁾ der Schädelhöhle hängen untereinander auf jeder Seite und von beiden Seiten her zusammen, und haben ihren Abzug vorzüg-

¹⁾ Abbildungen über die Sinus der harten Hirnhaut findet man bei Vicq d'Azur, verbunden mit einer sehr vollständigen Literatur, bei Haller (Iconum anat. Fasc. I.), bei Rosenmüller (chirurgisch-anatomische Kupfertafeln), und ganz vorzüglich schön bei Breschet (le système veineux). Haller hat zugleich das gesammelt, was bis auf seine Zeit über diese Venen beobachtet worden war.

lich durch die 2 Foramina jugularia in die Vena jugularis, das Foramen magnum ossis occipitis in die Vena vertebra profunda, durch die Fissura orbitalis superior in die V. thalamica cerebralis und facialis der Augenhöhle, endlich durch Menge nicht immer vorhandener Löcher, emissaria Santorini, nämlich durch die Foramina condyloidea posteriora, mastoidea, rietalia, ovalia, in die benachbarten Venen am Umfange des K. so daß also einer Hemmung des Rückflusses des Venenbluts aus Kopfe sehr vorgebeugt ist.

Drei Sinus, von denen jeder nur einmal vorhanden ist, liegt der mittleren Ebene, die den Schädel in 2 gleiche Hälften theilt, nämlich

Der obere Längenblutleiter oder Sichelblutleiter, *longitudinalis superior*, der größte unter ihnen, welcher da liegt der *Processus falciformis* am Schädel angewachsen ist. Vorn ist er hinten nimmt er an Größe zu, vorn steht er bei Kindern durch *Foramen coecum* mit kleinen Venen der Nase, oben mit Haut des Kopfs mittels kleiner Zweige, die durch die *Foramina parie* gehen, in Verbindung. Hinten im *Tentorium cerebelli* setzt er in den *Sinus transversus*, vorzüglich der rechten Seite, fort. Er ist die Venen von der Oberfläche der beiden Hirnhälften auf, die als viele kleinen großentheils schief von hinten nach vorn laufend, und also nicht in der Richtung des Blutstroms gehend, seltener quer, noch seltener schief nach hinten in den *Sinus* eintreten ¹⁾.

Der untere Längenblutleiter oder Sichelblutleiter, *longitudinalis inferior*, ist viel kleiner als der obere, gleicht mehr gewöhnlichen Vene, läuft im unteren Rande des *Processus falciformis* von vorn nach hinten, nimmt einige Venen von der inneren Fläche der Hemisphären des Hirns auf, und endigt sich in den *Sinus transversus quartus*. Bisweilen soll er gefehlt haben.

Der *Sinus transversus quartus*, liegt an der Stelle, wo sichelförmige Fortsatz mit dem *Tentorium cerebelli* zusammen und geht also in der Mittellinie des Zeltes von vorn nach hinten, vorn nicht nur den *Sinus longitudinalis inferior*, sondern auch größte und die tiefste Vene des Gehirns, die *Vena magna Galeni*. Diese nur einmal vorhandene sehr große Vene wird an dem Gange in die Ventrikel des großen Gehirns zwischen dem hinteren Ende des *Corpus callosum* und der auf den Vierhügeln ruhenden *Glandula pinealis* aus 2 großen Zweigen zusammengesetzt.

Diese 2 großen Zweige laufen nämlich dicht neben einander an der W

¹⁾ Bieg d'Azur beobachtete einmal, daß dieser *Sinus* eine Insel bildete. Bisweilen der *Sinus longitudinalis*, wie *Sömmering* (*Gefäßlehre*, S. 441.) erwähnt, eine Scheidewand in 2 *Sinus* theilt und fast doppelt. Bisweilen ist er auch durch kleine quere Vorsprünge in einige Fächer getheilt.

Seite des Fornix von vorn nach hinten, und vereinigen sich dann. Jeder derselben gehört einer Hemisphäre des Gehirns an, und wird hinter dem vorderen Schenkel des Fornix zusammengesetzt, theils aus Venen, die an der Seite des Septum pellucidum liegen und aus der Gehirnsubstanz hervorgetreten sind, theils aus Venen, welche den Plexus choroideus des Seitenventrikels begleiten haben und mit ihm durch die Monroische Oeffnung getreten sind. In vielen Stellen der Wände des Seitenventrikels im vorderen, hinteren und im unteren Horn liegen Venenstämmchen, die aus der Substanz des Gehirns hervorkommen, z. B. zwischen dem gestreiften Körper und dem Sehhügel. Manche von ihnen begleiten dann sehr geschlängelt den Plexus choroideus. An der unteren Seite des Hirnschenkels hängen diese im Plexus choroideus des unteren Horns gelegenen Venen mit den Venen an der Grundfläche des Gehirns und mit den die A. corporis callosi begleitenden Venen zusammen. Auf dem Sehhügel treten mehrere Venen aus dem Plexus choroideus unter dem Fornix zu den vorhin beschriebenen 2 Venenstämmen, auch aus dem Sehhügel, dem Corpus striatum und aus dem Balken kommen Aeste hinzu. In den hintersten Theil jener 2 Venen, oder in den Hauptstamm, den sie zusammensetzen, ergießen noch eine Anzahl Venen ihr Blut, welche theils um die Vierhügel herum aus dem hinteren und untern Horn, theils um den Hirnschenkel und die Brücke herum von der Grundfläche des großen und des kleinen Gehirns, theils mit den processibus cerebelli ad corpora quadrigemina aus der Substanz des kleinen Gehirns, theils endlich von der oberen Oberfläche des kleinen Gehirns kommen. Rosenthal¹⁾ fand sogar, daß 2 um die Hirnschenkel herumgeschlagene Zweige auf der Grundfläche des Gehirns zwischen den 2 Hirnschenkeln und vor dem chiasma nervorum opticorum unter einander von beiden Seiten her communicirten, und mit der V. corporis callosi, der V. fossae Sylvii und unter einander in Verbindung standen. Breschet hat aber den Verlauf dieser Venen nicht so angegeben. Der Stamm der Vena magna Galeni steigt nun zu dem Sinus quartus empor. In der vorderen Spitze des unteren Horns des Seitenventrikels hängen, nach Breschet²⁾, die Aeste der Vena magna Galeni, welche dem Plexus choroideus folgen, mit der Vena corporis callosi und mit der Vena fossae Sylvii zusammen, welche die ihnen entsprechenden Arterien ein Stück begleiten und sich zu den nämlichen Stellen des Gehirns verbreiten, als diese Arterien.

Der Sinus quartus ist daher sehr dick, nimmt zuweilen den Hirnhauptblutleiter, sinus occipitalis, auf, und endigt sich in dem linken oder in dem rechten Querbloodleiter, oder an der Stelle, wo beide zusammenstoßen.

Die 2 Hinterhauptblutleiter, sinus occipitales posteriores, laufen wie ein Kranz um das große Hinterhauptloch, und dann an der Sichel des kleinen Gehirns herauf. Unten hängen sie mit den Plexibus venosis der Rückgrathöhle und mit den vorderen Hinterhauptblutadern zusammen, und haben da das Ansehen eines Venengeflechts, oben ergießen sie sich in den Querbloodleiter, sinus transversus. In sie öffnen sich vorzüglich Venen des kleinen Gehirns.

Drei unter einander zusammenhängende Sinus, der Sinus transversus, der Sinus petrosus superior und der Sinus petrosus inferior, haben auf jeder Seite eine mehr quere und horizontale Lage und liegen am Hinterhauptbeine, am oberen Winkel und am hinteren Winkel des Felsenbeins. Der Sinus transversus und der Sinus petrosus superior liegen am angewachsenen Rande der großen horizonta-

¹⁾ F. Rosenthal, de intimis cerebri venis seu de venae magnae Galeni ramis; cum 2 iconibus. Nova acta physico-medica acad. Caes. Leopold. Carol. naturae curios. Tom. XII. pars I. p. 301.

²⁾ Breschet, le système veineux. Pl. 48. Fig. 2. V.

ten Falte der harten Hirnhaut, die man Tentorium cerebelli nennt

Der Querblutleiter, *sinus transversus*, ist der größte Blutleiter und eine der größten Venen, welche quer über die Mittellinie des Körpers hinweggehen. Er liegt in dem an den Schädelknochen angewachsenen Rande des Tentorium, und erstreckt sich quer über das Hinterhauptbein und über den *Angulus mastoideus* des Seitenschädelbeins bis an das Felsenbein, hier verläßt er das Tentorium cerebelli und läuft in der bekannten Rinne der *Pars mastoidea* des Schlafbeins bis zum Foramen jugulare. Er ist ein Mittelpunkt, in welchem die meisten Sinus unter einander zusammenhängen. Denn an der *Protuberantia occipitalis interna* nimmt er nicht nur den *Sinus longitudinalis superior* und *inferior*, den *Sinus quartus* und *occipitalis posterior* auf, sondern an der Stelle, wo das Tentorium an das Felsenbein befestigt zu werden anfängt, ergießt sich auch der *Sinus petrosus superior*, und vor dem Foramen jugulare der *Sinus petrosus inferior* in ihn, die selbst wieder mit andern Sinus in Verbindung stehen. Weilen nun die rechte und die linke Hälfte desselben sich in einander setzen, so kann auch das Blut von der rechten Seite des Gehirns unter manchen Umständen seinen Abfluß durch die linke *V. jugularis externa*,

Häufig ist der rechte Querblutleiter weiter als der linke (nach *Blaas*, *d'Azara*, *Sömmerrings* und *Rudolph's* Vermuthung, weil die meisten Menschen auf dieser Seite schlafen, und also das Blut des *Sinus longitudinalis superior* während des Schlafs mehr auf diese Seite abfließt). Selten ist der linke weiter. Bisweilen liegen auf einer Seite 2 parallele Querblutleiter unter einander, die sich durch 2 Oeffnungen in den der andern Seite münden. Nach *Lieutaud* soll der Querblutleiter sogar einmal auf der einen Seite gefehlt haben.

Der rechte und linke obere Felsenblutleiter, *sinus petrosus superior*, ist doppelt vorhanden, nimmt den ganzen Rand des Tentorium ein, der am oberen Winkel von der Spitze des Felsenbeins bis zu seiner Basis angewachsen ist, und öffnet sich in den *Sinus transversus*, zuweilen auch in den *Sinus petrosus inferior*. Er nimmt außer einigen Venen der harten Hirnhaut, Venen vom vorderen und hinteren Lappen des großen Gehirns, vom kleinen Gehirn und von der Brücke auf.

Der rechte und linke untere Felsenblutleiter, *sinus petrosus inferior*, ist weiter als der obere, liegt in der Furche zwischen dem unteren Winkel des Felsenbeins und dem Grundbeine. Beide stehen hinter dem Sattel mit einander durch eine quere Fortsetzung in Verbindung. Auf jeder Seite ist auch dieser Sinus mit dem *Sinus petrosus superior*, *cavernosus* und mit dem *Sinus occipitalis anterior* in Communication, außerdem gehen Venen der harten Hirnhaut und des vorderen Theils des kleinen Gehirns in ihn hinein.

Der rechte und linke Grundbeinblutleiter, *sinus occipitalis anterior* (*sinus fossae basilaris*, nach *Breschet*) bestehen aus 2 in der Rinne des Grundbeins herabsteigenden Venensträngen, die unter einander an einigen Stellen durch quere Stränge in Verbindung gesetzt

sind. Da jeder von diesen Strängen aus geflechtartig getheilten Venen besteht, so haben diese Sinus sehr viel Aehnlichkeit mit den vorderen Venengeflechten im Rückgratcanale, deren Fortsetzung sie sind. Sie nehmen unter andern die aus dem Meatus auditorius internus kommenden Venen des Labrynthes des Ohrs¹⁾, stehen oben mit dem Sinus petrosus inferior, circularis und cavernosus, unten mit der Wirbelvene in Verbindung.

Der kranzförmige oder elliptische Blutleiter, sinus circularis, liegt an der oberen Seite des Hirnanhangs auf dem Türkensattel, umgiebt wie eine weitere Ellipse die Stelle, wo sich der Trichter in den Hirnanhang einfügt, steht mit dem Sinus cavernosus, mit den Grundbeinblutleitern und mit den oberen Felsenblutleitern in Verbindung. Er nimmt Venen vom Hirnanhange auf. Zuweilen fehlt er ganz, öfter fehlt die vordere oder die hintere Hälfte desselben. Bisweilen ist auch eine von diesen beiden Hälften sehr dünn²⁾. Bisweilen dagegen soll er doppelt gewesen sein.

Der rechte und linke zellige Blutleiter, sinus cavernosus, liegt an der Seite des Türkensattels zwischen den Blättern der harten Hirnhaut, und ist durch viele unregelmäßige, querlaufende Fäden in Zellen getheilt. Durch ihn scheinen die Carotis und der 6te Hirnnerv hindurch zu gehen, nach Breschets Darstellung liegen sie aber nur an ihm an. Beide zellige Blutleiter stehen, nach Beobachtungen, welche Winslow und neuerlich Breschet gemacht haben, durch einen queren, unter der Glandula pituitaria weggehenden Strang unter einander, und durch die obersten Stränge der Grundbeinblutleiter auch mit diesen in Verbindung. Auch mit dem Kranzblutleiter communiciren sie und vertreten zuweilen dessen Stelle. Sie nehmen die Venen vom vorderen Lappem und vom Anfange des hinteren Lappens des großen Gehirns, so wie auch Venen der harten Hirnhaut auf. Das Blut derselben hat nach vorn vorzüglich durch die Vena ophthalmica cerebri der rechten und der linken einen Ausweg in die Augenhöhle, und von da in die vordere Anflügvene, nach hinten zu durch die Sinus occipitales anteriores in die Wirbelvene, und durch die Petrosos in die Vena jugularis. Nach Santorini³⁾ soll der Zellblutleiter einmal gefehlt haben.

Der rechte und der linke Kleinflügelblutleiter, sinus alae parvae (den Breschet zuerst beschrieben und sinus sphenoparietalis genannt hat) liegt in der Falte der harten Hirnhaut, welche eine Fortsetzung des Tentorium cerebelli ist, an dem hinteren freien scharfen Rande des kleinen Flügels hervorrägt und in die Quersfurche zwischen dem vorderen und hinteren Lappen des großen Gehirns eingreift. Breschet hat gezeigt, daß eine der größten Gehirnvenen, die Vena fossae Sylvii, welche etwas vor der A. fossae Sylvii liegt, sich in diesem Si-

¹⁾ Sömmerring, Gefäßlehre, S. 447.

²⁾ Sömmerring, a. a. D. S. 446.

³⁾ Observationes anatomicae, p. 72.

nus öffnet, und daß er eine Menge Knochenvenen und zuweilen die Vena meningea media, die die Arterie gleiches Namens begleitet, aufnimmt. Man bemerkt daher oft an der unteren Seite des kleinen Flügels eine Furche, die sich in eine am Seitenscheitelbeine neben den vorderen Nerven der A. meningea media in die Höhe gehende Furche fortsetzt, an welcher man eine Menge in die Diploe führende Löcherchen sieht ¹⁾.

• Emissaria Santorini ²⁾.

Die Bluthöhlen der Hirnschale haben durch dünne Venen (emissaria Santorini), welche durch Löcher der Hirnschale gehen, mit den äußern Venen des Kopfes Gemeinschaft. Diese sind namentlich diejenigen, welche

durch die Foramina mastoidea aus den Sinubus transversis zu den Venis occipitalibus; durch die Foramina parietalia aus dem

¹⁾ Breschet, le système veineux. Pl. 34 et 36. B. 45. A. explication, p. 62.

Auch die Blutleiter des Gehirns sind zuweilen Abänderungen unterworfen. So soll einmal ein Sinus transversus gefehlt haben (Lieutaud, essai anat. p. 385), und ein Sinus cavernosus (Santorinus, obs. anat. p. 72.). Häufiger wurden die Nerven fehlend, auch doppelt gesehen, selbst den Sinus falcoformis major sah man zum Theil doppelt. (Haller, Elem. physiol. IV. p. 147.) Einen sonderbaren Blutleiter auf jeder Seite, vom Sinus transversus über die Felsenbeine und durch die mittlere Schlädelgrube zur Augenhöhle verlaufend, sah Keilich (Beitr. z. pathol. Anat. Berl. 1813. S. 80.).

In dem Schädel eines alten Mannes, in welchem die Eindrücke der Arterien der harten Hirnhaut sehr tief waren, fand Otto auf der linken Seite 2 sonderbare Canäle, anomale Blutgefäße, die eine Verbindung der Hirnvenen mit den äußern Venen am Kopfe bildeten. Das linke Foram. mast. führte nämlich nicht gerade durch in die Schädelhöhle, sondern vertief zwischen der äußern und innern Knochen tafel weit und groß, erst horizontal, $\frac{1}{2}$ " lang nach vorn, dann immer weiter werdend, bedeuend schräg abwärts und vorwärts, fast bis zum untern Ende des proc. mast. herab, öffnete sich dann zwar innerlich durch ein großes rundes Loch in den untern Theil der Fossa sigmoidea, setzte sich aber als Canal im Schläfenbeine weiter fort, und spaltete sich dann in feinere Canäle für die Diploe des Knochens und in einen Verbindungskanal mit einer zweiten anomalen Vene.

Es fand sich nämlich in der Wurzel des Proc. zygom. des linken Schläfenbeins etwa 1" vor und über dem äußern Ende der Fissura Glaseri, in der sonst sehr festen Knochenmasse, ein rundes, glattes, wohl $1\frac{1}{2}$ " im Durchmesser haltendes Loch, welches zu einem Knochen canale führte, der gerade einwärts bis in die Schädelhöhle drang, sich dann knieförmig rückwärts bogte, als tiefer, etwa $\frac{3}{4}$ " langer, im Leben von der harten Hirnhaut vervollständigter Halbcanal an der Grenze der vordern Fläche des Felsenbeines und der Schuppe des Schläfenbeines vertief, dann wieder innerlich durch eine dünne Knochen tafel bedeckt wurde, weit, und mannigfaltig gewunden in der Diploe des Schläfenbeins sich fortsetzte, mit den feinsten Nerven des vorigen verästen Canals zusammenhängend, und endlich mit einer bedeutend großen Öffnung in der Furche des linken Querblutleiters, da, wo er vom Hinterhauptbein zum Schläfenbein geht und sich abwärts krümmt, endigte. (Otto, neue seltne Beob. Berl. 1824. 4. p. 70.)

²⁾ Joh. Theoph. Waller, de emissariis Santorini. Fref. ad V. 1757. 4. Wegen dieser Verbindung der äußern und inneren Venen des Kopfes darf man hoffen, daß Blutegel an die Stirn in der Nähe der Halswurzel und hinter den Processus mastoideus gesetzt, leichter als anderwärts eine Entleerung der Venen des Gehirns her vorbringen.

Longitudinalis superior zu denselben; durch die Foramina condyloidea anteriora aus den Transversis zu den Vertebralibus; durch die Foramina spinosa, ovalia und rotunda, aus den Sinibus cavernosis zu den Plexibus pterygoideis; durch Löcher der Siebplatte des Siebbeins in die Venen der Nase gehen u.

Diese Venen sind jedoch unbeständig: man findet z. E. bald eins oder beide Foramina parietalia verwachsen; bald nur ein Foramen mastoideum, bald mehrere u. Auch durch das Foramen coecum vor dem Hahnenkamme des Siebbeins gehen bei Kindern dünne Venen aus dem Sinus longitudinalis superior zu den Venen der Nase.

Die Venae ophthalmicae, da sie hinten aus dem Sinus cavernosus hervortreten, vorn aber in die Vena facialis anterior übergehen, bringen den Sinus cavernosus mit den Gesichtsvenen in Verbindung.

Venae diploicae, Venen der Schädelknochen ¹⁾.

Im regelmässigsten Falle fand Breschet 8 Venenstämme, welche sich in der Diploë des Schädels baumsförmig zerkleinerten und unter einander mittels ihrer Zweige zusammenhingen. Zwei hintere Venae diploicae occipitales, welche unter einander durch einen communicirenden Zweig in Verbindung stehen und am Hinterhaupte gegen den Scheitel zu in die Höhe steigen, 4 an der Seite des Schädels gelegene, 2 auf der rechten und 2 auf der linken Seite gelegene Venae diploicae, temporales posteriores und Venae diploicae temporales anteriores, endlich 2 solche Venen an der Stirn, Venae diploicae frontales. Indessen sind diese Venen, nach Breschet, ihrer Zahl, ihrer Endigung und ihrer Verbreitung nach sehr veränderlich. So bildet Breschet die Furchen derselben an einem Schädel ab, wo nur die Vena diploica temporalis anterior vorhanden war, und die Stelle der posterior vertrat. Die Oeffnungen, durch welche diese Venen entweder an der inneren Oberfläche des Schädels mit den Venen der harten Hirnhaut und mit den Sinibus in Verbindung stehen, oder an der äußeren Oberfläche desselben mit andern Venen in Verbindung stehen, sind enger als die Canäle selbst. Die Canäle, in welchen die Venen liegen, sind von einer dichteren Knochenlamelle umgeben und von der benachbarten schwammigen Substanz geschieden. Diese Canäle werden von der über alle Begriffe dünnen und durchsichtigen innersten Haut der Venen ausgekleidet, ohne daß man etwas von einer äußeren Haut der-

¹⁾ Breschet, über neu entdeckte Theile des Venensystems (Nova acta physico-medica Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. curios. Tom. XIII. Bonnae 1826. und in seinem Meisterwerke: Le système veineux, auf sehr vielen Platten.

selben zu bemerken im Stande ist ¹⁾. Die Vena diploica temporalis anterior öffnet sich in den Sinus alae parvae. Die Venen der Diploë haben keine Arterien zu Begleitern.

Venen des Auges und der Augenhöhle, Venae ophthalmicae.

Jedes Auge hat 2 Venas ophthalmicas, eine cerebralis, welche dicker, und eine facialis, welche dünner ist.

1. Vena ophthalmica cerebralis, Hirnaugevne. Ihr vorderes Ende öffnet sich am innern Augenwinkel in das obere Ende der Vena facialis anterior. Von hier geht sie in der Augenhöhle an der innern Seite des Augapfels unter der Rolle des M. trochlearis rückwärts, krümmt sich dann über den Sehnerven hinter dem Augapfel hinüber, gelangt so an die äußere Seite des Sehnerven, steigt hier rückwärts hinauf über den Anfang des M. rectus externus, und ergießt sich durch den innern Theil der Fissura orbitalis superior in den Sinus cavernosus: selten in den circularis. Auf diesem Wege steht sie durch mehrere [nach Walter ²⁾ durch 3] Communicationszweige mit der Vena ophthalmica facialis in Verbindung.

Die Vena ophthalmica cerebralis nimmt, wenn man vorzüglich Walters Untersuchungen berücksichtigt, von vorn nach hinten nach und nach folgende, in vieler Hinsicht sehr veränderliche Venen auf. Eine Vene, vena sacci lacrymalis, vom Thränensacke und von den anliegenden Theilen am innern Augenwinkel. Die vordere Nasenvene, vena ethmoidea anterior, aus dem vordern Foramen ethmoideum, welche dünner ist als die posterior, und bisweilen fehlt. Die Thränendrüsenvene, vena lacrymalis, welche die obere Hirnbelvene der Aderhaut, vena vorticiosa superior, aufnimmt. Die hintere Nasenvene, vena ethmoidea posterior, aus dem hinteren Foramen ethmoideum; Venen von den Augenmuskeln, venae musculares, die sich an verschiedenen Orten in die Vena ophthalmica cerebralis, theils auch in die lacrymalis, und in die ethmoidea posterior ergießen; Venae ciliares, ergießen sich an verschiedenen Orten, theils auch in Venas musculares ic. Die Vena centralis des Sehnerven, ergießt sich in den hintern Theil der Vena opht. cerebralis, und in einigen Körpern in den Sinus cavernosus.

¹⁾ Bei der Trepanation werden bisweilen durch Verletzung der Hauptkämme derselben wichtige, schwer zu stillende Blutungen erregt. Siehe Th. I. S. 323.

²⁾ Walter, epistola ad Willh. Hunterum: de venis oculi (zugleich deutsch). Berlin 1778. 4.

2. *Vena ophthalmica facialis*. Ihr oberes Ende kommt aus dem *Sinus cavernosus*, unter der *V. ophthalmica cerebralis*. Von diesem geht sie durch den innern Theil der *Fissura orbitalis superior* in den hintern Theil der Augenhöhle, in diesem bis zur *Fissura orbitalis inferior*, und ferner in die *Fissura spheno-maxillaris* hinab, wo sie die *Vena infraorbitalis* aufnimmt, die aus der hintern Oeffnung des *Canalis infraorbitalis* zu ihr kommt und 2 Wirbelvenen der Aderhaut, *venae vorticosae*, empfängt. Dann verbindet sich mit der *Vena ophthalmica facialis* die vom *Foramen spheno-palatinum* kommende *Vena spheno-palatina*, und so entsteht dann der tiefe Ast der *Vena facialis anterior*, der unter dem Jochbeine in's Gesicht geht. Aeste der *Vena ophthalmica cerebralis* und *facialis*, welche aus dem Augapfel hervorkommen.

Diese schon zum Theil gelegentlich erwähnten Venen sind die *Venae ciliares* und die *Vena centralis retinae*. *Venae ciliares* heißen diejenigen Venen, welche die Sklerotika durchbohren, in der Aderhaut, im *Corpus ciliare* und in der Iris vertheilt sind. Nachdem sie die Sklerotika durchbohrt haben, empfangen sie feine Aestchen an der auswendigen Fläche derselben. Sie endigen sich theils mit dickeren, theils mit dünneren Stämmen in der *Vena ophthalmica cerebralis*, in der *V. ophthalmica facialis*, in der *V. communicans prima*, oder auch in *Ramis muscularibus*, in der *V. lacrymalis*, in der *Centralis*.

Einige *Venae ciliares posticae*, meistens 4, seltener 5, heißen *Vasa vorticosae*, werden in der vorderen Hälfte der auswendigen Fläche der Aderhaut aus büschelförmig sich vereinigenden Aesten zusammengesetzt, deren einige vorwärts zum vordersten Theile dieser Fläche der Aderhaut und zur Iris, andere seitwärts, andere noch mehr gekrümmt erst seitwärts, dann wieder rückwärts zum hintern Theile der Aderhaut zwischen den *Arteriis ciliaribus posticis* fortgehen.

Die übrigen *Venae ciliares posticae* liegen zwischen den *Vasis vorticosis* am vordern und hintern Theile der Aderhaut, und bilden ein Netz.

Die *Venae ciliares longae*, deren gemeiniglich 2 (an jeder Seite des Auges eine) da sind, durchbohren die Sklerotika an ihrem hintern Theile schief, jede in Begleitung eines *Nervus ciliaris*. Sie kommen von der Iris, gehen durch den *Orbiculus ciliaris*, und laufen jede an einer Seite zwischen der Sklerotika und der Aderhaut rückwärts, und vertheilen sich also fast eben so, als die *Arteriae longae* sich zur Iris vertheilen.

Die *Venae ciliares anticae* endigen sich in die Muskeln welche die *M. M. rectos* begleiten, kommen von dem vordern Ende der auswendigen Fläche der *Sclerotika*, wo sie unter einander verbunden sind und Aeste, welche die *Sclerotika* zwischen den Flecksen der *M. rectorum* und dem Rande der Hornhaut durchbohren, und unter *Orbicularis ciliaris* aus der *Iris* hervorkommen, aufnehmen.

Die *Vena centralis* ist eine dünne Vene, die sich im *Sinu venosus*, seltener in dem hintern Theile der *Vena ophthalmica* endigt. Sie entsteht am Ende des Sehnerven, auf der innern Fläche der Nervenhaut, aus vielen netzförmig verbundenen Aesten die die Nervenhaut inwendig bedecken und an der vordern Gränze der Nervenhaut mit den Venen des *Corpus ciliare*, des Glaskörpers der *Krystalllinse* Gemeinschaft haben. Sie liegt nahe am Augapfel der Mitte des Sehnerven, und tritt weiter hinten aus der Mitte eben unter seine Scheibe, geht in derselben an der Oberfläche des *Retinae* eine Strecke vorwärts fort, und gelangt endlich durch die *Fissura bitalis superior* zu dem *Sinus cavernosus*.

Venen der unpaaren Theile am Halse, *Venae thyroideae*, *Vena lingualis* und *pharyngea*.

Die *Venae thyroidea* nehmen von der *Schilddrüse*, dem Kopfe, theils auch vom *Schlunde* u. Aeste in sich auf.

Die *Superior* geht an jeder Seite der *Schilddrüse* vom obern Ende derselben auswärts in die *V. jugularis interna*, oder in die *V. facialis*.

Die *Media* geht an jeder Seite vom mittlern Theile derselben wärts in die *V. jugularis interna*.

Die *Inferior* geht an jeder Seite vom untern Theile derselben wärts in die *Vena jugularis communis sinistra*, und die rechten einigen Körpern in den Winkel, in welchem die *Vena jugularis communis dextra* und *sinistra* zusammenkommen. Oft ist noch eine *Inferior impar* da, welche vom mittlern untern Theile der *Schilddrüse* abwärts in die *Vena jugularis communis sinistra* oder in den Winkel geht, in welchem die *Vena jugularis communis dextra* und *sinistra* zusammenkommen.

Vena lingualis, die *Zungenvene*. Von jeder Seite des hintern Theiles der Zunge kommt eine *Vena lingualis* zur *Vena jugularis interna*, oder zur *Vena facialis communis*, oder zur *posterior*. Sie nimmt vom Rücken unter der Zunge und am Zungenbeine Aeste. Der größte Zweig ist die *Vena profunda* oder *ranina*. Die *V. lingualis* läuft im Munde ziemlich oberflächlich an der unteren Seite

der Zunge neben dem Zungenbändchen zwischen dem *M. genioglossus* und *mylohyoideus*, und geht dann über dem *M. hyoglossus* quer hinweg.

Venae pharyngeae, die Schlundkopfvenen, öffnen sich in die *V. jugularis interna*, oder in die *Facialis communis*, oder in die *Facialis posterior*. Häufig vereinigen sie sich mit der *V. lingualis* oder mit der *V. thyreoidea superior*. Breschet sah auch, daß sich Venen des Pharynx in die *V. vertebralis* ergossen. Sie stoßen an der hinteren Wand des Pharynx von beiden Seiten her zusammen.

Venen des Arms ¹⁾.

Schlüsselbeinvenen, *Venae subclaviae*.

An jeder Seite des Halses liegt eine *Vena subclavia*, eine dicke Vene, welche die Fortsetzung der *Vena axillaris* ist, und als solche quer einwärts vor dem *M. scalenus anticus* hergeht, und mit der *Vena jugularis interna* sich vereinigt, sich in die *V. jugularis communis* ergießt. Sie ist, weil sie vor dem *M. scalenus* dicht hinter dem Schlüsselbeine, und nicht, wie die *A. subclavia*, zwischen dem *M. scalenus anticus* und *medius* hergeht, viel kürzer als die Arterie gleiches Namens, und nimmt daher auch viele Venen, die den Ästen der *A. subclavia* entsprechen, z. B. die *V. mammaria interna*, *thyreoidea inferior*, *cervicalis superficialis* und meistens auch die *V. vertebralis* nicht auf. Ost ergießen sich indessen in dieselbe die *Vena intercostalis superior*, die *Vena transversa scapulae* und *colli*, welche letzteren Venen aber auch bisweilen mit der *Vena jugularis externa* in Verbindung stehen. Da wo die *Vena subclavia* unter dem Schlüsselbeine in die Achselhöhle hervortritt, liegt sie nach innen und unten neben der *A. subclavia*, welche von ihr und dem höher

¹⁾ Hinsichtlich der Venen des Armes hat Otto folgende Abweichungen gesammelt. Man sah die *Vena subclavia* einmal doppelt. (*Morgagni* epist. 69. 2.) Die *Vena cephalica* fehlt zuweilen ganz, oder endigt sich am untern Ende des Deltamuskels. (*Otto*, *path. Anat.* 1. Bd. p. 348. No. 27.)

Die *Vena mediana* fehlt nicht nur oft, sondern ist auch häufig doppelt, und wird auf die mannigfaltigste Art von der *Cephalica* und *Basilica* zusammengesetzt. Zweifeln läuft von der *Mediana* ein großer Venenstamm zwischen der *Cephal.* und *Basil.* etwa in der Mitte bis zur Schulter hinauf, in eine oder die andere von diesen oder in beide sich einmündend. (*Otto* a. a. D.)

Petr. Camper, *demonstrationes anatomico-pathologicae*. Lib. I. Amst. 1760. Fol.

oben liegenden Plexus nervorum brachialium in die Mitte genommen wird.

Vena axillaris.

Die Vena axillaris, die Fortsetzung der vorigen, kommt mit der A. axillaris aus der Achselgrube, und geht einwärts in die Vena subclavia über. Sie nimmt meistens folgende, mit den eben so benannten Arterien übereinkommende Venen auf: die Vena scapularis inferior, die Venae mammae externae, und außerdem einige Hautvenen des Arms, die Vena cephalica, die Vena basilica und endlich die Vena brachialis.

Hautvenen des Arms, Venae cutaneae brachii.

Venenneze der Hohlhand, rete volare manus.

Zwischen der Aponeurosis palmaris und der Haut der Hohlhand liegt ein Rete venosum volare, mit welchem die Venae digitales volares Gemeinschaft haben; die obersten Venen desselben gehen in das Rete venosum an der Beugeseite des Unterarms über.

Venenneze des Handrückens, Rete dorsale manus.

Auf dem Handrücken liegen, zwischen der Haut und den Flecken der Ausstreckmuskeln, mehrere dicke Venen, welche das sogenannte Rete dorsale ausmachen, welches aber bei verschiedenen Menschen sehr verschieden gestaltet ist. Dieses Rete nimmt die Venas digitales dorsales auf.

Eine Vene dieses Netzes, welche in der Gegend zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und dem des Zeigefingers liegt, wird Vena cephalica pollicis, eine andere, in der Gegend zwischen dem Mittelhandknochen des kleinen und des vierten Fingers, Vena Salvatella genannt.

Vena cephalica, basilica, mediana.

So nennt man die dicken Venas subcutaneas des Arms, welche im Panniculus adiposus desselben, nur von der Haut bedeckt, liegen.

Die Vena cephalica kommt aus dem Rete dorsale, geht in der Gegend des Radius, so daß sie allmählig vom Latus extensorium des Unterarms sich auf das Latus flexorium desselben lenkt, bis zur Pars radialis des Ellenbogengelenks, dann ferner am äußern Rande des M. biceps, und oben zwischen dem vordern Rande des M. deltoideus und dem M. pectoralis major hinauf, und ergießt sich endlich in die Vena axillaris, oder in die Vena subclavia, oder in die Vena jugularis externa. Sie ist die Hautvene, welche nahe an dem Rande

8 Vorderarms und an der Seite des Oberarms hinläuft, wo unten an r Hand der Daumen liegt.

Sie hat zuweilen mit der Vena subclavia oder der jugularis interna durch die Vena cephalica parva, welche zwischen dem M. pectoralis major und dem Scalenus hinaufsteigt, Gemeinschaft.

Bisweilen ist sie eine Fortsetzung der Vena cephalica pollicis, i andern einer andern Vene des Rete dorsale. Meistens geht die ößere Menge des Bluts, das sie führt, am Ellenbogen durch die V. mediana in die Basilica hinüber. Daher ist ihr zwischen dem M. deltoideus und M. pectoralis major gelegenes Stück meistens dünner. In der Nähe des Schlüsselbeins nimmt sie die Vena acromialis bisweilen auf.

Die Vena basilica kommt auch aus dem Rete dorsale, geht in r Gegend der Ulna, so daß sie allmählig vom Latus extensorium s Unterarms sich auf das Latus flexorium desselben lenkt, bis zur ars ulnaris des Ellenbogengelenks, ferner am innern Rande des M. biceps nach der Achselgrube, und ergießt sich daselbst in die Vena axillaris. Nahe bei ihrer Endigung in die Axillaris nimmt sie die l. circumflexa auf, welche von hinten sich zur Achselgrube herumschlägt.

Sie läuft daher näher an dem Rande des Vorderarms und an der Seite des Oberarms hin, wo unten an der Hand der kleine Finger liegt.

Die Vena mediana, welche gemeiniglich dicker ist, als die basilica und cephalica sind, ist gemeiniglich eine Vena communicans hier beiden. Sie geht nämlich in einigen Körpern aus der Vena cephalica höher oder tiefer am Unterarme aus, steigt am Latus flexorium schräg gegen die Vena basilica hinauf, legt sich am Ellenbogengelenke auf die Aponeurosis M. bicipitis, so daß sie daselbst auch auf der Fleische dieses Muskels und auf der von jener Aponeurosis bedekten Arteria brachialis liegt, und geht dann, ferner schräg aufsteigend, in die Vena basilica.

Bisweilen ist die Vena mediana eine Fortsetzung der V. cephalica pollicis, und hat dann mit der V. cephalica, die eine Fortsetzung einer andern Vene des Rete dorsale ist, nur mittelbare Gemeinschaft. Bisweilen ist sie nur kurz, indem sie aus der cephalica ab entspringt.

Diese Venen wählen gemeiniglich die Wundärzte beim Aderlassen, meist ihrer vorzüglichen Dicke wegen. Aber die Eröffnung derselben erfordert, wie man ist, viele Vorsicht, weil die am Ellenbogen unter ihr liegenden Theile leicht verletzt werden können.

Gemeiniglich ist noch eine Vena communicans, dünner, als die mediana, da, welche unterhalb des Ellenbogengelenks aus der mediana

290 Tiefliegende Venen des Arms. V. cava inferior.

na kommt, schräg aufwärts gegen die cephalica geht, und in der Gegend des Ellenbogengelenks, ober über demselben, sich in die cephalica ergießt. Man nennt sie Vena mediana cephalica.

Uebrigens liegen am Latus flexorium des Unterarms mehrere kleinere Venae subcutaneae, welche sich meist in die Vena mediana theils in die basilica und cephalica ergießen, und unter einer Gemeinschaft haben. Bisweilen sind eine oder 2 größere Nebenvenen die mit der Vena basilica meist parallel hinaufgehen, und sich in die Vena mediana ergießen, vorhanden.

Auch am Latus extensorium des Unterarms sind mehrere kleinere Venae subcutaneae, welche mit der Vena basilica und cephalica und unter einander Gemeinschaft haben, befindlich.

Tiefliegende Venen des Arms.

Venae radiales, ulnares, interosaeae. Vena brachialis.

Diese Venen, welche mit den Schlagadern in der Tiefe zwischen den Muskeln liegen, sind viel dünner, als die subcutaneae. Gewöhnlich werden die Arteria radialis, ulnaris, interossea, jede von einer Venen begleitet, welche dicht neben ihr liegen. Sie haben durch Venae communicantes Gemeinschaft mit den Venis subcutaneis und unter einander, und wie ihre Schlagadern aus der Arteria brachialis gemeinlich am Ellenbogengelenke, entspringen, so ergießen sich ebenfalls gemeinlich diese Venen in die Vena brachialis.

Die Vena brachialis begleitet die Arteria brachialis, mit der Vena profunda brachii, die Venas collaterales auf, wie mit den gleichnamigen Schlagadern gleichen Gang und Vertheilung haben. Gemeinlich ist sie anfangs doppelt, wird aber nachher einfach und ergießt sich endlich in die Vena axillaris.

Die Aeste der untern Hohlvene, Vena cava inferior

Die Vena cava inferior führt das Blut der Beine und des unteren Theils zum Herzen zurück, indem sie sich von unten her in die rechte oder rechte Nebenkammer desselben ergießt. Immer ist sie dicker als die V. cava superior.

¹⁾ Pettsche (Sylloge obs. anat. Diss. Haller. VI. 776.) fand, daß sie sich oberhalb der Vena renalis in 2 gleich große Aeste theilte, welche auf der Aorta lagen, einen Querschnitt communicirten, und dann weiter ins Becken herabstiegen.

S. G. Bilde sah eine doppelte aufsteigende Hohlader, zwischen denen die V. cava inferior lag. (Comm. petrop. XII. 1750. p. 312.)

S. G. Pöhl (observat. angiolog. de venis, Progr. 1733. p. 8.) sah

Sie entspringt im untern hintern mittlern Theile der Bauchhöhle, an der vordern Fläche des 5ten Bauchwirbels (oder vor dem Knorpelzwischen

doppelte Hohlader, wovon jeder Stamm auf seiner Seite der Aorta lag. Doch erstreckte sich die Theilung nicht über die Vena renalis hinaus.

Ein ähnlicher Fall wird von Lobstein (de nervo spinali ad par vag. access. Argent. 1760.) erzählt.

Einen interessanten Verlauf der unteren Hohlvene beschreibt und bildet ab J. D. Herholdt (Beschr. sechs menschl. Mißgeburten. Kopenhagen 1830. 4. mit 14 Kpft.). Sie stieg wie im normalen Zustande durch den Bauch in die Höhe, und bildete in der Gegend des obersten Brustwirbels einen Bogen nach der linken Seite, um sich von hinten über den linken Bronchus zu schlingen, vereinigte sich dann mit der obern Hohlvene, wie gewöhnlich die Azygos, und ging in einem gemeinschaftlichen Stamme zum rechten Atrium. Von der linken Nierenvene zog sich ein Zweig von beträchtlicher Größe aufwärts, in derselben Richtung, wie gewöhnlich die Hemi-azygos, durch das Zwerchfell und die Brust, nahm die Vena intercost. der linken Seite auf und ging hinter der Aorta in die untere Hohlvene, neben dem 6ten Rückenwirbel.

Sehr merkwürdig ist folgende Abweichung. (Gurlt, Diss. de venarum deformitatibus, ad nexovitiis rarioris venae caevae infer. exempl. Vratisl. 1819. 4. Otto neue seltne Beob. Berl. 1824. 4. S. 68. sq.)

Die untere Hohlvene stieg nicht, wie gewöhnlich, rechts neben der Aorta zur Leber auf, sondern nahm mehr den Lauf der Vena hemi-azygos und azygos, und endigte sich so in die obere Hohlader. Die Venae iliacae communes vereinigen sich nicht, wie gewöhnlich, vor dem 4ten oder 5ten Lendenwirbel zum Stamme der unteren Hohlader, sondern erst nach Empfang der Nierenvenen, und zwar vor dem 2ten Lendenwirbel. Der so gebildete Stamm der Vena cava infer. wendete sich dann auf dem ersten Lendenwirbel hinter der Aorta weg nach links, so daß er an der linken Seite der Aorta und hinter dieser durch den Hiatus aort. des Zwerchfells in die Brusthöhle trat, hier vor dem Rückgratsende der 5 untern linken Rippen in die Höhe stieg, sich dann vor dem 6ten und 7ten Rückenwirbel hinter der Aorta und dem Duct. thor. wieder zur rechten Seite der Wirbelsäule senkte, und nun im Laufe der Vena azygos fortging, und endlich, wie diese, dicht oberhalb des Herzbeutels von rechts und hinten her sich in die Vena cava superior einstellte. Sie empfing auf diesem Wege alle Venen, die sonst die Vena cava infer., die Hemi-azygos und die Azygos aufnehmen. Die Lebervenen vereinigen sich zu einem etwa fingerdicken Stamme, der das Zwerchfell durchbohrte, und sich in dem rechten Vorhofe, da, wo sonst die Cava infer. sich einmündet, endigte.

Einen ganz ähnlichen Fall sah Otto (ebendas. S. 69.) in der Sammlung des Prof. Jaffra in Glasgow, nur mit dem Unterschiede, daß die Vena cava an ihrem untern Ende nicht so früh gespalten war, und daß noch eine eigne große Vena hemi-azygos vorhanden war, die sich in die linke Vena jug. thorac. nahe vor deren Theilung einmündete.

Nach in dem von Weber (Rust's Magaz. f. d. ges. Heilk. B. XIV. S. 536. Med. Arch. 1829. S. 8.) beschriebenen Falle verlief die Cava infer. wie die Azygos, und mündete in die Cava sup. ein. Die Hepaticae sammelten sich zu einem eignen Stamme, der durch das Loch der Vena cava im Zwerchfelle trat und in den rechten Vorhof einmündete, wie sonst die untere Hohlvene.

In einem andern von Otto (neue seltne Beob. S. 70.) beschriebenen Falle spaltete sie sich schon beim Abgange der Nierenvenen auf dem 2ten Lendenwirbel in die beiden Iliacae communes. Die rechte lief ohne Abgabe größerer Aeste auf der rechten Seite der Aorta gerade herab, legte sich zwischen die Art. hypog. und Iliaca comm. und spaltete sich neben dem Promont. in die Becken- und Schenkelvene. Die linke V. il. comm. lief gleich über den Stamm der Aorta weg nach links, gab die linke Nebenieren- und Nierenvene ab, kam an der äußeren Seite der linken Art. iliaca comm. zu liegen, und spaltete sich ebenfalls neben dem Promont. in ihre beiden Aeste.

In einigen Fällen sah man sie aus dem linken Vorhofe entspringen (Ring, in med. and phys. Journ. Vol. XIII. p. 120., Lemaire' in Bullet. des ac. méd. Tom. V. 1810.)

Fälle, wo sie die Lebervenen nicht aufnahm, so daß diese als ein eigner Gefäß-

dem 4ten und 5ten Bauchwirbel), hinter der Arteria iliaca dextra um ein Wirbelbein tiefer, als die Theilung der Aorta), und weit rechts, dadurch daß die Vena iliaca dextra und sinistra zusammenkommen; geht dann, außerhalb und hinter dem Saße der Baue an der vordern Fläche der Bauchwirbel, neben der Aorta, weit liegend als diese, gerade hinauf, lenkt sich unter der Leber und etwas rechts, geht durch die Rinne oder den Canal am Rande derselben, dann sofort durch das Foramen quadrilaterum des Zwerchfelles in die Brusthöhle, in den Herzbeutel, und so zu dem Nebenkammer des Herzens, indem sie der Vena cava superior entgegenkommt, welche jedoch eine solche Richtung nach abwärts vorwärts hat, daß sie einen stumpfen Winkel mit der V. cava inferior macht. Da der Herzbeutel dicht auf der oberen Fläche des Zwerchfelles aufliegt, so ist sie, so wie sie durch das Zwerchfell in die Brusthöhle gekommen ist, sogleich im Herzbeutel, und da das Herz mit seiner Fläche auf der oberen Fläche des Zwerchfelles ruhet, so erreicht sie alsbald den Ort ihrer Endigung am untern Theile der vordern Nebenkammer, so daß also kaum noch ein Theil derselben in der Brusthöhle

Auf ihrem Wege bis zur Leber nimmt sie nur die Venas lumbales, die Venas renales, die Vena spermatica dextra (die sinistra in die V. renalis), die Vena suprarenalis dextra (die sinistra in die Vena renalis) auf.

Erst indem die Vena cava inferior durch die Leber geht, gießen sich in dieselbe die Venae hepaticae, und durch diese erst mittelbar das Blut der Viscerum chylopoëticorum. An der vordern Fläche der Leber nimmt sie im Embryo den Ductus venosus auf, durch den Durchgange durch das Zwerchfell empfängt sie die Venas phrenicas inferiores.

Aber sie empfängt daselbst keine Venen, die der A. mesenterica inferior, Mesenterica superior und der Coeliaca entsprächen, denn die Vena portae, unten beschrieben werden wird, führt das Blut aus allen diesen Eingeweiden, welchen sich diese Arterien verbreiten, in die Leber.

Venae phrenicae.

Zwei sind 2, 3 oder 4. Sie entstehen aus Aesten an der vordern Fläche des Zwerchfelles, welche meist die Aeste der Zwerchfellarterien begleiten, und ergießen sich in die Vena cava inferior dicht unter dem Zwerchfelle; bisweilen eine oder die andere zwischen den Lagen derselben, und sogar über der convexen Fläche desselben. Die letzteren, ergießen sich auf der gewölbten Seite des Zwerchfelles bisweilen ausbreiten,

Kann sich in das Herz einfüllen, auch wo sie doppelt oder ungerade hoch geht, so wie ihrer Lage nach verachtet gefunden wurde, siehe man bei Otto (s. a. D.

Breschet Venae phrenicae superiores. Die Venen, die der rechten und linken Hälfte des Zwerchfells angehören, stehen in der Mitte untereinander in Verbindung.

Die Lebervenen, venae hepaticae.

Indem die Vena cava inferior durch die Leber geht, nimmt sie am oberen Rande 2 oder 3 größere, und schon vorher in der Fossa venae cavae viele kleinere Venas hepaticas auf, welche das Blut aus der Leber zurückführen. Selten geht eine Vena hepatica durch das Zwerchfell und oberhalb desselben in die Vena cava inferior.

Die Nierenvenen, venae renales ¹⁾.

Die 2 Venae renales sind dicke Äste der Vena cava inferior, welche das Blut von beiden Nieren zurückführen. Sie ergießen sich von beiden Seiten in die Vena cava inferior, in der Gegend der Arteriarum renaliun, und unter einem beinahe rechten Winkel, so daß sie gegen die Aorta hin ein wenig aufwärts steigen. Die linke geht gemeinschaftlich vor der Aorta vorbei.

Wegen der Lage der Vena cava nach der rechten Seite ist die rechte kürzer, die linke länger. Die rechte ergießt sich gemeinlich tiefer.

Jede Vena renalis empfängt aus dem Hilus ihrer Niere die Nierendrüse; die linke nimmt zugleich von unten die Vena spermatica, von oben die Vena suprarenalis ihrer Seite auf, und ist daher dicker, als die rechte.

Im Verhältniß gegen die Arterias renales ist ihre Haut ungemein dünn, und ihre Höhle ungemein weit.

¹⁾ *Albin* (annot. acad. lib. VII. cap. 2. p. 34.) sah in einem Erwachsenen die linke Nierenvene nicht, wie gewöhnlich, vor der Aorta, sondern hinter derselben laufen. Anfangs lag sie auch hinter der Nierenarterie, dann aber trat sie nach vorn, und vertiefte sich vor derselben zur Niere. Sie ward von der Aorta so an die Wirbelsäule angegedrückt, daß der Blutlauf von der Niere nach der Hohlader hin nur sehr unvollständig sein konnte.

Zwei ähnliche Fälle berichtet *Sandifort* (obs. anat. path. Lib. I. Igd. Bat. 1777. p. 81.). Im ersten Falle entsprang die linke Nierenvene weit tiefer als gewöhnlich aus der Hohlvene, lief hinter der Aorta weg, und stieg schief nach oben zur Niere ihrer Seite. Im zweiten Falle war dieselbe so zusammengedrückt, daß man sie kaum finden konnte. Sie entsprang aus der Hohlvene nahe an ihrer Spaltung in die beiden Iliac. und stieg in sehr schiefer Richtung aufwärts nach ihrer Niere hin.

Einiger anderer Fälle dieser Art erwähnt auch *Haller* (Elem. phys. VII. p. 267). *Rauchertel* Varietäten der Nierenvene, namentlich das Mehrfachwerden, hat *Sandifort*, observat. anat. path. Lib. IV. p. 98. sq. Mehrere der wichtigsten bildet *S. F. Meckel* in s. Tab. anat. path. ab. *Fleischmann* (Leichenöffnungen. Erlangen 1815. S. 225.) erzählt eine sehr seltsame Abweichung derselben.

Die inneren Samenvenen, venae spermaticae internae ¹⁾.

Die beiden Venae spermaticae internae kommen im männlichen Körper von den Hoden, im weiblichen von den Eierstöcken, den Muttertrompeten und der Gebärmutter. Sie sind eng und von ansehnlicher Länge, doch viel weiter als ihre Schlagadern.

Im männlichen Körper kommt jede Vena spermatica von ihrem Hoden, aus der Scheidenhaut desselben, in der Scheidenhaut des Samenstranges bis zum Bauchringe hinauf. Sie geht dann durch denselben in die Bauchhöhle, ferner vor den Vasis iliacis, dem Ureter und dem Psoas, dicht an der auswendigen Fläche der Bauchhaut, zum hintern Theile der Bauchhöhle hinauf. Vom Hoden bis zum Bauchringe ist sie in viele Aeste getheilt, welche netzförmig mit einander verbunden sind, und ein Adergeflechte, plexus pampiniformis, ausmachen, das die Schlagader, und am untern Theile des Samenstranges die Aeste derselben umgiebt. Weiter oben ergießen sich diese Aeste in einen Venenstamm.

Im weiblichen Körper kommt jede Vena spermatica interna größtentheils von ihrem Eierstocke, theils von der Trompete, theils von dem Uterus, geht dicht an der auswendigen Fläche der Bauchhaut, vor den Vasis iliacis und dem Psoas, hinauf. Der untere Theil dieser Vene bildet auch hier einen Plexus pampiniformis, der die Schlagader und deren Aeste umgiebt. Der obere Theil ist ein einfacher Venenstamm.

Sowohl im weiblichen als im männlichen Körper nimmt jede Vena spermatica kleine unbeständige Aeste von der Bauchhaut, vom Harn gange u., und gemeiniglich oben auch eine Vena subrenalis an, welche die Niere umzingelt, und so vom obern zum untern Ende der Niere herunkommt, indem sie aus dem umgebenden Zellgewebe und Fette Aeste aufnimmt.

Endlich ergießt sich im weiblichen und im männlichen Körper fast beständig die rechte Vena spermatica in die Vena cava inferior, die linke in die renalis, jene gemeiniglich in die Vorderseite der Vena cava, diese in die untere Seite der Vena renalis. Die, welche sich in die V. cava ergießt, geht unter einem spitzigen Winkel in dieselbe über.

Bisweilen findet man an einer oder an beiden Seiten auch eine Vena spermatica interna secundaria, welche sich in die Vena suprarenalis ergießt.

¹⁾ A. Monro, Diss. de semine et testibus. Edinburgi 1755. Tab. I. fig. 2. bildet sie ab, und zeigt, daß die des männlichen Körpers Klappen besitzen, daß diese denen des weiblichen Geschlechts, welche dem äußeren Drucke nicht so sehr ausgesetzt sind, fehlen. Die Venen des Hoden siehe bei Albin, Annot. acad. Lib. II. Tab. VII. fig. 1. 2. 3. schön abgebildet.

Die Nebennierenvenen, venae suprarenales.

Gemeinlich kommt von jeder Nebenniere eine dünne Vene, welche in der inneren braunen Masse derselben entspringt, in derselben nach und nach Seitenäste aufnimmt, und dann in der Furche der vordern Fläche fortgeht. Die rechte ergießt sich in die Vena cava inferior, die linke in die linke Vena renalis.

Die Lendenvenen, venae lumbares.

Die Venae lumbares sind 3 bis 4 dünne Äste der Vena cava inferior, welche in ihrem Gange und ihrer Vertheilung sich fast wie die Venae intercostales und wie die gleichnamigen Schlagadern verhalten, und sich von beiden Seiten in dieselbe ergießen. Sie stehen auf jeder Seite durch die senkrecht emporsteigende Vena lumbaris ascendens unter einander und mit der V. azygos und hemi-azygos in Verbindung.

Die Hüftvenen, venae iliacae.

Die Vena cava inferior entsteht, wie gesagt, an der vordern Fläche des fünften Bauchwirbelbeins aus 2 Venen, welche Venae iliacae heißen.

Diese Venen haben im Ganzen denselben Gang und dieselbe Vertheilung, welche die beiden Schlagadern haben, zu denen sie gehören. Sie kommen in einem spitzen Winkel zusammen, indem jede derselben schräg aufwärts rückwärts einwärts geht. Im weiblichen Körper ist, wegen des breiteren Beckens, dieser Winkel größer.

Jede Vena iliaca liegt neben ihrer Schlagader. Die rechte Vena iliaca an der äußern Seite ihrer Schlagader, die linke aber an der innern der andern.

Jede Vena iliaca wird aus 2 Venen zusammengesetzt.

- I) Vena iliaca interna oder hypogastrica, welche aus dem Becken von innen nach außen zu ihrem Stamme hinaufgeht, und hinter der Arterie gleiches Namens liegt.
- II) Vena iliaca externa oder cruralis, welche vom Ligamentum Fallopii, also von außen nach innen, zu ihrem Stamme hinaufgeht, und meist in gleicher Richtung mit ihm ist.

I. Vena hypogastrica.

Die Vena hypogastrica liegt neben und hinter der Arteria hypogastrica, und nimmt folgende, die eben so benannten Arterien begleitenden Venen auf: Vena iliolumbalis, die Vena sacra lateralis, die Vena obturatoria, die Vena iliaca posterior, die Vena ischia-

dica. Andere Zweige der Vena hypogastrica, die Vena pudenda interna, die Venae haemorrhoidales, die Venae vesicales, ferner in weiblichen Körper noch die Vena uterina ¹⁾ und Venae vaginales bilden große Venennetze, plexus venosi. Ueber alle Erwartung groß sind diese Venengeflechte am schwangeren Uterus, wo sie Walter sehr schön dargestellt hat. Dieses Venengeflecht des Uterus ist aus mehreren, zwischen den Eagen des Uterus concentrisch liegenden Venengeflechten zusammengesetzt. Die verschiedenen genannten Plexus anastomosiren mit einander.

Es ist nur eine Vena dorsalis penis und Clitoridis da, welche mitten auf dem Rücken dieser Theile, zwischen den beiden Arterien dorsalibus hin, unter der Synchondrose des Schambeins durchgeht, und dann in 2 Aeste sich spaltet, deren je einer in die Vena pudenda interna seiner Seite übergeht.

Eine Vena umbilicalis, als Ast der V. hypogastrica, giebt es nicht, denn die Vena umbilicalis geht zur Leber.

Die Venen, welche der A. sacra lateralis und der A. sacra media zu vergleichen sind, bilden auf der vorderen Oberfläche des Kreuzbeins ein Netz. Die Vena sacra media geht meistens in die längere Vena iliaca sinistra, und also nicht genau in den Vereinigungswinkel der V. V. iliacae. Die V. ileolumbalis steht mit den V. V. lumbalibus in genauer Verbindung. Durch die V. lumbalis ascendens steht die V. iliaca mit der V. azygos und hemi-azygos in Communication.

II. Vena cruralis.

Die Vena cruralis geht neben der A. cruralis, vom Schenkel unter dem Ligamentum Fallopii in die Bauchhöhle hinauf.

Als Hauptstamm der Venen des Beins liegt sie an der inneren Seite des oberh Theiles des Schenkels, nach vorn her zwischen dem M. pectinaeus und dem Psoas, neben der A. cruralis, an der inneren Seite derselben, wo sie bloß von der Haut und der Fascia lata bedeckt wird.

Unter dem Ligamentum Fallopii liegt sie nach innen neben der A. cruralis; die rechte lenkt sich im Aufsteigen unter der A. cruralis durch nach rechts, und gelangt an die äußere Seite derselben, indem sie in die Vena iliaca übergeht. Die linke steigt durchgehends an der innern Seite der linken A. cruralis hinauf.

¹⁾ W. Hunter, Anatomie uteri gravid, und Walter, von den Krankheiten des Bauchens und dem Schlagflusse; Berlin 1783, haben Abbildungen des Venengeflechtes des schwangeren Uterus gegeben.

Hautvenen des Fußes. Vena saphena magna. 297

laße am Ligamentum Fallopii nimmt sie in der Bauchhöhle 2 auf: 1) Vena epigastrica, 2) Vena circumflexa ilei. Diese Venen haben denselben Fortgang und dieselbe Vertheilung, welche Schlagadern desselben Namens haben. Die Vena epigastrica weiter nach innen, als die A. epigastrica.

außerhalb der Bauchhöhle am obern Theile des Schenkels empfängt Vena abdominalis, die Venas pudendas externas und die saphena magna.

Venae cruris, die Hautvenen des Fußes 1).

Venae plantares.

Die beiden Arteriae plantares werden nicht nur von Venis plantaris begleitet, welche die Venas digitales plantares aufnehmen, sich in die Venas tibiales posticas ergießen, sondern zwischen der und der Aponeurosis plantaris liegen auch Venae superes plantares, welche netzförmig mit einander anastomosirend das venosum plantare ausmachen, mit dem die Venae digitales plantares Gemeinschaft haben. An beiden Rändern des Fußes haben sie dem Rete dorsale Gemeinschaft.

Venae dorsales.

Auf der Superficies dorsalis des Fußes liegen zwischen der Haut und den Extensoribus digitorum mehrere, ziemlich dicke, Venen, die unter einander bergestalt Gemeinschaft haben, daß sie zusammenkommen das sogenannte Rete venosum dorsale ausmachen, welches, wie das Rete dorsale der Hand, bei verschiedenen Menschen sehr verschieden gestaltet ist. Dieses Rete nimmt die Venas digitales dorsales auf.

Vena saphena magna.

Die Vena saphena magna ist die Vena subcutanea der innern Seite des ganzen Beins und von ansehnlicher Dicke.

Sie entspringt als ein Theil des Rete venosum dorsale an der

über die Abweichungen an den Venen der Füße sagt Otto: die tiefen Venen der innern Extremitäten sind ziemlich beständig, doch spaltet sich die Schenkelvene, wie die Arterie, bald höher, bald tiefer, und die Venen des Unterschenkels sind oft eben so weichend wie die Arterien.

Die oberflächlichen Venen variiren desto häufiger, indem z. B. die Saphena major auf sehr verschiedenen Stellen die Schenkelbinde durchbohrt, in manchen Fällen sie gleich in Netze auflöst, ohne einen Stamm zu bilden, in andern deutlich zwei ziemlich parallele Stämme darstellt, auch die Vena saphena minor vertritt, wenn diese in seltenen Fällen keinen eignen in der Kniekehle sich einsetzenden Stamm bildet.

Die Venen des Fußes sind ebenfalls den mannichfaltigsten Verschiedenheiten unterworfen.

innern Seite des Rückens des Fußes, steigt vor dem innern Knöchel, dann an der innern Seite des Unterschenkels, vor dem *M. gastrocnemius internus*, ferner an der innern Seite des Kniegelenks, an der innern Seite des Oberschenkels hinauf, und ergießt sich nahe am Ligamentum Fallopii in die Vena cruralis.

Auf dem ganzen Wege nimmt sie von vorn und von hinten viele Venas subcutaneas auf, hat an der vordern und hintern Seite des Unterschenkels durch Venas communicantes mit der Vena saphena parva Gemeinschaft, die sich endlich selbst in sie ergießt. Nahe am Ligamentum Fallopii nimmt sie eine Vena pudenda externa auf.

In einigen Körpern geht eine 2te ansehnliche Vena subcutanea nahe bei der Saphena magna an der innern Seite des Schenkels hinauf, welche sich endlich in diese ergießt.

Vena saphena parva.

Die Vena saphena parva ist die Vena subcutanea der äußern Seite des Unterschenkels, und dünner als die magna. Sie kommt von der äußern Seite des Rückens des Fußes, aus dem Rete dorsale, steigt am äußern Knöchel, ferner an der äußern Seite des Unterschenkels hinauf, nimmt von vorn und hinten Venas subcutaneas auf, die mit der Saphena magna Gemeinschaft haben, lenkt sich hinter dem Kopfe des *M. gastrocnemius externus* nach hinten, und ergießt sich in der Gegend des Kniegelenks in die V. saphena magna, oder bisweilen in die Kniekehlevene.

Tiefe Venen des Fußes.

Venae tibiales anticae, tibiales posticae, peroneae. Diese Venen, welche mit den Schlagadern in der Tiefe zwischen den Muskeln liegen, sind dünner als die Saphenae. Gemeiniglich werden die Arteria tibialis antica, tibialis postica, peronea, jede von 2 Venen begleitet, welche dicht neben ihnen liegen. Sie haben durch Venas communicantes Gemeinschaft mit den Venis saphenis und unter einander, und so wie ihre Schlagadern aus der A. poplitea entspringen, ergießen sie sich in die Vena poplitea.

Vena poplitea, diese liegt nach hinten und etwas nach außen neben der A. poplitea in der Kniekehle, tritt durch die Flechte des Adductor magnus, an der innern Seite des Schenkelknochens vorwärts und heißt nun Vena cruralis.

Vena cruralis. Die Vena cruralis geht bei der A. crurali zwischen dem *M. triceps* und dem *Vastus internus* hinauf, nimmt die Venas profundas und circumflexas femoris auf, steigt zum Ligamentum Fallopii hinauf u., wie es oben angegeben worden.

Die Pfortader, Vena portarum.

Die schon oben erwähnte Pfortader macht mit ihren Aesten ein besonderes System aus, das mit dem Systeme der Vena cava inferior nur mittelbaren Zusammenhang hat¹⁾.

Sie wird als rückführendes Gefäß aus allen Venen der Verdauungswerkzeuge zusammengesetzt, und vertheilt sich dann wieder, als fortsührendes Gefäß, in der Leber. Sie ist indessen, nach Ph. F. Meckel, nur selten dickhäutiger als die V. cava inferior. Es kommt also alles Blut der Verdauungswerkzeuge in die Pfortader, aus dieser in die Leber, und (nachdem die Galle daraus abgefondert worden) durch die Venas hepaticas in die Vena cava inferior.

Ihre beiden Hauptäste sind die Vena mesenterica und die Vena lienalis.

* Die Gekr.vene, vena mesenterica.

Der Stamm der Vena mesenterica liegt neben der Arteria mesenterica superior. Sie wird aus folgenden Venen zusammengesetzt:

1) Venae ileae et jejunaes, 2) Vena gastro-epiploica dextra, 3) Vena colica dextra, welche bei den letzteren Venen in nicht seltenen Fällen in einen Venenstamm zusammenkommen, den man Vena gastro-colica nennt, und der sich dann in die Vena mesenterica

¹⁾ Indessen höre ich, daß Schlemm beobachtet hat, daß die Aeste der V. mesenterica minor mit denen der Aeste der Vena cava inferior am After (V. pudenda) in offener Verbindung stehen. Dasselbe hat Breschet wahrgenommen, der die V. mesenterica minor durch die Aeste der V. cava inferior anfüllte. Schlemm macht mit Recht darauf aufmerksam, daß wegen dieses Zusammenhangs der Venen am After mit den Aesten der V. portae, Blutegel an den After gesetzt, vortheilhafter wirken können, um auf die Stockungen des Bluts im Unterleibe zu wirken, als wenn sie an andere Stellen der Haut gesetzt werden.

Regelwidrige Anastomosen der V. portae mit den Aesten der Vena cava inferior hat Menière (Archiv. gén. de Méd. Avril 1826. 381.) beobachtet bei einem Manne von 45 Jahren, der keine Beschwerden des Blutlaufs hatte. An der V. iliac. dextra (beider Seiten?) ging ein Venenstamm so dick wie der Zeigefinger am Schaambeine ab, und lief auf dessen oberem Rande zur Lin. alba an dem Nabel vorbei durch das jachige Wand der Leber in den Sinus der ausgebeugten V. portae.

Dieser Canal hatte Klappen. Vom Nabel bis zur Leber hatte er keine Klappen, war enger und fester. Die andre Vene und das Herz waren regelmäßig. Einen ähnlichen Fall bewahrt Marc, Professor am Hospital de pitié. Auch Menière untersuchte ihn.

Bei einem 60jähr. Manne gab die rechte V. ilioa ext. am Schenkelringe 2 Aeste von der Dicke einer Schreibfeder, die sich sogleich vereinigten und durch ihre Schlinge die Art. obturat. gehen ließen, welche die Epigast. gab. Der Stamm, der sehr dünne Häute hatte und sehr weit war, ging geschlängelt zum Nabel, auf seinem Wege von da zur Leber, bildete er unter der Haut der Lin. alba eine Geschwulst von der Größe einer Nuß, und ging sich erweiternd durch die zedrige Falte der Bauchhaut zum Sinus der V. port. hep. Die V. umbilic. war obliterirt da. Der Canal hatte zwischen Nabel und V. portae, und vorzüglich an der Geschwulst, dicke faserige Wände. Die Venenvenen waren außerdem normal.

ergießt. 4) Vena colica media, 5) Vena colica sinistra mit der haemorrhoidalis interna, welche auch V. mesenterica minor genannt wird. 6) Einige Venae duodenales und pancreaticae. 7) In einigen Körpern auch die Vena coronaria ventriculi dextra.

Alle diese Venen haben denselben Verlauf, wie die Arterien gleichen Namens; nur die V. mesenterica minor ist viel länger als die A. mesenterica inferior, der sie entspricht und die sie begleitet, denn sie steigt bis hinter das Duodenum in die Höhe, um zur V. portae zu kommen. Bisweilen vereinigt sie sich indessen schon frühzeitig mit dem Stamme der V. mesenterica major.

Die Milzvene, vena lienalis oder splenica.

Der Stamm der Vena lienalis ist etwas dünner als der Stamm der mesenterica, liegt neben und unter der Arteria lienalis, geht aber weniger geschlängelt.

Sie nimmt folgende Venen auf: 1) Rami lienales, 2) Venae breves ventriculi, 3) Vena gastro-epiploica sinistra, 4) Vena coronaria ventriculi sinistra, 5) Venae pancreaticae, 6) Vena colica sinistra ergießt sich in einigen Körpern in die splenica. Die Vena mesenterica geht schräg aufwärts rechts, so daß der Stamm der Vena portarum als ihre Fortsetzung anzusehen ist; die Vena lienalis geht quer von links nach rechts. So kommen beide hinter dem obern Ende des Zwölffingerdarms in dem Stamme der Vena portarum zusammen.

In den Stamm der Vena portarum ergießen sich gemeiniglich auch die Vena coronaria ventriculi dextra und die Vena duodenalis superior, indem dieselben erst in die Vena gastro-duodenalis zusammenkommen.

Der dicke Stamm der Vena portarum ¹⁾ geht, weiter rechts und weiter hinten liegend als die Arteria hepatica, hinter dem Zwölffingerdarme schräg rechts hinauf, tritt an die Pforte der Leber, und dann in den rechten Theil der Fossa transversa. Hier theilt sie sich in einen rechten und linken Aft.

Der rechte Aft ist sehr kurz, und tritt alsbald in das rechte Ende der Fossa transversa. Vor seinem Eintritte in dieselbe nimmt er die Vena cystica auf, die sich in einigen Körpern in den Stamm selbst ergießt.

Die linke ist viel länger, geht längs der Fossa transversa bis zum linken Ende derselben, und tritt in dieses hinein. Beide Aeste vertheilen ihr Blut in das Haargefäßnetz, welches die ganze Leber durchdringt. Im Embryo vereinigt sich der linke Zweig mit dem

¹⁾ Die Vena portarum ist viel dicker als die Arteria hepatica, aber dünner als die Vena cava inferior.

chten Aste der Vena umbilicalis, der ihm entgegenkommt, und von dieser Vereinigungsstelle geht ein Gang, ductus venosus, zur V. cava inferior. Dadurch fließt ein Theil des Bluts, ohne in das Haargefäßnetz der Leber zu kommen, in die V. cava inferior. Eine denselben Zweck habende Einrichtung scheint auch bei dem Erwachsenen Statt zu finden. Denn nach Bertin und F. A. Walter ¹⁾ vereinigen sich mit ihm in der Substanz der Leber mehrere zum Theil nicht unansehnliche, sogar 1 Linie weite Nester mit Nestern der Lebervenen, und aus diesem Grunde gehen auch eingespritzte Flüssigkeiten leicht aus den Lebervenen in die Pfortader, und umgekehrt aus der Pfortader in die Lebervenen über.

Die Vena portarum ist nebst den Gallengängen und der Arteria epatica mit einem festen Zellgewebe (capsula Glissonii) umgeben; auch ist ihre eigene Haut stärker als die Haut anderer Venen.

Klappen sind in ihr und ihren Nestern nicht vorhanden ²⁾.

Die Nabelvene, Vena umbilicalis ³⁾.

Die Nabelvene, vena umbilicalis, des Kindes im Mutterleibe nimmt in dem Haargefäßnetze des Mutterkuchens ihren Anfang, läuft

¹⁾ Bertin, in Mém. de l'ac. roy. des sc. de Paris. 1765. F. A. Walter, De structura hepatis et vesiculae felleae; in Annot. acad. Berol. 1786. 4. S. 94 sq. Meckel, Hdb. d. Anat. IV. S. 342.

²⁾ Bei anderen Säugethieren findet man Klappen im Systeme der Pfortader, wo Nester in Stämme übergehen.

³⁾ Man sehe Sömmerrings Gefäßlehre, S. 484 sq., und dessen Icones embryonum humanorum, Francof. 1790. Fol. Tab. 2. Die Abhandlungen, welche Sömmerring daselbst anführt, sind Albin, Tabulae septem uteri gravidii. Leidae. — Röderer, icones uteri humani. Goettingae 1739. Fol. Tab. III. — Hunter, Tabulae uteri gravidii. — Sandifort, Observationum anatomico-pathologicorum. Lib. II. Tab. VII. — Wrisberg, de structura ovi et secundinarum humanarum. Goettingae 1783. 4. Eine schöne Abbildung der Nabelvene findet man auch in Liedemanns Werken über die Arterien auf der letzten Tafel.

Die Nabelvene ist bisweilen 2-, 3- und mehrfach vorhanden (Haller, Elem. phys. VIII. p. 221.), oder sie tritt auf ungewöhnlichen Stellen in die Leber. So sah sie J. B. Otto (vath. Anat. neue Ausg. p. 350.) mehrmals bei Kindern mit Bauchspalte am Rande, und selbst auf der ebern Fläche der Leber sich einengen, und letztern Fall beobachtete auch Breschet (medico-chirurg. transact. Vol. IX. 1818. p. 483.)

Kosenthal (Abhdl. a. d. Geb. d. Anat., Phys. 2c. Berl. 1824. S. 150.) sah sie bei einem Fötus mit Nabelbruch in die untere Hohlader gehen. — Littré (Mém. de l'ac. d. sc. 1709. p. 10.) sah sie größtentheils die untere Hohlader bilden. Sie durchbohrte abgeseondert von den Lebervenen das Zwerchfell, und mündete sich in die obere Hohlader ein; — Werse (de cordis ectopia, Berol. 1819. p. 22.) sah einen Ast von ihr in die Leber, den andern in die obere Hohlader gehen. — Berkring (spic. obs. p. 80.) sah sie mit einem Aste in die Leber, mit dem andern in die Gefrösene, und Fingerhuth (bei einem Kalbe, Meckels Arch. 1826. p. 111.) sah sie in die Milzvene gehen. In dem Leichname eines etwa 50 Jahre alten, an Bauchwassersucht gestorbenen, Mannes fand Otto (neue etwa Beob. Berl. 1824. 4. S. 71) die Nabelvene noch offen, in der Dicke einer Schwannenfeder, und ungeadert werdend, sich in den linken Ast der ungewöhnlich dicken Pfortader ein-

geschlängelt (wiewohl nicht so sehr, als die sie begleitenden Arterien), in welchem viel gallertartigen Zellstoff (Sulze) umgeben durch den Gallertstrang, bringt durch den Nabel, umbilicus, in den Unterleib im unteren Rande des Ligamentum suspensorium der Leber in die Fossa venae umbilicalis an der untern Seite der Leber, die der beträchtlichen Größe der Leber sehr schnell erreicht. In die Leber geht sie aufwärts, giebt nach Art der Arterien mehrere, nach dem Kreisring bis 20, ansehnliche Aeste links in die Leber, bis sie sich in einen großen Aest in den linken Aest der Pfortader, mit dem andern, in einer Furche der Leber laufenden ductus venosus in die Leber ergießt. Bisweilen senkt sich ein Theil von ihr in die Gefäßrinne übertrifft die Nabelvene bei weitem die Pfortader. Nirgends finden sich in ihr Klappen. Der venöse Gang macht eine Hohlvene aufwärts einen spitzen, unterwärts einen stumpfen Bogen. Er soll bisweilen gefehlt haben. Nach der Geburt schließt sich die Nabelvene gänzlich, so daß sie zuletzt einen rundlichen Strang, die Leberband, ligamentum teres, bildet. Gemeiniglich verhärtet sie sich gegen das Ende des 1sten Monats nach der Geburt.

mündend. In dieser ganzen Länge war sie mit flüssigem dunkeln, aus dem Unterleibe kommenden, Blute strotzend angefüllt.

Einige ähnliche Fälle sehen bei Kerkring (*spic. obs. p. 21.*), Haller (*phys. VI. p. 483.*), Hoffmann (*Ephem. N. C. cent. 9. et 10. p. 100.*), die Leber hinweg, unmittelbar zum rechten Herzohr gehen (sah sie Wendt (*Acad. N. C. Tom. 13. P. II. 1821. S. 869.*)).

Einmal verband sich mit ihr ein sonderbarer, aus der rechten Leber entspringender Aest. (*Serres, in Arch. génér. de méd. Déc. 1823.*) würdig ist aber ein von Herholdt (*Beschreib. 6 menschlicher Mißgeburt 1850. p. 28*) beobachteter Fall aus einer Mißgeburt, wo sie den gemeinen Hauptstamm für alle Körpervenen ausmachte.

Gorg. *Ern. Stahl, resp. Joach. Petr. Jaetke, Diss. de vena portae, hepaticae, splenicæ, mesentericæ, hypochondriacæ, splenicæ, suffocativæ, hysterice, hæmorrhoidali, Halae 1698. 4.* In Halleri coll. *Diss. anat. Vol. III. p. 131.*

Chr. Trawn, Diss. de vena portae. Lgd. Bat. 1715. 4.

Joh. Saltzmann, resp. Joh. Matth. Fuchs, theses anatom. phil. portae. Argentor. 1717. 4. Halleri coll. *Diss. anat. Vol. III. p. 131.*

Aug. Fr. Walther, Pr. de vena portae exercitationes anat. Halae 1739. P. II. ibid. 1740. 4. Recus. in Halleri coll. *Diss. anat. p. 207 et 217.*

J. Juncker, Diss. de vena portae, porta salutis. Halae 1745.

Von den Saugadern insbesondere.

Ductus thoracicus.

Der Hauptstamm des Systems der lymphatischen Gefäße ist der Ductus thoracicus, der auch bei Einigen Ductus chyliferus, im Deutschen Brusthöhre, Milchbrustgang, Milchsaftgang, Speisefaströhre u. heißt.

Der Anfangstheil desselben, nämlich der unterste Theil, mit welchem er in der Bauchhöhle anfängt, heißt Receptaculum chyli. Dieser Theil ist in andern Thieren beträchtlich dicker und weiter als seine Fortsetzung, die unter dem Namen des Ductus thoracicus von ihm unterschieden wird, und heißt daher bei ihnen Cisterna chyli, oder Ampulla chyli. Im Menschen ist er vom Ductus thoracicus selbst kaum unterschieden.

Das Receptaculum chyli, d. i. der Anfang des Ductus thoracicus, liegt im hintern mittlern Theile der Bauchhöhle, vom 2ten, 3ten Lendenwirbel bis zum untersten Brustwirbel hinauf, hinter der Arteria renalis dextra, zwischen der Aorta und dem rechten Schenkel des Zwerchfelles, und nimmt die Plexus lumbaris, die Vasa chylifera und die übrigen Saugadern des Unterleibes auf ¹⁾.

Der Ductus thoracicus, die unmittelbare Fortsetzung desselben, tritt rechts neben der Aorta durch den Hiatus aorticus des Zwerchfelles in die Brusthöhle, gelangt so in das Cavum Mediastini posticum, liegt vor den Brustwirbeln, zwischen der Aorta und der Vena azygos, im Ganzen gerade und parallel mit beiden, flach geschlängelt hinauf. In der Gegend des 6ten Brustwirbels, oder höher, lenkt er sich im Aufsteigen hinter der Speiseröhre und hinter der Aorta allmählig nach links, kommt hinter dem Bogen der Aorta bis zum 7ten Halswirbel hinter und über die linke Vena jugularis, beugt sich in einem kleinen Bogen vorwärts und abwärts, und ergießt sich in die linke ²⁾ Vena subclavia, so daß seine Endigung entweder da, wo diese Vene mit der linken V. jugularis interna in die linke V. jugularis communis übergeht, oder weiter nach außen liegt. In einigen Fällen ergießt er sich, etwas höher, in die Vena jugularis interna.

Auf diesem ganzen Wege nimmt er noch Saugadern der Brust und des Halses auf.

¹⁾ Bisweilen sind zwei, selten drei neben einander liegende Receptacula da.

²⁾ Sehr selten in die rechte.

In manchen Körpern theilt er sich und vereinigt sich wieder, einmal oder mehreremale, so daß er eine oder mehrere Inseln bildet ¹⁾. An solchen Stellen ist er gemeiniglich mehr geschlängelt.

Er ist die dickste und weiteste Saugader. Doch auch er ist in Vergleichung gegen die größern Blutgefäße ein sehr dünnes Gefäß, indem er in Erwachsenen, im mäßig ausgebrehten Zustande, etwa eine Linie im Durchmesser hat.

Seine Gestalt ist im Ganzen die einer cylindrischen Röhre, wie die der andern lymphatischen Gefäße.

Seine häutige Masse ist beschaffen wie die der andern lymphatischen Gefäße.

Die Anzahl und Lage seiner Klappen ist unbestimmt. Seine Mündung aber an seiner Ergießung in die Blutvene hat beständig eine Klappe, welche den Eintritt des Blutes in den Ductus thoracicus abhält ²⁾.

Die andern Hauptstämme.

Außer dem Ductus thoracicus sind noch einige andere Hauptstämme der Saugadern da, welche sich unmittelbar in Blutvenen ergießen.

1) Truncus subclavius dexter, der Hauptstamm der Saugadern des rechten Arms und der rechten Seite der Brust, welcher von den rechten Achseldrüsen kommt. Dieser ergießt sich in den Winkel, in welchem die Vena subclavia dextra mit der Vena jugularis interna dextra zusammenkommt. 2) Truncus jugularis dexter, der Hauptstamm der Saugadern der rechten Seite des Halses. Dieser ergießt sich in die Vena jugularis interna, meist in den Winkel, in welchem die Vena jugularis externa mit ihr zusammenkommt.

Bisweilen verbinden sich beide Stämme in Einen Stamm (truncus dexter), der dann sehr kurz ist, und sich in die Vena subclavia dextra ergießt. 3) Bisweilen ergießt sich auch noch ein Truncus axillaris sinister, der von den linken Achseldrüsen kommt, in die Vena subclavia sinistra, unweit der Ergießung des Ductus thoracicus.

Saugadergeflechte der Lendengegend, Plexus lumbares et iliaci.

An dem Theile der vordern Fläche des Rückgrats, der aus den Bauchwirbeln besteht, steigt vor, neben und hinter der Aorta und Vena cava

¹⁾ Bisweilen theilt er sich an einer Stelle in drei Aeste, die sich dann wieder vereinigen, so daß er an einer und derselben Stelle 2 Inseln bildet. Sehr selten ist er ganz doppelt; auch ergießt er sich selten nur mit 2 Mündungen.

²⁾ Jo. Adolph Wedel, (Prof. Jen. †) de valvula venae subclaviae ductui thoracico imposita. Jen. 1714. 4.

ange mit einander anastomosirender Saugadern (plexus lumbar-
nauf, die sich endlich oben in das Receptaculum chyli endigen.
Vasa lumbaria gehen auch mit der Aorta durch den Hiatus
is in das Cavum Mediastini posticum hinauf, und ergießen
den Ductus thoracicus.

den Vasis iliakis kommen von beiden Seiten 2 Stränge zahlreicher
dern (plexus iliaci) herauf, die vor den untersten Bauchwirbeln
Plexus lumbaris übergehn. Jeder Plexus iliacus wird, wie
na iliaca, aus einem Plexus iliacus internus s. hypogastric-
b einem externus s. cruralis zusammengesetzt, welche neben den
äßen gleiches Namens liegen.

ch im Zellgewebe an der vordern Fläche des heiligen Beins liegen
ern, vasa lymphatica sacralia, welche mit denen des Mast-
Gemeinschaft haben, und nach oben in die Plexus lumbares,
uch in die Iliacos internos übergehn.

: diese Saugadern haben ihre Drüsen (glandulae lumbares,
sacrales —). Die Lumbares sind vorzüglich zahlreich.

Saugadern des Dünndarms.

dem engen Darne entspringt eine Menge von Saugadern,
weil sie zur Zeit der Verdauung den Speisefast oder Milchfast
) einsaugen, Speisefastgefäße oder Milchsaftgefäße
chylifera s. lactea) heißen.

es dieser Gefäße entspringt in der inwendigen Haut (tunica
des Darms von den Zotten und überhaupt von der Schleim-
s Darmcanals, geht schräg durch die eigne Haut desselben
ischen den Fleischfasern durch in das 1ste Zellgewebe, wo es von
wendigen Haut bedeckt wird, so daß es in diesem allmählichen
nge durch die Häute des Darms zugleich am Darne gegen den
desselben fortgeht, an welchem das Gekröse sitzt. Unterweges
diese Gefäße Nestchen aus den Häuten des Darms selbst in

kommen nun 2 Reihen dieser Gefäße, eine vordere und
itere, eine von jeder Seite des Darms, nach dem Gekröse hin
entgegen, und gehen dann, im Gekröse zwischen den beiden
desselben, theils neben den Blutgefäßen, theils allein, gegen
ang des Gekröses am Rückgrate hin. Das ganze Gekröse ent-
große Menge solcher in ihm fortgehender Gefäße, welche, nach der
r Venen, aus kleineren Nesten in größere Neste sich vereinigen, auch
h wieder theilen, und sich unter einander netzförmig verbinden.
lich kommen am Anfange des Gekröses alle Saugadern desselben

in einige wenige Stämme zusammen, welche sich mit den Plumbaribus in das Receptaculum chyli ergießen.

Auf dem Wege durch das Gekröse gehen diese Gefäße durch eine Saugaderdrüsen (glandulae mesentericae), von denen in § ihres Baues und des Durchganges der Speisefastgefäße alles das was oben von diesen Drüsen überhaupt gesagt ist. Sie liegen scheidener Entfernung von den Därmen, einige derselben den 1 näher, andere dem Anfange des Gekröses näher: jene sind kleine größer.

Die Speisefastgefäße gehen auf die angegebene Weise zu Drüsen; die meisten durch 2 oder 3, einige nur durch eine. Zwischen Drüsen sieht man eins oder das andere Gefäß nur neben an ihr vorbeigehen, ohne in sie hineinzutreten. Doch kommt dieser Gefäße zum Receptaculum chyli, das nicht wenigstens eine solche Drüse gegangen wäre. Da gewissermaßen die Varentia jeder Drüse von den Inferentibus derselben unterschieden so unterscheidet man Vasa chylifera primi ordinis, welche vom zu den nächsten Drüsen gehen; Vasa secundi ordinis, welche von Drüsen zu den 2ten gehen u. s. w.

Die Beschaffenheit der Speisefastgefäße ist dieselbe als in übrigen Saugadern. Sie haben zahlreiche, paarweis liegende Klappen auch schon am Darne im ersten Zellgewebe. Die offene Seite Klappen ist dem Receptaculum chyli zugewandt, so daß sie den Durchgang des Speisefastes zu demselben gestatten, den Rückgang zu hindern.

Die meisten Speisefastgefäße entspringen vom Jejunum, weniger vom Ileum; auch vom Duodenum nur wenige, und diese nicht auf die besagte Art im Gekröse, indem dieser Darm keine Klappen hat, sondern vom Darne im Zellgewebe rückwärts zum Plexu hepatico.

Diese Gefäße dienen, den Speisefast aus dem dünnen einzusaugen; außer der Zeit der Verdauung nehmen sie nur das Lymph in sich. Die aus den Häuten des Darmes entspringenden Lymphgefäße nehmen von diesem ein.

Wenn der Durchgang des Speisefastes durch die Speisefastgefäße Drüsen derselben anhaltend gehindert ist, so entsteht vom Mangel der Ernährung eine gewisse Art der Auszehrung (tabes mesenterica). (S. Sömmmerling bei Baillie Anatomie des krankh. Baues. Deutsche Uebers. S. 116.)

Saugadern des Dickdarms.

Auch vom weiten Darne entspringen Saugadern, in einer geringeren Menge. Es gilt von ihnen alles, was von den Speisefastgefäßen gesagt ist.

Sie gehen vom blinden Darne am Mesocolon fort, und da, wo jedes 2 an einander liegende Matten hat, zwischen diesen Matten. So gelangen sie theils zum Receptaculum chyli, theils zum Plexus lumbaris.

Saugaderdrüsen (glandulae mesocolicae) sind im Mesocolon auch, aber viel kleinere und kleinere, als im Mesenterium. Auch haben sie näher am Darne ihren Sitz, als das im Mesenterium der Fall ist.

Diese Gefäße saugen aus dem weiten Darne Darmsaft und flüssige Theile des Koths ein.

Daher verhärtet der Koth desto mehr, je länger er im Darmkanale verweilt.

Saugadern des Magens.

Die vielen Saugadern des Magens, welche im ersten Zellgewebe desselben verbreitet sind, und aus den tiefer liegenden Häuten desselben hervorgehen in sich nehmen, versammeln sich in 2 Stränge, deren einer längs dem kleinen Bogen desselben (plexus gastricus superior), der andere längs dem großen liegt (plexus gastricus inferior s. gastro-epiploicus). Beide Stränge haben Saugaderdrüsen, und gehen theils in der Cardia, theils am Pylorus zum Ductus thoracicus über.

Saugadern des Netzes.

Im großen Netze findet man Saugadern, welche in den Plexus gastro-epiploicus übergehen.

Wahrscheinlich sind auch im kleinen Netze Saugadern vorhanden.

Saugadern der Milz.

Die Saugadern der Milz sind theils superficiales, welche zwischen der äußern und der eignen Haut derselben verbreitet sind, theils profundae, welche in dem Parenchyma derselben liegen. Sie versammeln sich am Hilus der Milz in einen Strang (plexus lienalis), welcher von der Vena und Arteria lienalis begleitet, und sich in den Ductus thoracicus ergießt. Auch dieser Strang hat Saugaderdrüsen.

Saugadern des Pankreas.

An der hintern Seite des Pankreas kommen Saugadern aus demselben hervor, und verbinden sich mit dem Plexus lienalis.

Saugadern der Leber und der Gallenblase.

Die Leber hat vorzüglich viele Saugadern. Sie sind theils oberflächlich, superficiales, auf der Oberfläche der Leber, von der äußern Haut derselben bedeckt und netzförmig verbreitet, theils profundae, im Parenchyma liegend.

308 Saugadern der Leber, der Nieren und Harnblase.

Die auf der obern Fläche sammeln sich größtentheils in einen od einige Stämme, welche durch die Lücke des Zwerchfelles zwischen dem schwertförmigen Fortsatze des Brustbeins und der 7ten Rippe zum Cavum Mediastini anticum hinaufsteigen, und sich hier mit den Saugadern verbinden; theils gehen sie auch rückwärts zum Ductus thoracicus, theils verbinden sie sich an den Bändern der Leber mit den Saugadern des Zwerchfells, durchbohren auch theils das Zwerchfell, um kommen so zur obern Fläche desselben.

Die auf der untern Fläche und die Profundae sammeln sich meist in den Plexus portarum, der von der Fossa transversa, und dann ferner hinter dem Pylorus zum Receptaculum chyli hinget. In diesem Plexus portarum sind auch Saugaderdrüsen.

Von der Oberfläche der Gallenblase kommen Saugadern gegen den Blasengang hin, welche sich zum Plexus portarum gesellen u.

Saugadern der Nieren und der Nebennieren.

Jede Niere hat Saugadern, theils superficiales, die unter ihrer äußern Haut netzförmig verbreitet sind, theils profundas, in ihrem Parenchyma. Sie gehen gegen den Hilus der Niere zu, und vereinigen sich zahlreich in einen Strang (plexus renalis), der in der Gegend der Arteria und Vena renalis einwärts und etwas aufwärts, theils zum Plexus lumbaris, theils zum Receptaculum chyli geht. Auch vom Nierenbeden und vom Harn gange gehen Saugadern zum Plexus renalis und zum Plexus lumbaris. Von jeder Nebenniere gehen Saugadern zum Plexus renalis.

Saugadern der Harnblase.

Die blutführenden Venen der Harnblase werden von Saugadern begleitet, welche mit den Obturatoriiis, denen der Zeugungstheile und des Mastdarms Gemeinschaft haben, und in den Plexus hypogastricus übergehen.

Auch Saugaderdrüsen findet man an diesen Saugadern.

Saugadern des Mastdarms.

Der Mastdarm ist mit vielen Saugadern, auch mit Saugaderdrüsen umgeben. Diese haben nach hinten mit den Sacralibus, und vorn mit denen der Harnblase in Männern, mit denen der Mutterschele in Weibern, Gemeinschaft, und gehen theils in die letzten Vasa lymphatica coli, theils zu beiden Seiten in die Plexus hypogastricos über.

Saugadern der männlichen Geschlechtstheile.

Saugadern der Hoden.

Von jedem Hoden kommen Saugadern, die aus dem Rete vasculosum, der Tunica albuginea und dem Nebenhoden entspringen. Mit ihnen verbinden sich Saugadern der Scheidenhäute, und so entsteht ein Strang (plexus spermaticus), welcher im Zellgewebe des Samenstranges durch den Bauchring hinauffleigt, und so mit den Blutgefäßen des Samenstranges zur Regio lumbaris gelangt, wo er sich mit dem Plexus lumbaris, theils auch mit dem Renalis seiner Seite verbindet.

Saugadern des Hodensackes.

Die Saugadern des Hodensackes gehen von jeder Hälfte desselben zu den Glandulis inguinalibus ihrer Seite, theils hinten zu denen des Mittelfleisches.

Saugadern des Gliedes.

Das männliche Glied hat Venas lymphaticas subcutaneas, welche zwischen der Haut und den Corporibus cavernosis von der Eichel gegen den Anfang des Gliedes hin, und dann von jeder Hälfte in die Glandulas inguinales übergehen; und profundas, welche neben der Harnröhre von der Eichel nach der Synchondrosis pubis fortgehen, unter dieser durch in das Becken treten, und so zum Plexus hypogastricus gelangen.

Saugadern der Samenbläschen.

Von jedem Samenbläschen gehen Saugadern aus, welche mit denen der Harnblase, des männlichen Gliedes, des Mastdarms sich verbinden, und sich in den Plexus hypogastricus ergießen.

Saugadern der weiblichen Geschlechtstheile.

Saugadern des Uterus und der Eierstöcke.

Von der Gebärmutter gehen theils Saugadern an jeder Seite in einen Strang (plexus spermaticus) über, der mit der Vena spermatica aufsteigt, und in den Plexus lumbaris übergeht.

Mit diesem Plexus spermaticus verbinden sich die Saugadern des Eierstockes und der Trompete jeder Seite.

Theils gehen Saugadern von jeder Seite der Gebärmutter im runden Bande zu den Vasis lymphaticis epigastricis.

Der größte Theil der Saugadern der Mutter geht an jeder Seite in einen Strang (plexus uterinus) über, welcher sich in den Plexus hypogastricus ergießt.

Die Nester dieser Saugadern liegen zahlreich an der auswendigen Fläche der Mutter, von der auswendigen Haut derselben bedeckt, und nehmen einsaugende Nester aus dem Parenchyma derselben auf.

Saugadern der Scheide und der weiblichen Schaam.

In dem Zellengewebe, das die Mutterscheide umgiebt, findet man viele Saugadern, welche theils in die Plexus uterinos, theils in die Plexus hypogastricos übergehen. Von jeder Seite der weiblichen Schaam gehen Saugadern zu den Glandulis inguinalibus ihrer Seite.

Von der Clitoris gehen sie wahrscheinlich eben so, wie am männlichen Gliede.

Saugadern an der Wand des Unterleibes.

In der Cellulosa subcutanea des Bauches und zwischen den Bauchmuskeln liegen Saugadern, welche theils nach der Regio inguinalis in die Glandulas inguinales, theils am Rückgrate durchbohrend in den Plexus lumbaris übergehen.

Ein besonderer Strang (plexus epigastricus) kommt mit der Vena epigastrica an jeder Seite zum Annulus herab, und geht in die Glandulas inguinales über.

An der inwendigen Fläche des Bauches liegen die oben genannten Plexus lumbaris und iliaci, und in diese gehen die Saugadern der inwendigen Bauchmuskeln, auch des M. iliacus internus, des Psoas, und theils die der Bauchhaut über.

An der Arteria iliolumbalis liegt ein Strang von Saugadern (plexus iliolumbalis), der in den Plexus iliacus oder lumbaris übergeht.

Saugadern der Bauchhaut.

Das Zellgewebe an der Bauchhaut ist mit vielen Saugadern durchzogen, welche in die Plexus lumbaris, iliacos, iliolumbales, epigastricos u. übergehen.

Saugadern der Bauchglieder.

Die Saugadern des Beins sind theils oberflächliche, superficiales, theils tiefliegende, profundae.

Die superficiales liegen in der Cellulosa subcutanea, und fangen in derselben schon von den Beinen an. Die Stämme derselben liegen in Strängen. Ein Strang (plexus saphenus externus) kommt vom äußern Theile des Fußes, am äußern Knöchel und ferner an der äußern Seite des Unterschenkels, längs der Vena saphena parva her-

ist, und geht dann theils hinter dem Kniegelenke in den Plexus saphenus internus über, theils an der äußern Seite des Oberschenkels höher hinauf. Der andere Strang (plexus saphenus externus) kommt vom innern Theile des Fußes, am innern Knöchel, und ferner an der innern Seite des Unterschenkels und des Oberschenkels, längs der vena saphena magna herauf.

Der Plexus saphenus internus und die übrigen Vasa lymphatica subcutanea des Oberschenkels gehen größtentheils in die Glandulas inguinales über. ¶

Die Vasa lymphatica profunda des Beins liegen zwischen den Muskeln desselben. Die Stämme derselben gehen längs den Schlagadern und tiefliegenden Blutvenen hinauf: bei jedem Schlagadernstamme mehrere.

Eben so liegen die Vasa lymphatica tibialia postica, peronea, tibialia antica, bei den gleichnamigen Schlagadern. Diese vereinigen sich in den Plexus cruralis, der in der Kniekehle, wo er noch Plexus popliteus heißt, neben der Arteria poplitea hinausgeht, ferner diese Schlagader bis zum Ligamentum Fallopii begleitet, die Vasa lymphatica profunda femoris aufnimmt, und unter dem Ligamentum Fallopii durch in den Plexus iliacus externus übergeht.

Nabe an diesem Bande haben diese Gefäße einige Saugaderdrüsen (glandulae femorales s. inguinales profundae).

Auch in der Kniekehle findet man eine oder einige kleine lymphatische Drüsen (glandulae popliteae); unterhalb der Kniekehle am Schienbein sind diese Drüsen wenigstens selten ¹⁾.

Die Arteria obturatoria wird auch von Saugadern (plexus obturatorius) begleitet, welche aus den Adductoribus, dem M. pectineus, gracilis u. Aeste aufnehmen, durch den Einschnitt des eisförmigen Loches in das Becken treten, und dem Plexus iliacus sich zugesellen.

In der Cellulosa subcutanea des Gefäßes liegen Vasa lymphatica superficialia, welche theils nach außen mit den superficialibus externis des Oberschenkels sich verbinden, und in die Glandulas inguinales übergehen, theils nach oben den abdominalibus posterioribus sich zugesellen.

Zwischen den Muskeln des Gefäßes liegen Saugadern, die in den Plexus iliacus posterior und den Plexus ischiadicus übergehen,

¹⁾ Haller (El. phys. I. p. 191.) „In poplite fere desinunt, quum in tibia, fibula, pedeque nullae mihi unquam occurrerint.“ Cruikshank fand unter der Kniekehle niemals Saugaderdrüsen (Einsaug. Gef. S. 117.). Auch Hildebrandt hat hier nie lymphatische Drüsen gesehen. Mascagni giebt eine Glandula tibialis an, die er bisweilen auf dem obern Theile des Schienbeins angetroffen hat.

welche die gleichnamigen Schlagadern begleiten, und durch die Incisura ischiadica, jener über, dieser unter dem M. pyramidalis in den Plexus iliacus internus sich ergießen.

Die Leistenbrüsen, glandulae inguinales ¹⁾, liegen theils in der Regio inguinalis des Bauchs, am Ligamentum Fallopii, dicht unter der Haut, theils am obersten Theile des Oberschenkels, in der innern und vordern Gegend desselben, auf der Fascia lata, dicht unter der Haut.

In diese Drüsen ergießen sich die Vasa lymphatica superficialia des Oberschenkels, auch die des Bauchs und der äußern Zeugungstheile; und von ihnen gehen wieder Vasa lymphatica, durch die Fascia lata, unter dem Ligamentum Fallopii durch, in die Bauchhöhle hinein, zum Plexus cruralis.

Saugadern des Zwerchfells.

Auf beiden Flächen des Zwerchfells findet man Saugadern.

Die an der concaven Fläche sind mit dem Theile der Bauchhaut bedeckt, der diese Fläche des Zwerchfells überzieht. Ueber der Leber sind sie theils mit denen der Leber verbunden. Sie gehen theils am Hiatus aorticus in den Ductus thoracicus, theils durch die vordern Lüden des Zwerchfells in die Vasa lymphatica mammaria interna.

Die an der converen Fläche sind mit dem Theile der Brusthaut und des Herzbeutels bedeckt, der diese Fläche überzieht. Sie sind ansehnlicher als jene; auch gehen durchbohrende Saugadern von der concaven Fläche zur converen. Sie gehen theils nach vorn in die Vasa lymphatica mammaria interna, theils nach hinten in den Ductus thoracicus, theils auch in die intercostalia über.

Saugadern der Brust.

In der Cellulosa subcutanea der Brust und zwischen den Brustmuskeln liegen Saugadern, welche an jeder Seite in die Glandulas axillares übergehen.

Auf der inwendigen Fläche der Rippenknorpel an jeder Seite des Brustbeins steigen neben den Blutgefäßen, die man mammaria interna nennt, Stränge von Saugadern (plexus mammarii interni), mit Drüsen, welche nach oben sich rückwärts lenken, sich mit den Mediastinis verbinden, und in die Plexus subclavios übergehen, in die Höhe.

Uebrigens liegen im Mediastinum, zwischen beiden Säcken der Brusthaut, viele Saugadern (vasa lymphatica mediastina) mit

¹⁾ Diese Drüsen sind es, welche oft in der venetischen Krankheit sich entzünden und anschwellen (bubones venerei).

rißen, welche theils höher, theils tiefer in den Ductus thoracicus, als auch in den Truncus dexter übergehen.

Die Blutgefäße zwischen den Rippen werden auch von Saugadern (asa lymphatica intercostalia) begleitet, in jedem Zwischenraume: Rippen. Diese ergießen sich nach vorn in die V. l. mammaria interna, nach hinten in den Ductus thoracicus.

Saugadern der Brusthaut und des Herzbeutels.

Das Zellgewebe der Brusthaut ist mit vielen Saugadern durchzogen, welche in die Vasa lymphatica mammaria interna, mediana, intercostalia übergehen. Der Herzbeutel ist mit vielen Saugadern überzogen; auch liegen an seiner auswendigen Fläche, sowohl vorn hinten, lymphatische Drüsen, in welche Stämme dieser Venen über-
en.

Saugadern des Herzens.

Die Saugadern des Herzens versammeln sich in Stämme, welche von den Stämmen der Vasorum cardiacorum auf der Oberfläche des Herzens gehen, dann vom Herzen an der Aorta und Vena cava superior aufsteigen, mit denen des Herzbeutels, ferner mit denen der Lungen und des Mediastinum sich verbinden, und so zu Drüsen kommen, welche im Mediastinum hinter und über dem Bogen der Aorta, hinter der Arteria pulmonalis liegen.

Saugadern der Lungen.

Die Lungen haben eine Menge Saugadern. Die oberflächlichen sind netzförmig auf der Oberfläche der Lungen verbreitet, von der äußern Seite derselben bedeckt, die tiefliegenden liegen in der Tiefe neben den Stämmen der Blutgefäße.

Die Stämme, in welche sich die Gefäße versammeln, gehen von jeder Lunge neben dem Luftröhrenaste und der Luftröhre selbst, von der rechten theils neben der Vena cava superior und der Vena azygos auf; und die linken gehen in den Ductus thoracicus, die rechten in den Truncus dexter, oder Subclavius dexter.

Mit den Saugadern der Lungen sind Drüsen derselben (glandulae bronchiales) verbunden, welche theils am Mediastinum, theils zwischen den Läppchen der Lungen, meist da liegen, wo die Luftröhren sich theilen. Die oberste größte derselben liegt da, wo die Luftröhre sich in ihre beiden Äste theilt; die übrigen an den kleineren Ästen sind kleiner.

Saugadern der Speiseröhre.

Die Speiseröhre ist mit Saugadern umgeben, die auch theils

314 Saugadern der Thymus, der Milchdrüsen, der Arme.

Drüsen haben, welche mit den *Vasis lymphaticis mediastinis* in Verbindung sind, und nach oben in den *Ductus thoracicus* gehen.

Saugadern der Thymusdrüse.

Aus der Thymus gehen Saugadern zu den Drüsen, die am vordern Theile des *Mediastinum* liegen, und verbinden sich mit den *Venis mammariis internis*.

Saugadern der Milchdrüsen.

Die Saugadern der Mamma versammeln sich theils an dem äußern Theile derselben in Stränge, die nach den *Glandulis axillaribus* hingehen; theils an dem innern Theile in durchbohrende Aeste, welche durch den *M. pectoralis* und die Zwischenräume der sechs obern Rippen zu den *Vasis lymphaticis mammariis internis* gehen.

Saugadern der Brustglieder.

Die Saugadern des Arms sind theils oberflächliche, theils tiefliegende.

Die *Vasa superficialia* liegen in der *Cellulosa subcutanea*, und fangen in derselben schon von den Fingern an. Die Stämme derselben liegen in Strängen. Ein Strang (*plexus cephalicus*) kommt von der Daumenseite der Hand, am *Latus radiale* des Arms, längs der *Vena cephalica*, ein anderer (*plexus basilicus*) von der Seite des kleinen Fingers der Hand, am *Latus ulnare* des Arms herauf. Beide Stränge gehen an der innern Seite des Oberarms bis zur Achselgrube in die *Glandulas axillares*, der *cephalicus* aber theils an der vordern Seite der Schulter zum *Plexus subclavius*.

Die *Vasa profunda* liegen zwischen den Muskeln. Ihre Stämme begleiten die Schlagadern, und können daher benannt werden: *Vasa lymphatica radialis, ulnaria, interossea externa et interna, brachialia profunda*. Alle diese versammeln sich dann in einem Strang (*plexus brachialis*), der mit der *Vena brachialis* zur Achselhöhle hinaufkommt, zu den *Glandulis axillaribus*, und ferner in den *Plexus subclavius* übergeht.

Die Achselbrüsen, *glandulae axillares*, liegen in der Achselgrube zwischen der Fleische des *M. latissimus dorsi* und der des *M. pectoralis major*, theils näher am Arme, theils an den Rippen, dicht unter der Haut.

In diese ergießen sich die *Vasa lymphatica superficialia und profunda* des Arms, auch die von der innern Fläche des Schulterblatts, von der auswendigen Fläche der Brust und von der Mamma,

und von ihnen gehen wieder Vasa lymphatica zum Plexus subclavius.

Auch an den Saugadern des Oberarms findet man hier und da Saugaderdrüsen, sowohl an den superficialibus als an den profundis: seltner an denen des Unterarms. Eine liegt gemeiniglich an der innern Seite des Condylus internus des Oberarms.

Der Plexus subclavius liegt hinter dem Schlüsselbeine, an der Vena subclavia. Er nimmt die Vasa lymphatica cephalica, die aus den Glandulis axillaribus, die Mammaria interna, auch Subcutanea colli u. auf.

Nahel an der Ergießung gehen die Gefäße, welche diesen Plexus bilden, in einen Truncus subclavius über. Der linke ergießt sich in den Ductus thoracicus, der rechte besonders in die Vena jugularis dextra.

Saugadern des Kopfs und des Halses.

An jeder Seite des Halses begleitet ein herabsteigender Strang von Saugadern (plexus jugularis) die Vena jugularis interna, welcher endlich in einen oder zwei Stämme vereinigt, und sich auf der linken Seite in den Ductus thoracicus, nahe bei dessen Endigung, auf der rechten besonders, als Truncus jugularis dexter, in die Vena jugularis interna ergießt. An diesem Plexus sind Saugaderdrüsen (glandulae jugulares profundae).

Am vordern Theile des Halses liegen Saugadern (subcutaneae colli) in der Cellulosa subcutanea, mit ihren Drüsen (glandulae jugulares superficiales). Diese Drüsen sind, wenn sie anschwellen, verschiebbarer, und ihre Eiterung ist mit weniger bedenklichen Zuständen verbunden, als die derjenigen Drüsen, welche unter dem M. platysma myoides liegen. Ein Strang begleitet an jeder Seite die Vena jugularis anterior, und geht in den Truncus jugularis über.

Auch die Vena jugularis posterior wird von einem Strange Saugadern begleitet, mit denen sich die Venae lymphaticae cervicales verbinden, welche viele Drüsen (glandulae cervicales) haben. Dieser Strang geht zum Truncus jugularis und subclavius herab.

In der Cellulosa subcutanea des Gesichts liegen Saugadern, deren Stämme theils mit der Vena mentalis, theils mit der Vena facialis anterior über den Rand der obern Kinnbacke zum Halse herabgehen.

Von der Schläfengegend sammeln sich Saugadern in einen Strang, der hinter der Parotis herabgeht (plexus temporalis).

Vom Hinterhaupte kommen Saugadern zu den Glandulis cervicalibus herab.

316 Saugadern des Gesichts, der Augen, des Gehirns.

Saugaderdrüsen liegen an der Seite des Angesichts, unter dem *Processus jugalis* des Schläfenbeins, auf der *Parotis* (*glandulae parotidae*); die Geschwulst dieser letztern Drüsen kann leicht mit der *Parotis* verwechselt werden; an der untern Seite der untern Kinnba bei der *Glandula salivaris submaxillaris* (*glandulae submaxillares*); auch am untern Theile des Hinterkopfs (*glandulae occipital*

Saugadern der Augen.

Im Glaskörper, der Krystalllinse, der Hornhaut, der Sklerotika, ohne Zweifel lymphatische Venen sowohl, als lymphatische Schlagadern. Ob sie aber Aeste der rothen Venen des Auges sind, oder wie in dem Theilen sich in besondere Stämme ergießen, das ist noch nicht kannt ¹⁾. Wenigstens sind Stämme lymphatischer Venen der Aughöhle so wenig, als lymphatische Drüsen in derselben erwiesen.

Saugadern des Gehirns.

Auch im Gehirne sind Saugadern, sowohl auf der Oberfläche als in den *Plexus choroideus* ²⁾, nicht aber in der Substanz des Gehirns, sondern nur an den Häuten desselben beobachtet worden. dem Rückenmarke sind sie jedoch noch nicht zuverlässig bekannt.

¹⁾ *Ruysch*, thes. anat. II. ass. 1. n. 10.

²⁾ *Steno*, in *Barthol. anat.* p. 475. *Nuck*, de invent. nov. p. 152. *Grashant's* Beschreibung der Saugadern, S. 175, und *Ludwig's* Note ebraden *B. N. Schreger* fand in einem Ochsenhirne Saugadern, die in den gestreiften Lagen gingen, wo sie ein gewöhnliches Netz bildeten, das deutlich von den Blutgefäßen unterschieden werden konnte. *Schreger*, de vasis lymphaticis in plexu choroidei et corpore striato cerebri inventis. In dess. fragm. anat. et physiol. 1791. fasc. I. Vorzüglich sind aber die letzten Tafeln des großen *Naccagni* Werks: *Vasorum lymph. hist. et ichnographia*, wegen der Saugadern in Schädelhöhle zu betrachten.

Fünftes Buch.

Von dem

Nervensystem.



Literatur über das Nervensystem.

Die Schriften, welche die Literatur über das Nervensystem ausmachen, sollen nach folgendem Plane angeführt werden:

- I. Schriften über den Begriff und die Geschichte des Nervensystems. S. 319.
- II. Ueber den Bau der zum Nervensysteme gehörenden Theile. S. 319.
- III. Ueber die Regeneration der zum Nervensysteme gehörenden Theile. S. 320.
- IV. Beschreibung des gesammten Nervensystems. S. 321.
- V. Vermischte Abhandlungen über die Nerven. S. 322.
- VI. Ueber die Gehirnhäute. S. 323.
- VII. Ueber das Gehirn und das Rückenmark. S. 324 — 329.
- VIII. Ueber einzelne Theile des Gehirns. S. 329.
- IX. Ueber die Entwicklung des Nervensystems. S. 331.
- X. Ueber einzelne Nervenpaare. S. 331.

I. Schriften über den Begriff und die Geschichte des Nervensystems.

1551. **Jo. Fr. Car. Stegmann*, praes. *Phil. Fr. Meckel*, *Diss. de usu et dignitate neurologiae*. Halae 1794. 8.
1552. **Jo. Chr. Fr. Harles*, *comment. anat. hist. neurologiae primordia*. Langae 1795. 8.
1553. **Ejusd.*, *Pr. historiae neurologiae veterum speciminis secundi sectio*. Erlang. 1796. 8.
1554. **Deff.* Versuch einer vollständigen Geschichte der Hirn- und Nervenlehre im Alterthume. Erster Theil. 1801. 8.
1555. **Jo. Dan. Metzger*, *animadversiones anatomico-physiologicae in extrinam nervorum*. Regiom. 1783. 4. Recus. in *ej. opusc. anat. et phys. rhodanae et Amst.* 1790. p. 117 sq.

I. Schriften über den Bau der zum Nervensysteme gehörenden Theile.

1556. **Dan. Nebel*, *de nervorum et tendinum fibris cincinnatis*. *Miscell. d. nat. cur.* Dec. 3. Ann. 5 et 6. 1697 et 1698. p. 218.
1557. *Guichard Jos. Duvernoy*, *observat. sur une grenouille, qui prouvent que les nerfs ne sont que des tuyaux*. *Mém. de Par.* 1700. p. 40.
1558. *Christ. Vater*, *de fibris cerebri in hydrocephalo nato evidentius servatis*. *Miscell. acad. nat. cur.* Dec. 3. an. 9 et 10. 1701 — 05. p. 294.
1559. *Andr. Ottomar Goelicke*, *de nervorum structura et usu*. *Frct. ad adr.* 1732. 4.
1560. *Joh. Steph. Guettard et J. Le Theullier*, *ergo nervi canales*. *Paris* 1743. 4.
1561. **Jean Godofr. Zinn*, *de l'enveloppe des nerfs*. *Mém. de Berlin* 53. p. 130.
1562. *Wedale*, *the construction of the nerves and causes of nervous disorders*. *Lond.* 1758. 8.
1563. *Lorenzo Massimi*, *esperienze anatomiche intorno i nervi*. in *Roma*. 766. 4.
1564. **Georg Prochaska*, *de structura nervorum tractatus anatomicus, tabulis aeneis illustratus*. *Vindobon.* 1779. 8. Recus. in *ejusd. oper. min.* *Vol. I.* p. 273 sq.

1565. * *Felix Vicq d'Azyr*, Mém. 1 — 3, recherches sur la structure du cerveau, du cervelet, de la moelle allongée, de la moelle épinière l'origine des nerfs de l'homme et des animaux. Mém. de Paris 1788. 8. mém. p. 495, 543, 566.

1566. * *Joh. Pseffinger* (praes. *Jo. Fr. Lobstein*), Diss. de nervorum. Sectio. I. Argentor. 1782. Sect. II. ibid, 1783. 4. (cont. II. etiam succinctam nervorum encephali descriptionem.) Recus. in script. nevrol. min. Vol. I. p. 1 — 60.

1567. *Felix Fontana*, Traité sur le venin de la vipère. Floren. II. 1781. 4. p. 194.

1568. * *Alex. Monro*, observations on the structure and function of the nervous system, illustrated with (47) tables. Edinburgh 1783. Fol. Bemerkungen über die Structur und Verrichtungen des Nervensystems Engl. übersetzt nebst einigen Anmerk. und Zusätzen (v. *S. Th. Edm. Miller*) Mit 13 Kupf. Leipz. 1787. 4. — microscopical inquiries into the structure of the brain, with fig. Edinb. 1780. Fol.

1569. * *Jo. Chr. Reil*, exercitationes anatomicae. Fasc. I. de nervorum; cum trib. tabb. aen. Halae 1796. Fol.

1570. * *Everard Home*, the croonian lectures. Experiments and observations upon the structure of nerves. Philos. trans. 1799. Vol. 89.

1571. *Villars*, recherches microscopiques sur la structure des nerfs. *peron*, Bulletin des scienc. méd. Vol. II. p. 187.

1572. *George Cuvier*, extrait d'un mémoire sur la structure des nerfs. *Villars*. Annalen der Wetterauischen Gesellsch. Bd. 2. S. 242.

1573. *A. Barba*, osservazioni microscopiche sul cervello e sui nervi. Napoli 1807. 8. ed. 2. ibid. 1819. 8. — *mikroskopische Beobachtungen über das Gehirn und die Nerven. Auszugsweise aus dem Ital. übersetzt in *Reils* Arch. X. 459. — *Dasselbe a. d. Ital. übersetzt und mit graphie des Verfassers versehen von *J. J. Albrecht v. Schönber* Steintafel. Würzburg 1829. 4.

1574. * *Everard Home*, Microscopical observations on the brain and nerves; showing that the materials of which they are composed exist in the same state as in the animal. On discovery of valves in the branche of the vas breve, lying between the villous and muscular coats of the stomach. On the structure of the nerves. Phil. trans. 1821. P. I. p. 25.

1575. * *Idem*. On the nerves, which associate the muscles of the diaphragm to the actions of breathing, speaking, and expression. Being a continual paper on the structure and functions of the nerves. Phil. trans. 1799. P. I. p. 284.

1576. *Prevost et Dumas*, in *Magendie* Journal de Physiol. expér. p. 320.

1577. * *Ever. Home*, on the internal structure of the human brain examined in the microscope, as compared with that of fishes, in worms. Philos. trans. 1824. P. I. p. 1.

1578. * *J. A. Bogros*, note sur des canaux découverts dans les nerfs. Mém. lu à l'acad. des scienc. le 2. Mai 1825. — Mémoire sur la structure des nerfs. Répert. génér. d'anat. et de phys. path. Vol. IV. 1825. Ueber die Structur der Nerven. *Meusingers* Zeitschr. f. d. org. Med. S. 217.

1579. * *Breschet et Raspail*, Anatomie microscopique des nerfs. On démontre leur structure intime, et absence de canaux contenant

Reproduction d. Nerven. Beschreibung d. Nervensyst. 321

1581. *Fr. Michaelis, über die Regeneration der Nerven, ein Brief an Peter Camper. Cassel 1785. 8. Auch in Richters chir. Bibl. VIII. S. 122.
1582. *Just. Arnemann, Versuche über die Regeneration an lebenden Thieren. Erster Band, über die Regeneration der Nerven. Götting. 1786. 8. Zweiter Band, über das Gehirn und Rückenmark. Götting. 1787. 8. m. Kpf.
1583. *Derselbe, ein Paar Worte über die Wiederzeugung der Nerven. Reils Archiv III. 100.
1584. *Will. Cruikshank, experiments on the nerves, particularly on their reproduction, and on the spinal marrow of living animals, in phil. transact. of the royal soc. of London. 1795. P. I. p. 177. Deutsch: Versuche über die Nerven, besonders über ihre Wiederzeugung und über das Rückenmark lebender Thiere. In Reils Archiv II. S. 57.
1585. *Joh. Haighton, an experimental inquiry, concerning the reproduction of nerves. In phil. transact. 1795. P. I. p. 190. Deutsch: Versuche über die Reproduktion der Nerven. In Reils Archiv II. 71.
1586. *J. E. S. Meyer, über die Wiederzeugung der Nerven. In Reils Archiv II. S. 449.
1587. *Zimmermann, über Reproduction im Allgemeinen, und über Reproductionsfähigkeit einzelner Organe, besonders der Nerven und Muskeln. In Reils Arch. XI. 131 — 155.
1588. Flourens, siehe Bemerkungen, angeführt, in Cuvier Analyse des travaux de l'acad. roy des sc. pendant 1824.
1589. Joh. Swan, a dissertation on the treatment of morbid local affections of nerves, to which the Jacksonian prize was adjudged by the roy. College of Surgeons 1820, and Observations on some points relating to the anatomy, physiology and pathology of the nervous system. London 1822. Verf. v. Franke unter dem Titel: *Gekrönte Preisschrift über die Behandlung der Localkrankheiten der Nerven, nebst dessen anatomisch-physiologisch-pathologischen Beobachtungen über das Nervensystem. Leipzig 1824. 8.
1590. *P. J. Descot, Dissertation sur les affections des nerfs, à Paris 1825. 8. Ueber die örtlichen Krankheiten der Nerven, übers. v. J. Radius. Leipzig 1826. 8.
1591. Prévost, Annales des sciences naturelles, Tom. X. 1827. p. 168. Ueber die Regeneration des Nervengewebes. Neufinger's Zeitschr. 2. Bd. S. 318.
1592. Larrey, Annales des sciences naturelles. X. 1827. p. 439. Ueber Regeneration der Nerven in Amputationsstumpfen. Neufinger's Zeitschr. 2. Bd. S. 320.

IV. Beschreibung des gesammten Nervensystems.

1593. *Thob. Mostelius, synopsis exortus, et distributionis omnium nervorum in corpore humano, quemadmodum describuntur ab anatomicorum rincipis Vesalio, ut sine negocio adpareat, a qua syzygia unaquaelibet corporis pars suos accipiat nervos. Witeberg. 1558. 12.
1594. *Raym. Vieussens, nevrographia universalis, h. e. omnium corporis humani nervorum, simul et cerebri medullaeque spinalis descriptio anatomica, eaque integra et accurata, variis iconibus fideliter et ad vivum delineatis, aereque incisus illustrata, cum ipsorum actione et usu physico distincte explicatis. Editio nova Lugduni 1684. Fol. Lugduni 1716. Fol. — Titulo in germania prima, ob causas in nova praefatione allegatas adornata, et adjecto rerum indice aucta. Frcf. 1690. 8.
1595. *D. Bayne, alias Kinneir, a new essay on the nerves, and the doctrine of the animal spirits etc. London 1738. 8.
1596. *Aug. Schaarschmidt, Neurologische Tabellen. Berlin 1750. 8.
1597. *Alex. Monro (pater), nervorum anatome contracta latine reddita, in subjecta sunt ejusdem explicatio motus reciproci cordis et ductus thoracici descriptio. Franequerae 1754. 8.
1598. *Ejusd. tractatus tres de nervis eorumque distributione et motu cordis et ductu thoracico. Latine redditi a G. Coopmans. ed. 2da. Franequerae 1762. 8. (Harlingae 1763. 8.?)
1599. *Roland Martin, tal om nervers allmaenna Egenskaper i Maenniskans kropp; Haellet soer kongl. vetenskaps academien, vid praesidii ned tillträdande, Anatomie. III.

322 Beschreibung d. Nervensystems. Vermischte Abhandlungen.

laeggande den 26. Jan. 1763. Och jaemte bifogat utkast til nervernes særskilda anatomiska beskrifning. Stockholm 1763. 8. — institutiones neurologicae s. de nervis corp. hum. tractatio, praemissa est oratio de proprietatibus nervorum generalibus. Holmiae et Lipsiae 1781. 8.

1600. * *Just. Chr. Loder*, primae lineae neurologiae corporis humani. Comm. I. Jenae 1778. 4.

1601. * *Joh. Gottl. Haase*, cerebri nervorumque corporis humani anatomia repetita, c. II. tabb. Lips. 1781. 8.

1602. * *D. E. Günther*, Cerebri et nervorum distributionis expositio. Duisburg 1786. 8. Kurzer Entwurf der anatomischen Nervenlehre. Uebers. mit Zus. d. Wf. herausg. v. H. W. Pottgießer. Düsseldorf 1789. 8.

1603. * *Sam. Th. Hom. Schmerring*, Hirn- und Nervenlehre. Erf. a. N. 1791. 8. 1800. 8.

1604. *Vincenz Malacarne*, neuro-encefalotomia. Pavia 1791. 8.

1605. * *Georg. Coopmans*, neurologia et observatio de calculo ex uretra sponte elapso, post exiccationem uncias V. et 3/8 pendente. Edit. altera emend. locupl. tabulis illustrata. Franequerae 1795. 8.

1606. *Thom. Barthol. Fabricius*, Neurologia. Brunsvic. 1806. 8.

1607. *Charl. Bell*, a series of engravings explaining the course of nerves with an address to young physicians on the study of the nerves. Second edit. Lond. 1816. 8. (9 Kpft.) Deutsch von Heinr. Robbi, mit Vorrede von Joh. Chr. Rosenmüller. Leipz. 1820. 8.

1608. — an exposition of the natural system of the nerves of the human body. London 1824. 8.

1609. * *Conradi Joannis Martini Langenbeck* Icones anatomicae. Neurologia. Fasc. I. cum Tab. XXXIV. Fasc. II. cum Tab. IX. Fasc. III. cum Tab. XXIX. (vgl. d. Literat. im 1. Bd. S. 17 No. 93.)

1610. The Anatomy and Physiology of the nervous System by *Valent. Flood*. Dublin 1828. 12. *

V. Vermischte Abhandlungen über die Nerven.

1611. * *Ab. Haller*, resp. *Math. Lud. Rud. Berckelmann*, Diss. de nervorum in arterias imperio. Gotting. 1744. 4.

1612. * *Zinn*, de l'enveloppe des nerfs, trad. du latin. Hist. de l'acad. royale de Berl. 1753. p. 131.

1613. * *Jac. Fr. Isenflamm*, resp. *Jo. Fr. Doerffler*, Diss. de vasis nervorum. Erlangae 1768. 4. recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. III. p. 164.

1614. * *Jo. Chrph. Pohl*, Progr. quaedam de nervis observationes. Lipsiae 1774. 4.

1615. * *Henr. Aug. Wrisberg*, de nervis arterias venasque comitantibus. In ej. comment. Vol. I. p. 363. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. III. p. 24. et in commentat. soc. reg. Gotting. Vol. VII. 1784 — 1785. p. 95.

1616. * *Sam. Chr. Lucae*, quaedam observationes anatomicae circa nervos arterias adeuntes et comitantes. c. fig. annexae sunt annotationes circa telam cellulosa. Erf. a. M. 1810. 4.

1617. *Charl. Bell*, on the nerves; giving an account of some experiments on their structure and functions, which lead to a new arrangement of the system. Philos. trans. 1821. P. II. p. 398.

1618. * *Ejusd.* recherches anatomiques et physiologiques sur le système nerveux. *Magendie* Journ. de physiol. expér. Vol. I. p. 384 — 391. Vol. II. p. 66 — 76. nouvelles recherches, ibid. Vol. II. p. 363. — Versuche über den Bau und die Functionen des Nervensystems, die zu einer neuen Ansicht desselben führen. N. d. philos. transact. 1821. p. 398, in *Reckes's* Arch. VIII. 391.

1619. *Ejusd.* on the nerves which associate the muscles of the chest in the actions of breathing, speaking and expression. Phil. Trans. 1822. p. 284.

1620. *Ejusd.* sur les nerfs de la face, traduit par *Defermon*, in *Magendie* Journ. de physiologie exp. Tome X. à Paris 1830. p. 1.

1621. *Ejusd.* exposition du système naturel des nerfs du corps humain, trad. de l'anglais par *T. Genest*. Paris 1825. 8.

1622. *Ejusd.* on the nervous circle which connects the voluntary muscles & the brain. Phil. transact. 1826. P. II. p. 163.
 1623. *Ejusd.* lectures on the nervous system. The London medical Gazette. Vol. I. 1828. No. 19. April, p. 553. No. 21. April, p. 617. No. 23. 1, p. 681. No. 25. p. 747.

VI. Schriften uber die Gehirnhaute im Allgemeinen.

1624. *M. E. Etmuller*, Diss. de cerebri membranis. Lips. 1721. 4.
 1625. **Jo. Guil. Chr. Baumer*, Diss. de meningibus. Glessae 1775. 4.

Dura mater.

1626. **Jo. Hadr. Slevogt* resp. *Car. Chr. Xylander*, Diss. de dura re. Jenae 1690. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 809 sq.
 1627. **Mich. Heiland*, de cohaerentia crassae meningis cum cranio ejus-
 suturis nulla. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 3. 1699 et 1700. p. 279.
 1628. **Joh. Jacob. v. Dobeln*, dubitatio de pericranii origine, et conti-
 nione cum matre dura, ex observatione anatomica, qua dicta mater a cal-
 ae suturis et superficie interna omnino separata fuit deprehensa. Acta acad.
 cur. Vol. V. p. 514.
 1629. *Ant. Pacchioni*, epist. ad *Lud. Testi* de novis circa solidorum ac-
 lorum vim in viventibus ad durae meningis structuram et usum obser-
 vationibus. In actis Erud. Lips. 1701.
 1630. **Ejusd.* de durae meningis fabrica et usu disquisitiones anatomicae.
 nae 1701. 8. Recus. in ej. opp. Rom. 1741. 4.
 1631. **Ejusd.* Diss. epistolaris (ad *Lucam Schroeckhium*) de glandulis
 globatis durae meningis humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam me-
 gem productis. Romae 1705. 8. (in act. nat. cur. Dec. III. adpend).
 1632. **Ejusd.* Dissertationes physico-anatomicae de dura meninge humana
 is experimentis et lucubrationibus auctae et illustratae. Romae 1721. 8.
 1633. *Ejusd.* Dissertationes duae ad *Fantonum* datae illustrandis durae
 meningis ejusque glandularum structurae atque usibus concinnatae. Romae
 3. 8.
 1634. *J. Fantoni*, animadversiones in opuscula *Pacchioni* de structura
 motu durae matris. Genev. 1718. (8?)
 1635. * — *Ejusd.* epistolae tres de lymphae durae meningis veris scatu-
 nibus, contra motum ejus membranae. In coll. Diss. *Pacchioni*. Rom.
 1. 8.
 1636. *Ejusd.* Diss. de structura et motu durae membranae cerebri, de
 valis ejus et vasis lymphaticis piae meningis. (In opusc. med. et physiol.
 rev. 1738. 4.)
 1637. **Alex. Littre*, grains glanduleux dans la dure mere et leur usage.
 n. de Paris 1704. 4. hist. p. 32. ed. in-8. hist. p. 39.
 1638. **Jean Mery*, observation qui prouve que la dure mere est exacte-
 ment collee a toute la superficie interieure du crane. Mem. de Paris 1705.
 p. 50 ed. in-8. hist. p. 64.
 1639. *Joh. Ant. Stancari*, de dura meninge; utrum sit musculus, et quo
 lo? Commentarii Bononienses. Tom. I. C. p. 133. O. p. 334.
 1640. *Humphrey Ridley*, experimentum anatomicum ad veram durae
 ris motus causam detegendam institutum. Phil. trans. 1703. p. 1480.
 1641. *Ann. Charl. Lorry*, sur les mouvemens du cerveau et de la dure
 e. Mem. de math. et de Phys. Vol. III. p. 277. 344.
 1642. **Mich. Ern. Etmuller*, Progr. de durae matris officio. Lips. 1721. 4.
 1643. *Joach. J. Costar* et *Lud. Petr. Lehoc*, Diss. non ergo dura mater
 et motum per se. Paris 1728. 4.
 1644. *Herm. Fr. Teichmeyer*, Diss. de musciosa durae matris sub-
 stia. Jenae 1729. 4.
 1645. **Aug. Fr. Walther*, Pr. de pulsu sanguinis in durae meningis
 . Lips. 1737. 4. Recus. in *Hall.* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 775.
 1646. *J. L'Admiral*, icon durae matris in convexa superficie visa. Amstel.
 3. 4.

1647. *J. L'Admiral*, icon durae matris in concava superficie vi
1738. 4.

1648. *J. Fr. Fleischmann*, Diss. de dura matre. Altorf. 1739.

1649. *Laghi*, sulla insensibilità ed irritabilità Halleriana, opus
autori da *Giac. Bartol. Fabri*. Bologna 1757. 4. P. II. p. 113 e
iconibus, quibus originem et decursum filorum nerveorum, per duram
decurrentium, delineare curavit. Tab. II. N. O. et Fig. II. p. 344.

1650. *Le Cat*, Diss. sur la sensibilité de la dure mère. Sur
l'exist. de la nature et des propriétés de fluide des nerfs. Berl. 1755.

1651. **Phil. Jac. Beyckeri*, praes. *Jo. Fr. Lobstein*, Diss. de ne
matris. Argentor. 1772. 4. Recus. in *Ludwig*. script. nevol. mü
p. 89. sq.

1652. *Jo. Gottfr. Leonhardi*, Pr. quatenus dura cerebri men
mereatur nomen? Lips. 1778. 4.

1653. *Henr. Aug. Wrisberg*, de nervis, qui ex eodem (qui
duram matrem ingredi falso dicuntur. Gotting. 1777. 4. In ej. cor
1800. p. 98.

1654. **Fr. Arnold*, Ueber die Nerven die zur harten Hirnhaut
Tiedemann und *Treviranus* Zeitschr. für Physiologie. B. II. p. 1
p. 151.

Arachnoidea.

1655. *Andr. Ottomar Goelicke*, Diss. I. II. de meninge ar
Fref. ad Viadr. 1736. 1737. 4.

1656. **Xav. Bichat*, traité des membranes. Traité de la
arachnoide, p. 186—226. Darans fast wörtlich in *deff. Anat. desc*
p. 29—59. (Hierher gehört auch *deff. allgemeine Anatomie*.)

1657. **C. Van den Broecke*, commentatio de membrana arac
fig. Gandaviae 1823. in *Annales academiae Gandaviensis*. Gandav
p. 19.

1658. *Martin Saint-Ange*, Recherches anatomiques et physio
cerveau et de la moëlle épinière et sur le liquide cérébro-spinal, in
hebdomadaire de Méd. Jan. 1830. p. 87.

Pia mater.

1659. **Jo. Henr. Graetz*, epist. anat. ad *Fred. Ruysch*, de
ejusque processibus. Acc. *Ruysch*. responsio. Amst. 1696. 4.

1660. **Car. Aug. a Bergen*, Progr. de structura piae matris;
novam nec hactenus visam tradit observationem. Fref. ad Viadr
Recus. in *Halleri* Coll. Diss. anat. Vol. II. p. 833.

1661. **Andr. Ottomar Goelicke*, epist. anat. ad *Fred. Ruysch*
cursu arteriarum per piam matrem cerebrum involentem, de tert
meninge, de arteriis membranarum cavitates ossis frontis supra
et eas sub sella equina investientium, nec non de vasis arteriosis
patis et diaphragmatis. Acc. *Ruyschii* responsio. Amstel. 1679. 4.

1662. **B. S. Albin*, de sinuosis cerebri flexibus. De pia matre
itemque corticis et medullae cerebri vasis. Deque ipso cortice et
In ej. annot. acad. Lib. I. c. 12. p. 39.

VII. Ueber das Gehirn und das Rückenmark.

Gehirn.

1663. *Andr. Planeri*, Diss. de capite et cerebro hominis ejusq
Tubing. 1580. (1586). 4.

1668. *Casp. Hoffmann*, resp. *Dietrich*, Diss. de cerebro, medulla spinali et nervis cum biga problematum de motu et usu cerebri. Aldorf. 1622. 4.
1669. *Gottfr. Welsch*, anatomie cerebri humani. Lips. 1639. (1674.) 4.
1670. *Jo. Arn. Friderici*, resp. *Chstph. Relovio*, Diss. de cerebro, cerebello et horum medulla oblongata. Jenae 1661. 4.
1671. *Mich. Sennerti*, resp. *G. G. Schramm*, Diss. de cerebro. Viteberg. 1662. 4.
1672. *Marcell. Malpighii*, exercitatio epistolica de cerebro, clar. *Carolo Fracassato*. In ej. opp. 1664. in *Mangeti* Bibl. anat. II. 294. et epistola responsoria de cerebro *Car. Fracassati*. ibid p. 301 sq.
1673. *An account of some discoveries concerning the brain, optic nerves and the tongue, made by Sig. Malpighi*. Phil. transact. 1667. Vol. II. p. 491.
1674. *Thom. Willis*, cerebri anatomie, cui accessit nervorum descriptio et usus c. 13 tabb. aen. Lond. 1664. 4. (Amstel. 1664. 12. 1667. 12. Lond. 1670. 4. Genev. 1676. 4. Amstel. 1673. 12. Genev. 1694. 4. Recus. in ej. opp. Amst. 1682. 4. et in *Mangeti* Bibl. anat. II. p. 241—294 et p. 598—632.
1675. *Nic. Stenonis*, discours sur l'anatomie du cerveau. à Paris 1669. 12. *Diss. de cerebri anatomie, e gallico exemplari, Parisiis edito an. 1669 latinitate donata, opera et studio Guidonis Fancisii*. Lugd. Bat. 1671. 12. (Recus. in *Winslow*. expos. anat. et in *Mangeti* Bibl. anat. Vol. II. p. 326.)
1676. *Franc. Jos. Burrhi*, epistolae II. 1) de cerebri ortu et usu medico, 2) de artificio oculorum, humores restituendi, ad *Thom. Bartholinum*. Hafniae 1669. 4.
1677. *Jo. Jac. Ritter*, singulares quaedam anatomicae observationes in cerebro, in thorace, in abdomine. Nov. act. acad. n. cur. Vol. III. p. 533.
1678. *Joh. Henr. Glaseri* tractatus posthumus de cerebro, in quo hujus non fabricae tantum, sed actiones omnes principes, sensus ac motus ex veterum et recentiorum placitis et observationibus perspicue et methodice explicantur. Nunc primum luci publicae expositus opera *Joh. Jac. Staehelini*. Basil. et Fref. 1680. 8.
1679. *Ant. Leeuwenhoek*, letter, concerning the observations by him made of the carneous fibres of a muscle, and the cortical and medullar part of the brain. Phil. trans. 1677. p. 899.
1680. *Ejusd.* an abstract of a letter, concerning the parts of the brain of several animals. Philos. trans. 1684. p. 883.
1681. *Fr. Schrader*, resp. *B. D. Behrens*, Diss. de cerebro et cerebello. In ej. additamentis ad *Veslingii* syntagma anat. Helmstad. 1689. 4.
1682. *Just. Vesti* Pr. de cerebro minus cognito. Erford. 1689. 4.
1683. *Henr. Ridley*, the anatomy of the brain containing its mechanism and physiology, together with some new discoveries and corrections of ancient and modern authors upon that subject. To which is annexed a particular account of animal functions and muscular motion. London 1695. 8. — Anatomia cerebri, mechanicam ejus atque physiologiam comprehendens, una cum novis inventis atque veterum et modernorum authorum circa idem subiectum emendationibus, vert. *M. E. Eitmüller*. Miscell. Acad. nat. cur. Dec. III. an. 9. 10. 1701—1705. Append. p. 76. (Lugd. Bat. 1725. 8. 1750. 8.) et in *Mangeti* Bibl. anat.
1684. *J. Jac. Harderi* Diss. de cerebri humani structura naturali. Basil. 1710. 4.
1685. *Urb. Sohan*, Diss. de cerebro. Traj. ad Rhen. 1712. 4.
1686. *Jo. Dom. Santorini*, de cerebro. In ej. obs. anat. Venet. 1724. 4. p. 48.
1687. *A. Fr. Walther*, Progr. de cerebro, nervis et gangliis. Lips. 1727. 4.
1688. *Jo. Ern. Hebenstreit*, Pr. de methodo cerebrum incidendi. Lips. 1739. 4.
1689. *Otto Just Breden*, kurze und gründliche Demonstration des Gehirns und derer Theile, welche solches umgeben, denen Chirurgis und Anatomicis zum Besten nach der Lage und Structur entworfen. Leipz. u. Belle 1741. 8.
1690. *Sauveur Morand*, observations anatomiques sur quelques parties du cerveau. Mém. de Paris 1744. hist. p. 5. mém. p. 342. éd. in-8. hist. 5. mém. p. 430.

1691. *Jean B(onhomme)*, traité de la cephalotomie, ou description anatomique des parties que la tête renferme. à Avignon 1748. 4.
1692. *Arnauld Eloy Gautier d'Agoti*, (siehe Anat. Liter. im 1. Bd. S. 16. No. 73.)
1693. * *Petr. Tarin*, adversaria anatomica prima de omnibus cerebri, nervorum et organorum functionibus animalibus inservientium descriptionibus et iconismis. Paris 1750. 4.
1694. *Jo. Grg. Roederer*, observationes de cerebro. Gotting. 1758. 4.
1695. * *Just. Godofr. Günz*, Progr. I. II. observationes anatomicae de cerebro cont. Lips. 1750. 4.
1696. * *Jo. Wilh. Baumer*, resp. *Jo. Fr. Richter*, Diss. de encephalo. Erford. 1764. 4.
1697. *Raph. Bienvenu Sabatier*, mémoire sur quelques particularités de la structure du cerveau et de ses enveloppes. Mém. de math. et de phys. 1773. Vol. VII. p. 593.
1698. * *Joh. Ehrstph. Hudr. Mayer*, anatomisch-physiologische Abhandlung vom Gehirn, Rückenmark und Ursprung der Nerven. Mit Kupf. Berlin und Leipzig 1779. 4.
1699. * *Vincenzo Malacarne*, nuova esposizione della vera struttura del cervello umano. Torino 1776. 8.
1700. *Ejusd.* Encefalotomia nuova universale, ossia nuova dimostrazione anatomica di tutte le parti contenute nel cranio umano, e d'altri animali, con la descrizione delle varietà state nelle medesime osservate. Torino 1780. 8.
1701. *Laur. Nihell*, Diss. de cerebro. Edinb. 1780. recus. in *Smethe thes. med. Edinensi.* Vol. IV.
1702. * *Franc. Gennari*, de peculiari structura cerebri, nonnullisque ejus morbis. Parmae 1782. 8.
1703. * *Felix Vicq d'Azyr*, traité d'anatomie et de physiologie, avec des planches coloriées, représentant au naturel les diverses organes de l'homme et des animaux: Planches anatomiques avec des explications très-détaillées. Prem. part. Organes contenues dans la boîte osseuse du crâne. Cerveau de l'homme. Cinq Cahiers. à Par. 1786—1790. (*Oeuvres de Vicq d'Azyr.* Vol. VI.)
1704. *Ejusd.* Mém. 1) recherches sur la structure du cerveau, du cercelet, de la moëlle allongée, de la moëlle épinière et sur l'origine des nerfs de l'homme et des animaux. Mém. 2) observations sur plusieurs regions de cerveau disséqué par sa base et sur l'origine des nerfs. Mém. 3) sur la structure du cercelet, de la moëlle allongée, et de la moëlle épinière; et sur l'origine de plusieurs nerfs. Mém. 4) sur la structure du cerveau comparé avec celui de l'homme. Mém. de Par. 1781. mém. p. 405, 543, 566. 1783. mém. p. 468.
1705. * *Sam. Thom. Sommerring*, vom Hirn- und Rückenmark. Reim 1788. 8.
1706. * *Ejusd.* de basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri V. cum IV. tabb. aen. Gotting. 1778. 4. Recus. in *Ludwig. script. nevrol. min.* Vol. II. p. 1—112.
1707. * *Ejusd.* tabula baseos encephali. Frcf. ad M. 1799. Pl. Fol.
1708. * *Der selbe*, über das Organ der Seele. Mit Kupf. Königsberg 1796. 4.
1709. * *Ejusd.* Academiae annotationes de cerebri administrationibus anatomicis vasorumque ejus habitu. Denkschr. der Münchner Acad. 1808. S. 3.
1710. * *Ejusd.* quatuor hominis adulti encephalum describentes tabulas commentario illustravit *E. d'Alton*. Berol. 1830. 4.
1711. *Alex. Monro* (fil.) three treatises on the brain, the eye and the ear. Edinb. 1797. 8.
1712. ... *Rossi*, sur la structure du cerveau. Mém. de l'acad. de Turin 1805—1808. Vol. IX. p. 89.
1713. * *Jos. und Karl Benzel*, Prodrömus eines Werkes über das Hirn der Menschen und der Säugethiere. Tübingen 1806. 4.
1714. * *Ejusd.* de penitiori structura cerebri hominis et brutorum. Cum XV. tabb. aen. et totid. linear. Tubing. 1812. Fol.
1715. * *Fr. Benj. Osiander*, vera cerebri humani circa basin incisae imago, cum observationibus de cerebro et medulla spinali, novaque nervos aequae plantarum vasa hydrargyro implendi methodo. Comment. soc. reg. Gotting. Vol. XVI. 1804—1807. p. 77—106.

1716. *Karl Fr. Burdach, Beiträge zur nähern Kenntniß des Gehirns in Hinsicht auf Physiologie, Medicin und Chirurgie, 1r u. 2r Thl. Leipz. 1806. 8.
1717. *Chaussier*, exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encephale ou cerveau. Avec planch. à Par. 1807. 8.

1718. *Jo. Ehr. Reil, über die Bildung des kleinen Gehirns im Menschen. Reils Archiv VIII. 1. Erste Fortsetz. der Untersuchungen über den Bau des kleinen Gehirns. Ebendas. VIII. S. 273. Zweite Forts. über die Organisation der Lappen und Läppchen, oder der Stämme, Aeste, Zweige und Blättchen des kleinen Gehirns, die auf dem Kern desselben aufliegen. Ebendas. VIII. 385. — Dritte Forts. Nachtrag zur Anatomie des kleinen Gehirns. Ebendas. IX. S. 129. Vierte Fortsetz. Untersuchungen über den Bau des großen Gehirns im Menschen. Ebendas. IX. S. 136. — Das Balkensystem oder die Balkenorganisation im großen Gehirn. Ebendas. IX. 172. — Die Sylvische Grube, oder das Thal, des gestreifte große Hirnganglium, dessen Kapsel und die Seitentheile des großen Gehirns. Ebendas. IX. S. 195. — Fünfte Fortsetz. Das verlängerte Rückenmark, die hinteren, seitlichen und vorderen Schenkel des kleinen Gehirns und die theils strangförmig, theils als Ganglienkette in der Axt des Rückenmarkes und des Gehirns fortlaufende graue Substanz. Ebendas. IX. S. 485. — Sechste Fortsetz. Die vordere Commissur im großen Gehirn. Ebendas. XI. S. 89. — Siebente Fortsetz. Die Scheidewand, ihre Höhle, die Zwillingshöhle und die Höhlen im Gehirn. Ebendas. XI. S. 101. Achte Fortsetz. Nachträge zur Anatomie des großen und kleinen Gehirns. Ebendas. XI. S. 345. — Nangel des mittlern und freien Theiles des Balken im Menschengehirn. Ebendas. XI. S. 341.

1719. *Charl Bell*, the anatomy of the brain; explained in a series of engravings, beautifully coloured, with a dissertation on the communication between the ventricles of the brain. London 1809. 4.

1720. *G. Cuvier*, rapport fait à l'institut national sur un mémoire de *M. Gall* et *Spurzheim* relatif à l'anatomie du cerveau. à Par. 1808. 4.

1721. *Fr. Jos. Gall* et *G. Spurzheim*, recherches sur le système nerveux en général, et sur celui du cerveau en particulier. av. fig. à Par. 1809. 4. — — Untersuchungen über die Anatomie des Nervensystems im Allgemeinen und des Gehirns insbesondere; ein dem Franz. Institute überreichtes Memoire, nebst dem Berichte der H. Commissarien des Inst. mit den Bemerk. des Verf. über diesen Bericht. 2 Thle. Paris und Straßb. 1810—1812.

1722. *Rolando*, saggio sulla vera struttura del cervello dell' uomo e degli animali, e sopra le funzioni del sistema nervoso. Sassari. 1809.

1723. **Sam. Chr. Lucae*, de cerebri in homine vasis et motu. Heidelberg. 1812. 4.

1724. *J. A. H. Reimari*, de cerebro et nervis commentariolus. Denkschr. v. Akad. d. Wiss zu München auf d. Jahre 1811 und 1812. S. 167.

1725. **Erl. Gust. Carns*, Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns, nach ihrer Bedeutung, Entwicklung und Vollendung im thierischen Organismus. Mit 6 Kpft. Leipz. 1814. 4.

1726. **Fr. Rosenthal*, ein Beitrag zur Encephalotomie. Nebst 2 Kpft. Weimar 1815. 8.

1727. *John Gordon*, observations on the structure of the brain, comprising an estimate of the claims of *Dr. Gall* and *Spurzheim* to discovery in the anatomy of that organ. Edinb. 1817.

1728. **F. Lauth*, sur la structure du cerveau et de ses annexes. Journal compl. d. dict. des sc. méd. Vol. III. 1819, p. 97. Vol. IV. 413 et 303.

1729. **Karl Fr. Burdach*, vom Baue und Leben des Gehirnes, 1 — 3 Bd. mit Kpft. Leipz. 1819—26. 4.

1730. **Gottfried Reinhold Treviranus*, Untersuchungen über den Bau und die Functionen des Gehirns, der Nerven und der Sinneswerkzeuge in den verschiedenen Klassen und Familien des Thierreichs. Bremen 1820. 4. (Bildet nach dem 3ten Bd. der vermischten Schriften anat. und physiol. Inhalts.)

(Die Werke von *Serres*, *Desmoulin* und *Laurencet* sind bereits Th. I. S. 48 No. 676. 677. 678. aufgeführt. — In den Werken, welche den Bau des Gehirns auch durch Abbildungen erläutern, gehören ganz besonders noch die öfter citirten *Icones anatomicae* von *Langenbeck*, Fasc. I

1731. *Aug. Erl. Hoch, Darstellung des Gehirns, des Rückenmarkes und der Sinneswerkzeuge, so wie auch des menschlichen Körpers überhaupt, nach seinem äußeren Umfange. Mit 15 Kpf. Leipzig 1824. 8.

1732. The anatomy of the brain, adapted for the use of students, comprising directions with regard to the method to be pursued in its dissection, conformable to the mode practised by most anatomists. London 1824. 12.

1733. *Henr. Fr. Ohrt, Diss. diatribes, quae de cerebro nonnulla continent, fragmenta quaedam. Kiliae 1826. 4.

1734. *P. J. Manec, anatomie analytique. Tableau représentant l'axe cerebro-spinal chez l'homme avec l'origine et les premières divisions des nerfs qui en partent. Par. 1828. (eine lith. Tafel in gr. Fol. mit Text an der Seite.)

1735. A Series of Engravings intended to illustrate the structure of the Brain and Spinal Chord in Man, by Herbert Mayo. London 1827. S. London med. and phys. J. July 1727. p. 63 recensirt.

1736. Luigi Rolando, della struttura degli emisferi cerebrali. Torino 1830. 4. (10 Kpft.) Auszug in Biblioteca italiana, Marzo 1831. p. 299.

Kleines Gehirn.

1737. *Laurent. Heister, de admiranda cerebelli structura. Ephem. acad. nat. cur. Cent. 5 et 6. p. 157.

1738. Leopoldo Caldani, esperienze ed osservazioni dirette a determinare qual sia il luogo principale del cervello, in cui, piu che altrove, le fibre midollari dello stesso viscere s'incrocicchiano. Saggi di Padova. Vol. 1. p. 1.

1739. Vincenzo Malucarne, questioni anatomiche, fisiologiche e chirurgiche dilucidate. Quest. 4. Posto l'esistenza di tutte quella parti del cervello, che in alcuni libri moderni si veggono mentovate, quali sono i lobi, i lobetti, i foglietti, le linguette laminose, le code, i fiocchi, le tonsille, l'ugola, il tuberculo anch'esso laminoso, la piramide, le commessure e la numerosissima famiglia delle lamine, e i noccioli midollari, e i molteplici alberi della vita, che in quella picciola porzion del cervello degli uomini e di quadrupedi, si dicono compresi e visibili, quale mai e egli la maniera piu speditiva di vederne quelle tante cose e di numerarne per fin le lamine, come si pretende essere strato fatto? Memor. della soc. Italiana. Vol. VIII. P. I. p. 219.

1740. Serres, recherches physiologiques et pathologiques sur le cervelet de l'homme et des animaux. Paris 1823. 8. avec fig.

(Vergl. auch hier Reil No. 1718.)

Rückenmark.

1741. *Gerard Blasii anatome medullae spinalis et nervorum inde provenientium. Amstel. 1666. 12. cum fig.

1742. *Guichard Joseph Duverney, de la structure et du sentiment de la moëlle. Mém. de Paris éd. in — 4. 1700. hist. p. 14. mém. p. 196. éd. in — 8. hist. p. 18. mém. p. 252.

1743. *Jo. Jac. Huber, Pr. de medulla spinali. Gotting. 1739. 4.

1744. *Idem, de medulla spinali, speciatim de nervis ab ea provenientibus commentatio, c. iconib. Gott. 1741. 4.

1745. *Antoine Portal, observation sur une spina bifida, et sur le canal de la moëlle épinière. Mém. de Paris 1770. hist. p. 40. mém. p. 238.

1746. *Raph. Bienoenu Sabatier, mémoire sur quelques particularités de la structure de la moëlle de l'épine et de ses enveloppes. Mém. de Par. 1783. mém. p. 67.

1747. *Grg. Christ. Frotcher, descriptio medullae spinalis ejusque nervorum iconibus illustrata. Erlangae 1788. Fol. Recus. in Ludwigi script. nervol. min. Vol. IV. p. 70.

1748. *G. G. Th. Keuffel, Diss. de medulla spinali. Halae 1810. 8. Deutsch: über das Rückenmark, in Reil's Arch. X. 123 — 203.

1749. *Vincenzo Racchetti, della struttura, delle funzione e delle malattie della midolla spinale. Milano 1816. 8.

1750. *Karl Fr. Burdach, Berichte über die Fön. anat. Anstalt zu Nürnberg. Erster Bericht, mit einer Beschreibung des unteren Endes des Rückenmarkes. Leipzig 1819. 8.

Ueber das Rückenmark u. einzelne Theile des Gehirns. 329

1751. * *L. Rolando*, recherches anatomiques sur la moëlle allongée. Lues 'academie de Turin dans la séance du 29. Déc. 1822. 4. c. fig. *Mogendie*, ann. de physiol. experim. Vol. IV. 1825. p. 317. et Bullet. d. sc. méd. 1825. t. IV. p. 309.

1752. * *Idem*, ricerche anatomiche sulla struttura del midolle spinale. n figure. Torino 1824. 8.

1753. * *Car. Franc. Bellingeri*, de medulla spinali nervisque ex ea promantibus annotationes anatomico-physiologicae. Augustae Taurinor. 1823. 4. tabb. aen.

1754. * *C. P. Ollivier*, traité de la moëlle épinière et de ses maladies, nemant l'histoire anatomique, physiologique et pathologique de ce centre reux chez l'homme. (Paris 1824. 8.) Seconde édit. revue, corrigée et gm. 2 Voll. avec 3 pl. à Paris 1827. 8. — Deutsch: über das Rückenmark) seine Krankheiten. Mit Zusätzen vermehrt von Just. RADIUS. Mit 2 rintafeln. Leipz. 1824. 8.

1755. * *D. G. E. Girgensohn*, das Rückenmarkssystem, eine anatomische handlung als Einleitung zur Physiologie und Pathologie dieses Systemes. ga 1828. 8. m. Kpf.

VIII. Schriften über einzelne Theile des Gehirns.

Sinus der harten Hirnhaut.

1756. * *Renate Jacq. Crescens Garengot*, observation anatomique sur sinus du cerveau. Mém. de Paris, 1728. hist. p. 21. éd. in — 8. hist. p. 27.

1757. * *Jo. Grg. Duvernoy*, de sinibus cerebri. Comm. petrop. Vol. IV. 35. p. 130 sq.

1758. * *Just. Godofr. Günz*, Pr. de sanguinis motu per durioris cerebri embranae sinus observationes quaedam. Lips. s. a. 4.

Verschiedene Substanzen.

1759. * *Marcelli Malpighi* de cerebri cortice. In operibus et in Man- ti Bibl. anat. II. 321.

1760. * *G. Lud. Teissier*, de substantia corticosa ac medullosa cerebri. d. B. 1710. 4.

1761. * *Mich. Ern. Etmüller*, epist. anat. ad *Fr. Ruyschium* de cerebri ricali substantia. In *Ruyschii* operibus. Amstel. 1721. 4. acc. *Ruychii* sponso.

1762. * *Jo. Christoph. Bohlü* Diss. epist. ad *Fr. Ruyschium*, de usu no- rum cavae propaginum in systemate chylopoeo, ut et de corticis cerebri tura. In *Ruysch. operib.* Amst. 1727. 4. — *Ruyschii* responsio. Ibid. tab. aen.

1763. * *Meckel*, sur la diversité de couleur dans la substance médullaire i cerveau des Nègres. Hist. de l'acad. roy. d. sc. et bell. lettr. de Berlin 53. p. 97.

1764. * *Ch. Fr. Ludwig*, Diss. de cinerea cerebri substantia. Lips. 1779. 4. in ej. exerc. acad. Fasc. I.

Glandula pinealis.

1765. *Jo. Jac. Waldschmidt*, resp. *Jo. Wilh. Beutler*, Diss. de glan- dae pinealis statu naturali et praeternaturali. Marpurgi 1680. 4.

1766. *J. Eberh. Schweling*, resp. *W. Penon*, Diss. de glandula pineali de mentium humanarum. Bremae 1688. 4.

1767. *J. Filing*, resp. *W. Zurckes*, Diss. de glandula pineali. Bremae 85. (4?)

1768. *J. Salzmann*, Diss. de glandula pineali lapidifecta. Argentor. 73. 4.

1769. *J. G. Günz*, Progr. quod lapillos glandulae pinealis in quinque mente ientis proponit. Lips. 1753. 4.

1770. **Jo. Fr. Meckel*, observationes anatomicae de glandula p septo lucido, et origine paris septimi nervorum cerebri. In *Ludwig. nevrol. min.* Vol. IV. p. 9.

1771. **Idem*, observations anatomiques sur la glande pinéale, sur la transparente, et sur l'origine du nerf de la septième paire. *Mém. de 1765.* p. 91.

1772. **Hieron. Laub*, arenulae in glandula pineali repertae. *Ephex cur. Cent.* 9 et 10, p. 149.

1773. *Jac. Fr. Isenflamm*, de acervulo cerebri. *Nov. act. acad. na Vol. VIII.* p. 162.

1774. **E. S. Pfaff*, über den Hirnsand. *Med. Arch.* III. 769.

1775. **Sam. Thom. Soemmerring*, resp. *Nic. Lisignolo*, Diss. de lis vel prope vel intra glandulam pinealem sitis, sive de acervulo c Moguntiae 1785. 8. Recus. in *Ludwig. script. nevrol. min.* Vol. III. p

1776. *Gisb. Jac. Wolff*, Diss. sist. quaestiones varii argumenti (c nario et acervulo cerebri.) *Harderov.* 1791. 4.

Glandula pituitaria.

1777. **Joh. Conr. Brunner*, resp. *Franc. Sebast. Vorster*, Di glandula pituitaria. *Heidelberg.* 1688. 4. (Frcf. 1715. 8.)

1778. *Alex. Littre*, observation sur la glande pituitaire d'un h *Mém. de Paris 1707. hist.* p. 16. *mém. p. 125. éd. in -8. hist.* p. 19. p. 162.

1779. **J. Wenzel*, Beobachtungen über den Hirnanhang fallsüchtigen sonen. Nach seinem Tode herausgegeben v. *E. Wenzel*, nebst einer kurz benschichte des Verfassers, von *Dr. S. Ch. Lucd*, mit 9 Kpft. *Mayn 18*

1780. **Karl Vogel*, von der Bedeutung der Hirnanhänge, *Junau handlung.* Würzburg 1828. 8.

Ventriculi.

1781. *Joach. Oelhafen*, Diss. de usu ventriculorum cerebri. *Gedan.* 16

1782. *Alex. Littre*, observation sur l'eau, qui est dans les ventricul cerveau. *Mém. de Paris 1711. hist.* p. 29 *éd. in -8. hist.* p. 37.

1783. *Herm. Fr. Teichmeyer*, Progr. I—III. de lymphä cerebri. 1728. 4.

1784. **Car. Aug. a Bergen*, exercitatio splanchnologico-anatomica ventriculorum cerebralium lateralium novam sistit tabulam. *Frcf. a. 1734.* 4. Recus. in *Halleri coll.* II. *Diss. anat.* Vol. II. p. 841.

1785. *Vincenzo Malacarne*, questioni anatomiche, fisiologiche e c giche dilucidate. Quest. 1. Se nel cerebro umano altre cavitä non s' trino costantemente, degne d'entrar nel numero de ventricoli, eccetto le q universalmente conosciute. Quest. 2. quale si e l'ampiezza della cavi cinque ventricoli novelli? Quest. 3. qual e la maniera piu speditiva di pringli? *Memor. della soc Italiana.* Vol. VIII. P. I. p. 219.

1786. **Jo. Gottl. Huase*, de ventriculis cerebri tricornibus lucubrä anatomicae. *Lips.* 1789. 4.

1787. **Car. Asm. Rudolphi*, commentatio de ventriculis cerebri. phiae 1796. 4.

1788. **Derseibe*, über die Gehirnhöhlen. *In f. anat. phys.* Al *Berlin 1802.* 8. S. 149—189.

Infundibulum.

1789. **Jon. Sidrén*, resp. *Adolph Murray*, observationes anate circa infundibulum cerebri; ossium capitis in foctu structuram alienam temque nervi intercostalis cervicalem. *Upsal.* 1772. 4. Recus. in *Lu script. nevrol. min.* Vol. II. p. 242.

Verschiedene andere Theile.

1790. **Alb. a Haller*, resp. *Joh. Gottfr. Zinn*, Diss. sist. experä quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivi

- libus instituta. Götting. 1749. 4 recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. I. p. 421. et in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. IV.
 1791. **Joh. Conrad Peyer*, de rete mirabili cerebri ejusque descriptione oratori et usu. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 2. an. 5. 1686. p. 355.
 1792. **Herm. Fr. Teichmeyer*, Pr. de magna cerebri valvula. P. I. II. aë 1728. 4.
 1793. **Idem*. Progr. de septo pellucido, animae domicilio. Jenae 1729. 4.

IX. Schriften über die Entwicklung des Nervensystems, namentlich des Gehirns.

1794. **Jac. Fidel. Ackermann*, de nervi systematis primordiis commentio. Accedit de naturae humanae dignitate oratio academica. Mannheim. Heidelberg. 1813. 8.
 1795. **J. F. Meckel*, Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Centralthe des Nervensystems in den Säugthieren. In, *Meckels* Arch. I. 1 — 108. Abtheilung, ibid. I. 334 — 422.
 1796. **Ignaz Döllinger*, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des menschlichen Gehirns. Mit 2 Kpft. Gref. a. W. 1814. Fol.
 1797. *L. Schönslein*, von der Hirnmetamorphose. Würzburg 1816. 8.
 1798. **Friedrich Ziedemann*, Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Fötus des Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirns in den Thieren. Mit 7 Kpft. Nürnberg 1816. 4. Französisch: anatomie du cerveau, contenant l'histoire de son développement dans le foetus, et une exposition comparative de la structure dans les animaux. Trad. par un Allemand, avec un discours préliminaire sur l'étude de la physiologie en général, et sur celle de l'action du cerveau en particulier par *A. J. L. Jourdan*. à Paris 1823. 8. avec 14 planch. English: the anatomy of the foetal brain, with a comparative exposition of its structure in animals. Translated from the french of *A. J. L. Jourdan* by *Will. Bennett*. To which are added, some late observations on the influence of the sanguineous system over the development of the nervous system in general. Illustr. by 14 plates. Lond. and London 1825. 8.
 1799. **Desmoulins*, exposition succincte du développement et des fonctions du système cerebro-spinal. Vid. Arch. génér. de méd. Juin. 1823.
 1800. *Nichol*, on cerebral structure occurring in infants. London 1822. 12.
 1801. **Paul. Balogh de F. Almás*, Diss. de evolutione et vita encephali. Vini 1823. 8.
 1802. **Girgensohn*, Bemerkungen über die Deutung einiger Theile des Gehirns. *Meckels* Arch. Jahrg. 1827. p. 358.
 1803. **Ejusd.* nouvelles observations sur quelques parties de l'encephale Fétus humain. Répert. génér. d'anat. et de phys. path. Vol. V 1828. p. 180.

X. Schriften über mehrere Nervenpaare zugleich.

1804. **Meckel*, Diss. anatomique sur les nerfs de la face. Hist. de l'ac. des sc. et bell. lett. de Berlin 1751. p. 19.
 1805. **Car. Sam. Anderschii* fragmentum descriptionis nervorum carcorum (vel potius nervorum prope cor) dextri lateris jam ante aliquot denia typis impressum, nunc demum ao. 1791. subjuncta autoris tabula nomenque adjectis editum a *S. Th. Soemmerring*. Recus. in *Ludwig*. script. vol. min. Vol. II. p. 113.
 1806. **Ejusd.* tractatio anatomico-physiologica de nervis humani corporis quibus, quam edidit *Ernst. Phil. Andersch*. P. I. II. Regiom. 1797. 8. bbb. aen.
 1807. **Scriptores* neurologici minores selecti, s. opera minora ad anatomiam, physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. Edidit, notulis et nullis illustravit, praefatus est, indicibus auxit *Christ. Frid. Ludwig*. I. I — IV. c. tabb. aen. Lips. 1791 — 1795. 4.
 1808. **Nicol. Utric. Stieck*, Diss. de quinque prioribus encephali nervis. Götting. 1791. 8.

1809. * *Ant. Scarpa*, tabulae neurologicae ad illustrandam historiam anatomicam cardiacorum nervorum nonni nervorum cerebri, glossopharyngaei et pharyngaei ex octavo cerebri. Ticini 1794. Fol.

1810. * *Adph. Murray*, sciographica nervorum capitis descriptio, et quidem paris 1. 2. 3. 4. 5. Upsal. 1793. 4. resp. *Jac. Ackermann*. — 2) resp. *Ja. Noraeus* 6—11. Upsal. 1798. — resp. *Olavus Noraeus* — cervicalium cum plexu brachiali. Ups. 1794. resp. *Jo. Jac. Ekman*. intercostalis s. sympathetici. Ibid 1796. resp. *Gust. Henr. Ahlstedt*, dorsalium atq. lumbalum. Upsal. 1796. 4. resp. *Laurent. Zenius*, sacralium cum plexu ischiadicum. Upsal. 1797. 4.

1811. * *Chr. Jac. Baur*, tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani, thoracis imprimis abdominisque. Tubing. 1818. 4.

Hirnnerven. Erstes Paar.

1812. * *Jo. Hadr. Slevogt*, resp. *Jo. Otto Horstius*, Diss. qua processus cerebri mammillares ex nervorum olfactoriorum numero exemptos disquisitionem submittit. Jenae 1715. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 846. (Siehe auch *Stieff* No. 1808. und *Murray* No. 1810.)

1813. * *Dieder. Wilh. Andreae*, Diss. de processibus mammillaribus. Lgd. Bat. 1715. 4.

1814. * *Jo. Ern. Neubauer*, de processuum cerebri mammillariorum connexione. Nov. acta acad. nat. cur. Vol. VI. p. 293.

1815. *Jos. Weitbrecht*, de vera significatione processuum mammillariorum cerebri. Comm. petrop. XIV. 1751. p. 276.

1816. *Guichard. Jos. Duverney*, comparaison des nerfs olfactifs de l'homme et dans les animaux. Mém. de Par. Tom. I. p. 366.

1817. *Aimé Matthieu*, tentamen physiologico-anatomicum de nervi generis, accedente primi, secundi, tertii et quarti nervorum paris descriptione. Lgd. Bat. 1758. 4.

1818. * *Joh. Dan. Metzger*, primi paris nervorum historia. Argentorati 1766. 4. In ejusd. opusculis. Gothae 1790. p. 1 sq. in *Ludwig*. script. nervol. min. Vol. I. p. 108 et in *Sandisfort* thes. Diss. III. 457.

1819. * *Jo. Gtl. Haase*, Pr. de nervis narium internis. Lips. 1791. 4.

1820. * *M. F. Magendie*, le nerf olfactif est-il l'organe de l'odorat? expériences sur cette question. In ej. Journ. de physiol. expér. Vol. IV. 1825. p. 169.

Zweites Paar.

1821. * *Constantii Varolii* de nervis opticis, nonnullisque aliis praeter communem opinionem in humano capite observatis ad *Hieronimum Mercurialem*. Frfc. 1591. 8.

1822. * *Leeuwenhoek*, microscopical observations, concerning the optic nerve. Phil. transcript. 1675. p. 378.

1823. * *Dan. Bernoulli*, experimentum circa nervum opticum. Comment. acad. sc. Petrop. Tom. 1. 1728. p. 314. sq.

1824. * *Jo. Ant. Heyn*, disquis. inaug. exhibens animadversiones ad juxta nervum opticum atque amphiblestroidem tunicam. Kilonii s. a. 4.

1825. *J. Fr. Henckel*, epist. gratulatoria ad *Jo. Kesselring*, de nonnullis singularibus circa nervos opticos. Halae 1738. 4. recus. in commerc. Lit. Norico 1739. p. 71 sq.

1826. * *Jo. Juncker*, resp. *Jo. Henr. Moeller*, Diss. exhibens nonnullas observationes circa tunicam retinam et nervum opticum. Halae 1749. 4. Hall. coll. VII. 2. p. 187.

1827. * *Phil. Michaelis*, über die Durchkreuzung der Sehnerven. Mit einigen Num. v. *Sömmerring*. Halle 1790. 8.

1828. * *Sam. Thom. Soemmerring*, resp. *Fr. Nic. Noethig*, Diss. de decussatione nervorum opticorum. Moguntinae 1786. 8. Recus. in *Ludwig*. script. nervol. min. Vol. I. p. 127.

1829. * *Weber*, anat. physiol. Erklärung der Sinnesverrichtung des Secht. In *Reiß* Arch. VI. 282. (handelt v. S. 286—292. v. d. Durchkreuzung.)

- l. * *William Hyde Wollaston*, on semidecussation of the optic ner-
hil. trans. 1824. P. I. p. 222.
ll. auch *Stiedé* No. 1808. und *Murray* No. 1810.)

Fünftes Paar.

- l. * *Jo. Casp. Frank*, Diss. sist. delineationem anatomicam et physio-
pathol. consensus nervi trigemini. Jenae 1799. 8.
2. * *Jo. Frid. Meckel*, Diss. de quinto pare nervorum cerebri. Got-
1748. 4. tabb. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. I. p. 145.
3. * *Jo. Fr. Meckel*, observation anatomique sur un noeud ou gan-
u second rameau de la cinquième paire des nerfs du cerveau nouvel-
découvert, avec l'examen physiologique du véritable usage des noeuds
glions des nerfs. Voyez Mém. de Berlin 1749. p. 84 — 103.
4. * *Jo. Fr. Meckel*, de ganglio secundi rami quinti paris nervorum
nuper detecto, deque vera gangliorum nervosorum utilitate. Berol.
1 *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 7.
5. * *Anton Balthasar Raymund Hirsch*, Diss. paris quinti nervorum
di disquisitio anatomica in quantum ad ganglion sibi proprium semi-
et ad originem nervi intercostalis pertinet. Viennae 1765. 4. Recus. in
script. nevrol. min. Vol. I. p. 244. et in *Sandifort* thes. Diss. III. 477.
6. * *Henr. Aug. Wrisberg*, observationes anatomicae de quinto pare
m encephali, et de nervis, qui ex eodem duram matrem ingredi falso
r. Gottingae 1776. 4. c. tab. aen. Novi commentar. soc. Gottingens.
1776. Phys. p. 41. in ejusd. commentationum. Vol. I. p. 98 sq. et in
ii script. nevrol. min. Vol. I. p. 265.
7. * *D. Palletta*, de nervis crotaphitico et buccinatorio. Mediolani
Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. III. p. 63.
8. * *Ant. Scarpa*, anat. annot. Lib. II. de organo olfactus praecipuo,
nervis nasalibus inferioribus et pari quinto nervorum cerebri. Ticini
9. * *Jo. Gul. Haase*, Progr. de nervo maxillari superiore s. secundo
quinti paris nervorum cerebri. Lips. 1793. 4.
10. * *Idem*, Progr. de nervis narium internis (quinti paris). Lips.
Recus. in *Ludwig.* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 11.
11. * *John Hunter's* Beschreibung einiger Zweige des fünften Nerven
In Bemerk. über d. thier. Defon. Braunsch. 1802. S. 364 ff.
12. * *Aug. Frid. Ludw. Fitzau*, Diss. de tertio ramo paris quinti ner-
cerebri s. nervo maxillari inferiore. Lipsiae 1811. 4.
13. * *Guil. Herm. Niemeyer*, de origine paris quinti nervorum cerebri
aphia. Halae 1812. 8. Deutsch: über den Ursprung des fünften Ner-
s des Gehirns. In *Reils* Arch. XI. 1 — 88.
14. * *Aug. Erl. Bock*, Beschreibung des fünften Nervenpaares und seiner
ung mit andern Nerven, vorzüglich mit dem Gangliensysteme. Mit Kupf.
1817. Fol. — Dessen Nachtrag zu der Beschreib. u. f. w. Meissen
ol.
15. * *Intorno la scoperta di due nervi dell' occhio umano ragguaglio del*
s. *Trasmondi*. Estratto dell giornale arcadico. Vol. XIX. P. I. Roma
(1 Rpf.)
16. * *Osservazioni storico-anatomiche intorno alla pretesa scoperta di un*
e di due nervi nel occhio umano. Roma 1823. 8.
17. * *Riposta del Dr. Gius. Trasmondi al Sign. G. Flajani* intorno
rta del musculo d'*Hornor* e de' nuovi due nervi dell' occhio umano.
823. 8.
18. * *rher* gehören auch einige der unter No. 1617 — 1623 aufgeführten Ab-
en von *Bell.*)
19. * *Dan. Fred. Eschricht*, de functionibus septimi et quinti paris ner-
n facie propriis. In *Magendie* Journ. de physiol. exper. Vol. VI.
228.
20. * *Idem*, de functionibus primi et quinti paris nervorum in olfactorio
propriis. Ibid. Vol. VI. p. 339.

Siebentes Paar.

1850. **Jo. Fr. Meckel*, observation anatomique sur la glande pinéale, sur la cloison transparente, et sur l'origine du nerf de la septième paire. Mém. de Berlin 1765. p. 91.

Achstes Paar.

1851. *Peter Paul Molinelli*, de ligatis sectisque nervi octavi paris. Commentar. Bononienses. Vol. III. C. p. 67. O. p. 280.

1852. *Charles Louis Dumas*, exposé de quelques expériences propres à déterminer quelle est l'influence des nerfs de la huitième paire sur la coloration du sang. *Sedillot* rec. périod. de la soc. de médéc. de Paris. Vol. XXX. p. 353.

1853. *Ducrotay de Blainville*, expériences sur l'influence de la huitième paire des nerfs dans la respiration. *Nouv. Bulletin de la soc. philom.* Vol. II. p. 226.

1854. *Legallois*, mémoire sur la section de nerfs de la huitième paire. *Nouv. Bulletin de la soc. philom.* Vol. II. ann. 3. (1810) p. 101.

(Siehe auch *Scarpa* No. 1809.)

1855. **W. Krimer*, über das Verhältniß der Form und Richtung des Gehörnervens zu seiner Verriichtung. *In f. phys. Untersuch.* Leipzig. 1820. p. 22.

Neuntes Paar.

1856. **Jo. Franc. Guil. Boehmer*, Diss. de nono pare nervorum cerebelli. Gotting. 1777. 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevr. min. Vol. I. p. 273.

1857. **Car. Sam. Andersch*, de nono nervo capitis s. nervo sensorio linguae. In ej. tract. de nervis c. h. aliquibus. P. I. p. 1 sq.

1858. **C. L. Jacobson*, (Acta regiae societ. Hafniens. Vol. V. p. 292.) Deutsch: Beiträge zur Otoiatric. Erster Beitrag: Ueber eine neue, im D. entdeckte Nervenverbindung. *In Med. Arch.* V. 252.

1859. *Ejusd.* description anatomique d'une anastomose entre le nerf pharyngo-glossien, le trifacial et le trisplanchnique. *Repert. génér. d'anat. et de physiol. path. et de cliniq. chir.* Tom. II. Paris 1826. 4. p. 197 — 204. *Notes additionnelles à ce mémoire par G. Breschet.* Ibid. p. 204 — 215.

1860. **Hermanu Friedr. Kilian*, anatomische Untersuchungen über das neunte Hirnnervenpaar oder den Nervus glossopharyngeus. Nebst angehängten Bemerkungen über das anatomische Museum der Universität zu Straßburg. *Hafsl.* 2 Kpft. Pesth 1822. 4.

(Vgl. auch *Scarpa* No. 1809.)

Zehntes Paar.

1861. *Raphael Bienvenu Sabatier*, mémoire sur les nerfs de la dixième paire. Mém. de mathem. et de phys. 1773. Vol. VII. p. 553.

1862. **Car. Sam. Andersch*, de decimo nervo capitis sive nervo harmonico magno capitis. In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. P. I. p. 19.

1863. *George Martin*, the experiment of culling the recurrent nerves, carried on further than has hitherto been done. *Med. essays and observations by a Soc. in Edinburgh.* Vol. II. p. 114.

1864. *John Haighon*, experiments made on the laryngial and recurrent branches of the eighth pair of nerves, with a view to determine the effects of the division of those nerves on the voice. *Mem. of the med. soc. of London.* Vol. III. p. 422.

Elftes Paar.

1865. **Jo. Frid. Lobstein*, Diss. de nervo spinali ad par vagum accessorio. Argentor. 1760. 4. recus. in *Sandifort* Thes. diss. Tom. I. p. 325 et in *Ludwigii* script. nevr. min. Vol. II. p. 219.

1866. **Car. Sam. Andersch*, de undecimo nervo capitis sive nervo motorio linguae. In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. P. I. p. 52. — de nervo descendente interno colli s. nervo musculos colli movente interno, et nervo descendente externo colli s. nervo musculos colli movente externo. Ibid. p. 91.

1867. * *Jo. Bapt. Morgagni*, epistola de iis, quae in Academia Bononiensi ab *Antonio Maria Valsalva* recitatae sunt: Diss. 1. P. 3. tertio loco proponit, quibus trahebatur ad suspicandum, nervos, quos ceteri credunt et vocant a spinali medulla ad par vagum accessorios esse, et vocari oportere a pari vago ad medullam spinalem recurrentes. Commentar. Bononiens. Vol. I. p. 377.

1868. * *Ant. Scarpa*, de nervo spinali ad octavum cerebri accessorio commentarius. Acta acad. med. chir. Vindobon. Tom. I. 1788. p. 337. Ueber ein zum achten Paare der Gehirnerven hinlaufendes Beinerven der Rückgrates. Abhandl. der med. chir. Acad. zu Wien. Bb. 1. S. 385.

Rückenmarksnerven im Allgemeinen.

1869. * *Aug. Car. Boë*, die Rückenmarksnerven nach ihrem ganzen Verlaufe, Vertheilungen und Verzweigungen, nebst 1 Bd. Kpf. (in Fol.), enthaltend die Abbildungen derselben auf 7 Kpft. Leipz. 1827. 8. Latein.: accurata nervorum spinalium descriptio. Latine vertit *Alb. Fried. Haenel*. Lips. 1828. 8.

Einzelne Rückenmarksnerven.

1870. * *Jani Bang*, nervorum cervicalium anatome. Hafniae s. a. 8. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. I. p. 343.

1871. * *Georg. Thom. Asch*, Diss. de primo pare nervorum medullae spinalis. Goetting. 1750. 4. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. I. p. 310.

1872. *Felix Vicq d'Asyr*, mémoire sur la description des nerfs de la seconde et troisième paire cervicale. Mém. de Paris 1777. hist. p. 11. mém. p. 21.

1873. * *Goswini Friderici Peipers*, tertii et quarti nervorum cervicalium descriptio, cui accedit succincta eorundem nervorum quinti; nervi phrenici praesertim ratione originis; nervi accessorii Willisii; nervi duri ejusque praecipue rami inferioris; nervi hypoglossi et occipitalis maximi a secundo cervicalium nervo adumbratio. Halae 1793. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 18.

1874. * *Ephraim Krüger*, Diss. de nervo phrenico. Lips. 1758. 4. in *Sandisfort* thes. Diss. III. 503.

1875. * *Henr. Aug. Wriberg*, Pr. de respiratione prima, de nervo phrenico et calore animali quaedam animadversiones. Gottingae 1763. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. IV. p. 16. et in *Sandisfort* thes. II. 255.

1876. * *Car. Sam. Andersch*, de parvo nervo corporis sive parvo nervo harmonico corporis (phrenicus). In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquibus. P. II. p. 110.

1877. * *Jo. Gul. Haase*, Pr. de nervo phrenico dextri lateris duplici, parteque vagi per collum decursu. Lipsiae 1790. 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. III. p. 112.

1878. * *Jac. Jo. Klunt*, Diss. de nervis brachii. Gottingae 1784. 4. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. III. p. 122.

1879. * *Jo. Adam Schmidt*, commentarius de nervis lumbalibus eorumque nexu anatomico-pathologicis. C. IV. tabb. aen. Vindobonae 1794. 4.

1880. * *Jo. Henr. Joerdens*, descriptio nervi ischiadici iconibus illustrata. Erlang. 1788. Fol.

1881. * *Jo. Leonh. Fischer*, descriptio anatomica nervorum lumbalium, sacralium et extremitatum inferiorum. Cum IV tabb. linear. et IV. adumbratis. Lips. 1791. Fol. max.

1882. * *Martin. Ern. Styx*, descriptio anatomica nervi cruralis et obturatorii icone illustrata. Jenae 1782. 4.

1883. * *Jo. Chr. Rosenmüller*, Pr. nervi obturatorii monographia. Lips. 1814. 4.

Sympathetischer Nerv.

1884. *François Pourfour du Petit*, mémoire dans lequel est démontré que les nerfs intercostaux fournissent des rameaux, qui portent des esprits dans les yeux. Mém. de Paris 1727. 4. hist. p. 7. mém. p. 1. éd. in-8. hist. p. 9. mém. p. 1.

1885. *Antoine Portal*, description du nerf intercostal dans l'homme. *Mém. de l'institut Nat.* Vol. IV. mém. p. 151.

1886. **Car. Aug. a Bergen*, Diss. de nervo intercostali. *Freß. ad Viadr.* 1731. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 871. sq.

1887. **Aug. Frid. Walther*, Pr. I. II. quo paris intercostalis et vagi corporis humani nervorum et ab utroque ejus latere obviorem anatonem exhibet, postquam expositionem *Cl. Winslow* nuperrime cum cadavere contulit. Lips. 1733. 1735. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 909 et 927.

1888. *Franc. Jos. Hunauld*, observation sur un rameau des nerfs anses considérable, partant du plexus gangliforme sémilunaire, qui remonte du bas ventre à la poitrine, et va se perdre à l'oreillette droite et à la base du coeur où il se distribue. *Mém. de Par.* 1734. hist. p. 44. éd. in — 8. hist. p. 60.

1889. **Alb. Haller*, resp. *Hardov. Wilh. Ludw. Taube*, de vera nervi intercostalis origine. *Götting.* 1743. 4. Recus. in *Halleri* coll. Diss. anat. Vol. II. p. 939. et in ejusd. *Oper. minor.* Tom. I. p. 503. (enthält die Geschichte der Entdeckungen über den sympathischen Nerven bis auf Haller. Diese Geschichte ist fortgeführt in der später erwähnten Abhandlung von Hirze bis auf die neueste Zeit.)

1890. **J. J. Huber*, *Epist. anat. ad D. D. Wolrath Wigand*, de nervi intercostali, de nervis octavi et noni paris, deque accessorio nonnulla tradens. *Götting.* 1744. 4.

1891. **Casimiri Chrsth. Schmideli* epistola anatomica, qua de contraversa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur, ad *Joh. Wilh. Wannerum*. C. tab. aen. *Erlangae* 1747. 4.

1892. **Idem*, resp. *Jo. Gerold*, Diss. qua quaedam de nervo intercostali notantur. *Erlang.* 1754. 4. c. tab. aen.

1893. **Demetrius Iwanoff*, Diss. de origine nervorum intercostalium. *Argentorati* 1780. 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevr. min. Vol. III. p. 81.

1894. **Bemerkungen über den Ursprung des Symp.* giebt: *Kav. Feltr Fontana* in *Kühn und Weigels ital. Bibl.* Bd. 2. Heft 2. S. 90.

1895. **Car. Sam. Andersch*, de magno nervo corporis sive magno nervo harmonico corporis. In ejusd. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. p. 102.

1896. **M. Girardi* de nervo intercostali. *Florentiae* 1791. Recus. in *Ludwigii* script. nevr. min. Vol. III. p. 78.

1897. *J. Munniks*, observatio, qua, ad illustrandam artem medicam, ostenditur origo nervi intercostalis, ejusque commercium cum aliis nervis, ab ejus origine usque ad exitum e calvaria, cum autopsia tum observatis medicis confirmata. c. tabb. aen. II. In ejusd. obs. variis. *Groningae* 1805.

1898. **U. F. Emmert*, einige Bemerkungen über den sympathischen Nerven bei Säugthieren und Vögeln. In *Reils Arch.* XI. 117.

1899. **Joh. Frid. Lobstein*, de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis, commentatio anatomico-physiologico-pathologica, tabulis aeneis et lithographicis illustrata. *Paris* 1823. gr. 4.

Bau der Ganglien.

1900. **Jo. Maria Lancisius*, Diss. de structura usuque gangliorum ad *Jo. Bapt. Morgagnium*. In *Morgagni advers. anat.* V. p. 101 sq. edit. *Lugd. Bat.* 1741. 4.

1901. *Jean Theodor Eller*, exposition anatomique de l'origine et de la formation du ganglion. *Mém. de Berlin* 1746. p. 108.

1902. **Jam Johnstone*, essay on the use of the ganglions of the nerves. *Philos. trans.* Vol. 54. 1764. p. 177.

1903. — history of a foetus born with a very imperfect brain: to which is subjoined a supplement of the essay on the use of the ganglions. *Philos. transact.* Vol. 57. 1767. p. 118 ff.

1904. — Experiments in support of the uses ascribed to ganglions of the nerves, in *Phil. trans.* Vol. 54 and 57. — *Phil. trans.* Vol. 60. 1770. p. 30.

1905. **Jam Johnstone*, Versuch über den Nutzen der Nervennoten. *N. b. Engl. Stettin* 1787. 8.

1906. *Jo. Gul. Haase*, Diss. de gangliis nervorum. *Lipsiae* 1772. 4. Recus. in *Ludwig.* script. nevr. min. Vol. I. p. 61 sq.

17. * *Ant. Scarpa*, de nervorum gangliis et plexibus. In ej. anat. an-
 th. I. Mutinae 1779. 4.
 18. * *Car. Guil. Wutzer*, de corporis humani gangliorum fabrica atque
 monographia c. tab. aen. Berol. 1817. 4.
 19. * *Jo. Mich. Leupoldt*, Diss. de systematis gangliaris natura. Er-
 1818. 4.

Einzeln Theile des sympathischen Nerven.

10. * *Jo. Ern. Neubauer*, descriptio anatomica nervorum cardiacorum.
 prima: de nervo intercostali cervicali dextri imprimis lateris. Adj. sunt
 nervor. a dextro corporis latere ad cor tendentium. Frsf. et Lipsiae
 4. Recus. in ej. opera anat. collecta cur. *Hinderer*. Frsf. et Lips.
 p. 59 sq.
 11. * *Car. Sam. Andersch*, de nervis cardiacis lateris dextri sive nervis
 dos cordis lateris dextri moventibus. In ejusd. tract. anat. de nerv. c. h.
 p. I. p. 148. — de nervis cardiacis lateris sinistri sive nervis muscu-
 rdis lateris sinistri moventibus. Ibid. P. II. p. 1. — de nervo cardiao
 iciali sive nervo musculum lateris superficialis movente. Ibid. II. p. 85.
 12. * *Chr. Theoph. Ludwig*, Pr. de plexibus nervorum abdominalium
 nervo intercostali duplici observationes nonnullae. Lipsiae 1772. 4.
 in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. III. p. 105.
 13. * *Henr. Aug. Wrisberg*, observationum de nervis viscer. abdom.
 observ. anat. nevrologicae de ganglio plexuque semilunari in abdomine,
 vis illum formantibus. Gott. 1780. In commentationib. soc. reg. scientiar.
 g. Vol. II. 1779. p. 79. in auctoris Commentationum med. phys. anat. etc.
 col. I. Gotting. 1802. p. 240. et in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol.
 50.
 14. * *Ejusd.* observationum anatomico-neurologicarum de nervis vis-
 abdominalium. Part. II. de nervis systematis coeliaci. Sect. I. de
 gastricis, quae est observationum de ganglio plexuque semilunari con-
 o Imma. — Commentat. soc. Gotting. Vol. XV. 1800 — 1803. Phys.
 et in auctoris Comment. Vol. I. p. 551. — Continuatio secunda de ner-
 paticis et splenicis. Comment. soc. Gotting. Vol. XVI. 1804 — 1807.
 p. 15.
 15. * *Alb. de Haller*, ad figuram nervorum cordis lateris sinistri Cl.
Anderschii discipuli sui divinatio. Nov. comment. soc. Gotting.
 II. P. I. p. 1.
 16. *Jo. Bern. Jac. Behrends*, Diss. qua demonstratur cor nervis ca-
 addita disquisitione de vi nervorum arterias ingentium. Moguntiae
 4. Recus. in *Ludwigii* script. nevrol. min. Vol. III. p. 1.
 17. * *Ad. Theoph. Nicolaus Zerner*, Diss. an cor nervis careat et
 rere possit. Erfordiae 1794. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min.
 V. p. 1.
 Vgl. hierbei *Scarpa* No. 1809.)
 18. * *Jo. Gtl. Walter*, tabulae nervorum thoracis atque abdominis
 1783. Fol. max. — Description des nerfs du thorax et de l'abdomen.
 du Latin. Nouv. mém. de l'Acad. roy. d. sc. et bell. lett. de Berlin
 p. 81. (Englisch: plates of the thoracic and abdominal nerves, reduced
 he original, as published by order of the royal Academy of sciences
 lin, accompanied by coloured explanations, and a description of the
 gum, great sympathetic and phrenic nerves. London 1783? 4.)
 19. * *Jo. Gtl. Haase*, de plexibus oesophageis nervosis, parisque vagi
 ctus decursu. Lipsiae 1791. 4. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min.
 II. p. 117.
 20. *Munniks*, Observationes variae Obs. I. qua indagatur, num cordis sub-
 muscularem revera nervi occupent. Groningae 1805.
 21. * *Jo. Chr. Reil*, über die Eigenschaften des Ganglien-Systems und
 verhältniß zum Cerebral-System. In *Reils* Arch. VII. S. 189.
 22. * *R. V. Rudolphi*, einige Bemerkungen über den sympathischen Ner-
 In *Abhd. d. Königl. Akad. d. Wiss. in Berlin* in d. J. 1814 — 1815.
 1 ff.

338 Schriften über einzelne Theile des sympath. Nerven.

1923. *Capre, über die stärkste Entwicklung des Gangliennerven bei sinnigen (N. J. de méd. Tom. IV. p. 40). Med. Arch. VI. 464.

1924. *Fr. Tiedemann, Tabulae nervorum uteri. Heidelbergae 1822

1925. *Leonhard Hürzel, Diss. sist. nexus nervi sympathetici cum cerebralis. Heidelbergae 1824. 4. Deutsch: Untersuchungen über die Bindungen des sympathischen Nerven mit den Hirnnerven. In Tiedem. und Trevir. Zeitschr. für Psychol. Bd. 1. S. 197 sq. Recherches sur anastomoses du nerf grand sympathique avec les nerfs cérébraux. J. compl. du Dict. des sc. méd. XXII. p. 305.

1926. *Sebastianus Goetz, Neurologiae partium genitalium masculin. prodromus. Erlangae 1823. 4.

1927. *Frid. Arnold, Diss. sist. observationes nonnullas neurologicae parte cephalica nervi sympathici in homine, c. tab. aen. Heidelberg. 1826. Deutsch: Einige Beobachtungen über den Kopftheil des sympathischen N. beim Menschen. In Tied. und Trev. Zeitschr. f. Psych. Bd. 2. S. 147. B. III. Observations sur la portion céphalique du nerf grand sympath. Journ. compl. du Dict. des sc. méd. XXIV. 337.

1928. Fouilhoux, remarques anatomiques et physiologiques sur le système nerveux ganglionaire. (Nouv. Bibl. méd. avril 1824. p. 409.) — non remarques anatomiques et physiologiques sur les ganglions du grand pathique. (Ibid. p. 42.)

1929. *Fr. Arnold, über den Ohrknoten, eine anatomisch-physiologische Abhandlung. Heidelberg 1828. 4. (m. Abbild.)

1930. *P. J. Manec, anatomie analytique. Nerf grand sympathique. (1ste. Tafel in Fol. mit Text an der Seite.) à Par. 1828.

1931. *Note sur la véritable origine du nerf propre au muscle tenseur la membrane du tympan, ou muscle interne du marteau. In répert. d'anat. et de phys. path. et de clinique chirurg. rédigé par M. G. Bras Vol. VI. à Par. 1828. p. 92—95.

1932. *Rud. Wagner, über einige der neueren Entdeckungen 'in der Anatomie Arnolds Ohrknoten). In Meusingers Zeitschr. für die organ. Bd. III. Hft. 3. Sept. 1828. S. 359.

1933. *Fr. Arnold, der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, in anatomischer und physiologischer Hinsicht bearbeitet. Mit 10 u. 10 Einertaf. Heidelberg 1830. 4.

1934. *Jo. Bapt. Servais, Diss. anat. phys. de parte nervi sympathetici in homine. Leodii 1830. 4.

Ueber das Nervensystem im Allgemeinen.

Eintheilung des Nervensystems in die Centraltheile
und in die Nerven.

Das Nervensystem besteht aus dem Centraltheile, oder dem Gehirne und Rückenmarke, und den Nerven. Alle diese Theile hängen ununterbrochen mit einander zusammen.

In dem Gehirne und Rückenmarke ist die dem Nervensysteme eigenthümliche weiche Substanz, deren Eigenschaften schon Th. I. S. 154 erörtert worden sind, in großer Menge angehäuft, ohne daß die Fasern und Blättchen, aus denen die größeren und kleineren Abtheilungen größtentheils bestehen, in häutigen Röhren eingeschlossen sind. Vielmehr berühren sie sich unmittelbar, und haben oft eine grauröthliche, nicht aus Fasern bestehende Nervensubstanz zwischen sich. Die einzelnen Fasern des Gehirns und Rückenmarks sind auch nicht in einem lockeren nachgiebigen Zellgewebe aufgehangen und dadurch von einander so getrennt, daß jede für sich in merklichem Grade verschiebbar und beweglich wäre, vielmehr liegen sie so neben einander, daß man schließen muß, daß, wenn ja in diesen Fasern während des Lebens bei ihrer Berrichtung eine Bewegung stattfindet, sie ohne eine merkliche Verschiebung der Nervenfasern geschehen müsse.

Weil nun die kleinsten Theile des Gehirns und Rückenmarks so weich und weder in häutigen Röhren eingeschlossen, noch durch sichtbares lockeres Zellgewebe von einander abgefordert sind, so sind sie weicher und der Verdrückung mehr als irgend ein anderer Theil des Körpers ausgesetzt.

Die größeren Theile sind aber in den Behältern der Hirnschale und des Canales des Rückgrats geschützt, und daselbst mittels mehrfacher, über einander eingeschlossener häutiger Schläuche oder Säcke sehr weckmäßig aufgehangen; denn zwischen die Hauptabtheilungen derselben weissen ausgespannte horizontale und senkrechte Falten jener an dem Schädel und an der Wirbelsäule befestigten häutigen Säcke ein. An den senkrechten Falten hängen viele Theile des Gehirn- und Rückenmarks, indem die das Gehirn und Rückenmark überziehenden Häute daran in sehr vielen Punkten angewachsen sind; auf den horizontalen Falten ruhen mehrere Theile des Gehirns und des Rückenmarks, und werden zugleich von den benachbarten Theilen abgefordert und dadurch

in einer Lage erhalten, in welcher sie nicht auf dieselben drücken sich nicht verschieben können. Zugleich wird hierdurch bewirkt, nirgends auf den knöchernen Behältern mit ihrem ganzen Gewicht und an sie angeedrückt werden, und daß ihnen also nicht heftige Erschütterungen durch die Knochen mitgetheilt werden.

Allen diesen später im Einzelnen zu beschreibenden Einriß verdankt es der Mensch, daß er laufen und springen kann, ohne große, weiche und so fein organisirte Masse des Gehirns und marks durch die Stöße leidet.

Anderß verhält sich bei den Nerven. Die meisten von ihnen zwischen weichen Theilen in Polstern von lockerem Zellgewebe Fett, zugleich aber nicht selten in gewissem Grade dem Drucke der Muskeln oder einem äußeren Drucke ausgesetzt. Die eigenthümlich stanz ist aber bei ihnen in feine Fäden zertheilt, und diese sind engen, häutigen Röhrchen eingeschlossen, die durch Zellgewebe in größere häutige Scheiden zu größeren Bündeln zusammengefaßt. Es ist schon Th. I. S. 281. erwähnt worden, daß diese Nervenfäden so klein sind, daß nach Prevost's und Dumas's Messung und Berechnung 16000 Nerven beisammen liegen können, der $\frac{1}{2}$ P. Linie im Durchmesser bei Nerven gelangen nun auf oft sehr langen Wegen zu fast allen Theilen des Körpers, und sind überall, wo sie durch große Bewegungen und gezerrt werden können, geschlängelt. Die kleinsten Fädchen sind aber sind überall wellenförmig gebogen. Nur die größeren liegen hinter den Knochen der Rippen und der Gliedmaßen und Zwischenräumen der Muskeln einigermassen geschützt.

Weil nun das Gehirn dem Kopfe, das Rückenmark dem Rumpfe beide also ihren knöchernen Kapseln in gewissem Grade ähnlich sind, die größeren Stränge der Rückenmarksnerven aber unter den Rippen und der Gliedmaßen liegen, so haben die größeren Nerven des Nervensystems, isolirt betrachtet, einige Aehnlichkeit in ihrer Lage mit dem Gerüste der Knochen. Das Nervensystem ist vollkommen symmetrisch, als das Skelet. Anstatt aber daß die beiden Hälften des Skelettes in der mittleren zwischen ihnen liegenden Ebene hinten und vorn fest vereinigt sind, ist das Centrum des Nervensystems durch 2 sehr tiefe, in der mittleren Ebene desselben befindliche Einschnürungen seiner ganzen Länge nach in 2 von einander fast abgesonderte Hälften zertheilt, die nur durch mittlere Theile von sehr geringem Umfange einander vereinigt werden. Vorn vereinigen sich die beiden Hälften der Nervenverbreitungen, wenn man den Nervus vagus sympathicus ausnimmt, nirgends auf eine sichtbare Weise. Sogar bei vielen nur einmal vorhandenen Theilen des Körpers der Fall, bei den Lippen, bei der Zunge, bei dem Gaumenvorhange und bei dem Kehlkopf diese Theile erhalten auf jeder Seite ihre Nerven, welche sich in der M

nicht auf eine sichtbare Weise unter einander verbinden. Nach Langenbeck's Ab- bildungen scheinen die Nerven auf dem Rücken des Penis eine Ausnahme zu machen. Indessen hat Boet auch hier keine sichtbare Verbindung der Nerven der rechten und der linken Seite finden können.

Von dem geringen Zusammenhange der beiden Seitenhälften des Gehirns, oder des Rückenmarkes, oder der Nerven durch einmal vorhandene mittlere Theile, muß man wohl die dem Nervensysteme eigenthümliche Erscheinung ableiten, daß ein großer Theil der einen Hälfte des Nervensystems in seiner Verrichtung, Empfindung oder Bewegung zu vermitteln, gestört sein kann, ohne daß es die andere Hälfte ist, daß sich über diese einseitige Lähmung nicht zugleich auf das Herz, auf den Magen, Darmcanal und auf andere Theile erstreckt, deren Nerven in der mittlern Ebene von beiden Seiten her zusammenkommen.

Lage der grauen und der weißen Substanz im Nervensysteme ¹⁾.

Die 2 Substanzen ²⁾, welche man im Nervensysteme unterscheidet, die rauhrothliche sehr gefäßreiche, nicht faserige, und die weiße nicht sehr gefäßreiche, meistens faserige, liegen theils in größeren Lagen neben einander, im Gehirn nämlich so, daß die weiße Lage das Innere bildet, und die graurothliche Substanz die äußere und manche Stellen der den Hirnhöhlen zugekehrten inneren Oberfläche überzieht, im Rückenmarke so, daß die graue Substanz das Innere bildet und von einer Lage weißer Substanz überzogen wird, theils füllt die graue Substanz die Zwischenräume zwischen den Fasern und Blättchen der weißen Substanz aus, die dadurch auf ihrer Durchschnittsfläche ein gefestetes Ansehn bekommt.

An den Nerven kann man eine Mengung von grauen und weißen Substanzen nicht wahrnehmen, das einzige erste Gehirnnervenpaar, den Gehörnerven ausgenommen, wohl aber scheint die Substanz der Gehirn- und Rückenmarksnerven im Allgemeinen weißer, als die des Nervus sympathicus, welche für die dem Willen nicht unterworfenen Organe vorzugsweise bestimmt ist, durchsichtiger und röthlicher zu sein.

¹⁾ Der Unterschied der Farbe des Marks und der grauen Masse ist desto deutlicher, je früher man das Gehirn untersucht. Wedel fand in einem jungen Mohren von 12 Jahren die markige Masse blauschwarzlich (Mém. de l'acad. de Berlin, 1753.), in einem erwachsenen Mohren schwarzbraun (ebend. 1757.). Prof. Walter, der Vater, fand in einem Mohren die ganze markige Masse etwas dunkler (de venis oculi p. 21.). Camper fand in vier Mohren die Farbe, sowohl der grauen Masse als des Marks, blässer (ll. Schriften, I. S. 32.); auch S. Lh. Sommering fand es nicht tiefer gefärbt; vielmehr schien es ihm blässer (Versch. des Regens. §. 53.).

²⁾ Walter, der Vater, fand das Gehirn fester und zäher bei Mohren (a. a. O. S. 20.). Ebdenselbe sagt (ebend.): es pflegt bei Wahnsinnigen härter zu sein. Auch Haller sagt: „Aurior in stultis“ (pr. lin. phys. §. 374.). Man findet aber bisweilen auch Gehirne von Wahnsinnigen, die weicher sind. Chamberl. (obs. clinicae. Par. 1789. Obs. 29.) fand in Leichen solcher Menschen, die an tödtlichen Fiebern gestorben waren, die Gehirnmasse oft fester.

Endigung, Richtung und Verflechtung der Fasern der weißen Substanz.

Da die Fasern des Gehirns und des Rückenmarks in manchen Richtungen durch einander durchgehen und unter einander verflochten sind, auch außerdem zwischen ihnen die Nervenfasern hervorkommen, so ist eine vorzüglich wichtige Frage die, in welchem Zusammenhange diese verschiedenen Fasern unter einander stehen, d. h. wie und dem Gehirne und Rückenmarke selbst angehörenden Fasern anfangen, in welchem Verhältnisse sie zur graudübligen Substanz wie sie unter einander verbunden sind, ob die Fasern der Nervenfasern der Fasern des Gehirns und Rückenmarkes sind, oder welche Theile des Gehirns und des Körpers durch bestimmte Fasern einander in Verbindung stehen, ob auch Theile des Gehirns und Rückenmarkes unter einander durch Nervenfasern verbunden sind, zu andern Nerven übergehen und in den Scheiden derselben zu dem Hirne und dem Rückenmarke zurücklaufen, ob es eine Verbindung der Nerven gebe, welche nicht nur darin besteht, daß die in ihrer häufigeren eingeschlossenen kleinen Nervenfasern sich unter einander verflochten und in einer andern Ordnung von neuem in Bündel zusammengeordnet werden, sondern daß sie in ihrem Nervenmarke zusammenstoßen, es Vereinigungspunkte der Nerven gebe, von welchen aus auf die zu verschiedenen Theilen gehen, gewirkt werden könne, ob eine ihre innere Einrichtung specifisch verschiedene Nerven gebe, namlich solche, welche die Bewegung der Muskeln, oder die Entstehung der Empfindungen, oder gewisse chemische Prozesse bei der Ernährung und Fortpflanzung vermitteln helfen, ob die verschiedenen Sinnesnerven eine specifische Einrichtung haben, oder ob ihre verschiedene Bestimmung auf andere Weise beruht, wie sie sich in gewissen Organen endigen und den auf sie wirkenden Eindrücken ausgesetzt sind.

Man muß offen gestehen, daß die feinere Anatomie des Nervensystems bis jetzt so wenig ausgebildet ist, daß sich auf die mei-

Ohr oder Auge zugeführt worden, oft nur einfach empfunden werden, und daß eine einfache Anstrengung des Willens Muskelfasern der Zunge, der Lippen, des Kehlkopfs und anderer Theile auf beiden Seiten zugleich in eine gemeinschaftliche Bewegung versetzen könne, da man überhaupt durch mehrere Umstände zu dem Gedanken geleitet wird, es müsse im Nervensysteme gewisse Mittelpunkte geben, von welchen aus auf beide Seitenhälften, und auf welche von beiden Seitenhälften aus gleichzeitig gewirkt werden könne, so verdienen die wenigen und kleinen Theile des Gehirns und Rückenmarks sowohl, als auch die wenigen Nerven, welche in der mittleren Ebene eine Vereinigung der beiden Seitenhälften des Nervensystems hervorbringen, eine besonders genaue Untersuchung.

Die Verbindung der beiden Seitenhälften des Gehirns und des Rückenmarks geschieht aber theils durch grauröthliche, nicht deutlich faserige, theils durch weiße faserige Substanz. Durch die grauröthliche oder durch die weiße Substanz werden meistens Theile, die aus derselben Substanz bestehen, unter einander vereinigt; indessen kommt doch unweilen auch der Fall vor, wo der Zwischenraum zwischen doppelt vorhandenen weißen faserigen Theilen durch grauröthliche Substanz ausgefüllt wird, z. B. der Zwischenraum zwischen den Schenkeln des Gehirns.

Die einmal vorhandenen weißen faserigen Theile, welche die Seitentheile des Gehirns unter einander vereinigen, haben meistens eine quere Lage, oder wenigstens eine Lage, vermöge welcher sie mehr der Quere als der Länge nach laufen, und durch sie scheinen die weißen Seitentheile mit einander in Verbindung gebracht zu werden.

Die Seitentheile selbst enthalten aber außer diesen ziemlich querlaufenden Fasern auch Fasern, welche mehr der Länge nach laufen, und folglich mit jenen queren durchflochten sind. Sie setzen sich vom Rückenmark bis zu den verschiedenen Theilen der Seitenhälften des Gehirns fort, und nur an einer Stelle, da wo das Rückenmark mit dem Gehirne zusammenstößt, an den Pyramiden, scheinen manche ihrer Fasern von einer Seite über die Mittellinie hinweg auf die andere Seite zu gehen und eine theilweise Durchkreuzung hervorzubringen, was indessen noch jetzt von mehreren Anatomen in Zweifel gezogen wird.

Weil die mittleren faserigen Theile nur Fasern enthalten, die ziemlich nach einer Richtung gehen, so sind sie einfacher als die Seitentheile, in welchen oft Längenfäsern mit Quersäsern durchflochten sind, auch läßt sich in ihnen deswegen die Faserung leichter zeigen, denn da wo Längenfäsern mit Quersäsern durchflochten sind, muß eine Classe von Fasern zerrissen werden, wenn die andere sichtbar gemacht werden soll, was bei der Weichheit der Fasern schwer gelingt.

Methode, die Richtung der Fasern sichtbar zu machen.

Um die Faserung der verschiedenen Theile des Nervensystems zu untersuchen, stehen uns 3 Mittel zu Gebote: das von Gall angewendete, wo man an den aus Fasern bestehenden Stellen möglichst frischer Gehirne Theile loszureißen sucht, entweder indem man anstoßende Gehirnthelle faßt und loszieht, oder indem man die Oberfläche in einer gewissen Richtung, bei welcher die Faserung deutlich wird, mit der Messerscharfe schabt.

Ein 2tes Mittel besteht darin, daß man sich darauf beschränkt, die an sich freiliegenden Oberflächen der faserigen Gehirnthelle recht genau zu betrachten; denn an diesen kann man die Fasern in der allernatürlichsten Lage ohne alle Vorbereitung sehen. Diese Methode verdient an den Theilen, an welchen sie anwendbar ist, den Vorzug vor allen andern Methoden, und in der That ist sie auf mehr Hirnthelle anwendbar, als man auf den ersten Anblick glauben sollte, wenn man nämlich nicht nur Gehirne erwachsener Menschen, sondern auch die von Embryonen und die von verschiedenen Thieren aus allen Bildungsstufen frisch zergliedert. Denn bei Embryonen sind die querlaufenden Fasern zu einer gewissen Zeit sehr wenig entwickelt, während die Längensfasern schon weit mehr ausgebildet sind, und man kann dann die Längensfasern in einer viel größeren Ausdehnung unbedeckt sehen, als bei dem erwachsenen Menschen. Etwas ähnliches findet bei manchen Thieren Statt, bei welchen die Ventrikel des Gehirns im Verhältnisse zum Gehirne sehr groß und die Fasern sehr deutlich sind, und bei welchen daher die Oberfläche, wo sich Fasern beobachten lassen, sehr beträchtlich groß ist. Carus, Döllinger, J. F. Meckel, F. Ziedemann, Serres, Desmoulins, Breschet und Laurencet haben bei Embryonen des Menschen und der Thiere; Gall, Carus, Treviranus und mehrere der so eben erwähnten Anatomen, unter den älteren Anatomen aber der berühmte Malpighi, der zuerst die Faserung des Gehirns beschrieben hat, haben an den Gehirnen verschiedener Thiere diese Untersuchung begonnen.

Endlich besteht ein 3tes Mittel darin, daß man den Centraltheilen des Nervensystems eine größere Festigkeit und Härte giebt, indem man sie längere Zeit in concentrirten Weingeist, in concentrirte Auflösungen von Sublimat oder von salzsaurem Kalk bringt, eine Methode, welche Keil, Burdach und Andere mit gutem Erfolge angewendet haben, um die von ihnen bekannt gemachten Hirnzerlegungen auszuführen. Gegen diese Methode hat man zwar eingewendet, daß sie trüglisch sei, weil die vielleicht sichtbar werdenden Fasern und Blättchen bei dem Prozesse der Erhärtung und Gerinnung erst entstehen, denn auch gewonnenes Eiweiß zeige sich aus Blättern zusammengefaßt, die durch Gerinnung entstanden wären. Allein dieser Einwurf ist leicht zu beseitigen. Denn während man die erhärteten Fasern an der Oberfläche abzieht, bemerkt man deutlich, daß es die nämlichen Fasern sind, die man schon vor der Anwendung des Weingeistes erkannte, theils stimmen die Resultate der von Keil angewendeten Methode mit der von Gall benutzten im Wesentlichen überein; endlich ist die

hauptung unrichtig, daß die concentrischen Lagen oder Blätter, aus welchen Eiweiß besteht, erst in Folge der Gerinnung entstanden. Vielmehr besteht Eiweiß wirklich aus unzähligen verschiedenen Lagen von Eiweiß, die sich wegen der Art der Vergrößerung lagenweise ansehen. Denn indem es im Eiter fortrückt, legt die innere Oberfläche des das Ei umfassenden Eierleiters neue Lagen von Eiweiß auf die Oberfläche der alten ab, diese Lagen werden dann dem Gerinnen des Eies sichtbar.

Abdunstungen grauer Substanz, in welcher sich die Bündel der Hirnfasern zertheilen und wieder vereinigen, oder Ganglien des Gehirns, nach Gall.

Die graue Substanz kommt, wie schon oben erwähnt worden ist, an manchen Stellen so vor, daß sie eine ziemlich gleichförmige Masse bildet, B. an der Oberfläche der Windungen des Gehirns und im Centro des Rückenmarks; an andern wechselt sie mit Lagen weißer Fasern ab, und erfüllt die Zwischenräume zwischen den ausinandertretenden und zum Theil durchkreuzenden Fasern und Blättern. Es hat an manchen Stellen den Anschein, als ob die Zahl der weißen Fasern auf der einen Seite einer solchen grauen Anschwellung viel größer als auf der andern wäre, und als ob also die Fasern, welche man die in die graue Anschwellung eintretenden nennt, während ihres Durchgangs durch die Membran an Zahl und Größe zunehmen. Weil man nun Anschwellungen im Gehirn und Rückenmarke der Insecten und vieler andern Thiere Knoten, Ganglien, ganglia, nennt, und weil man vermuthet, daß diese Knoten, deren innern Bau man wegen ihrer Kleinheit noch nicht genug kennt, wohl eine ähnliche Beschaffenheit hätten, als jene Anschwellungen im Gehirn des Menschen; so hat Gall für diese Anschwellungen gleichfalls diesen Namen angewendet. Weil indessen der Name Ganglien im menschlichen Körper schon für gewisse an den Nerven befindliche Anschwellungen gebräuchlich ist, die ihrem Baue nach sehr von jenen Anschwellungen des Gehirns verschieden sind, und also der Anfänger leicht zu einer falschen Idee verführt werden könnte; so ist es vorzuziehen, den Namen Ganglien nicht für die erwähnten Anschwellungen im Gehirn zu gebrauchen.

Anfang der Nervenfäden.

Die Stellen am Gehirne und Rückenmarke, wo die Fasern der Nerven zwischen den Fasern des Gehirns hervordringen, nennt man die Ursprungsstellen der Nerven, und diese Fasern, die daselbst noch gar nicht erst kurz zuvor in häutige Röhrchen aufgenommen worden sind, die Wurzeln, radices nervorum, ohne jedoch damit die Vorstellung zu verbinden, als ob die Nerven aus dem Gehirne und Rückenmarke wie die Pflanze aus dem Samen hervorwüchsen. Man weiß nicht einmal, ob diese Fasern der Wurzeln der Nerven unmittelbare Fortsetzungen

der Fasern des Gehirns und Rückenmarks sind, oder ob sie, wie Hall glaubt, mit ihren Enden in der grauen Substanz aufhören.

Die meisten Anatomen sind jetzt allerdings der Meinung, daß die Bildung der centralen Theile des Nervensystems der Entstehung der Nerven und der Organe, in welchen sich die Nerven endigen, vorausgehe. Bei gewissen Organen, welche spät entstehen, wie bei den Armen und Beinen, ist das offenbar der Fall. Ob aber in den Häuten, welche gleichzeitig mit dem Rückenmarke und Gehirn gebildet werden, nicht auch gleichzeitig feine, uns nicht sichtbare Nerven entstehen, ist eine Frage, welche durch Beobachtungen nicht entschieden werden kann. Seers hat durch Schlüsse, die er aus von ihm beobachteten Mißbildungen zog, zu beweisen gesucht, daß die Bildung der Nerven von den Organen aus ihren Anfang nehme, in welchen sie sich verbreiten. Allein seine Beweise reichen nicht hin. Bei dem Mangel eines Nerven fehlt, wie Ziedemann zeigt, auch häufig der Ursprung und das Organ, in welchem er sich endigt. Dieses ist auch nicht zu verwundern, weil die bildende Kraft keine Theile ausbildet, welche keinen Nutzen haben. Tritt nun zuweilen der Fall ein, wo ein Organ nicht zu neuen Nerven vorhanden ist, und doch der Nerv sich nicht bis zum Centrum des Nervensystems fortsetzt, und wo also der Nervensprung fehlt, so darf man daraus nicht schließen, daß der Nerv von jenem Organe aus sich gebildet habe, denn es ist sehr wohl möglich, daß früher der ganze Nerv vorhanden war, und daß sein Ursprung durch eine Krankheit zerstört wurde. Dieselbe Erklärung gilt auch in die Fälle, wo der Nervensprung vorhanden ist, aber das Organ fehlt, in welchem er sich endigen sollte.

Am Rückenmarke sieht man sehr deutlich, daß an den Stellen, an welchen sehr dicke Nerven ihren Anfang nehmen, das Rückenmark selbst dicker ist und in seiner Mitte mehr graue Substanz einschließt, als an den Stellen, wo dünne Nerven entspringen, und daß es also z. B. am Halse, wo die dicken Armnerven, und in der Gegend des obersten Kreuzdenwirbels, wo die dicken Schenkelnerven entspringen, vorzüglich dick ist.

Giebt es specifisch verschiedene Nerven?

Ob die meisten Nerven eine eigenthümliche innere Einrichtung besitzen, vermöge deren sie zu der besonderen Function geschickt sind, die sie haben, oder ob sie nur deswegen zu einer bestimmten Berrichtung tauglich sind, weil sie an ihrem Anfange mit bestimmten Theilen des Centrums des Nervensystems, und an ihren Enden mit bestimmten Organen in Verbindung stehen, die gewisse Eindrücke ihnen zuführen, oder von ihnen empfangen können, ist noch nicht entschieden. Daß manche Nerven, wie der Geruchnerv und der Hörnerv, sehr weich sind, beweiset nicht, denn dieses rührt daher, daß die Marksfäden dieser Nerven nicht in so viele Scheiden gehüllt sind als die der meisten andern Nerven. Auf dem bedurfte der Geruchnerv bis an die Siebplatte, und der Hörnerv, der keinem nachtheiligen äußeren Drucke ausgesetzt ist, dieser Scheiden nicht so sehr, als andere Nerven.

Der Geruchnerv zeichnet sich aber allerdings dadurch sehr wesentlich vor allen andern Nerven aus, daß er deutlich unterscheidbare Lagen von grauer und weißer Substanz enthält.

Es ist schon Theil I. S. 275 bis 281 von der eigenthümlichen

Einrichtung der Nerven gehandelt worden, vermöge welcher sie sich nicht nur in kleinere Zweige theilen, sondern sich auch zuweilen wieder unter einander vereinigen. Man nennt diese Vereinigung einzelner Nervenzweige Nervencommunicationen, oder Anastomosen der Nerven, *communicatio, anastomosis nervorum*. Wo sich diese Zertheilung und Vereinigung einzeln unterscheidbarer Nervenzweige mehrmals wiederholt, oder wo sich viele Nervenzweige wechselseitig vereinigen, nennt man die Vereinigung ein Nervengeflecht, *plexus nervorum*. Es ist auch schon baselbst gezeigt worden, daß eine solche Verflechtung der Nervenbündel nicht selten auf eine vorborgene Weise zwischen den, in einer gemeinschaftlichen Scheide eingeschlossenen Nervenbündeln geschehe, daß es sich aber nirgends beweisen lasse, daß bei diesen und anderen Nervenastomosen ein Zusammenstoßen und eine Vereinigung der Nerven vermöge ihres Nervenmarkes stattfinde, sondern daß wahrscheinlich dabei nur ein Austausch von Nervenbündeln geschehe, welche die Scheide des einen Nerven verlassen, und in die des andern aufgenommen werden, und dabei selbst durch ihren häutigen Ueberzug von den benachbarten Nervenbündeln abgefordert sind.

Die Nervenknotten, *ganglia nervorum*, sind nun aber eine Anstalt zur Vereinigung von Nerven, die weit mehr in's Feine geht und vielleicht sogar eine Vereinigung der Nerven mittels ihres Nervenmarkes bewirkt. Nervenknotten nennt man nämlich röhliche, dicke, von einer aus Zellgewebe bestehenden Haut überzogene Stellen, welche sich entweder an einzelnen Nerven (*ganglia simplicia* nach Scarpa), oder an Orten, wo mehrere Nerven unter einander zusammenstoßen (*ganglia composita* nach Scarpa) befinden. Es ist zwar keinem Zweifel unterworfen, daß die mit einem Nervenknotten zusammenhängenden Nervenbündel sich im Innern desselben in kleinere Bündel und Fäden zertheilen, daß diese Bündel und Fäden, wo sie groß genug sind, um einzeln betrachtet zu werden, mit einer häutigen Hülle umgeben sind, von welcher die Festigkeit herrührt, durch welche sie sich von Markfäden des Gehirns unterscheiden, daß die Zwischenräume zwischen den noch einzeln unterscheidbaren, auseinanderweichenden oder zusammentretenden Nervenfasern mit einem röhlichen gefäßreichen Zellgewebe ausgefüllt sind. Man beobachtet sogar hier und da, wie einzelne Fäden der auf der einen Seite in ein Ganglion eintretenden Nerven in die Fäden der auf der andern Seite desselben austretenden Nerven ununterbrochen übergehen. Aber es gelingt keineswegs, die Mehrzahl der zertheilten Nervenfasern durch die Nervenknotten hindurch zu verfolgen, vielmehr findet man, daß die Enden und Anfänge der sehr fein zertheilten eintretenden und austretenden Nerven in kleinen röhlichen durchsichtigen Klümpchen liegen, in welchen

sie unserm Auge verschwinden. Die Untersuchung kann hier nur mit Hilfe des Mikroskops fortgesetzt werden. Es ist nicht genug, im Allgemeinen an jeder Stelle des Nervenknotens Nervensäden zu entdecken, die eine gewisse Richtung haben, sondern man muß die einzelnen Nervensäden von den eintretenden zu den austretenden Nerven herüber verfolgen. Weil nämlich nicht alle Nervensäden an der nämlichen Stelle in ihre feinsten Zweige gespalten werden und in die röhrlischen durchsichtigen Klümpchen eintreten, sondern der eine etwas früher, der andere etwas später, so kann man leicht die Nervensäden auch an solchen Stellen fort zu verfolgen meinen, wo man einzelne Nervensäden nicht mehr im Auge zu behalten im Stande ist. Es begegnet nämlich hierbei dem Beobachter leicht, daß, wenn ein Nervensädchen verschwindet, er es nicht bemerkt, weil er sich an das benachbarte, in derselben Richtung gehende noch deutliche, hält. Diese Untersuchung ist so schwierig, daß gar nicht daran zu denken ist, daß die anatomische Streiffrage über das Verhalten der Nerven in den Nervenknoten, durch die Untersuchungen und Abbildungen Scarpa's und Wutzer's gelöst sei, welche dicke Nervensäden abbilden, die von den eintretenden zu den austretenden Nerven hinübergehen. Dieselbe Einrichtung, welche sich in vielen Nerven findet, daß nämlich die Nervensäden innerhalb der Scheide der Nerven ein Geflecht bilden, findet sich auch hier in den Nervenknoten, aber deswegen darf man nicht mit J. F. Meckel d. ä. ¹⁾, Zinn ²⁾, Haller ³⁾, Haase ⁴⁾, Scarpa ⁵⁾ und Monro ⁶⁾ behaupten ⁷⁾, es bestände die Einrichtung der Nervenknoten ganz allein darin, daß sich die Nerven in den Nervenknoten in feinere Bündel und Fäden zertheilten, und daß diese daselbst in anderer Ordnung wieder zu größeren Nerven zusammenträten; ferner, es entstünde die Anschwellung der Nerven daselbst nur dadurch, daß die Zwischenräume zwischen den auseinander weichenden und wieder zusammentretenden Nervensäden durch eine weiche, gallertartige, grauröthliche gefäßreiche Masse erfüllt würden, welche die zerpaltenen Nerven auseinander hielte, ihnen wie ein Polster diene, und eine an-

¹⁾ J. F. Meckel, Observations anatomiques sur un noeud ou ganglion etc. Hist. de l'ac. roy. de Berlin 1749.

²⁾ Zinn, Hist. de l'ac. roy. de Berlin 1753. p. 137.

³⁾ Haller, Elem. phys. c. h. T. IV. Lib. X. sect. 6. §. 11.

⁴⁾ J. G. Haase resp. Peschel, Diss. de gangliis nervorum. Lipsiae 1772. 4. und in Ludwig, scriptores neurologici minores. 4. T. I. p. 74.

⁵⁾ A. Scarpa, Annotationum anatomicarum Lib. I. 4.

⁶⁾ A. Monro, Bemerkungen über die Structur und die Einrichtung des Nervenknotens. übers. Leipzig 1781. 4. p. 410.

⁷⁾ Die Bemerkungen dieser und anderer Schriftsteller über die Nervenknoten findet man mit ihren eignen Worten angeführt in C. G. Wutzer, de o. h. gangliorum fabrica atque usu monographia, c. tab. aen. Berolini 1817. 4.

re Beschaffenheit als die Nervensubstanz hätte. Denn am Ganglion des 5ten Nervenpaars, welches sich zu einer genauen Untersuchung vorzüglich gut eignet, weil hier die einzelnen anschwellenden Nervenbündel mehr als in andern Knoten auseinander gezogen sind, überzeugt man sich, daß man viele feine Fäden, in die sich die Bündel spalten, nicht ununterbrochen durch die röhlichen durchsichtigen Stellen hindurch verfolgen kann, in welche sie eintreten und aus welchen gegenüber andere feine Fäden austreten. So wenig als man hier das röhliche, in den Theilungswinkeln der einzeln unterscheidbaren Nervenästchen gelegene Zellgewebe mit den klüftlichen durchsichtigen Klümpchen verwechseln wird, in welche endlich viele nicht mehr einzeln unterscheidbare Fädchen übergehen, eben so wenig darf man diese 2 röhlichen Substanzen an andern Ganglien mit einander verwechseln.

Es ist sehr wohl möglich, daß in diesen letztern röhlichen durchsichtigen Stellen der Nervenknoten viele kleine Nervenfäden mittels ihres Nervenmarks zusammenstoßen, oder daß sich in ihnen die Zahl der kleinen Nervenfäden vergrößern, entweder, indem manche Fäden an den klüftlichen durchsichtigen Stellen ihren Anfang nehmen, oder indem die klüftlichen Nervenfäden, ohne kleiner zu werden, Aeste abgeben, und daß außerdem eine Vermengung mancher Nervenbündel bewirkt werde, indem sie sich in ihre Fäden zertheilen, die dann ununterbrochen von neuem zu andern Bündeln zusammentreten.

Die hier gegebene Darstellung von dem Baue der Nervenknoten steht zwischen den einander entgegengesetzten Behauptungen mancher Anatomicen über diesen Gegenstand in der Mitte, und zwar, wie ich glaube mit Recht, weil von beiden Seiten übertrieben und mehr ausgesagt worden ist, als was sich durch Beobachtungen darthun läßt. Dieser Uebertreibung hat sich auf der einen Seite *Bichat*¹⁾ schuldig gemacht, wenn er sagt, man könne in den Ganglien keine Fäden und Linien unterscheiden, sondern die Masse derselben sei gleichartig. Dieser Uebertreibung stehen sich aber auch auf der andern Seite diejenigen schuldig, welche, weil sie finden, daß sich manche dickere, mit unbewaffnetem Auge noch unterscheidbare Fäden der in die Ganglien eintretenden und aus ihnen austretenden Nerven geflechtartig vereinigen, behaupten, daß dieses mit allen Fäden der Fall sei, und daß ganz allein hierin der Bau der Nervenknoten beruhe, da sie doch zugestehen sollten, daß sich manche Fäden so zertheilen, daß sie sich unsern Nachforschungen ganz entziehen.

Man darf sich nicht darüber wundern, daß die chemischen Untersuchungen *Bichats*, *Wuher's*, *Mangendie's* und *Cassaignes* über

¹⁾ *Bichat*, allgemeine Anatomie, übers. v. *Pfaff*. Th. I. 299.

die Beschaffenheit der Nervenknoten, beweisen, daß dieselben aus einer ganz andern Substanz bestehen, als das Gehirn, und daß die Substanz mehr mit der der Häute, welche aus Zellgewebe bestehen, übereinstimmt. Das nämliche ist auch bei den meisten in vielen Hüllen eingeschlossnen Nerven der Fall, und rührt daher, daß die häutigen Hüllen einen großen Theil der Substanz ausmachen, und das Rückenmark vor der Einwirkung unserer chemischen Reagentien schützen.

Ueber den Nutzen der Nervenknoten und des mit vorzüglich vielen Nervenknoten versehenen sympathischen Nerven.

1. Die Nervenknoten haben den Nutzen, den die Nervengeflechte überhaupt hervorbringen.

Weil es unbestreitbar ist, daß in den Ganglien eine geflechtartige Verbindung verschiedener Nervenbündel Statt finde, so ist es auch gewiß, daß dieselben den Nutzen haben, welche die Geflechte hervorbringen, den nämlich, die kleineren Bündel und Fäden der Nerven von einander zu trennen, in anderer Ordnung wieder zusammen zu fassen und sie bequem nach verschiedenen Richtungen zu vertheilen. Auch ist dieser Zweck nicht von geringer Wichtigkeit, denn A. Monro machte mit Recht auf andern darauf aufmerksam, daß es sehr wichtig sei, daß die zur Erhaltung des Lebens unentbehrlichen Organe nicht von einem einzelnen Nervenpaare, sondern von vielen zugleich mit Nerven versehen würden, damit, wenn ein Nervenpaar durch einen zufälligen äußeren Einfluß oder durch Krankheit gelähmt würde, nicht auch zugleich die Function eines so wichtigen Organs, z. B. die des Herzens aufhörte, sondern vielmehr nur ein wenig geschwächt würde. Denn das Herz, welches seine Nerven aus mehreren Ganglien empfängt, erhält Nervenfäden, welche von den meisten Halsnerven und von dem obersten Rückenerven entspringen, wodurch zugleich bewirkt wird, daß das Herz mit einer großen Strecke des Rückenmarks in Verbindung steht.

2. Man darf vermuthen, daß in den Ganglien und vielleicht auch in manchen Geflechten des sympathischen Nerven eine Uebertragung von Eindrücken von einem Nerven auf die mit ihm zusammenstoßenden Nerven geschehe.

Diese Vermuthung gründet sich darauf, daß es den Anschein hat, daß manche Nervenfäden der in den Ganglien sehr fein zertheilten Nerven unter einander durch ihr Rückenmark zusammenstoßen. Dieses ist nach den Beobachtungen Fontana's, Prevost's und Dumas's, (s. Th. I. S. 274 sq.) bei den Nerven an andern Stellen nicht der Fall, denn die Nerven bestehen nach ihnen im Allgemeinen aus unzähl-

igen, sehr kleinen, in Scheiden eingeschlossenen, keine Nester abgebenden oder aufnehmenden Nervencylindern. Wäre nun diese mikroskopische Untersuchung für andere Nerven richtig, und litte sie nur in den Ganglien und in manchen Geslechtern des sympathischen Nerven, welche jene Schriftsteller nicht besonders untersucht haben, eine Ausnahme, so würde man die Möglichkeit einer solchen Uebertragung eines Eindruckes von einem Nerven auf den andern außerhalb des Gehirns und des Rückenmarkes als eine sehr wichtige Wirkung der besonderen Einrichtung der Ganglien betrachten müssen. Denn Anastomosen und Geslechter der Nerven, in welchen die von ihren Häuten umgebenen Nervenfäden und Nervenbündel aus der Scheide des einen Nerven in die des andern übergehen, können, wie man vermuthen darf, eine solche Uebertragung des Eindruckes von einem Nerven auf den andern nicht bewirken. Bekanntlich läßt es sich aber bei weitem bei den meisten Nervenverbindungen großer Nervenstränge beweisen, daß die Verbindung von dieser Beschaffenheit sei.

Hierdurch wird man daher auf die von vielen Physiologen gehegte, noch neuerlich von G. R. Treviranus vertheidigte Ansicht geführt, daß die Ganglien die Ursache eines Consensus, oder einer Sympathie der Nerven wären, und dieser Vermuthung ver dankt auch der sympathische Nerv seinen, von Winslow ihm gegebenen Namen.

Mit dieser Vermuthung kann nun zwar eine andere Vermuthung über den Nuzen der Nervenknoten in Verbindung gebracht, und einigermaßen als eine Anwendung derselben darge stellt werden. Indessen ist sie doch noch weniger durch Gründe gestützt, und noch hypothetischer als jene.

3. Dieselbe besteht nämlich darin: in den Nervenknoten vermehre sich die Zahl der Nervenfäden, oder mit einem andern Worte, sie wären die Mittelpunkte, aus welchen daselbst Nervenfäden entspringen.

Wenn man nämlich von einem Nervenfaden sagt, daß er an derjenigen Stelle entspringe, an welcher sein mit dem übrigen Nervensystem verbundenes Ende liegt, und wenn man die Vorstellung hegt, daß von einem Punkte aus, in welchem die zu verschiedenen Theilen des Körpers gehenden Nervenfäden sich durch ihr Mark vereinigen, viele Theile u. einer gemeinschaftlichen Thätigkeit erregt werden können, so muß man festsetzen, daß die Vermuthung nichts Widersprechendes enthalte, daß auch Nervenfäden in den Ganglien entspringen, und daß auch die Ganglien vielleicht Mittelpunkte für die in ihnen entspringenden Nervenfäden sind. Hiermit ist aber nicht behauptet, daß, wenn ein Ganglion an einem Nerven befindlich ist, der ganze Nerv von dem Ganglion entspringe. Es entspringt vielleicht nur daselbst eine geringe Anzahl von Nerven-

fäden, und mengt sich dem zertheilten, aus dem Gehirne oder Rückenmarke hervorgegangenen Nerven bei. Vielleicht sind alle Ganglien, auch die an den Gehirn- und Rückenmarksnerven befindlichen, Theile eines einzigen, durch Fäden zusammenhängenden Systems; denn es giebt so viel wir jetzt wissen, kein einziges Ganglion; zu welchem sich nicht Fäden des sympathischen Nerven hin verfolgen ließen, sie mögen nun direkt, oder nachdem sie zuvor in die Scheiden anderer Nerven aufgenommen worden, dahin gelangen. Vielleicht bewirkt dieses allgemeine Gangliensystem die Regulirung der vom Willen unabhängigen Thätigkeiten, und vielleicht entspringen also auch in den Ganglien der Gehirn- und Rückenmarksnerven einzelne kleine Fäden, welche mit den Bündeln und Fäden der Rückenmarksnerven zu Theilen hingehen, welche ohne Zuthun des Willens thätig sind, z. B. zu der die Ausdünnung absondernden Haut und zu den die Ernährung bewirkenden Gefäßen, welche sich an solchen Stellen des Körpers befinden, zu welchen man die Äste des sympathischen Nerven aus andern Ganglien noch nicht zu verfolgen im Stande gewesen ist.

Diese Vorstellung, nach welcher Nervenknotten, die so genau mit den Gehirn- und Rückenmarksnerven verschmolzen sind, als Theile des sympathischen Nerven betrachtet werden, ist um so eher zulässig, da solche Knotten, welche mit Gewißheit für Theile des sympathischen Nerven zu halten sind, bei manchen Thieren unmittelbar auf der Oberfläche der Rückenmarksnerven aufsitzen, z. B. die untersten ganglia cervicalia, und die obern ganglia thoracica auf den Flügelnerven der Vögel.

Es ist denkbar, daß es auch Nervenknotten gebe, aus welchen alle die Nervenfasern entspringen, welche mit den Knotten in Verbindung stehen, so daß sie durch sie keine Nerven hindurchgehen, und daß sich eben hierdurch die mit den Gehirn- und Rückenmarksnerven verschmolzenen Ganglien von manchen Ganglien des sympathischen Nerven unterscheiden.

Mit den bei den letzteren Sätzen hängt auch die Vermuthung zusammen:

4. die Ganglien und vielleicht auch manche Geschlechter beschränkten den Einfluß des Gehirns auf die Theile, welche von den Ganglien Nerven erhielten, und verursachten dadurch, daß die von den Ganglien mit Nerven versehenen Muskeln dem Willen nicht unterworfen wären, und sie verhinderten auch, daß die Fortpflanzung der Eindrücke von gewissen Stellen des Körpers zu dem Sitze der Empfindungen durch die aus den Ganglien entspringenden Nerven geschehen könnte.

*) E. H. Weber, Anatomia comparata nervi sympathici. Tab. II. Fig. 2. p. 32 41

Denn wenn es Stellen giebt, wo die feinsten Nervenfasern unter oder durch ihr Nervenmark zusammenstoßen, und wo sie also nicht durch ihre Hüllen isolirt bis zu dem Gehirne und Rückenmarke fortgehen, so es Stellen giebt, wo der durch einen Nervenfasern fortgepflanzte Druck in vielen mit ihm zusammenstoßenden Nervenfasern Wirkungen überbringt, so darf man wohl vermuthen, daß diese Stellen verhindern, der Seele vermittelt dieser Nerven bestimmte Bewegungen hervorzubringen, oder daß die Seele von gewissen Organen durch solche Fasern solche Empfindungen erhalten könne, und folglich, wenn es Theile giebt, deren Nervenfasern nicht bis zum Gehirne und Rückenmarke fortgehen, sondern deren Enden in den Ganglien aufzusuchen sind, so könnten dieselben vielleicht auch von andern Mittelpunkten des Nervensystems, vom Gehirne aus zur Thätigkeit angeregt werden. Indessen sind auch diese Annahmen sehr hypothetisch und keineswegs erwiesen.

Winslow ¹⁾, Le Cat ²⁾, Eschenbach ³⁾, Hirsch ⁴⁾ hatten unter Nr. 3. angeführte Vermuthung vorgetragen, Johnstone ⁵⁾, Lister ⁶⁾, Pfeffinger ⁷⁾, Iwanoff ⁸⁾, und neuerlich Bichat ⁹⁾, Gall ¹⁰⁾ und Gall ¹¹⁾, und andere neuere Schriftsteller, haben die unter Nr. 4. dargestellte Vermuthung damit verbunden ¹²⁾.

Für die Winslowschen und Johnstonschen Ansichten

¹⁾ Winslow, Exposition anatomique. Tab. III. éd. Paris 1712, und in der lateinischen Uebers. Frankfurt 1753. §. 364. T. IV. P. 2. §. 125.

²⁾ Le Cat, Traité des sensations et des passions. T. I. Paris 1767. p. 127, 144.

³⁾ E. E. Eschenbach, anatomische Beschreibung des menschlichen Körpers. Rostock 1750. §. 1298.

⁴⁾ A. B. R. Hirsch, Paris quinti nervorum encephali disquisitio anatomica. Viennae 1765. §. 47. Ludwig script. neutr. minor, Tom. I. p. 254. §. 63.

⁵⁾ J. Johnstone, in den Philos. Transactions T. 54. 1763. p. 177. T. 57. p. 121. T. 60. p. 30. und Essays on the use of the ganglions of the nerves. Shrewsbury 1771. Deutsch: Ueber den Nutzen der Nervenknoten. Stettin 1787, und Medical essays and observations, with disquisitions relating to the nervous systems, by James Johnstone Evesham. 1795. Deutsch: Untersuchungen über das Nervensystem u., überf. von Michaelis. Leipzig 1796.

⁶⁾ S. K. Unger, der Arzt, 5ter Bd. St. 253. Hamburg und Leipzig 1769. p. 324. und dessen Physiologie thierischer Körper. Leipzig 1771. S. 66.

⁷⁾ J. Pfeffinger, de structura nervorum. Argentorati 1782. §. 30. in Ludwig, script. neutr. min. Tom. I. p. 25.

⁸⁾ D. Iwanoff, Diss. de origine nervorum intercostalium. Argentorati 1780. §. 23. in Ludwig script. neutr. min. Tom. III. p. 102.

⁹⁾ A. Bichat, Anatomie gén. Paris 1801. Deutsch v. Pfaff. Leipzig 1802. T. I. S. 290.

¹⁰⁾ J. C. Reil, im Archive für die Physiol. T. VII. Halle 1807. p. 226.

¹¹⁾ J. F. Gall und Spurzheim, Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns.

Die ausführlichste Literatur hierüber, mit Anführung der wichtigsten Stellen, findet man in C. G. Wutzer, de corporis humani gangliorum fabrica atque usu monographia, c. tab. aen. Berolini 1817. 4.

lassen sich vorzüglich folgende Gründe zur Unterstützung anführen:

1. Kein einziger Muskel, der nur Fäden vom sympathischen Nerven erhält, kann willkürlich bewegt werden. Das Herz, die Gedärme, die Abführungsgänge der Leber, die Gallenblase, liefern hierzu die Beispiele. Wohl aber sind gewisse andere Muskeln, die zum Theile von sympathischen Nerven, zum Theile von Rückenmarks- und Gehirnvenen mit Fäden versehen werden, in einer halb willkürlichen Bewegung bestimmt, die nur bis zu einem gewissen Punkte nach Willkür aufgehoben oder beschleunigt werden kann. Ihre Bewegungen sind also gewissermaßen halb willkürlich, halb unwillkürlich, z. B. die des Zwerchfells, der Harnblase, des Mastdarms und vielleicht die der Iris.

2. Ferner kann man anführen, daß kein einziger Muskel, dessen Bewegungen ganz willkürlich sind, sichtbare Nerven vom Nervus sympathicus erhalte. Denn obgleich Haase und einige andere Anatomen Fäden beschrieben haben, die vom Halstheile des sympathischen Nerven zu den M. scalenis oder zu dem N. longus colli gingen, so ist doch diese Beobachtung nicht mehr anzunehmen, weil man neuerlich gefunden hat, daß in dieser Gegend solche Fäden zuweilen die Muskeln durchbohren und als Verbindungsfäden zu den Halsnerven gelangen.

Es würde aber sehr übertrieben sein, wenn man behauptete, daß alle Thiere, die ihre Funktionen unwillkürlich und bewußtlos vollbringen, sichtbare Nerven vom sympathischen Nerven erhielten.

Denn alle Gefäße der Extremitäten des Rückens und des Bauchs, welche, ohne daß der Wille daran Antheil hat, die Ernährung dieser Theile und die Absonderung durch die Haut bewirken helfen, erhalten, so viel man jetzt weiß, ihre Nerven nicht vom N. sympathicus, sondern von den an den Extremitäten liegenden Rückenmarksnerven ¹⁾, welche Luca, Boer und andere untersucht haben, und die Luca wohl noch nicht gänzlich von Zellgewebe gereinigt abbilden hat. Auch zur Milchdrüse der weiblichen Brust und zur Thränendrüse hat man bis jetzt noch keine Fäden des Nervus sympathicus verfolgt, darf indessen aber auch den Nervus lacrimalis, der vom 5ten Nervenpaare entspringt, nicht mit Gewissheit für den Nerven der Thränendrüse halten, da seine Zweige nur an ihr vertheilt und zum Theil durch sie hindurch zu andern Theilen zu gehen scheinen.

Sogar die Regel, daß alle Rückenmarks- und Gehirnnerven, die zu unwillkürlich thätigen Organen der Brust und der Bauchhöhle tiefen, erst durch die Ganglien des sympathischen Nerven hindurch müßten, hat einige Ausnahmen. Zwar bilden die Reihe von Knoten an der Wirbelsäule gleichsam eine Umfassung für die unwillkürlich thätigen Organe der Brust und des Unterleibes, durch welche die meisten Nerven, welche von dem Rückenmark und dem Gehirn kommen, hindurchgehen, aber der Nervus vagus ist die auffallendste Ausnahme. Er geht zu den Lungen, zum Herzen, zum Oesophagus, zum Magen und zur Leber. Indessen verbreitet er sich in jenen Theilen geflechtartig, und seine Fäden werden allerdings von dem sympathischen Nerven durch die röthliche Farbe ähnlich, auch besitzt er meistens 2 knotige Anschwellungen, und zeichnet sich durch eine sehr auffallende Verkettung seiner Bündel innerhalb der Scheide aus.

¹⁾ Ribes, Mém. de la soc. d'émulat. VIII. 1817. und Meckels Archiv B. V. p. 442. glaubt jedoch Fäden der Gangliennerven bis zum untern Ende der Armatum und ihrer Aeste, so wie andere bis zur Poplitea verfolgt zu haben. Diese Beobachtungen bedürfen indessen noch einer Bestätigung.

3. Daß die Nerven des N. sympath. und seine Ganglien gestochen und auf andere Weise gereizt, keinen Schmerz hervorbrächten, eine Be-
auptung mehrerer experimentirender Physiologen, die ich jedoch noch
cht für erwiesen halte.

Bichat ¹⁾ hat nämlich das Gangl. coeliacum beim Hunde mit dem Messer
d mit Säuren gereizt, ohne Schmerz zu erregen, das Ganglion cervicale in-
ius immer verlegt, ohne Muskelbewegung zu veranlassen; der hervorgezogene
um wurde von ihm, ohne einen Schmerz des Thiers zu veranlassen, gereizt.
ch fand er, daß die Zusammenschnürung der Samenerven bei der Unterbindung
Samenarterien keinen Schmerz verursache, was viele Chirurgen nicht zugeben.
e Sache ist schwierig, weil außer den Samenerven noch andere von den Len-
merven im Funic. sperm. verlaufen.

Reil ²⁾ fußt wohl bloß auf Bichats Versuche. Dupuy ³⁾ schnitt das
agl. cerv. inf. angeblich ohne daß das Thier Schmerz empfand, heraus.
gen die ⁴⁾ sagt, man könne ein Ganglion stechen, schneiden, abreißen, und
Thier schiene kein Bewußtsein davon zu haben. Er behauptet, oft an Pfer-
und Hunden Versuche mit den Ganglien des Halses gemacht und dieses er-
ren zu haben. Man nehme, sagt er, die Ganglien des Halses und selbst die
en der Brust hinweg, und man sieht keine wahrnehmbare Störung in den
actionen erfolgen. Wutzer ⁵⁾ öffnete 2 lebenden Hunden den Bauch, und
te die Lendennoten durch mannichfaltige mechanische Reizmittel; nachdem der
ad schon den ersten Schmerz verwunden hatte, und während er daher ruhig
ohne allen Erfolg. Hingegen erregte es den Hunden sogleich heftigen Schmerz,
in er den Plexus brachialis stach.

Ich meines Theils hatte die alltäglichen Beobachtungen über die Schmerzen
diesen Theilen, welche unempfindlich sein sollen, für beachtungswerther als
Experimente. Angehäufte Blähungen können bekanntlich im Darmkanale
jeder Zeit das heftigste Leibschneiden, und Ueberfüllung der Lunge mit Blut
n, ohne alle Entzündung, heftiges Bruststechen erregen. Bei Entzündung der
Marme vollends können die heftigsten Schmerzen in diesen Organen ihren Sitz
en. Wie käme es also, daß der Weg zum Gehirne in diesem Falle offen sein kann?
siche Veränderung könnte wohl bewirken, daß die Ganglien der Fortpflanzung des
iges kein Hinderniß in den Weg legten? Um diesen Einwurf zu beseitigen,
m Reil an, daß die graue Substanz, aus der die Ganglien und Nerven des
vus sympathicus beständen, weniger vollkommen die Empfindungen leiteten,
die weiße, und nannte sie in dieser Rücksicht Halbleiter. Seien nun die
leitenden Eindrücke schwach, so gelangten sie nicht bis zum Gehirne. So
sich aber eine große Menge angehäufter Electricität auch durch einen Halb-
er Bahn breche, so auch sehr heftige Reizungen durch die Ganglien und grauen
ren. Daher leitet es auch Wutzer ⁶⁾ her, daß ein Hund den heftigsten
merz verrieth, dem er den Unterleib aufgeschnitten, das 2te Gangl. lum-
re frei gemacht und auf eine Glasplatte gelegt hatte, wenn er es mit dem
ste des positiven und negativen Poles berührte. Dahingegen dasselbe Thier
her, wenn das Unterleibsstück des sympathischen Nerven gestochen und zerschnit-
würde, keinen Schmerz verrieth.

Aber mit der Berufung auf diese Analogie, welche nach manchen
Physiologen zwischen den electricischen Processen und dem Vorgange in
den Nerven Statt findet, durch welchen die Fortpflanzung der Eindrücke

¹⁾ Bichat, allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff. I. p. 305, 322.

²⁾ Reil, Archiv für die Physiologie. B. VII. 230.

³⁾ Dupuy, Bullet. de la soc. d'émulation. Paris 1816. No. XII. Déc.

⁴⁾ Magendie, Physiologie, übers. von Heusinger, p. 149.

⁵⁾ Wutzer, de corp. hum. gangliorum fabrica atque usu. Berol. 1817. p. 126.

⁶⁾ Wutzer a. a. O. S. 127.

256 Nutzen des Nervus sympathicus und des Vagus.

geschieht, muß man vorsichtig sein, und darf nicht auf eine noch nicht bewährte Hypothese eine neue bauen.

4. Manche haben auch behauptet, daß, wenn Nette oder Ganglien des Nervus sympath. galvanisirt würden, die unwillkürlichen Muskeln, die von daher Fäden erhalten nicht in Zuckungen geriethen, was doch bei den willkürlichen Muskeln der Fall ist, wenn ihre Nerven galvanisirt werden, eine Behauptung, welche, wie man sogleich sehen wird gleichfalls noch nicht bewiesen werden kann.

Humboldt ¹⁾ versicherte 1797, daß, wenn das Herz schnell und mit Entfernung einiger Nervenfasern aus der Brust genommen werde, man bei alleiniger Armirung der Nervenfasern Zuckungen in diesem Organe hervorbringen kann und schon 3 Jahre vor ihm hatte Fowler ²⁾ dasselbe Resultat erhalten, und Pfaff ³⁾ erzählt denselben Erfolg von seinen Versuchen. Bichat dagegen widersprach den Humboldt'schen Versuchen. Wenn er Ganglien und Därme, oder den Plexus mesentericus, Därme, oder die Herznerven und das Herz, oder den Nerv. vagus und das Herz armirte, niemals entstanden Zuckungen. Erst wenn man Gehirn und Herz, Rückenmark und Herz zc. armirte, obgleich, wenn zugleich willkürliche Muskeln in die Kette gebracht wurden, immer Zuckungen entstanden. Er gebrauchte dabei die Vorsicht, um eine mechanische Reizung zu vermeiden, welche die Conductoren auf das Herz machen könnten, indem sie dieselbe berühren, die Conductoren ans Herz zu bringen, ehe die Voltaische Säule geschlossen war, und dann die Säule zu schließen ⁴⁾.

Bichat erregte dagegen constant Contractionen des Herzens, wenn er dieselbe Substanz, nachdem er es herausgenommen hatte, an 2 Orten armirte. Man sieht aber nicht ein, daß die Resultate der Versuche von Bichat auf einem Theil des Apparats beruhen können? Denn da er den einen Pol mit den Nerven den andern mit dem Fleische in Verbindung brachte, so mußten die Nerven, wenn nicht als Nerven, doch als feuchte Stränge, die die Electricität leiten, ihren Dienste thun, sobald das Fleisch Contractionen zu machen geschickt und der Apparat wirksam gewesen wäre. Dergleichen Versuche beweisen also nicht die Abwesenheit des lebendigen Leitungsvermögens der Nerven, sondern die Unmöglichkeit der Muskeln oder des Apparates.

Es widersprechen auch diesen Versuchen die von Wutzer ⁵⁾, da er das Ganglion lumbare, das er durch untergelegtes Glas isolirt hatte, armirte und alle im Unterleibe enthaltenen Theile, und selbst den Schenkel dieser Seite in kräftiger, krampfhafter Bewegung gerathen sah.

5. Mechanische Reizung des Gehirns und Rückenmarks kann, wie es scheint, zwar alle Muskeln in Bewegung setzen, welche von dem Gehirne und Rückenmark-Nervenfasern erhalten, nicht aber die unwillkürlich wirkenden Muskeln, die vom Nervus sympathicus und vom Vagus mit Zweigen versehen werden.

Allerdings wird das Herz zuweilen durch Reizung des Rückenmarks zu stärkeren Zusammenziehungen veranlaßt, oder zu erneuerten, wenn es schon auf

¹⁾ H. v. Humboldt, Versuch über die gereizte Muskel- und Nervenfaser. B. I. S. 344.

²⁾ Rich. Fowler, Experiments on animal electricity. 1794.

³⁾ Pfaff, über die thierische Electricität und Reizbarkeit.

⁴⁾ Recherches sur la vie et la mort. Paris 1800.

⁵⁾ Wutzer a. a. O. S. 127.

gehört hatte zu schlagen. Allein diese erweckte Thätigkeit, die nach der gewöhnlichen Regel von beiden Vorkammern anfängt, und während diese erschaffen, auf die Herzkammern übergeht, hat keine Aehnlichkeit mit den unregelmäßigen Zuständen, in welche die willkürlichen Muskeln bei derselben Gelegenheit geraten. Auch haben die Beobachter oft nicht hinzugefügt, ob diese Bewegungen augenblicklich dem Reize folgen, oder erst nach einigen Augenblicken. Sie könnten demnach wohl sympathisch wie das Herzklopfen bei Gemüthsbewegungen sein. Denn umgekehrt wirken ja auch Einflüsse, die auf den sympathischen Nerven geschehen, heftig aufs Gehirn zurück. Man will Fälle beobachtet haben, wo ein Schlag auf den Magen unmittelbar und augenblicklich den Tod nach sich zog. Wie wirkt nicht Magenverderbnis auf den Kopf?

Durch den Sas No. 5. scheint es erklärlich, warum, wenn wegen organischer Fehler im Gehirne Epilepsie, Katalepsie zc. entsteht, war die willkürlichen Muskeln plötzlich und von den heftigsten Zuckungen ergriffen werden, keineswegs aber die, welche der Willkühr unterworfen sind, in einigem Grade aber einige halbwillkürliche, z. B. die Respirationsmuskeln.

Der Puls dagegen wird nur beschleunigt, was bei einer so heftigen Muskelanstrengung nicht anders sein kann. Er setzt keineswegs aus zc., die Sphincteren kränken nicht in Convulsionen, denn sonst müßten sie sich abwechselnd öffnen und schließen, und dann würde unwillkürlicher Kotabgang und Harnabgang Statt finden.

6. Bei Lähmung und Vernichtung des Gehirns, ja sogar bei Vernichtung des Gehirns und Rückenmarks zugleich, dauert die Pulsation des Herzens, das vom N. vagus und vom N. sympathicus seine Nerven erhält, bei Säugthieren, Amphibien und Fischen noch einige Zeit fort.

Sogar die Beobachtungen des Le Gallois ¹⁾ widersprechen diesem Satze nicht, denn Le Gallois hat nur bewiesen, daß die Pulsationen des Herzens, nachdem das Rückenmark ganz zerstört worden, kraftlos und unzureichend zur Unterhaltung des Blutlaufs waren, und daß sie bei warmblütigen Thieren bald aufhören. Ich spreche daher hier nur von diesen nicht kraftvollen, aber doch sehr regelmäßig sich wiederholenden Pulsationen des Herzens, welche man nicht mit dem Sittern und Zucken der Fasern anderer Muskeln bei so eben geschlachteten Thieren vergleichen darf. Denn die Muskelfasern des Herzens wirken hierbei gemeinschaftlich und in einer gewissen Ordnung, was kaum zu begreifen ist, wenn man nicht annehmen will, daß sie durch ihre Nerven unter einander zusammenhängen, und daß die Nerven derselben ihre Wirkung, mittels deren sie die Muskelfasern des Herzens zu einer gemeinschaftlichen geordneten Bewegung verbinden, noch unabhängig vom Gehirne und Rückenmarke fortsetzen. Ich will hier an die mit Unrecht vergessenen Beobachtungen von R. Whytt ²⁾ erinnern.

R. Whytt ²⁾ zerstörte bei einem Frosche das Rückenmark, nachdem er ihn erpöht hatte, durch Einstoßen eines glühend heißen Drahtes. Er öffnete die Brust, und das Herz schlug nach 35 Minuten 30mal in einer Minute, — nach 1 Stunde nach 51 Min. 20mal, — nach 3 St. 51 Min., da das Zimmer wärmer ward, 5mal, — in die Sonne gebracht 31mal, — in kühlerer Luft am Fenster 25mal, — wieder in die Sonne gebracht 30mal, nach 6 Stunden und 16 Minuten, wo der Ventrikel ohne Bewegung war, das Herzohr 12mal, — und eben dasselbe nach 9 Stunden 11 bis 12mal. Und sogar aus dem Körper herausgenommene Froschherzen, in Wasser gethan, pulsirten noch ziemlich lange, das eine, 12 Minuten nach dem Herausnehmen, 20mal in einer Minute, — ein anderes 11 bis 10mal, — ein anderes 15 bis 11mal, — ein anderes 25 bis 9mal.

¹⁾ Le Gallois. Expériences sur le principe de la vie notamment sur celui des mouvements du coeur. Paris 1812.

²⁾ R. Whytt. Edinburger Versuche (neue) B. II. 316.

Eintheilung der Nerven des Gehirns und Rückenmarks in Empfindungs- und Bewegungsnerve

Nachdem schon früher von verschiedenen Physiologen mancherlei Vermuthungen über die Existenz einer doppelten Classe von Nerven für die Empfindung und für die Bewegung vorgetragen worden waren (Ch. Bell durch pathologische Beobachtungen am Gesichte des Menschen und bald darauf Magendie durch directe Versuche an den Rückenmarksnerven lebender Thiere zu beweisen gesucht, daß die mit Knoten versehenen Wurzeln der an diesen Stellen verbreiteten (die hinteren Wurzeln aller Rückenmarksnerven, und die große Wurzel des Nervus trigeminus) der Empfindung, die nicht mit Knoten versehenen Nervenwurzeln der Bewegung gewidmet wären.

Magendie ¹⁾ entblöste bei jungen Hunden das Rückgrat hinter der Lenden- und Kreuzgegend, und durchschnitt dann mit einer Scheere die hinteren Wurzeln der Nerven auf einer Seite. Daraus ging die Fähigkeit zu empfinden im Hinterbeine dieser Seite verloren, aber das Thier machte deutliche Bewegungen damit. Nun glückte endlich bei einem andern Hunde der viel schwierigere Versuch, deren Rückenmarkswurzeln ohne eine Verletzung der hinteren eben mittelst eines Staarmessers zu durchschneiden, das Glied wurde unbeweglich und schlaff, aber es blieb deutlich empfindlich. Die Richtigkeit des vorigen Versuchs noch mehr zu bestätigen, gab er Thiere, dessen Nervenwurzeln eben daselbst so eben vorn oder hinten durchschnitten worden waren, nux vomica ein. Weil nun die Nux vomica alsbald bei diesen Thieren allgemeine sehr heftige Convulsionen zu erregen pflegt, so gab er Achtung, ob dieselben auch in den durchschnittenen Gliedmaßen entstehen würden, deren vordere oder hintere Nerven durchschnitten worden wären. Denn da die Nux vomica ein Gift ist, welches zunächst auf das Centrum des Nervensystems wirkt, und da aus mittelst der Nerven krampfhaft zusammenziehungen der Muskeln hervorbringt, so erwartete er, daß, wenn die Wurzeln der Bewegungsnerve der hinteren Gliedmaßen durchschnitten wären, andere Muskeln, aber nicht die der hinteren Gliedmaßen in Bewegung gerathen würden. Das Resultat stimmte mit dem vorigen überein, denn waren die hinteren Wurzeln durchschnitten, so gerieth das Glied eben so sehr als andere Theile in Convulsionen, waren es aber die vordern, so blieb das Glied unbewegt und schlaff, während die

¹⁾ *Magendie, Journal de physiologie expérimentale et pathologique. T. 1. p. 276 — 279, 366 — 371. und zum Theil in Meckels Archiv übers. 1823. p. 113.*

Muskeln des Körpers heftige tetanische Zusammenziehungen erlitten, denn in diesem letzteren Falle konnte das Gift mittels der vorderen Nervenwurzeln auf die Muskeln jenes Glieds nicht wirken, weil sie durchschnitten waren, und durch die hinteren auch nicht, weil diese, wie er glaubt, keine Bewegungsnerven enthalten. Man mußte nun hier noch erwarten, daß, wenn er die vorderen oder die hinteren entblößten Wurzeln stäche und auf andere Art reizte, die hinteren Wurzeln heftigen Schmerz, aber keine Bewegung des Glieds, zu welchem sie gehen, die vordere Bewegung des Glieds aber keinen Schmerz verursachen würden. Das erwartete auch Magendie. Allein dieses war der Fall nicht. Die Reizung beider Arten von Wurzeln erregte Schmerz und Bewegung des Glieds. Wann er ein Bündel der hinteren Wurzeln quer durchschnitt, so entstand eine Bewegung des Gliedes im Ganzen (da doch diese Wurzel nur Empfindungsnerven enthalten soll), und der Schmerz war, wenn er sie reizte, gar nicht mit demjenigen zu vergleichen, welcher entstand, wenn das Rückenmark an der Ursprungsstelle dieser Nerven auch nur leise berührt wurde. Er behauptet aber, daß die erregte Bewegung bei Reizung der vorderen Wurzeln und die erregte Empfindung bei Reizung der hinteren Wurzeln heftiger gewesen wäre. Da nun Magendie vermuthete, daß wohl der angebrachte Reiz durch den Nerven auf das Rückenmark übergehen und hierdurch den scheinbaren Widerspruch der Versuche verursachen möchte, so schnitt er erst die Wurzeln ganz durch, und reizte nun die Durchschnitflächen der zu den hintern Gliedmaßen übergehenden Nerven; allein hierdurch brachte er meistens gar keine Wirkung hervor, und in den 2 einzigen Fällen, wo eine Wirkung erfolgte, entstand sowohl bei Reizung der hinteren als der vorderen Wurzeln Bewegung.

Die Zweifel, welche hierdurch erregt wurden, schienen noch durch die Versuche von Bellingeri ¹⁾ vermehrt zu werden, welcher zu dem Resultate gelangte, die hinteren, nicht die vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven dienen zur Empfindung; aber beide Wurzeln der Lendenerven wären der Bewegung gewidmet, die hinteren nämlich der Streckung der Füße, die vorderen ihrer Beugung.

Indessen sind diese Zweifel neuerlich durch die vortrefflichen Versuche von Johannes Müller in Bonn, und von Panizza in Pavia beseitigt worden.

Müller ²⁾ öffnete bei vielen lebenden Fröschen mittels einer scharf schneidenden, spitzigen Zange eine Wunde des Rückgrats. Die Frösche

¹⁾ C. Bellingeri, experimenta physiologica in medullam spinalem: Memorie della reale academia delle scienze di Torino, Tom. XXX. p. 293. und Ferrusca. Bullet. des sc. méd. Sept.

²⁾ Johannes Müller, in *Erstlings Notizen*, März 1831. S. 30. S. 113.

hüpften hierauf noch munter umher. Nun hob er die ziemlich dicken hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven in die Höhe, ohne die vorderen mit zu fassen, durchschnitt sie, faßte einen einzelnen Nerven mit der Pincette, und zerrte ihn mit der Spitze einer Haarnadel.

Ungeachtet er diesen Versuch sehr oft an einer Menge von Fröschen wiederholte, so gelang doch jeder Versuch, und hierdurch überzeugte er sich, daß auf die mechanische Reizung der hinteren Wurzeln niemals auch nur die entfernteste Spur einer Zuckung in den Extremitäten, zu welchen die Nerven gehen, entstehe.

Hebt man nun aber eine der vorderen, gleichfalls sehr dicken Wurzeln aus dem Canale des Rückgrats in die Höhe, so erfolgen schon bei der leisesten Berührung derselben die allerlebhaftesten Zuckungen in der hinteren Extremität. Schnitt er sie nun ab und faßte das abgeschnittene Ende mit der Pincette, und zerrte die angespannte Wurzel mit der Nadelspitze, so erfolgten bei jeder Reizung, er mochte den Versuch so viele Male und an so vielen Fröschen wiederholen als er wollte, die lebhaftesten Zuckungen. Uebrigens fand er nun auch, daß die Reizung der vorderen Wurzeln durch den Galvanismus sogleich die heftigsten, die der hinteren Wurzeln dagegen niemals Zuckungen bewirkt.

Zu ähnlichen Resultaten ist fast gleichzeitig in Italien Panizza gelangt.

Ch. Bell²⁾ stützt sich vorzüglich auf pathologische Beobachtungen von Verletzungen der Gesichtsnerven des 5ten und 7ten Paares.

Wenn Nerven des 5ten Paares gelähmt werden, so geht das Gefühl und der Gebrauch der Muskeln beim Kauen verloren, in wiefern auch die Gesichtsmuskeln beim Athmen, beim Lachen, beim Weinen und ähnlichen Verrichtungen thätig sind, verlieren sie ihre Kraft nicht. Die Kaumuskel, Backenmuskeln und die Muskeln der Lippen erhalten nach Bell's Vermuthung diejenigen Bewegungsnerven, welche die beim Kau-

¹⁾ Scarpa schreibt über diese Versuche Panizza's, denen er selbst beizuohnte, folgende: »In tanta circa gravissimum hoc argumentum ambiguitate Anatomes Professi noster Panizza eximia qua pollet tum in anatomicis tum in physiologicis dexteritate et ingenii acumine, negotium in se suscepit: tanto autem cum successu experiundo in frigidis aequae ac calidis sanguinis animalibus, ut amini in praesens amplius dubitare liceat, radicem unius cujusque nervi spinalis anteriorum motui musculorum voluntario inservire, posteriorem vero radicem sensui famulari. Horum experimentorum descriptio quam primum prodibit, non sine magna auctoris laude. Siehe Antonii Scarpa de nervorum deoque origine et essentia nervi intercostalis ad Henricum Weidmannum Anatomicum Lipsiensem. Milano 1831. 8. p. 7. (Estrato dagli Annali universali di Medicina. Maggio e Giugno 1831.)

²⁾ Ch. Bell, Idea of a new anatomy of the brain submitted for the observations of his friends. Siehe Magendie, Journal 1822. p. 370. 1827. p. 9. und Phil. Transact. 1826. P. II. Siehe auch die Eintheilung der Gehirnnerven weiter unten.

zu machenden Bewegungen veranlassen, von der kleinen Wurzel des 5ten Nervenpaars, die bekanntlich keinen Antheil an der Bildung des Knotens des 5ten Nervenpaars nimmt, deren Aeste sich aber mit den aus dem Knoten kommenden, dem Gefühle dienenden Aesten vereinigen. Das 7te Nervenpaar ist nach ihm nicht Empfindungsnerve, sondern nur Bewegungsnerve, der vorzüglich die Muskeln beim Mienenspiel und beim Athmen in Bewegung setzt. Da nun ein und derselbe Muskel zuweilen sowohl beim Kauen als auch beim Athmen mitwirkt, so bekommt er nicht selten doppelte Bewegungsnerven, einen vom 5ten, und den andern vom 7ten Hirnnervenpaare. Dessenungeachtet erregt doch die Verletzung des 7ten Gehirnnervenpaars Schmerz ¹⁾. Wenn das 5te Nervenpaar gelähmt ist, so wird das Gesicht beim Kauen schief gezogen, und während des Lachens kann es wieder gerade werden. Umgekehrt verhält sichs, wenn das 7te Nervenpaar gelähmt ist.

Noch einen Grund aber für die Meinung, daß es besondere Nerven, die die Empfindung, und besondere Nerven, die die Bewegung vermitteln, gebe, bilden die zahlreichen Fälle, wo beim Schlagflusse das Vermögen der willkürlichen Bewegung gewisser Theile aufgehoben ist, während in ihnen das Gefühl fort dauert, oder sogar eine solche übermäßige Empfindlichkeit eintritt, daß die Einreibung von Salben schmerzhaft ist. Viel seltener sind die entgegengesetzten Fälle, in welchen das Gefühl vernichtet gewesen sein soll, während das Vermögen der willkürlichen Bewegung der nämlichen Glieder fort dauerte, ein Zustand, den man Anästhesie nennt. Ich hege indessen hinsichtlich der meisten mir bekannt gewordenen Beobachtungen noch Zweifel, ob sie beweisen, daß das Bewegungsvermögen in den nämlichen Theilen fort dauert, in welchen das Empfindungsvermögen vernichtet war. Da nämlich die Muskeln der Finger am Unterarme, die der Behen am Unterschenkel liegen, so kann allerdings der Fall eintreten, daß die Finger oder Behen, oder die Hand und der Fuß, oder sogar auch ein großes Stück des Unterarms oder des Unterschenkels wirklich abgestorben ist, während die Finger oder Behen noch bewegt werden können ²⁾. Man erwäge hier den Einwurf, welcher Theil I. S. 295 gegen eine ähnliche Folgerung gemacht worden ist.

¹⁾ F. Eschricht, De functionibus nervorum faciei et olfactus organi. Diss. Hafniae 1825. 8. und im Auszuge in Gerson und Julius Magazin d. ausl. Lit. März 1826. p. 224.

²⁾ Eine ansehnliche Sammlung von neueren Beobachtungen von Anaesthesia findet man in Vasse, Zeitschrift für psychische Aerzte. 1822. H. 2. S. 203. Einen sehr merkwürdigen Fall, der, wenn er Zutrauen verdient, dem von mir geäußerten Zweifel nicht unterliegt, ist der von A. Reil in Proverbia Notizen 1820. B. XXIV, p. 217. Zimmermann, von der Erfahrung. S. 219. erwähnt auch einen Fall von Anästhesie, der mit der Kriebelkrankheit verbunden war.

Von den
Häuten, von welchen das Gehirn und Rückenmark
umgeben werden.

Die harte Haut.

Die harte Haut, *dura mater*, oder *dura meninx*, oder *dura membrana*, ist eine dicke, dichte und sehr feste Haut, welche theils die ganze inwendige Fläche der Hirnschale überzieht und das Gehirn einschließt, theils innerhalb des Canales des Rückgrates liegt und das Rückenmark wie eine Scheide umgiebt.

Der Kopfteil, *pars cephalica*, dieser Haut und der Rückgratstheil, *pars spinalis*, hängen durch das große Loch des Hinterkopfs mit einander zusammen, und dieser ist als ein Fortsatz jenes Theiles anzusehen.

Sie ist die dichteste und härteste Haut im ganzen menschlichen Körper, besteht aus einem sehr dichten, durch einen besondern Glanz ausgezeichneten Gewebe, in welchem sich in verschiedenen Richtungen liegende sehnige Fasern unterscheiden lassen. Sie gehört zu den fibrösen Häuten.

Die harte Hirnhaut.

Man kann die *Pars cephalica* der harten Hirnhaut künstlich in 2 Platten zertheilen, welche aber in der Natur nicht wirklich unterschieden und durch eine Lage Zellgewebe von einander getrennt sind, zwischen welchen indessen doch an gewissen Stellen Zwischenräume für daselbst verlaufende Venen befindlich sind.

Die auswändige Matte liegt dicht an der inwendigen Fläche der Hirnschale an, dient derselben als Weinhaut, und ist mit ihr durch dünne Blutgefäße, welche aus ihr in die Hirnschale, oder umgekehrt, dringen, und auch durch kurzes Zellgewebe verbunden. Je jünger der Körper ist, desto mehr sind dieser Blutgefäße, je älter er wird, desto mehr derselben werden geschlossen.

Die auswändige Fläche der harten Hirnhaut und die inwendige der Hirnschale hängen daher, und ganz vorzüglich bei kleinen Kindern, sehr fest zusammen ¹⁾, bei Erwachsenen am festesten da, wo die Näthe sind.

¹⁾ Es wird daher, wenn man (wie man zu thun pflegt, um das Gehirn zu untersuchen) das Gewölbe der Hirnschale rund herum durchgesägt hat, eine große Kraft erforderlich, dasselbe von der harten Hirnhaut loszureißen. An jungen Kindertöpfen ist die Trennung, wegen der größeren Menge der verbindenden Blutgefäße, gar nicht möglich; wenn man Stücke der Hirnschale abkeilt, so reißen Stücke der harten Hirnhaut mit ab.

Wenn man die Hirnschale von der harten Hirnhaut losgerissen hat, so erscheint die auswendige Fläche der letzteren von zerrissenen Gefäßen und Zellgewebe rauh, die Oberfläche der Hirnschale aber blutig.

Die inwendige Platte wendet ihre inwendige Fläche dem Gehirne zu, ist aber nur an einigen Stellen mit demselben verbunden. Nur gewisse Blutgefäße gehen durch die harte Hirnhaut zum Gehirne, und gewisse vom Gehirne in die Bluthöhlen der harten Hirnhaut über. Die inwendige Fläche derselben ist glatt, und beständig feucht und schlüpfrig von einer Feuchtigkeit, welche das Zusammenwachsen der harten Hirnhaut mit dem Gehirne verhindert. Diese Feuchtigkeit wird wahrscheinlich von ausströmenden Gefäßen beständig ausgehaucht, und von Zeit zu Zeit in einsaugende Gefäße wieder aufgenommen, so daß im gesunden Zustande nicht mehr derselben da ist, als zur Befeuchtung erfordert wird ¹⁾.

Die inwendige Platte der harten Hirnhaut bildet in der Höhle der Hirnschale, indem sie von der auswendigen abweicht, gewisse Falten oder Fortsätze.

Es giebt eine senkrechte, in der Mittellinie an der Decke der Hirnschale gelegene, und eine horizontale, über die hervorspringendsten Unebenheiten der Grundfläche der Hirnschale ausgespannte Falte der harten Hirnhaut. Beide Falten durchkreuzen sich an der *Protuberantia occipitalis interna*.

Die erstere heißt der sichelförmige Fortsatz, oder die Sichel, *processus falciformis* oder *falx cerebri et cerebelli*, oder *mediana cerebri et cerebelli*. Er ist eine häutige Falte, welche vorn an der Hahnenkamme des Siebbeins befestigt ist, dann in der Mitte des Innern der Hirnschale, an der *Spina frontalis interna* (wenn 2 Stirnbeine da sind, an der Stirnnaht), ferner unter der Pfeilnaht, endlich an dem obern Schenkel der *Spina cruciata* des Hinterhauptes, zur *Protuberantia occipitalis interna*, und von da als *falx cerebelli* bis zum großen Hinterhauptloche fortgeht. Ihr vorderer Theil, *falx cerebri*, liegt so in der Höhle der Hirnschale, zwischen den beiden Hemisphären des großen Gehirns, daß er senkrecht, bisweilen ein wenig schief auf den markigen Querbalken, *corpus callosum*, hinabragt. Der an der Hirnschale angewachsene Rand der Sichel ist convex; ihr freier ist concav. An ihrem vorderen Ende ist sie am niedrigsten, nach hinten wird sie allmählig höher, so daß sie wirklich die Gestalt einer Sichel hat. An ihrem obern Rande ist sie am dicksten, nach unten dünner.

¹⁾ Wenn sich zu viel derselben ansammelt, weil zu viel ausgehaucht, oder zu wenig eingesaugt wird, so entsteht der innere Wasserkopf (*hydrocephalus internus*), bei dem zuweilen die Hirnschale widernatürlich erweitert wird.

An der Sichel sind glänzende, unregelmäßig laufende Fasern zu sehen. Zuweilen ist sie nach ihrem untern Rande zu hie und da durchlöchert. In dieser Falte, wo sie an der Hirnschale befestigt ist, befindet sich ein dreieckiger Canal, der Sinus longitudinalis superior in welchem das Venenblut des benachbarten Theiles des Gehirns zusammenkommt. (Siehe S. 278.)

Beide Platten dieser Falte gehen an ihrem hinteren Ende auswärts in das Gezelt, tentorium cerebelli, über.

Diese häutige Wand befestiget die Hälften des großen Gehirns in ihrer Lage, daß eine die andere nicht drücke, wenn der Kopf auf eine Seite liegt. Weil aber die andern Hirnhäute in der Längenspalte des Gehirns an vielen Stellen dieser Falte festhängen, und durch Venen die in den Sinus longitudinalis übergehen, mit ihr verbunden sind, so hängt das Gehirn selbst an dieser Falte.

Die zweite Falte, welche quer liegt, und das Gezelt, tentorium cerebelli oder septum encephali, heißt, ist von derselben Beschaffenheit. Jede Hälfte derselben erstreckt sich von der Protuberantia occipitalis interna, wo sie mit der Sichel zusammenhängt, des Schenkels der Spina cruciata des Hinterkopfs bis an den obern Winkel des Felsenbeins. Der innere Rand dieser Falte ist zum Theil frei, schief und concav. Er umgiebt eine elliptische Oeffnung, durch welche im Anfang des verlängerten Markes hinabgeht. Der vorderste, an der Spitze des Felsenbeins befestigte Theil der Falte geht neben dem Lückenfortsatz noch weiter vorwärts, und überzieht daselbst den freien Rand des kleinen Flügels des Keilbeins.

Der hintere große Theil liegt in der Querspalte, durch welche das große Gehirn vom kleinen getrennt wird, der vordere kleine Theil liegt in der Querspalte, fossa Sylvii, durch welche der vordere Lappen des großen Gehirns vom hinteren geschieden ist.

Das Tentorium dient daher, das große Gehirn zu unterstützen damit dasselbe das kleine nicht drücke.

Die Schlagadern dieses Theiles der harten Hirnhaut (arteriae meningae), deren Aeste auf ihrer auswärtigen Fläche sich baumförmig vertheilen, und auf der inwendigen Fläche der Hirnschale Furchen bilden, sind an jeder Seite: die Arteria meningea media. Sie ist über den ganzen Theil der harten Hirnhaut, der in der Schläfengegend und am Schtettel liegt, bestimmt und ein Ast der A. maxillaris int. Die bedeutenden Arteriae meningae anticae liegen vorn und sind Aeste der A. ophthalmica und der A. ethmoidea. Die gleichfalls sehr kleinen Arteriae meningae post. dem hinteren Theile bestimmt, sind Aeste der A. c. vertebrales, der A. vertebralis, oder der A. pharyngeales.

Die sehr kleinen Arteriae meningeae inferiores, für den mittlern Theil in der Basis, sind Aeste der Carotis cerebialis.

Die Venen der harten Hirnhaut ergießen sich in den Sinus und in die Vena meningea media, welche die Arterie gleiches Namens mit doppelten Zweigen begleitet, und zuweilen durch das Foramen spinosum aus der Schädelhöhle tritt, zuweilen aber sich gleichfalls in einen Sinus öffnet.

Die Venen der harten Hirnhaut s. in der Abbildung eines vortreflichen injeicirten Präparats Walters, des Waters, bei dess. Schrift von den Krankheiten des Bauchfells und dem Schlagflusse. Taf. 1. 2.

Diese Bluthöhlen, sinus durae matris, sind Behälter, welche zwischen der inwendigen und auswendigen Platte derselben, theils zwischen Fortsetzungen der inwendigen Platte, eingeschlossen werden. Wahrscheinlich sind diese Bluthöhlen in der harten Hirnhaut selbst deswegen angelegt, damit sie nicht leicht ausgebehnt werden und eine Ansammlung des Blutes gestatten oder gar bersten können. Von ihnen ist oben S. 277 sq. die Rede gewesen.

Auch Saugadern sind von Mascagni in der harten Hirnhaut beobachtet worden ¹⁾.

Nerven hat die harte Hirnhaut nicht. Die Nerven des Gehirnes gehen durch sie heraus, ohne ihr Fäden zu geben. Einige haben zwar geglaubt, daß sie Nervenfäden erhalte ²⁾, diese waren aber wahrscheinlich nur Fäserchen der Tunica arachnoidea oder feine Gefäßchen. Sie ist unempfindlich ³⁾. F. Arnold glaubt indessen neuerlich wieder Nervenfäden, welche vom 1sten Aste des 5ten Paares entspringen, zur Dura mater verfolgt zu haben.

Theils zwischen den beiden Platten der harten Hirnhaut, theils auf ihrer auswendigen Platte, am obern Theile derselben, meist in der Nähe

¹⁾ Mascagni behauptet, sie gesehen zu haben, wie sie dem Laufe der Blutgefäße folgen, mit ihnen durch das Foramen spinosum herausgehen etc. (Beschreib. der einfaug. Gefäße. S. 97, 98. und Prodrome d'un ouvrage sur les vaisseaux lymphatiques c. 2.) und hat sie auch auf der letzten Tafel seines großen Werkes selbst abgebildet.

²⁾ Vieussens Neurographia, p. 171. Winslow, expos. anat. Tête n. 47. Lieutaud, essays anatomiques, p. 434. Laghi in Fabri sulla insensitivita et irritabilita Halleriana, opuscoli di vari autori raccolti. Bologna 1757. II. p. 113, 333. Le Cat, sur la sensibilité de la dure mère. Berlin 1765. p. 176.

³⁾ Haller, opp. min. I, p. 345. Zinn, exp. p. 45. Zimmermann, de irritabilitate p. 6. Arneemann Berf. S. 101.

Phil. Jac. Beyckert, praes. Jo. Fried. Lobstein, de nervis durae matris. Arg. 1772. 4.

Henr. Aug. Wrisberg, de quinto pari nervorum encephali et de nervis, qui ex eodem (de quinto pare) duram matrem ingredi falso dicuntur. Goett. 1777. 4. Vide Comment. Vol. I. Gottingae 1800. Arnold in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie, B. II. 1827. p. 164, und B. III. p. 151.

der Sichel, liegen hier und da kleine Körperchen (*glandulae chioni*) ¹⁾, an unbestimmten Stellen, von unbestimmter Anzahl, von verschiedener Gestalt, meist rundlich, von verschiedener Größe, weicher, theils härlicher, röthlich oder gelbbraunlich sind. Einige selbst liegen dicht zusammen. Die inwendige Fläche der Hirnschale Grübchen, in denen sie liegen, so weit sie aus der harten Hirnhaut austragen. Andere ähnliche liegen an den Fortsetzungen der inneren Platte, welche die Sichel ausmachen. Der Nutzen dieser Körperchen noch unbekannt. Einige haben sie mit Unrecht für *Glandulae globatae* gehalten. Bei Kindern fehlen sie.

Die harte Rückenmarkthaut.

Die *Pars spinalis* der harten Hirnhaut ist eine Fortsetzung der *Pars cephalica*, die durch das große Loch des Hinterhauptes in den Schädel geht. Sie umgiebt das Rückenmark, und am untern Theile des Rückgrats, wo das Rückenmark aufhört, die daselbst liegenden vielen Nerven. Wie ein weiter Schlauch liegt sie in dem Canale des Rückgrats vom Kopfe bis zu dem untern Theile des heiligen Beins.

Sie hat die Gestalt eines sehr langen Sackes, der von der dünneren Rückenmarkthaut nicht ausgefüllt wird, in der Gegend der Wirbel weiter ist, als oberhalb derselben, dann nach unten wieder mählig enger wird, und am Ende des Canals im heiligen Beine zuläuft.

Dieser Sack oder Schlauch liegt auch nicht dicht an der inneren Fläche des Canales des Rückgrats, wie die *Pars cephalica* an der inneren Fläche der Hirnschale, sondern nur locker, und zwar lockerer als vorn, so daß zwischen ihm und der inneren Fläche des Canals ein Zwischenraum ist, den eine wässerig-gallertartige Materie, vorn Zellgewebe, am Kreuzbeine Fett ausfüllt. Hier liegen die Nerven des Rückgrats. Die harte Rückenmarkthaut ist daher auch nicht gleich der Weinhaut des Rückgratcanals, wie die *Pars cephalica* der Hirnschale, sondern die inwendige Fläche der Wirbelbeine hat eine besondere Weinhaut.

Es wird folglich dieser Schlauch, der einen etwas kleineren Durchmesser hat als der Rückgratcanal, in diesem letzteren schwebend gehalten, in dem er großen Theils durch lockeres Zellgewebe anhängt. In der Nähe des großen Hinterhauptlochs ist er etwas fester durch

¹⁾ *Ant. Pacchioni*, Ital. Prof. Rom. diss. epistolaris ad Luc. Schroeck glandulis conglobatis durae meningis humanae, indeque ortis lymphaticam matrem productis. Rom. 1705. 8.

sehnigen Ring angewachsen. Innerhalb des heiligen Beins hängt er durch einige sehnige Bändchen an der Wirbelsäule fest.

Die inwendige Fläche dieses Schlauchs, welche, wie an der Pars cephalica, glatt und feucht ¹⁾ ist, ist dem Rückenmarke zugewendet, liegt aber nicht so nahe an demselben an, als die Pars cephalica am Gehirne.

Diese Einrichtung ist sehr zweckmäßig, damit das Rückenmark bei den verschiedenen Beugungen des Rückgrats nicht gedrückt werden möge.

An den Stellen, wo die Rückenmarksnerven durch die Zwischenwirbellocher aus dem Canale des Rückgrats heraustreten, begleitet sie dieselbe mit einer canalartigen Verlängerung, welcher sich in dem aus Zellgewebe bestehenden Ueberzuge dieser Nerven allmählig endigt.

Die Blutgefäße der harten Rückenmarkshaut sind Aeste derer, welche zum Rückenmarke selbst gehören und unten angegeben werden.

Was von den Nerven der harten Hirnhaut gesagt worden, gilt auch von diesem Theile der harten Haut.

Die Spinnwebenhaut.

Die Spinnwebenhaut, tunica arachnoidea, oder Schleimhaut, tunica mucosa, ²⁾ des Gehirns ist eine sehr dichte, aber zugleich eine sehr dünne, zwischen der harten und der weichen Haut gelegene Membran in der Hirnschale und im Rückgrate, welche im Rückgrate bis ins heilige Bein reicht. Sie liegt nämlich auf der inwendigen Seite der harten und auf der auswendigen Fläche der weichen Hirnhaut, und ist von diesen Häuten ganz verschieden. Man unterscheidet einen doppelten Theil derselben; der eine Theil überzieht die innere Oberfläche der harten Haut des Gehirns und des Rückenmarks, giebt derselben die glatte glänzende Oberfläche, ist aber mit dieser sehnigen Haut so fest verwachsen, daß es kein Mittel giebt, sie von ihr zu trennen. Der andere Theil bedeckt die weiche Hirnhaut des Gehirns und des Rückenmarkes. Beide Theile gehen an dem unteren Ende im Kreuzbeine ununterbrochen in einander über. Jeder Gehirn- und Rückgratnerve, ferner auch die Blutgefäße, werden, während sie von der Oberfläche des Gehirns und des Rückenmarkes zur harten Haut hinübergehen, von einer Fortsetzung der Spinnwebenhaut überzogen, so daß diese Theile daselbst in einem Canale desselben liegen. Durch diese canalartigen Fortsetzungen hängt der die

¹⁾ Wenn die Feuchtigkeit der harten Hirnhaut sich hier anhäuft, so entsteht die Wassersucht des Rückgrats, bei welcher meist die Bogen der Wirbelbeine am untern Theile des Rückgrats, wo sie sich am meisten sammelt, hinten offen sind (spina bifida).

²⁾ Den Namen Spinnwebenhaut hat man ihr wegen ihrer Dinnheit gegeben. Da sie aber nicht aus einzelnen Fäden besteht, so ist dieser Name nicht so schicklich, als der Name mucöse oder Schleimhaut des Gehirns und des Rückenmarks.

harte Haut und der die weiche Haut überziehende Theil gleichfalls ununterbrochen zusammen. Die Spinnwebenhaut umgiebt folglich einen völlig geschlossenen Zwischenraum. Man kann sich daher die Spinnwebenhaut als einen doppelten Schlauch vorstellen, von welchem der weitere den engeren einschließt, und von welchem der weitere in den engeren an dem Ende beider Schläuche sich umbiegt, und welche außerdem noch durch Canäle, die quer durch den Zwischenraum zwischen beiden Schläuchen liegen, unter einander zusammenhängen. Es verhält sich folglich diese seröse Haut fast so wie die der Sehnenscheiden. (Siehe *Lt. I. S. 371.*) In dem Zwischenraume zwischen beiden Theilen ist ein wenig Feuchtigkeit enthalten. Nach *Magendie's* Bemerkung befindet sich aber auch zwischen dem Theile dieser Haut, welcher die weiche Rückenmarkshaut sehr locker überzieht, und dieser weichen Haut selbst, eine nicht unbedeutliche Menge Wasser, sowohl bei lebenden als bei todtten Thieren wie auch beim Menschen, die man nicht mit jener Flüssigkeit verwechseln darf. Krankhafter Weise kann sich auch im Schädel eine größere Menge dieses Wassers, und zwar theils zwischen der äußeren und inneren Platte der Spinnwebenhaut, theils in dem Zellgewebe der weichen Hirnhaut unter der Spinnwebenhaut anhäufen. Auf der Oberfläche der Windungen des großen und kleinen Gehirns liegt die Arachnoidea unzertrennlich an der weichen Hirnhaut an; wo aber Vertiefungen zwischen den Windungen sind, tritt sie nicht mit der weichen Hirnhaut in dieselben hinein, sondern geht, wie eine Brücke, über dieselben von einer Windung zur andern hin ¹⁾. Auf der Grundfläche des Gehirns liegt sie lockerer, geht ohne in die *Fossa Sylvii* hineinzutreten, von den vorderen zu den hinteren Lappen des großen Gehirns, auch von einer Hälfte des großen Gehirns zur andern, und vom großen Gehirne zum kleinen über. Auch das Rückenmark umgiebt sie, wie schon gesagt, sehr locker.

Darüber, ob die Spinnwebenhaut in die Ventrikel des Gehirns eindringt und dieselben inwendig überzieht, oder ob nur die weiche Hirnhaut in dieselben gelange, und ob also das in den Höhlen des Gehirns enthaltene Serum in dem Sacke der Spinnwebenhaut liege und von ihr abgesondert werde, oder ob es die von *Magendie* ²⁾ entdeckte Flüssigkeit in der Wirbelsäule, ein Produkt der weichen Haut (Gefäßhaut) sei, ist noch nicht völlig entschieden. Wenn das eine der Fall wäre, so müßte es am Eingange in die Höhlen des Gehirns eine Öffnung geben, durch welche die Höhlen des Gehirns mit dem zwischen der harten und der weichen Hirnhaut befindlichen, von der Spinnwebenhaut ausgekleideten Zwischenraume communicirten. In der That hat *Bichat* ³⁾ behauptet, eine in den 3ten Ventrikel führende Querspalte zwischen dem Hirnballen und der Milchdrüse beobachtet zu haben, und auch *Savary* ⁴⁾, *Wenzel* ⁵⁾, *J. F. Ridel*

¹⁾ Wenn man eine kleine Öffnung in dieselbe macht, und Luft einläßt, so erhebt sie sich von der auswendigen Fläche der weichen Hirnhaut.

²⁾ *Magendie, Journal de physiologie exp.* 1823. p. 27 — 36.

³⁾ *Bichat, Traité des membranes.* p. 186. sq.

⁴⁾ *Savary, im Dictionnaire des sciences méd.* Tome II. p. 262.

⁵⁾ *Wenzel, de penitioni cerebri structura.* Tubingae 1817. Fol.

¹⁾, und neuerlich von den Bröcke ²⁾, sind dieser Behauptung beigetreten. der That bedarf es zur Entscheidung dieser Streitfrage noch einer wiederholten Erörterung. Denn Guyot ³⁾, und später Martin Saint-Ange ⁴⁾, der letztere seine Untersuchung speciell auf diese Spalte richtete, fanden keine alte. Der letztere behauptet, daß man, wenn man die Hälfte der Basis cranii nehme, und dann das Gehirn von unten her zerstücke, sich überzeuge, daß von Nichts beschriebene Canal nicht existire, sondern daß er bei der gewöhnlichen Zergliederungsweise durch eine Zerreißung entstehe. Ungeachtet sich Wenzel ⁵⁾ viel Mühe gegeben haben, so haben sie doch keinen Uebergang dieser Membran in den 3ten Ventrikel finden können. Wäre eine Spalte an der von Bist angeführten Stelle, so wäre es schwer erklärlich, wie das in den Ventrikeln befindliche Serum im gesunden und kranken Zustande daselbst zurückgehalten werden könnte. In der That scheinen auch die Beobachtungen des Cotugno zu besagen, daß es bei Gesunden nicht daselbst zurückgehalten werde. Cotugno öffnete nämlich die Rückgrathöhle, und schnitt die Dura mater ein. Hierbei floß beträchtliche Menge Serum aus, die sich also in dem Sacke der Arachnoidea befunden hatte; hob er nun den Kopf in die Höhe, so floß von neuem eine große Flüssigkeit, wie aus einer neuen Quelle. Nach Versuchen, die er an 20 Thieren machte, schätzt er die Menge beider Portionen Flüssigkeit im Mittel zwischen 4 bis 5 Unzen. Nach Magendie soll aber auch die zwischen der Spinnwebenhaut und der Gefäßhaut des Rückenmarkes enthaltene Flüssigkeit mit der Flüssigkeit in den Ventrikeln des Gehirns communiciren, was er durch getrennte Flüssigkeiten darzuthun suchte.

Die Spinnwebenhaut ist sehr dünn und durchsichtig ⁶⁾, und scheint organisch, ohne Gefäße und Nerven, nur eine dünne Lage von Fasern zu sein ⁷⁾, welche aus Serum entsteht, das aus austretenden Flüssigkeiten der weichen Hirnhaut abgesetzt wird.

Die weiche Haut, oder die Gefäßhaut des Gehirnes und des Rückenmarkes.

Die weiche Hirnhaut oder eigene Haut des Gehirns, pia mater, s. membrana mollis, s. membrana propria cerebri et medullae spinalis, ist eine dünne weiche Haut, welche das ganze Gehirn mit dem Rückenmarke überzieht.

Da, wo die Oberfläche des Gehirns und des Rückenmarkes Vertiefungen (sulci cerebri, sulci cerebelli, fossa Sylvii, fissura medullae spinalis anterior et posterior etc.) hat, geht sie nicht, wie

1) S. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Th. III. S. 553.

2) Jac. Corn. van den Bröcke, Commentatio de membrana arachnoidea praemio ornata, in Annales academiae Gandaviensis. Gandavi 1823. 4. p. 19.

3) H. Guyot, Essai sur les vaisseaux sanguins du cerveau, in Magendie Journal de physiol. exp. 1829. p. 42.

4) Martin Saint-Ange, Recherches anatomiques et physiologiques du cerveau et de la moëlle épinière et sur le liquide cérébro-spinal. Journal hebdomadaire de méd. Jan. 1830. p. 97.

5) Wenzel, a. a. O. p. 87.

In jungen Körpern ist sie durchsichtiger als in alten. Auch krankhafter Weise kann sie von ihrer Durchsichtigkeit verlieren.

Sommerring hat zwar 1778 Saugadern auf einem Rattegehirne mit Quecksilber angefüllt; allein er will doch nicht behaupten, daß sie in der Substanz dieser Haut liegen. (Hirntehre, S. 9.) Mascagni behauptet, Saugadern in dieser Haut angefüllt zu haben. (Beschreib. d. einfaug. Gef. S. 98.)

bedrandt, Anatomie. III.

die Arachnoidea, über dieselben hin, sondern in dieselben hinein, so daß sie durchaus auf der Oberfläche des Gehirns, auch auf den vertieften Theilen derselben, liegt. Auf diese Weise gelangt sie sogar durch die große Querspalte des Gehirns in das Innere desselben, in die Gehirnkammern u. hinein, und überzieht die inwendige Fläche derselben, die Erhabenheiten in denselben, und trägt auch daselbst zur Bildung der Aderstränge (plexus choroidei) bei.

Ihre auswändige Fläche ist ziemlich glatt, der Arachnoidea zugewandt und, so weit sie nicht vertieft liegt, von derselben zunächst bedeckt; wo sie aber vertieft liegt, so wie auch in den Gehirnkammern von derselben entfernt.

Ihre inwendige Fläche liegt dicht auf der Gehirnmasse, und Nette ihrer Blutgefäße dringen daselbst allenthalben zahlreich in die Gehirnmasse hinein.

Sie hat eine Menge Blutgefäße, mit deren Netten und Nestchen netzförmig durchzogen ist; oder vielmehr diese Blutgefäße machen mit dem Zellengewebe, das sie verbindet, die weiche Hirnhaut aus ¹⁾.

Es ist merkwürdig, daß die Schlagadern und Venen einander in dieser Haut nicht, wie anderswo, begleiten.

Sie hat auch Saugadern ²⁾. Nerven aber hat sie nicht, und ist daher auch ohne Empfindlichkeit ³⁾.

Die weiche Rückenmarkshaut, pia mater medullae spinalis, oder mit einem andern Worte, die Gefäßhaut desselben, ist dicker und fester als die Gefäßhaut des Gehirns. Sie umgiebt das Rückenmark so dicht, daß sie sich in einem gespannten Zustande befindet, und daher das Mark hervorpreßt, wenn das Rückenmark quer durchgeschnitten wird. Ihre äußere Oberfläche ist glatt, und wird nur locker von der Spinnenwebhaut bedeckt. Ein dickerer vorderer und ein dünnerer hinterer Fortsatz dringen in die vordere und hintere Rückenmarkspalte. Diese gefäßreiche Haut hängt durch Gefäße und durch kleine häutige, an vielen Stellen in das Rückenmark eindringende Verlängerungen an den Rückenmark sehr fest. Wenn man das Rückenmark in dünne Scheiben schneidet, und das Mark desselben durch Uebergießen mit einer Auflösung von Kali erweicht und auspreßt, so bleiben die erwähnten häutigen Fortsätze übrig, welche untereinander zusammenhängen und den von der Pia mater umschlossenen Raum in viele canalartige Räumchen theilen. In diesen Räumchen lag zuvor das Mark. Die Pia mater erstreckt sich

¹⁾ Sömmering nennt sie daher Membrana vasculosa, Gefäßhaut.

²⁾ Edm. King, in phil. transact. n. 189. Pacchioni, epist. de gland. dur. cap. p. 116. Mascagni a. a. D. S. 98. Ludwig bei Mascagni a. a. D. S. 98.

³⁾ Haller, opp. min. I. p. 348. Castell, experimenta, Sect. IV.

als einfacher Schlauch bis ins Kreuzbein, sondern so wie sie auch oben den Rückenmarksnerven ihre Scheiden giebt, so überzieht sie unter dem 2ten Lendenwirbel, wo das Rückenmark aufhört, nur Nerven. Sie hält die Substanz des Gehirns und Rückenmarkes zusammen und dient den eindringenden Blutgefäßen zur Grundlage.

Das gezahnte Band, *ligamentum denticulatum*, ist eine dünne, längs dem Rückenmark verlaufende, zu beiden Seiten zwischen vorderen und hinteren Nervenwurzeln gelegene Falte der weichen Rückenmarkshaut, welche meistens zwischen je 2 Nerven des Halses oder des Brustes durch einen sehnigen Faden seitwärts in dem Zwischenraume zwischen 2 austretenden Nervenpaaren an der *Dura mater* angeheftet ist, daher daselbst Taschen bildet, deren Zahl nicht ganz bestimmt ist, weil über da ein solcher Faden und Taschen fehlt. Oben sind die Fäden horizontal und liegen wie die Nerven mehr quer, nach unten zu werden sie schief und liegen schief. Der erste Taschen liegt noch über dem Hinterloche hinter der *A. vertebralis*, aber vor dem *N. accessorius* *ii*. Das Band liegt überhaupt den vorderen Wurzeln etwas näher als den hinteren.

Übersehen wir nun die Mittel, welche zum Schutze des Rückenmarkes angewendet sind, mit einem Blicke, so sehen wir, daß es an seiner äußeren Fläche und in seinen 2 Spalten von der weichen Rückenmarkshaut eingeschlossen, mittels derselben durch 2 Reihen Fäden in dem häutigen Canale der harten Rückenmarkshaut locker aufgehängt, und daselbst durch die Umschläge einer serösen Haut, der Spinnwebenhaut, befestigt ist, daß aber der Canal der harten Rückenmarkshaut selbst wieder in dem häutigen Canale locker durch Zellgewebe und einzelne sehnige Fäden aufgehängt ist, und daß hierdurch sowohl die Beugung der Wirbelsäule, als die Drehung um die Längsaxe keinen nachtheiligen Einfluß auf das Rückenmark hat.

Das Rückenmark, *medulla spinalis*.

Das Rückenmark ist ein walzenförmiger, von hinten nach vorn etwas plattgedrückter Strang, der beim Erwachsenen vom Hinterhauptungefähr bis zur Mitte des 2ten Lendenwirbels reicht, zuweilen etwas kürzer oder auch ein wenig länger ist. Bei sehr kleinen Embryonen (B. nach Meckel und Tiedemann bei etwa 7wöchentlichen Embryonen, nach meinen eigenen Beobachtungen, an einem im gebogenen Zustande $5\frac{1}{2}$ Par. messenden, und also etwa 6 Linien langen Embryo, reicht er bis ans Ende

des Kreuzbeins, und vielleicht sogar bis auf das Schwanzbein, welche von mir beobachteten Falle nach Art eines Schwänzchens umgebogen im Neugeborenen erstreckt es sich bis in den 3ten Lendenwirbel. Den Theil des Canals der Wirbelsäule und der harten Rückenmark fällen die sehr langen Nervenwurzeln, die man zusammen caudal, Rosschweif, nennt.

Die merkwürdige Erscheinung, daß sich das Rückenmark beim Wachsthum gegen das Gehirn zu etwas zurückzieht, ist, nach Del¹⁾ bemerkt, dem Menschen eigenthümlich. Nach ihm reicht es zur Zeit der 14ten Woche bis an den 2ten Kreuzwirbel. Nach Tiedemann reicht es um die 27ste Woche bis ans Ende der Lendenwirbel, und um die 30te Woche bis zu dem 3ten Lendenwirbel. Diese Verkürzung geschieht durch die Verkürzung der Wirbelsäule und die in dem Rückgratcanale gelegenen Nervenwurzeln wachsen als das Rückenmark, denn anfangs fehlt die cauda equina, entsteht und vergrößert sich, während das Rückenmark verhältnißmäßig wird. Bei Thieren mit kurzem Schwanz reicht, nach Serres²⁾, das Rückenmark auch weniger weit im Canale der Wirbelsäule herab, als bei Thieren mit langem Schwanz.

Dieser Strang des Rückenmarks hat an den 2 Stellen, wo die Nerven entspringen (die Nerven der Arme und Füße), eine Anschwellung; die eine ist im Nacken, die andere an der Vereinigungsstelle der Brust und Lendenwirbeln gelegen. Bei sehr kleinen Embryonen, deren die Gliedmaßen noch nicht entwickelt, oder noch sehr klein sind, sind diese Anschwellungen, oder sie sind unmerklicher, und bei Thieren, denen die Gliedmaßen fehlen, sind das ganze Leben hindurch keine Anschwellungen vorhanden. Wo die Gliedmaßen klein sind, sind sie weniger merklich. Bei Amphibien mit 2 Gliedmaßen ist nur eine solche Anschwellung vorhanden, bei mißgebildeten menschlichen Embryonen, denen die Bauchglieder gleichfalls nur eine. Am auffallendsten ist, nach Serres³⁾, die Veränderung des Rückenmarks gleichzeitig mit dem Wachstume der Gliedmaßen der Froschlurven zu bemerken.

Das Rückenmark läuft unten in eine Spitze aus, an der Spitze und am Schwanzende eine bis 2 kleine Anschwellungen bemerkt, indessen oft nicht deutlich sind. Gall glaubte bemerkt zu haben, daß die Umriffe des Rückenmarks wellenförmig gebogen wären, und an der Ursprungsstelle jedes Nerven eine kleine, kauliche Anschwellung bilde.

Von der Spitze des Rückenmarks geht zum Ende des Kreuz- und zum Schwanzbeine ein Faden, der nach Bosc längere und kürzere sehr dünnen Nervenpaare begleitet wird, nach Burdach enthält etwas Nervenmark, der aber nach der meisten A

¹⁾ J. F. Meckel d. j., Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Centralnervensystems in den Säugethieren, im Archive für die Physiologie, 1816. p. 78. 4. 92.

²⁾ Fr. Tiedemann, Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirnbaues im Thiere. Mit 7 Tafeln. Nürnberg, 1816. 4. p. 49, 91.


³⁾ Serres, Anatomie comparative du cerveau. Paris 1821. 8.

rsuchungen, unter welchen ich auch Rudolphi nenne, nur häutig ist. Zwei tiefe, in der mittleren Ebene des Körpers liegende Spalten, hintere und eine vordere, gehen in das Rückenmark hinein, und in einen Fortsatz der weichen Rückenmarkshaut auf. Sie stoßen fast zusammen. Die vordere ist an den meisten Stellen weiter, und deshalb leichter zu finden. Die hintere ist enger, aber tiefer, und läßt sich nicht an einem etwas erhärteten Rückenmark wahrnehmen. Unter den neueren Untersuchungen stimmen die von Gall, Bellingeri, Rolando und meine eigenen Beobachtungen über die Existenz dieser 2 Spalten vollkommen überein. Wenn das Rückenmark in 2 gleiche, von einander abgeforderte Seitentheile, wären nicht diese Seitenthälften auf dem Boden der vorderen Spalte durch eine Lage weißer, auf dem der hinteren durch eine grauer Substanz vereinigt. Diese beiden Lagen kann man die weiße und die graue Commissur des Rückenmarks nennen. Sie verdienen die Aufmerksamkeit der Anatomen in vorzüglichem Grade, weil sie die Hälften des Rückenmarks zu einem Ganzen machen. Sie sind aber noch nicht genau genug untersucht. Nach Vicq d'Azyr, Cuvier, Sömmerring und Gall ¹⁾ laufen die Fasern der vorderen Commissur quer, und verbinden dadurch die Seitentheile, deren Fasern an den Seitenwänden der Spalte der Länge nach gehen. Gall sagt, daß sich diese queren Fasern einander durchkreuzen, was die gegenwärtigen Schriftsteller behauptet hatten. An der Oberfläche, welche die Seitentheile in der hinteren Spalte einander zuzehren, laufen die Fasern derselben, aber nicht in der daselbst befindlichen Commissur. Diese Commissur besteht nach Bellingeri und Rolando nur aus grauer Sub-

stanz. Über den 2 beschriebenen Spalten giebt es keine, in welche von einem sichtbaren Fortsatz der weichen Rückenmarkshaut hineinginge. Diese aber theilt sich das in Weingeist erhärtete, von seiner weichen Haut abgetrennte Rückenmark noch an mehreren Stellen vorzüglich leicht, und auch an mehreren Stellen, vorzüglich am verlängerten Marke, der nach gehende vertiefte Linien.


Das Rückenmark besteht aus einer äußeren weißen und aus einer inneren grauen Lage. Beide Lagen liegen nicht concentrisch. Wenn man, wie Bellingeri, das in sehr verdünnter Salpetersäure, oder, wie bei einer Auflösung von salzsaurem Kalk und Weingeist etwas erhärtete Rückenmark des Menschen und der Thiere in Scheiben schneidet, so sieht man die inwendig liegende graue Substanz auf dem Querschnitte an

F. Gall und K. Spurzheim, Anatomie und Physiologie des Nervensystems Allgemeinens und des Gehirns insbesondere. Paris 1810. T. I. p. 119.

den meisten Stellen ungefähr die Figur  von zwei Hörnern,

durch einen Querschnitt (die graue Commissur) untereinander verbunden sind (die eine senkrechte Linie, die nicht ganz bis an den Querschnitt stellt die vordere Rückenmarksspalte, die 2te senkrechte Linie, die ganz an den Querschnitt geht, die hintere Rückenmarksspalte vor). Doch ist die Form nicht überall dieselbe. An einigen Stellen nähern sich die beiden

Wurzeln so sehr, daß sie einem  ähnlich werden, an sehr vielen

Stellen ist die Figur ungefähr so  gestaltet, daß der Querschnitt an den vorderen Hörnern der Wurzeln liegt. Mit einem Worte, die graue Substanz an jeder Hälfte des Rückenmarks hat 2 Hörner, ein vorderes und ein hinteres, die unter einander durch die graue Commissur verbunden werden. An den meisten Stellen sind die vorderen Hörner kürzer, aber dicker als die hinteren, und zuweilen sogar zweigespaltig. Jeder Lappen der grauen Substanz kommt derjenigen Stelle der äußeren Oberfläche des Rückenmarks vorzüglich nahe, wo die vorderen und hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven entspringen. Diese Stelle liegt vorn der Rückenmarksspalte näher als hinten, und die Rückenmarkswurzeln treten auch vorn näher an der Spalte aus dem Rückenmark hervor, als hinten. Es gelingt zuweilen, wie ich selbst bezeugen kann, die Spuren der Nervenwurzeln bis zur grauen Substanz zu verfolgen (Rolando ¹⁾ und Bellingeri ²⁾ haben über die Gestalt, die die graue Substanz an verschiedenen Stellen des Rückenmarks der Menschen und der Thiere sehr specielle Untersuchungen angestellt, und die auf den vielen gemachten Querschnitten befindliche Figur abbilden lassen.

Am oberen Theile des Halses liegt dicht neben der hinteren Rückenmarksspalte auf jeder Seite ein schmales Bündel, welches sich durch seine sehr weiße Farbe und Erhabenheit auszeichnet, und durch eine Furche begrenzt wird. Es begleitet diese Spalte ein Stück abwärts, wird ab dann schwerer unterscheidbar, und verschwindet endlich ganz. Es ist also nicht durch eine so deutliche Spalte, in welche ein Fortsatz der weichen Rückenmarkshaut dränge, von dem Seitentheile des Rückenmarks getrennt. Rolando nennt diese schmalen Bündel die hinteren Pyramiden des Rückenmarks. Er läugnet, daß es vorn neben der vorderen Spalte auch 2 solche Bündel und 2 Furchen gebe, was früher Chauffier u

¹⁾ L. Rolando, Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale. figure. Art. tratto dal Dizionario periodico di Medicina. Torino 1824. p. 55.

²⁾ C. F. Bellingeri, De medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus. Augusti Taurinorum 1823. 4. p. 6.

neuerlich Burdach behauptet haben. Sömmerring glaubte zu beiden Seiten des Rückenmarks, zwischen den vorderen und hinteren Wurzeln der Nerven, eine der Länge nach laufende Spalte gesehen zu haben. Allein sie ist, wie Gall und Chauffier gezeigt haben, nicht wirklich vorhanden. Ein Eindruck, von welchem das Ligamentum denticulatum anfängt, veranlaßt nur diesen Schein.

Man sieht leicht ein, daß, wenn man die am meisten vorspringenden Spitzen der 2 halbmondförmigen Lappen der grauen Substanz des Rückenmarks als die Gränzen gewisser Hauptabtheilungen der weißen Substanz, welche die graue Substanz umgiebt, ansehen will, man 6 weiße Abtheilungen am Rückenmarke unterscheiden könne, 2 kleine vordere zwischen der vorderen Rückenmarkspalte und den Hörnern der Halbmonde, 2 hintere, zwischen der hinteren Rückenmarkspalte und den Hörnern der Halbmonde, und endlich 2 größte mittlere Abtheilungen zwischen den genannten Bündeln an der Seite des Rückenmarks, am concaven Rande der Halbmonde gelegenen. In der That kommt hiermit auch die Eintheilung des Rückenmarks, welche Bellingeri gegeben hat, ziemlich überein. Er hat auch Spalten gezeichnet, welche oft auf diese hervorstreichendsten Spitzen der grauen Substanz gerichtet wären, die ich aber nicht gefunden habe. Burdach rechnet zu diesen 6 Bündeln noch die erwähnten 2 sehr kleinen Bündel an der hinteren, und 2 andere sehr kleine an der vorderen Rückenmarkspalte hinzu.

Rolando unterscheidet am oberen Theile des Rückenmarks 2 vordere Bündel, 2 hintere Bündel, und an diesen dicht an der hinteren Rückenmarkspalte 2 kleine pyramidale Bündel.

Dieserjenigen, welche angenommen haben, daß die 4 Reihen von Nervenwurzeln auf der Mitte einer Abtheilung des Rückenmarks entspringen, zählen natürlich 4 Abtheilungen des Rückenmarks. Indessen hat diese Meinung wenig für sich, denn am verlängerten Marke kommen die entspringenden Nerven nicht aus der Mitte der daselbst unterscheidbaren 6 Bündel, sondern an den Furchen hervor, welche dieselben trennen.

Zwischen der grauen und der weißen Commissur des Rückenmarks befindet sich bei dem menschlichen Embryo ein Canal, der nicht selten auch bei Erwachsenen noch angetroffen wird, und den ich an den Durchschnitten des erhärteten Rückenmarks wiederholt deutlich gesehen habe. Carus ¹⁾ fand ihn bei Neugeborenen deutlich, und bei Embryonen ist er desto größer, je jünger sie sind. Bei den Säugethieren, nach Meckel ²⁾, und bei allen andern Classen der Wirbelthiere, nach Carus, fin-

¹⁾ C. G. Carus, Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns etc. Leipzig 1814. 4. p. 129.

²⁾ J. F. Meckel d. j., Archiv d. Physiol. B. I. p. 336.

bet er sich das ganze Leben hindurch. Er ist für das Rückenmark ~~streitig~~ ~~dasselbe~~, was die Ventrikel für das Gehirn sind ¹⁾. In der ~~Th~~ erweitert er sich auch bei den Vögeln in der unteren Anschwellung des Rückenmarks in einen ziemlich ansehnlichen, mit Wasser gefüllten Ventrikel. Daß er sich beim Menschen mit dem Wachstume so sehr verengt und bei Erwachsenen meistens unsichtbar wird, ist eine Erscheinung, die außer dem Menschen vielleicht nur noch dem Affen zukommt ²⁾.

Das Rückenmark ist frühzeitig bei den Embryonen schon sehr dick und unterscheidet sich bei den kleinen Embryonen, wie man sie im bebrüteten Eie beobachten kann, nur wenig von dem Gehirn. Nach J. F. Meckel ³⁾ und Tiedemann ⁴⁾ besteht das Rückenmark bei sehr kleinen menschlichen Embryonen aus 2 rinnensförmig gebogenen langen Markstreifen, welche vorn schwach, hinten vielleicht gar nicht unter einander zusammenhängen. Diese vom Rückenmarke gebildete lange, mit Flüssigkeit gefüllte Rinne, wird dadurch zu einem geschlossenen Canale, daß die Haut, welche sie umgibt, die Öffnung an ihrer hinteren Seite verschließt. So lange die graue Substanz im Centro des Rückenmarks noch nicht sehr ausgebildet ist, sondern das Rückenmark auf seinem Querschnitte wie eine gebogene Markplatte erscheint, giebt es noch keine vordere und hintere Rückenmarkspalte. Die vordere Rückenmarkspalte, welche das ganze Leben hindurch die weitere ist, entsteht früher als die hintere, wie es scheint durch eine Art von Einbeugung jener Lamelle nach innen.

Was den inneren Bau der Markwände des Rückenmarks betrifft, so ist es gewiß, daß die weiße Substanz größtentheils aus unter einander verflochtenen, der Länge nach laufenden Fasern besteht, zwischen welchen hier und da häutige Verlängerungen der weichen Rückenmarkshaut hineingehen. An einigen Stellen an der weißen Commissur und an den Wänden der hinteren Rückenmarkspalte finden sich auch Quersfasern. Alle diese Fasern sind nicht in continuirlichen häutigen Scheiden eingeschlossen, und weil sie sehr weich sind, so kann man sich am besten vor

¹⁾ Die Geschichte der Entdeckung dieses Canals haben Gall, Carné und Almas gegeben. Er wurde zuerst von C. Stephani (de dissectione partium, Lib. III p. 337.) beim Erwachsenen gefunden, und von Columbus, Viccolomini, Bauhinus, Malpighi, Morgagni und Portal bestätigt. Burdach sah ihn wiederholt im Leichname der Erwachsenen in den Hals- und oberen Brustwirbels. Gal behauptete, es wäre ein doppelter Canal vorhanden, was durch die Beobachtungen Kahrer nicht bestätigt wird.

²⁾ F. Tiedemann, Icones celebri simiarum et quorundam animalium rariorum Heidelbergae 1821. Fol. c. tab. aen. p. 9. F. Almas, de evolutione et vita encephali. Pestini 1823. 8. §. 20. p. 36.

³⁾ J. F. Meckel, a. a. O. 35. sq. 43. sq. 341.

⁴⁾ F. Tiedemann, a. a. O. 12. 17.

ihre Lage am Rückenmarke überzeugen, das durch Weingeist, oder durch eine Auflösung von salzsaurem wasserfreien Kalk in Weingeist erhärtet ist. Hiermit stimmen auch Keuffels unter Reils Leitung gemachte Beobachtungen überein, und Oliviers Schlüsse, daß es keine Längensfasern geben könne, weil die ins Rückenmark eindringenden häutigen Fortsätze der weichen Hirnhaut keine Scheiden für die Fasern, sondern ein Netzwerk bilden, reichen nicht hin, die Existenz der Längensfasern zweifelhaft zu machen, die ich am erhärteten Rückenmarke oft genug deutlich gesehen und abgezogen habe.

Rachetti ¹⁾ und Rolando ²⁾ haben aber noch auf eine besondere Einrichtung, die unsere Beachtung verdient, aufmerksam gemacht. Rachetti bemerkte nämlich, daß die weiße Substanz durch graue, vom inneren Centrum nach außen gehende Linien in Lamellen getheilt werde. Rolando bemerkte dieses auch, und sah, daß, wenn man das Rückenmark auf eine gewisse Weise vorbereite, die Marksubstanz desselben (vornehmlich deutlich die vordere) aus einer gefalteten Markhaut bestünde, deren umgeschlagene Ränder abwechselnd an dem Centrum und an der Peripherie lägen und die längs des Rückenmarks verliefen. Zwischen die Matten dieser Falten treten von außen dünne Fortsätze der Pia mater, von innen dünne Lagen der grauen Substanz. Die weiße vordere Commissur bestünde nur aus der von der einen Seite zur andern sich fortsetzenden Markhaut. In der hinteren Spalte finde kein solcher Uebergang der Markhaut von der einen Seite zur andern Statt, und die Markhaut sei daher als ein gefaltetes Blatt zu betrachten, dessen Ränder nach hinten ungerollt wären. Er zeigte diesen Bau auf dem mit einem scharfen Rasirmesser gemachten Querschnitte eines Stückes Rückenmark, das er lange Zeit hatte in einer Salzauflösung liegen, und dann 15 bis 20 Tage in Wasser maceriren lassen. Diese Beobachtungen, welche auch, um den Bau sowohl des Rückenmarks als des Gehirns aufzuklären, sehr wichtig sein würden, bedürfen jedoch noch sehr der Bestätigung.

Bei einem neugeborenen Kinde, dessen Rückenmark ich in frischem Zustande in viele Lamellen zerschnitt, fand ich, daß sich die hinteren weißen Bündel durch ihre weiße Farbe und Festigkeit sehr vor allen andern Theilen des Rückenmarks auszeichneten. Die mittlere graue Substanz nahm einen sehr großen Umfang ein, und ging an der Stelle, wo Bellingeri die hintere Seitenspalte annimmt, meistens bis an die Oberfläche. Die übrige Substanz war in der Nähe der Oberfläche grau, und nur da, wo sie an die mittlere graue Substanz gränzte, weiß. Daher sah man hier eine weiße, zwischen der mittleren und der an der Oberfläche gelegenen grauen Substanz laufende Linie, deren Fortsetzung die vordere Commissur bildete. An dem hinteren sehr weißen Bündel unterschied man dicht neben der Mittelspalte die 2 kleinen eben so weißen Bündel, die man mit Rolando's Pyramiden nennen kann. In einigen Stellen glaubte ich zu bemerken, daß die Substanz, welche später den vorderen Theil des Rückenmarks bildet, und

¹⁾ Rachetti, Della struttura, delle funzioni e delle malattie della midolla spinale. Milano 1816. 8. p. 156.

²⁾ Rolando, Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale, con figure. Torino 1824. 8. p. 64. sq. Tav. III.

die hier noch grau war, aus Falten bestand, die von der Oberfläche nach ripherie zugekehrt waren.

Ursprung der Rückenmarksnerven.

Vom Rückenmarke entspringen 30 bis 31 Nervenpaare, nämlich Halsnervenpaare, *nervi cervicales*, wovon das 1ste zwischen Hinterhaupte und dem 1sten Halswirbel, das 8te zwischen dem 7ten Wirbel und dem 1sten Rückenwirbel hervortritt, 12 Rückennerve, *nervi dorsales*, von denen das 12te zwischen dem 12ten Brust- und dem 1sten Lendenwirbel, 5 Lendennerven, *nervi lumbales*, von denen das letzte zwischen dem 5ten Lendenwirbel und dem 1sten Kreuzwirbel, und 5 Kreuznerven und 1 Schwanzbeinnerv, *nervi sacrales et coccygeus*, von denen die 2 letzten durch die Oeffnung des Wirbelcanals zwischen dem Kreuz- und Schwanzbeine hervortreten. Die Rückenmarksnerven, mit Ausnahme des letzten oder der 2 letzten, und des 1sten, entspringen mit 2 Wurzeln, einer vorderen und einer hinteren, von der vorderen und hinteren Hälfte des Rückenmarks, während die Gehirnnerven nicht mit 2 von entgegengesetzten Seiten entspringenden Wurzeln ihren Anfang nehmen. Am unteren Ende des Rückenmarks entspringen die Rückenmarksnerven so dicht an einander, daß keine Zwischenräume zwischen ihren Wurzeln bemerkt werden können. In den mittleren Rückenwirbeln sind die Zwischenräume zwischen den Nerven am größten. Ganz oben gehen sie mehr quer zu ihren Intervertebellöchern; je mehr sie nach abwärts liegen, einen desto spitzigeren Winkel bilden sie mit dem Rückenmarke, und desto länger verlaufen sie in den Intersegmentalcanalen und im Sacke der Dura mater, ehe sich ihre Wurzeln vereinigen. Kein einziger Rückenmarksnerv hat, wie das bei vielen Gehirnnerven der Fall ist, eine Richtung nach vorn und oben. Alle Rückenmarksnerven, welche mit hinteren und vorderen Wurzeln entspringen, haben an ihrer hinteren Wurzel einen länglichen, harten, grauen Spinalganglion, *ganglion spinale*, das bei den meisten Nerven im Intervertebrallöcher durch die Intersegmentalcanäle liegt. Nur bei den Kreuznerven liegt es noch innerhalb des Wirbelcanals, bei allen aber befindet es sich in einer canalförmigen Verlängerung der Dura mater. Die vordere Wurzel läuft in einer Rinne des Spinalganglion hin, ist an ihm angeschlossen, vermischt sich aber, wie Hase und Prochaska zuerst bewiesen, erst am äußeren Ende desselben mit dessen Fäden; von hier an geht auch der Nerv erst eine äußere dicht anliegende Scheide, die theils die Fortsetzung der fibrösen Dura mater, theils von zelliger Beschaffenheit ist, dahingegen die einzelnen Fäden ihr Neurilem schon an der Oberfläche des Rückenmarks von der Pia mater bekommen. Die G

spinalia der dickeren Nerven, die zu den Brust- und Bauchgliedern gelangen, sind größer als die der dünnern. An den mit einfachen Wurzeln entspringenden Nerven sind sie nicht deutlich, oder fehlen ganz. Die Zahl der Bündel der Wurzeln ist auf beiden Seiten und bei verschiedenen Menschen nicht dieselbe. Die hinteren Wurzeln kommen auch ziemlich in einer Linie aus dem Rückenmarke hervor. Bellingeri glaubt sie auf den Querschnitten des Rückenmarks, das er in verdünnter Salpetersäure erhärtet ließ, bis an die hinteren Hörner der grauen Substanz verfolgt zu haben. Die vorderen Wurzeln haben dünne Fäden, die nicht so in einer Linie liegen, sondern bald mehr nach vorn und bald mehr nach hinten hervorkommen. Unter der Pia mater spalten sich alle Wurzeln in sehr feine Fäden. Auf dem Querschnitte des Rückenmarks sieht man hier und da weiße Linien, welche eine solche Richtung nach der Äre haben, als wären sie die in das Innere eindringenden Wurzeln. Jede Wurzel nähert sich nach und nach der andern, doch geht jede durch eine besondere Oeffnung der harten Rückenmarkshaut heraus. Die hinteren Wurzeln haben, wie Willis und neuerlich Ratchetti bemerkt, und Gall sehr schön abbildet, an der Hals- und Lendenanschwellung dickere Fäden, und entspringen ebendasselbst entfernter von der Mittelspalte, als die vorderen Wurzeln.

Bellingeri behauptet, die hinteren (mit Ganglien versehenen) Wurzeln der Rückenmarksnerven hätten einen dreifachen Ursprung, 1) von den hinteren Hörnern der grauen Substanz, 2) von der weißen Substanz der hinteren Bündel (diese wären nicht so groß), 3) von den Seitenbündeln des Rückenmarks (diese wären meistens sehr voluminös, und trügen allein nur zur Bildung der Spinalganglien bei).

Die vorderen Wurzeln hätten auch einen dreifachen Ursprung: 1) von den vorderen Bündeln, 2) von den Seiteneinschnitten, 3) von den Seitenbündeln des Rückenmarks. Es sei zweifelhaft, ob sie zur grauen Substanz dringen. Diese Symmetrie des dreifachen Ursprungs der vorderen und hinteren Wurzeln hat aber nicht viel für sich, denn die hinteren Wurzeln kommen, wie schon bemerkt worden, mehr in einer Reihe aus dem Rückenmarke hervor, und unterhalb der Pia mater ist die Verfolgung der Wurzeln äußerst schwer. Kolando glaubt zwar auch, daß die Wurzeln in die Tiefe dringen, aber zwischen den Falten, welche das weiße Markblatt macht, aus welchem nach ihm die weiße Substanz des Rückenmarks besteht. Daher glaubt er auch nicht, daß die Wurzeln bis zur grauen Substanz drängen.

Das Gehirn, cerebrum.

Das Gehirn läßt sich, nach dem Ansehen seiner Oberfläche, in 3 Abtheilungen theilen:

1) in das große Gehirn, cerebrum, das sich durch gewundene, $\frac{1}{2}$ bis über einen ganzen Zoll tiefe Furchen auszeichnet, zwischen welchen breite, darmähnlich gewundene Windungen, gyri, liegen, die an beiden Hälften des Gehirns und bei verschiedenen Menschen nicht dieselben sind. Die ganze Oberfläche desselben ist mit einer 1 Linie bis $1\frac{1}{2}$ Linien dicken Lage grauer Substanz, substantia corticalis, überzogen;

2) in das kleine Gehirn, cerebellum, das durch viele tiefe quere Einschnitte in Lappen getheilt wird, die selbst wieder durch weniger tiefe Einschnitte in eine Menge schmaler, querer, ziemlich paralleler Bindungen getheilt werden. Auch die Oberfläche des kleinen Gehirns wird von einer $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Linie dicken Lage grauer Substanz überzogen. Bei dem großen und kleinen Gehirne scheinen diese Furchen und Bindungen dazu zu dienen, eine recht große Oberfläche zu bilden, an welcher sich recht viele Fasern der weißen Substanz des Gehirns endigen, und in der sich die Blutgefäße der Pia mater verteilen können. Das kleine Gehirn liegt unter dem hinteren Theile des großen Gehirns, mit dem es durch die Vierhügel in Verbindung steht;

3) in den Verbindungstheil, durch den das Rückenmark mit dem großen und kleinen Gehirne, und diese beiden unter sich vereinigt werden, und von welchem fast alle Gehirnnerven entspringen. Er hat keine Bindungen, und besteht theils aus weißen Fasern, theils aus eingestreuter grauer Substanz. Auch schließt er in seiner Substanz keine Höhle ein.

Das ganze Gehirn ist ein Oval, das vorn etwas schmaler als hinten, beträchtlich weniger hoch als breit, und also von unten nach aufwärts zusammengedrückt ist. Eine an manchen Stellen fast 2 Zoll tiefe obere Spalte theilt das große Gehirn von obenher und von vorn, das kleine von hintenher und von unten in 2 Seitenhälften, zwischen welchen die senkrechte Falte der harten Hirnhaut, falx cerebri und falx cerebelli aufgenommen wird. Eine noch viel breitere, horizontale, vom tentorium cerebelli ausgefüllte Spalte, die sich hinten und unten mit der vorigen kreuzt, trennt das große Gehirn vom kleinen. Das große Gehirn ist an seiner unteren und auf seiner äußeren Seite selbst durch einen queren Einschnitt, der sich in die Furchen zwischen den Bindungen fortsetzt (fossa Sylvii), in einen vorderen und in einen großen hinteren Lappen getheilt. Oben sind beide Lappen vollkommen un-tereinander verschmolzen.

Die untere Oberfläche des Gehirns paßt in die auf der Grundfläche des Schädels befindlichen Erhabenheiten und Vertiefungen, und die am höchsten gelegene Schädelgrube nimmt den vorderen Lappen des großen Gehirns auf, der am wenigsten nach unten hervorragt, die tiefen Seitentheile der mittleren Schädelgrube nehmen das sehr weit herabragende vordere Ende des hinteren Hirnlappens jeder Seite auf, und der vom kleinen Flügel gebildete scharfe Vorsprung, der noch durch eine Falte der Dura mater vergrößert wird, die eine Fortsetzung des Tentorium cerebelli ist, legt sich in die erwähnte Querfläche, fossa Sylvii, zwischen diese 2 Hirnlappen hinein. Das kleine Gehirn liegt in

der hinteren Schädelgrube unter dem Tentorium verborgen, vor ihm steigt aus dem Hinterhauptloche an dem Mittelstücke des unpaaren Os basilare der unpaare Verbindungstheil herauf und erstreckt sich bis auf den Türkenattel hinauf.

Das Gehirn von oben angesehen. Man sieht in dieser Stellung von dem kleinen Gehirne gar nichts, denn es wird bei dem Menschen von dem hinteren Theile des großen Gehirns ganz bedeckt, und ragt hinten gar nicht hervor. Eine tiefe Längenfurche, in welche der sichelförmige Fortsatz der harten Hirnhaut tritt, theilt das Oval in 2 ziemlich gleich große Hälften, die man, so weit sie in dem großen Gehirne gehören, Halbkugeln, *hemisphaerium dextrum* und *sinistrum* nennt. Die Furchen, die an manchen Stellen fast einen Zoll tief sind, und die zwischen 2 Furchen gelegenen $\frac{1}{2}$ bis $\frac{1}{2}$ Zoll breiten Wülste oder Bindungen, *gyri*, haben an dieser äußeren Oberfläche einige Nehtlichkeit mit den Falten eines gefalteten Tuchs. Sie sind keineswegs auf den beiden Hälften symmetrisch. Die Abweichungen in der Gestalt und Zahl dieser Furchen von der Symmetrie sind, nach Wenzel, bei dem Menschen viel größer als bei den Thieren.

Beugt man die 2 Hälften des großen Gehirns auseinander, so sieht man in der Tiefe der Furchen eine sehr breite und weiße Markbinde, *corpus callosum*, quer aus der einen Hälfte in die andere gehen. Sie nimmt bei weitem nicht die ganze Länge der Furchen, sondern nur etwa die Hälfte derselben ein, und liegt auch nicht genau in der Mitte, sondern etwas mehr nach vorn als nach hinten. Ihre obere Oberfläche ist gewölbt, zeigt viele Querstreifen wegen des queren Verlaufs der Markfasern, und einen in der Mittellinie gelegenen Längsstreifen. Hinten hört die Binde mit einem dicken freien Rande auf, unter welchem man in die Hirnhöhlen eindringen kann; vorn beugt sie sich knieförmig nach abwärts, läßt keine Öffnung übrig, durch die man in die Hirnhöhlen eindringen könnte, sondern setzt sich mit einer grauen Platte in Verbindung, welche auf der Grundfläche des Gehirns beide Seitenhälften des Gehirns unter einander vereinigt. An der Stelle, wo diese Markbinde aus den 2 Hemisphären hervorkommt, hören die Bindungen und Furchen auf. Denn es befindet sich dicht über der Binde eine Spalte, in welcher die graue Substanz der Bindungen an die weiße innere Substanz des Gehirns grenzt.

Das Gehirn von seiner äußeren Seite angesehen. Man sieht, daß der Umriss der uns zugewendeten Hälfte des großen Gehirns ungefähr die Gestalt eines halben Ovals hat, und daß unter dem hinteren Theile desselben das kleine Gehirn liegt, welches durch die tiefe Quersfurche, die das Tentorium cerebelli aufnimmt, vom großen Gehirne getrennt ist, sich durch seine schmalen, nicht so gewundenen Furchen und Wülste sehr von dem großen Gehirne unterscheidet, und daß es von hier aus gesehen sehr niedrig erscheint, so daß sein Umkreis etwa nur $\frac{1}{2}$, oder $\frac{1}{3}$ oder nicht einmal so viel von dem hier sichtbaren Umkreise des großen Gehirns ausmacht. Vorn und unten bemerkt man am großen Gehirne einen Einschnitt, die *fossa Sylvii*, welcher von der Grundfläche aus schief nach hinten und oben emporsteigt, und den sehr hochliegenden und kleinen vorderen Hirnlappen von dem tiefer herabreichenden und größeren hinteren Hirnlappen scheidet. Die Seite des hinteren Hirnlappens, welche über dem kleinen Gehirne liegt, ist concav. Das vordere Ende dieses Lappens ragt etwas nach unten hervor, weniger das hintere Ende. Vor dem kleinen Gehirne steigt der Verbindungstheil fast senkrecht gegen die Mitte des großen Gehirns empor.

Das Gehirn von unten angesehen. Es stellen sich uns hier 3 Paar Erhabenheiten dar, nämlich die durch die mittlere Längenspalte getrennten vorderen Hirnlappen, welche am wenigsten hervorragen, ferner die stärker hervorragenden und weiter von einander abstehenden vorderen Spigen der hinteren Hirnlappen (welche von manchen Anatomen mittlere Hirnlappen genannt werden), endlich die am allermeisten hervorragenden, näher an einander liegenden Seitenhälften des kleinen Gehirns, welche hinten und unten durch eine tiefe Furche von einander getrennt sind. In der zwischen diesen Erhabenheiten übrig bleibenden vertieftesten Stelle, welche zwischen den genannten mittleren Erhabenheiten am breitesten und tiefsten ist, liegt der Verbindungstheil, welcher das Rückenmark mit dem kleinen und großen Gehirne in Verbindung setzt, namentlich unten das verlängerte Mark, über ihm und

vor ihm die Brücke, vor ihr und über ihr die 2 auseinander weichenden, durch eine Furche geschiedenen, durch graue Substanz vereinigten Hirnschenkel, vor ihnen endlich der die beiden Halbkugeln des großen Gehirns unter einander verbindende graue Hügel mit den 2 Markkugeln, dem Trichter, dem Hirnanhange, der Vereinigung der Sehnerven und der vor der Vereinigung der Sehnerven gelegenen, zum Balken übergehenden grauen Platte.

Hebt man das kleine Gehirn möglichst in die Höhe, schlägt es vorwärts, und sieht dann zwischen ihm und dem hinteren Lappen des großen Gehirns hinein, so sieht man zwischen den Hälften des großen Gehirns den hinteren Rand des Balkens, dann, näher nach dem kleinen Gehirne zu, die obere Seite des Verbindungstheiles, an welcher die Vierhügel in die Augen fallen. Man überzeugt sich, daß hier dieser Verbindungstheil, der das kleine Gehirn und das Rückenmark mit dem großen Gehirne in Verbindung bringt, einen sehr kleinen Umfang hat. Zwischen diesem Verbindungstheile und dem hinteren Rande des Balkens hängt an einem an den Sehhügeln befestigten Markbogen die Zirbeldrüse, die auf der Vierhügeln aufsteigt, und zwischen ihr und neben ihr ist die von Häuten bedeckte und verschlossene große Oeffnung der Hirnventrikel, die seitwärts an den Hirnschenkel herum bis auf die Grundfläche des Gehirns herabgeht. Nicht man das verlängerte Mark vorwärts, so erkennt man zwischen ihm und dem über ihm liegenden kleinen Gehirne die Oeffnung der Hirnhöhle des kleinen Gehirns oder der 4ten Hirnhöhle, welche zwischen dem Verbindungstheile und dem kleinen Gehirne liegt.

Das Gehirn von seiner mittleren senkrechten Durchschnittsfläche betrachtet, nach Wegnahme des Bogens und der Scheidewand. Man sieht von der glatten, den Hirnhöhlen zugekehrten Oberfläche des Gehirns nur sehr wenig, weil sich die Hirnwindungen hinten herum und unten herum biegen, und sie dadurch zum Theil verdecken.

In der Mitte (jedoch etwas näher nach unten) sieht man 2 glatte, unter einander verschmolzene Hügel, den weißen Sehhügel und den grauen gestreuten Körper. In den Sehhügel pflanzt sich von unten her der Verbindungstheil ein.

Der Umfang der Stellen, durch welche beide Hälften des Gehirns unter einander zusammenhängen, ist sehr klein. Das hier durchschnittene Corpus callosum (der Balken), ferner die vordere, die hintere Commissur und der Bogen der Glandula pinealis sind die vorzüglichsten weißen Verbindungen des großen Gehirns. Die graue Commissur und die graue Platte an der unteren Seite des Gehirns sind die durch die graue Substanz bewirkten Verbindungen beider Hälften des großen Gehirns. Das Mittelstück des kleinen Gehirns ist der einzige Hirnhügel, wo die aus einer grauen und aus einer weißen Lage bestehenden Windungen sich von einer Seitenhälfte zur anderen begeben. Der Verbindungstheil (die Vierhügel, die Hirnschenkel, die Brücke und das verlängerte Mark) hängen durchgängig in fast allen Punkten ihrer mittleren Ebene zusammen.

Beugt man die gegen die genannten Hügel herumgebogenen Hirnwindungen zurück, so macht man den großen Seitenventrikel des großen Gehirns sichtbar, der die 2 genannten Hügel als eine Vertiefung fast rings herum umgibt, so daß hier die nach innen gekehrte glatte Oberfläche des großen Gehirns sichtbar wird. Die genannten Hügel ragen also in dieser Vertiefung wie ein Berg hervor, und in diesem Berg pflanzt sich der Verbindungstheil ungefähr wie der Stiel in den Hut eines Pilzes ein. An der den Seitenventrikel bildenden Vertiefung unterscheidet man ein vorderes, oberes und ein unteres Ende oder Horn, denn die Vertiefung ist nicht völlig ringförmig. Hinten geht eine Verlängerung der Vertiefung in den hinteren Lappen des großen Gehirns ziemlich tief hinein, die man das hintere Horn nennt.

Der Verbindungstheil des Gehirns und Rückenmarks.

Der Verbindungstheil hat, wie aus dem Vorigen erhellt, 3 Theile, medulla oblongata, pons Varolii, corpora quadrigemina crura cerebri und tuber cinereum.

Die *Medulla oblongata*, das verlängerte Mark, die Fortsetzung des Rückenmarkes innerhalb des Schädels, hat noch ziemlich die Form des Rückenmarkes. Es besitzt eine vordere und eine hintere Spalte, aber im Innern nicht jene weiße und jene graue Commissur. Es schwillt nach oben zu an und ist an seiner Oberfläche deutlich in 6 aus Längenschnitten bestehende Erhabenheiten getheilt, die aber nach innen zu so genau unter einander zusammenhängen, daß man daselbst schwer die Grenzen zwischen ihnen bestimmen kann, nämlich 1) in zwei hintere, *corpora restiformia*, die zu beiden Seiten der hinteren Spalte liegen, welche sich hier dadurch erweitert, daß die *Corpora restiformia* auseinander weichen und in das kleine Gehirn treten. Dicht an der hinteren Spalte zeichnet sich an diesen Erhabenheiten selbst wieder ein hervorspringendes, sehr weißes, schmales Bündel aus, welches man die hintere Pyramide genannt hat; 2) in zwei mittlere, und 3) in zwei vordere Bündel, die zu dem großen Gehirne in die Höhe steigen. Die zwei mittleren schließen zwischen ihren Fasern zwei sehr längliche, ovale, an der Seite liegende Hügel, die in ihrer Mitte einen von einer gezackten graugelblichen Schicht umgebenen Kern haben, die Oliven, *corpora olivaria*, ein. Von diesen Erhabenheiten gehen Bündel zu den Gehirnhügeln und zu dem großen Gehirne, welche Keil die Schleife genannt hat. Die zwei vorderen Bündel sind die vorderen Pyramiden, *corpora pyramidalia*, welche neben der vorderen Spalte liegen, und sich in die Hirnschenkel fortsetzen.

Pons Varolii, die Brücke oder der Hirnknoten, *protuberantia annularis*, ist eine ungefähr einen Zoll breite Binde, welche aus dicken Quersfasern bestehet, die aus der einen Seitenhälfte des kleinen Gehirns hervorkommen und bogenförmig zu der anderen Seitenhälfte übergehen, zwischen welchen und hinter welchen die fortgesetzten Längensfasern des verlängerten Markes zu dem großen Gehirne emporsteigen. Die Quersfasern der Brücke legen sich mit ihrer gewölbten Seite unter und unter dem *Processus clinoides posterior* an, und schließen mit dem kleinen Gehirne zusammen einen Ring, durch welchen die Fortsetzung der Pyramiden und Oliven zum großen Gehirne in die Höhe steigen. Zum Theil durchkreuzen und durchflechten sich die innern Quersfasern der Brücke und die Längensfasern der Pyramiden, und in die Zwischenräume zwischen den zum Theil auseinander weichenden Fasern ist graue Substanz eingestreuet. An ihrer vorderen Seite hat die Brücke einen Eindruck, in welchem die *Arteria basilaris* liegt. Da die Brücke, obfi der ihren hohlen Bogen ausfüllenden Fortsetzung der Oliven, sich in die Spalte in dem unteren und vorderen Theile des Mittelstücks des kleinen Gehirns anlegt, ohne daselbst angewachsen zu sein, so wird diese

Spalte dadurch in eine ziemlich verschlossene Höhle, in die 4te Hirnhöhle, verwandelt, die zwischen den 2 Corporibus restiformibus und dem Mittelstücke des kleinen Gehirns ihren Eingang hat. Diese Öffnung wird jedoch durch die (wenigstens beim Embryo, zuweilen auch bei Erwachsenen) von einer Lamelle grauer Substanz überzogene Pia mater verschlossen. Neben ihr zu beiden Seiten, über dem Nervus vagus und glossopharyngeus, befindet sich ein Plexus choroides, d. h. ein aus einem vielfach zusammengefalteten Theile der Pia mater und gewundenen Blutgefäßen, vorzüglich Venen, bestehender weicher Klumpen, über dessen Nutzen man noch nichts weiß. Auf dem von der Brücke gebildeten Boden der 4ten Hirnhöhle sind einige weiße und graue quere Streifen sichtbar.

Crura oder pedunculi cerebri, Hirnschenkel. Nachdem die verschmolzene Fortsetzung der Pyramiden durch den von den Querfasern der Brücke und dem kleinen Gehirne gebildeten Ring durchgegangen ist, kommen sie oben und vorn in der Gestalt zweier viel dickerer, aus etwas schief gemachten Längensfasern bestehender, allmählig auseinander weichender Bündel zum Vorschein, die zu dem großen Gehirne in die Höhe steigen, indem jedes in die platte Oberfläche, die sich beide Hemisphären des großen Gehirns einander zuehren, eindringt. Sie sind unten durch eine Furchung geschieden, die sich nach vorn erweitert, in welcher graue Substanz liegt, durch welche beide Hirnschenkel unter einander verbunden sind. In ihrem Inneren befindet sich ein wenig schwärzlich-graue Substanz. In ihrer oberen und zugleich nach hinten gekehrten Seite sind sie mit einander und mit den Vierhügeln verschmolzen. Nur ein zwischen ihnen und den Vierhügeln aus der 4ten in die 3te Hirnhöhle emporsteigender Canal giebt die Grenze zwischen ihnen und den Vierhügeln an.

Corpora quadrigemina, die Vierhügel, ragen an der hinteren und oberen Oberfläche der Hirnschenkel nach hinten in die Höhe. Man sieht sie, wenn man die hinteren Lappen des großen Gehirns in die Höhe hebt, das Tentorium cerebelli entfernt, und in die zwischen dem großen Gehirne und dem kleinen Gehirne befindliche Durchspalte hineinsieht. Man sieht nämlich dann vorn aus der oberen Hälfte des Mittelstücks des kleinen Gehirns 2 weiße, durch eine dünne Gehirn-lamelle (valvula cerebelli) verbundene, neben einander liegende weißliche Markschenkel hervorkommen, und in die vier, paarweise gelegenen, von einander durch eine kreuzförmige Vertiefung geschiedenen Hügel übergehen, welche selbst wieder zu beiden Seiten mit dem rechten und mit dem linken Sehhügel zusammenhängen. Seitwärts an der Stelle, wo dieser Zusammenhang bewirkt wird, befindet sich ein kleines graues Hügelchen, welches mit dem Sehnerven sehr genau zusammenhängt, das Corpu-

niculatum internum, der knieförmige Körper. Die Vierhügelmen außer den erwähnten Bündeln des kleinen Gehirns die Fortsetzung der Oliven auf, und vermitteln dadurch die Verbindung des kleinen Gehirns und der vorderen Rückenmarksbündel mit dem großen. Die 2 hinteren Hügel heißen testes, die 2 vorderen nates.

Tuber cinereum. Die 2 Seitenhälften oder Hemisphären des kleinen Gehirns sind nicht nur an ihrer oberen Oberfläche durch eine Spalte, sondern auch größtentheils an ihrer unteren Oberfläche durch eine untere Spalte getrennt. Diese untere Spalte wird aber auf der Innenseite des Gehirns durch die hinzutretenden Hirnschenkel und durch zwischen demselben gelegene graue Substanz verdeckt, vor dem Hirnschenkel aber durch einen über dem Türkensattel liegenden grauen Hügel, Tuber cinereum, geschlossen, an welchem der Trichter, infundibulum, herabhängt, der sich in dem aus 2 Lappen bestehenden Hirnanhang, glandula pituitaria, endigt. An der hinteren Seite des Gehirns bemerkt man 2 runde und weiße Markkugeln, corpora millaria oder candicantia, vor ihnen die Durchkreuzung der Sehnerven, chiasma nervorum opticorum. Da nun die untere Spalte, welche die Hemisphären des großen Gehirns trennt, von allen diesen Seiten von unten her bedeckt und geschlossen wird, so verwandelt sie sich in eine ziemlich geschlossene mittlere Höhle des großen Gehirns, in die 3te Hirnhöhle, deren Boden der Hirnschenkel und das Tuber cinereum ist.

Das große Gehirn.

Corpus callosum, der Balken. Die durch eine Spalte geschiedenen Seitenhälften oder Hemisphären des großen Gehirns werden aber nicht an ihrer unteren Seite durch die Hirnschenkel und durch das Tuber cinereum unter einander verbunden, sondern auch auf dem Boden der tiefen oberen Spalte des großen Gehirns liegt, wie schon gesagt worden, eine aus weißen Quersfasern bestehende dicke Binde, der Balken, die fast aus der Mitte der einen Hemisphäre in die Mitte der andern herübergeht, und von hinten nach vorn ungefähr halb so breit als der Abstand des hintersten Theiles des großen Gehirns vom vordersten beträgt. Der vordere Rand dieser Binde liegt der vorderen Seite der Hemisphären näher, als der hinteren Spitze. Vorn hat diese Binde kein freies Ende, sondern sie beugt sich daselbst unter einem Winkel, den man, nach Keil, das Knie des Balkens nennt, nach hinten, und geht in die vor den Sehnerven liegende graue Substanz über, welche selbst wieder eine Fortsetzung des Tuber cinereum ist. Weil nun die weiße Querbinde, die oben die beiden Seitenhälften des großen Gehirns verbindet, Anatomie. III.

hirns unter einander verbindet, mit der grauen Substanz, welche diese Verbindung der beiden Seitenhälften unten auf der Grundfläche des großen Gehirns bewirkt, ununterbrochen durch die vordere Umbeugung des Balkens zusammenhängt, so ist der Zwischenraum zwischen den Hemisphären nach vorn zu nicht offen, sondern durch das Knie des Balkens geschlossen. Es giebt daher keinen vorderen Eingang in diesen Zwischenraum, den man die Ventrikel des großen Gehirns nennt. Wohl aber ist dieser Zwischenraum nach hinten offen, denn hinten endigt sich der Balken mit einem dicken, etwas umgerollten, freien Rande, der zwar auf den Vierhügeln aufliegt, mit ihnen aber nicht verwachsen ist, so daß sich zwischen dem Balken und den Vierhügeln der große Eingang in die Ventrikel des großen Gehirns befindet, durch den auch Gefäße in dieselben eintreten, oder aus ihnen hervorkommen; der aber übrigen durch die Hirnhäute verschlossen ist.

Thalamus nervi optici, der sogenannte Sehhügel oder das hintere Hirnganglion, und corpus striatum, der gestreifte Körper oder das vordere Hirnganglion. Der größte Theil der platten Oberfläche, die die eine Hemisphäre des großen Gehirns der andern zugehrt, ist wie die äußere, obere und untere Oberfläche des großen Gehirns von braunen Bindungen bedeckt. Nur ein schmaler, zwischen dem Balken und dem Tuberculum cinereum gelegener Fleck ist davon ausgenommen. Er reicht an der rechten und an der linken Hälfte des Gehirns von einem unteren, weißen, ovalen, stärker hervorspringenden Hügel, dem Sehhügel, thalamus nervi optici, und von einem oberen, keulensförmigen, flachen, gebogenen grauen Hügel, dem gestreiften Körper, corpus striatum, gebildet. Dieser letztere Hügel liegt dicht unter dem vorderen Theile des Balkens, und umgiebt mit seinem vorderen keulensförmigen Ende den vorderen Theil des Sehhügels von oben und außen her. Hinten läuft er sich aus, und wird durch eine durchsichtige, etwas aufgeworfene Linie, welche vom Sehhügel geschieden. In den unteren hinteren Theil des Sehhügels jeder Seite tritt der heraussteigende Hirnschenkel, fast wie der Stiel der Frucht, ein. Daher hat er auch den Namen Pedunculus cerebri bekommen. An seiner hinteren Seite treten auch mit ihm die Fasern der Vierhügel mit ein. Alle diese Markbündel spalten sich im thalamus fächerförmig, haben graue Substanz zwischen sich, gehen zum Theil durch das Corpus striatum hindurch, zum Theil unmittelbar strahlenförmig in das Mark der Hemisphäre des Gehirns, bis zu den Bindungen über. Daher wechselt graue und weiße Masse im Thalamus und Corpus striatum ab und giebt ihnen innerlich ein gestreiftes Ansehn. Diese beiden Hügel ragen also an der inneren Seite, welche die eine Gehirnhälfte der andern zugehrt, hervor, und der äußere, etwas nach vorn und oben gelehrt

Hirn.

ist; ferner daß die beiden Seitenventrikel nicht in den 3ten Ventrikel übergehen. Nur die Fornix und den Sehhügeln bleibt Monroi. Die Pia mater, welche längs der Stelle, wo sich der in Falten gelegt, und in Falten und Zotten kraus, geschlängelt zwischen der weichen Hirnhaut den an dem Orte, wo der pleura abkrümmt, liegt in ihm eine Beschaffenheit zu sein scheint, als Monroi. Durch die Monroi'sche Oefnung des 3ten Ventrikels, von welchen in die des Seitenventrikels über.

Foramen, commissura posterior, commissura choroideus. Die innere Seitenfläche jedes Thalamus, wie wir gesehen haben, die Seitenwand des 3ten Ventrikels, die Decke der Fornix und der unter dem Fornix gelegene Plexus choroideus medius ist. Der Plexus choroideus medius liegt nahe an der Oefnung der Ventrikel am hinteren Rande des Corpus callosum an, läuft unter dem Fornix vorwärts und geht durch das Foramen Monroi in 2 Theile getheilt zu jedem Seitenventrikel. Zwischen den 2 Thalamis liegt, wie schon erwähnt worden, etwas Substanz, die dieselben vereinigt, commissura mollis, vor ihnen, dicht vor den vorderen Schenkeln des Fornix, die weiße Commissura anterior, die wie ein Rabenkiel stark und rund ist, und aus dem Corpus striatum der einen Seite in das der andern bringt; hinter dem Thalamis, dicht vor den Vierhügeln, befindet sich die Commissura posterior. Vom oberen Rande der inneren Oberfläche des Thalamus hängt auf jeder Seite ein Pedunculus glandulae pinealis, der mit den Vierhügeln und unter dem hinteren Rande des Balkens mit dem andern in einem Bogen vereinigt, an dem die graue, röthliche Glandula pinealis hängt, die auf den Vierhügeln ruht. In der Mitte an den Pedunculis sind kleine, harte, gelbliche, unorganisirte Massen befindlich, welche man Hirnsand nennt, die man zusammen mit dem Namen Acervulus bezeichnet. Dicht unter der hinteren Commissura öffnet sich der schon erwähnte Gang, aquaeductus Sylvii, welcher aus der 3ten Hirnhöhle in die 4te führt, und unter den Vierhügeln über dem Hirnschenkeln nach hinten geht. Der Boden der 3ten

hügels, der oberen des Corpus striatum und der unteren Oberfläche des Corpus callosum, das beide deckt, befindet, heißt Cornu anterius vorderes Horn des Seitenventrikels, der, welcher sich hinter dem Thalamus befindet, und von einer großen Einbeugung im hinteren Lappen des großen Gehirns gebildet wird, heißt hinteres Horn cornu posterius (auf seinem Boden sind einige Wülste und Furchen sichtbar, die man Pes hippocampi minor oder calcar avis nennt) der Theil des Seitenventrikels endlich, welcher sich zwischen der unteren Seite des Sehhügels und den sie daselbst überragenden und verdeckenden Hirnwindungen des unteren Theiles des Gehirns befindet, heißt unteres Horn, cornu inferius.

Septum pellucidum, die Scheidewand, fornix, der Markbogen, und pes hippocampi major, der große Seepferdesfuß. Das würde der 3te Ventrikel mit dem Raume, der sich über dem Sehhügel und unter dem Balken befindet (mit den Seitenventrikeln) zu einer einzigen ungetheilten Höhle zusammenfließen, hinge nicht von der Mittellinie der unteren Oberfläche des Balkens eine aus 2 Blättern gebildete Scheidewand, septum pellucidum, senkrecht herab, die vorn breit ist und den Raum zwischen dem Knie des Balkens ausfüllt, hinten schmal und spitz ausläuft. An ihrem unteren Rande ist sie von 2 Markbogen begrenzt, und ist mittels derselben auf den Sehhügeln befestigt. Diese Scheidewand liegt zwischen beiden Seitenventrikeln. Der Bogen fängt vorn mit 2 Schenkeln an, und endigt sich auch hinten in 2 Schenkel. Es fängt nämlich von jedem Corpus mamillare am Tuber cinereum ein, anfänglich in grauer Substanz verborgener, aus Längenfaser bestehender Bogen an (vorderer Schenkel des fornix), der in die Höhe steigt, wo ein Saum an dem unteren Rande des septum pellucidum liegt, der mit dem der anderen Seite vereinigt, die zwischen beiden Sehhügeln befindliche Spalte (die 3te Hirnhöhle) bedeckt, und sich an der Grenze der inneren Seitenfläche des Sehhügels um denselben herumwindet und an ihm durch die Pia mater angeheftet ist. Hinten, wo das Septum pellucidum aufhört, schließen sich die 2 hinteren Schenkel des Fornix an den Balken an, verlassen ihn aber hierauf wieder, und jeder umgibt die Stelle an der unteren Seite des Sehhügels, in welche der Hirnschenkel eindringt. An der unteren Seite des Sehhügels ver wächst er mit einer gebogenen weißen Hirnwindung, die in das untere Horn des Seitenventrikels hineinragt, pes hippocampi major.

Dadurch, daß der Fornix in diesem ganzen Verlaufe an den Sehhügel durch die weiche Hirnhaut angeheftet ist, trägt er dazu bei, daß der Seitenventrikel auf der Grundfläche des Gehirns, wo der vordere Schenkel in den Sehhügel eindringt, nicht offen steht, sondern durch ihn

ich Häute verschlossen ist; ferner daß die beiden Seitenventrikel nicht einander und auch nicht in den 3ten Ventrikel übergehen. Nur schon dem vorderen Theile des Fornix und den Sehhügeln bleibt eine kleine Oeffnung, foramen Monroi. Die Pia mater, welche die Höhle der Seitenventrikel überzieht, ist längs der Stelle, wo sich der Fornix an den Sehhügel anschließt, vielfach in Falten gelegt, und diese Falten sind selbst wieder durch viele Nebenfalten und Zotten kraus, durch welche zahlreiche Venen und einige Arterien laufen geschlängelt zwischen den Falten hin. Man nennt diesen Theil der weichen Hirnhaut den Plexus choroideus des Seitenventrikels. An dem Orte, wo der Plexus choroideus sich ins untere Horn hinabkrümmt, liegt in ihm eine kleine weiche Masse, die von derselben Beschaffenheit zu sein scheint, als die sogenannten Glandulae Pachioni. Durch die Monroi'sche Oeffnung gehen die Plexus choroidei des 3ten Ventrikels, von welchen ich die Rede sein wird, in die des Seitenventrikels über.

Commissura anterior, commissura posterior, commissura medialis und plexus choroideus. Die innere Seitenfläche jedes Thalamus macht, wie wir gesehen haben, die Seitenwand des 3ten Ventrikels aus, dessen Decke der Fornix und der unter dem Fornix gelegene Plexus choroideus medius ist. Der Plexus choroideus medius geht nämlich nahe an der Oeffnung der Ventrikel am hinteren Rande des Corpus callosum an, läuft unter dem Fornix vorwärts und geht durch das Foramen Monroi in 2 Theile getheilt zu jedem Seitenventrikel über. Zwischen den 2 Thalamis liegt, wie schon erwähnt worden, etwas weiche Substanz, die dieselben vereinigt, commissura mollis, vor ihnen, dicht vor den vorderen Schenkeln des Fornix, die weiße Commissura anterior, die wie ein Rabenkiel stark und rund ist, und aus dem Corpus striatum der einen Seite in das der andern bringt; hinter dem Thalamis, dicht vor den Vierhügeln, befindet sich die Commissura posterior. Vom oberen Rande der inneren Oberfläche des Thalamus springt auf jeder Seite ein Pedunculus glandulae pinealis, der über den Vierhügeln und unter dem hinteren Rande des Balkens mit dem anderen in einem Bogen vereinigt, an dem die graue, röthliche Glandula pinealis hängt, die auf den Vierhügeln ruht. In und an den Pedunculis sind kleine, harte, gelbliche, unorganisirte Körnchen befindlich, welche man Hirnsand nennt, die man zusammen mit dem Namen Acervulus bezeichnet. Dicht unter der hinteren Commissur öffnet sich der schon erwähnte Gang, aquaeductus Sylvii, welcher aus der 3ten Hirnhöhle in die 4te führt, und unter den Vierhügeln über den Hirnschenkeln nach hinten geht. Der Boden der 3ten

Hirnhöhle geht in den Trichter über. Die sehr vertiefte Stelle desselben heißt *aditus ad infundibulum*.

Das kleine Gehirn, *cerebellum*.

Es ist der größte unpaare Theil des Nervensystems. Sein von rechts nach links gehender Querdurchmesser ist viel größer (ungefähr 4 Zoll), als der von vorn nach hinten gehende. Am kleinsten ist der senkrechte Durchmesser. Eine Furche in der Mitte seiner hinteren, unteren und vorderen Seite macht zwar, daß man ein in der Furche liegendes, schmales Mittelstück, *Wurm, vermis*, und 2 rundliche, von oben und unten etwas plattgedrückte Seitentheile, ein rechtes und ein linkes *Hemisphaerium*, zur Bequemlichkeit bei der Beschreibung unterscheiden kann; aber sie sind durch diese Furche nicht so vollkommen wie die Hemisphären des großen Gehirns und die Seitentheile des Rückenmarks geschieden, denn das Mittelstück des kleinen Gehirns ist so groß, und der Bau desselben dem der Hemisphären so entsprechend, namentlich weil die Windungen beider Hemisphären sich über das Mittelstück fortsetzen, daß man das Ganze als einen einzigen unpaaren Theil ansehen muß. An der oberen Seite desselben ist nicht einmal eine deutliche mittlere Furche vorhanden.

Eine sehr tiefe horizontale Quersfurche (die einzige, in welcher nach vorn die Marksubstanz des kleinen Gehirns bloß zu liegen scheint, oder wo sie wenigstens nur von einer sehr dünnen, nicht deutlich sichtbaren Lage grauer Substanz überzogen wird, theilt die Hemisphären in eine obere und in eine untere Hälfte. Auch das Mittelstück oder der *Wurm, vermis*, wird durch eine solche Furche, die aber nicht genau die Fortsetzung der vorigen ist, in ein oberes und in ein unteres Stück, den oberen und den unteren *Wurm* getheilt. In jener Furche der Hemisphären endigen sich vorn die schmalen Windungen der oberen und unteren Hälfte der Hemisphären, und aus ihr tritt daselbst nach unten der mittlere, aus Fasern bestehende Schenkel des kleinen Gehirns, *processus cerebelli ad pontem*, hervor, und geht in einem Bogen quer von der großen Querspalte der einen Hemisphäre zu der der andern ununterbrochen hinüber, und bildet die schon oben erwähnte Brücke, *pons Varolii*. Das kleine Gehirn und dieser Bogen schließen zusammen einen Ring, durch den die Pyramiden und Oliven des verlängerten Markes zum großen Gehirn emporsteigen. Das kleine Gehirn macht das hintere, die Brücke das vordere Stück des Ringes aus. Dieser Markbogen verbindet die Seitentheile des kleinen Gehirns unter einander, und je größer sie daher sind, desto breiter und dicker ist die Brücke, und bei gewissen Thieren, deren kleines Gehirn keine Seiten-

theile hat, fehlt sie ganz. Beim Menschen ist sie vorzüglich groß. Das aus queren Bindungen, gyri, und aus innerer Marksubstanz bestehende schmale Mittelstück umgiebt den Mittelpunkt, um den es sich von hinten nach vorn herumkrümmt, nicht von allen Seiten. An einer nach der hohlen Seite der Brücke hinggerichteten kleinen Stelle ist eine Lücke, durch welche die vorderen Bindungen der oberen Hälfte des Mittelstücks von den vorderen Bindungen der unteren Hälfte desselben getrennt sind, und diese Lücke führt in eine im kleinen Gehirne befindliche, hinten sich mit einer verschlossenen Spitze in seiner Mitte endigende Höhle. Die Lage weißer und grauer Substanz, welche durch eine Art von Faltung die queren Bindungen des kleinen Gehirns, und namentlich auch des Mittelstücks desselben bildet, erstreckt sich von der Stelle, wo die Bindungen der oberen Hälfte des Mittelstücks aufhören, in Form einer Membran, die aus einer Lage weißer und aus einer Lage grauer Substanz besteht (die Hirnklappe, *valvula cerebelli anterior*, oder das vordere Marksegel, nach Reil), zu den Vierhügeln, und ist seitwärts an den 2 zu den Vierhügeln gehenden oberen Schenkeln des kleinen Gehirns angewachsen. Diese Membran bildet selbst meistens eine Anzahl Quersalten, welche große Ähnlichkeit mit den Bindungen des Mittelstücks haben. Auf eine ähnliche Weise erstreckt sich von der Stelle, wo diese Bindungen der oberen Hälfte des Mittelstücks an der Defnung des kleinen Gehirns aufhören (vom Knötchen), eine Membran abwärts, die die Fortsetzung der Bindungen desselben ist, (*valvula cerebelli posterior*, die hintere Hirnklappe, das hintere Marksegel), und ist seitwärts an dem innersten Theile der Seitenhälfte (an den Flocken und Mandeln, und an den unteren Schenkeln des kleinen Gehirns) angewachsen. Diese letztere aber sieht ziemlich weiß aus, ist nicht so dick als die vordere Hirnklappe, und besteht nicht aus einer deutlich unterscheidbaren grauen und weißen Lage. Die innere Oberfläche dieser Markhäute ist mit der Fortsetzung des die Höhle des kleinen Gehirns auskleidenden, durchsichtigen, von der Pia mater herrührenden Ueberzugs bedeckt.

An der in die Höhle des kleinen Gehirns führenden, vom Mittelstück unbedeckt gelassenen Defnung dringen von unten die unteren Schenkel des kleinen Gehirns (*processus cerebelli ad medullam oblongatam, corpora restiformia*), die die Fortsetzung der hinteren Bündel des Rückenmarks sind, und von oben, die oberen Schenkel des kleinen Gehirns (*processus cerebelli ad corpora quadrigemina*), die mit den Vierhügeln in Verbindung stehen, ein. Zwischen ihnen liegt auf jeder Seite der schon beschriebene mittlere Schenkel des kleinen Gehirns (*processus cerebelli ad pontem*). Auf jeder Seite sind die 3 Schenkel unter einander verwachsen, und außerdem ist der obere

Schenkel der rechten Seite mit dem der linken Seite durch die schon erwähnte Valvula cerebelli anterior, der untere Schenkel der rechten Seite mit dem der linken Seite durch die Valvula cerebelli posterior verbunden.

Die Fortsetzung der Nerven und überhaupt der vorderen Rückenmarksbündel, welche den Bogen der Brücke ausfüllt, und ihre, die Hirnschenkel zum Theil mit bildende Verlängerung, macht die vordere Wand der Höhle des kleinen Gehirns, der vierten Hirnhöhle, ventriculus quartus, aus. Die 3 Schenkel des kleinen Gehirns, nebst der Ausbuchtung der Seitenhälften desselben, machen auf jeder Seite die Seitenwände dieser Höhle, endlich die Valvula cerebelli anterior das etwas ausgehöhlte Mittelstück des kleinen Gehirns, und die Valvula cerebelli posterior machen zusammen die hintere Wand derselben aus. Die vierte Hirnhöhle liegt folglich zwischen der concaven, nach hinten gerichteten Oberfläche der Brücke und der Hirnschenkel, und der ausgehöhlten, nach vorn gerichteten Stelle des Mittelstücks des kleinen Gehirns und dessen Verlängerungen, den beiden Hirnklappen, und besitzt ein verschlossenes, in der Mitte des kleinen Gehirns eindringendes, spitzes Ende. Unten befindet sich zwischen dem verlängerten Marke und dem Mittelstücke des kleinen Gehirns der durch die weiche Hirnhaut verschlossene, zuweilen auch durch eine Gehirnlamelle gedeckte Eingang in die vierte Hirnhöhle. An diesem Eingange setzt sich diese Höhle in die hintere Rückenmarkspalte fort, und bildet dadurch die Schreibfeder, calamus scriptorius. Am oberen Ende derselben, zwischen den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns (processus cerebelli ad corpora quadrigemina), geht die vierte Hirnhöhle in den Aquaeductus Sylvii über, der zwischen den Vierhügeln und den Hirnschenkeln zur 3ten Hirnhöhle (zu dem Zwischenraume zwischen den Sehhügeln) führt.

An der Stelle, wo auf jeder Seite die 3 Schenkel des kleinen Gehirns unter einander verschmelzen, befindet sich im Marke der Hemisphären des kleinen Gehirns nach vorn ein von einer grauen gelblichen gezackten Linie umgebener Kern, corpus ciliare.

Die Markmasse des kleinen Gehirns ist durch Einschnitte, die sich an ihrer Oberfläche befinden, in Lappen, Lappchen und Windungen getheilt, die am Mittelstücke (Wurme) und an den Hemisphären die Gestalt und Zahl nach nicht ganz übereinstimmen. Man unterscheidet, wenn man die Lappen vom vorderen, oberen Rande der Hemisphären hinten herum bis zum vorderen unteren zählt, folgende, durch tiefe Einschnitte getrennte Lappen: den vierseitigen, den hinteren oberen Lappen, von ihm durch die tiefe horizontale Quersfurche geschieden den hinteren unteren, den zarten, den zweibäuchigen Lappen und die Mandeln; außer diesen sieht noch auf jedem Processus cerebelli

pointem eine Flocke auf. Das Innere jedes Lappens besteht aus Fasern, die nach der Oberfläche des kleinen Gehirns zu divergiren, eine Fortsetzung mehrerer von den 6 Markbündeln sind, die einzeln am Kerne des kleinen Gehirns zum Theil kreuzen. Die Oberfläche der Lappen, Lappchen und Blättchen ist von einer überall ziemlich gleich dicken Lage grauer Substanz überzogen, die auch in den tiefen Einschnitten von einem Lappen auf den andern ununterbrochen über-

Daher entsteht auf der senkrechten Durchschnittsfläche des Wurms Ansehen des Lebensbaums, arbor vitae, der einen senkrecht stehenden vordern, und einen liegenden hinteren Zweig hat. Der liegende ist der Durchschnitt der unteren Hälfte des Mittelstücks (des untern Wurms), der von vorn nach hinten 4 Lappen hat, nämlich Knötchen, den Zapfen, die Pyramide, und einen Asten, der Querbänder und Quercommisur für solche Bindungen der Hemisphären bildet, die theils unmittelbar über, theils unmittelbar unter tiefen Querfurche liegen, so daß also die tiefe Querfurche der Hemisphären auf diesen Asten Lappen des Wurms stößt. Die Grenzen der 4 Lappen werden durch 4 tiefe Einschnitte bestimmt, welche bis zum liegenden Zweig bringen, in welchen aber die graue, sie überdeckende Platte nicht unterbrochen ist. Der stehende Zweig ist der Durchschnitt der oberen Hälfte des Mittelstücks (des oberen Wurms), aus 2 Lappen, aus dem hinteren oberen und aus dem weiter liegenden vierseitigen besteht. Auch beide Hälften des Mittelstücks sind durch die graue Substanz, die sie überzieht, ununterbrochen miteinander verbunden.

Bergliederung des Gehirns von oben.

Man schneidet die Dura mater auf, heugt die Hemisphären des großen Gehirns auseinander, trennt die kleinen weißen, körnigen Körperchen, glandulae ionii, durch welche die Dura mater bei Erwachsenen, nicht aber bei Kindern, und da mit der Pia mater zusammenhängt, schneidet die von der Dura mater gebildete Falx cerebri vorn in der Hirnspalte quer durch, und schlägt sie abwärts, sieht dann im Grunde der oberen Hirnspalte die quere Markbinde des Leis, corpus callosum, seine queren Fasern, in der Mitte desselben eine Rinne, die Nath, raphe, seinen vordern Umschlag, das Knie, der zur grauen Substanz auf der Grundfläche des Gehirns heruntergeht, seinen dicken vordern freien Rand, der weiter von der hinteren Spitze des Gehirns entfernt, als das Knie von der vorderen, endlich die gewölbte Oberfläche desselben. Jede Rinne über dem Balken schneidet man jede Hemisphäre des großen Gehirns horizontal durch, sieht dann den größten Markdurchschnitt des großen Gehirns, öffnet einige Linien neben der Stelle, wo der Balken in die Hemisphären tritt, der Länge nach das vordere Horn jedes der 2 Seitendivertikel, dessen vordere der Balken ist, sieht auf dem Boden desselben vorn und seitwärts nach unten das keulenförmige graue Corpus striatum, das hinten spitz ausläuft, vorn an dem andern, hinten weiter von ihm liegt; hinter und unter ihm den vordern, ovalen Thalamus nervorum opticorum, der auch vorn dem andern gleich ist, hinten weiter von ihm absteht. Zwischen dem Thalamus und dem Corpus striatum jeder Seite sieht man die Grenze beider, die Taenia, auf dem

Thalamus den Plexus choroides des Seitenventriels. Nun zieht man den Balken in die Höhe, sieht das dünne Septum pellucidum zwischen beiden Seitenventrieln senkrecht herabhängen, das aus 2 Blättern besteht, zwischen denen eine kleine Höhle, *ventriculus septi pellucidi*, sich befindet. An seinem vorderen Rande bemerkt man den Fornix wie einen weißen Saum des Septums, den man auf die Spalte zwischen beiden Thalamis legt, und die Roussische Oeffnung, die dicht hinter dem vorderen Schenkel des Fornix aus einem Seitenventrikel in den andern, und aus beiden in den 3ten Ventrikel führt. Man schneidet an das Knie des Balkens und die vorderen Schenkel des Fornix durch, hebt sodann die Spalte zwischen den Schhägeln, welche der Fornix bedeckt, auf, und schlägt sie rückwärts, sieht nun die untere Oberfläche des Balkens und den an ihm angewachsenen Fornix, so wie den Plexus choroides der 3ten Hirnhöhle, die auf der Spalte zwischen beiden Thalamis liegt, zuvor von dem Fornix bedeckt wurde, unter dem hinteren Rande des Balkens hereinsteht, und durch die Roussische Oeffnung in den Seitenventrikel übergeht.

Man öffnet die Decke des hinteren Horns, sieht die Falten an der Wand desselben, *calcar avis* oder *pes hippocampi minor*, öffnet die äußere Wand des unteren Horns, sieht, wie sich der hintere Schenkel des Fornix um den Schlägel herum nach abwärts in dieses Horn biegt, und mit dem weißen, getrimmten Saum auf dem Boden des unteren Horns gelegenen Wulste, *pes hippocampi major*, vermischt, als dessen Saum, *limbria*, er nun angesehen wird, und den er an dem Schlägel anheftet; ferner den Plexus choroides, der die Verbindung zwischen dem Schlägel befestigt, und der an seinem Uebergange ins obere Horn eine längliche Anschwellung enthält. Biegt man die Schhägel, so sieht man zwischen ihnen eine Spalte, die 3te Hirnhöhle, in ihr in der Mitte die graue Commissura mollis, vorn, vor den abgeschnittenen vorderen Schenkeln des Fornix, die weiße Commissura anterior, hinten vor den Vierhägeln die weiße Commissura posterior, unter ihr den *Aditus ad aquaeductum Sylvii*, auf dem Boden der 3ten Hirnhöhle den *Aditus ad infundibulum*. Nun nimmt man sich schon dem großen und kleinen Gehirn das Tentorium cerebelli weg, sieht mit dem hinteren Rande des Balkens zwischen den hinteren Enden der Schhägel die schief nach hinten und aufwärts gerichteten *Corpora quadrigemina*, an denen die *Glandula pinealis* an ihrem *Pedunculus* hängen, die von dem ebenen Rande der inneren platten Oberfläche der Schhägel herabkommen, und einen Bogen, und endlich auch eine Commissur bilden. Von den Vierhägeln in das kleine Gehirn erstrecken sich die *Processus cerebelli ad corpora quadrigemina*, die von oben durch die *Valvula cerebelli anterior* gedeckt werden; diese schneidet man auf, und öffnet so die 4te Hirnhöhle. Nun nimmt man das Gehirn heraus und betrachtet seine Grundfläche und das kleine Gehirn.

Betrachtungen über die einzelnen Hirntheile.

Das verlängerte Mark, *medulla oblongata*.

Die vorderen Pyramiden, *corpora pyramidalia*, sind 2 schmale, sich der vorderen Mittellinie gelegene Stränge, welche deutlicher aus Längenschnitt zusammenzusetzen sind, als irgend ein anderer Theil des verlängerten Marks. In dem Querschnitte des Rückenmarks sind sie ziemlich gut zu unterscheiden, an manchen Stellen cylindrisch, an manchen eiförmig. Bei ihrem Uebergange zur Brücke sind sie etwas schmaler, und lassen daher zwischen sich und der Brücke eine kleine Vertiefung übrig. Ihre Fasern gehen zwischen den verschiedenen Lagen der Dura mater der Brücke hindurch zu den Nervenstämmen und zu dem großen Gehirn über.

Weniger ist ihre Zusammenhang mit den Fasern des Rückenmarks bekannt. In einer 14 bis 16 Linien von der Brücke entfernten Stelle des Rückenmarks ist die vordere Rückenmarkshäute zugleich an der Oberfläche vertheilt. Die Fortsätze der weichen Rückenmarkshäute, welche an allen andern weiter unten gelegenen Stellen des Rückenmarks in diese Spalte bis an die ziemlich tiefliegende vordere weiße Commissur des Rückenmarks eindringen, endigen sich hier sogleich an der Oberfläche, und bilden mehrere fadenartige Fortsätze zwischen die Faserbündel hinein, die wie in einander geschobene Finger sich zu durchdringen scheinen. Man sieht hier in einander eingreifenden Bündel sowohl von vorn, als auch von hinten die vorderen Centraläste des Rückenmarks aneinander sieht, als auch von

von hinten, wenn man das Rückenmark von seiner hinteren Spalte aus, wie namentlich Keil gethan hat. Diese Durchkreuzung, welche, wie ich anführt, schon von *Misichelli* 1709, und von *Petit* 1710 beschrieben, von einer großen Anzahl von Anatomen bestätigt worden ist, wurde von einigen berühmten Anatomen, namentlich von *Morgagni*, *Haller*, *Wicq. Roy*, *Cuvier*, *Prochaska*, *Sabatier*, *Chaussier*, und neuerlich von *Ando* nicht als eine wahre Durchkreuzung anerkannt. *Santorini* läugnet ab, daß an dieser Stelle vielleicht nur ein Schein einer Durchkreuzung durch das Auseinanderziehen der Fasern entstehe. Noch viel weniger soll nach *Ando* bei den Säugthieren eine Durchkreuzung Statt finden. Ich kann Zweifel nicht theilen, denn schon das Verhalten des an dieser Stelle in die Rückenmarkspalte tretenden Fortsatzes der weichen Rückenmarkshaut beweiset, hier die beiden Hälften des Rückenmarks, die anderwärts nur in der Tiefe unter einander zusammenhängen, an der Oberfläche vereinigt sind. Da nun von dieser Stelle an bis zur Brücke eine regelmäßige weiße Commissur in der vorderen Mittellinie fehlt, so darf man vielleicht vermuthen, daß die weißen Querfasern, welche unten die weiße Commissur bilden, an jener Stelle der Durchkreuzung eine oberflächliche und schiefe Lage angenommen haben, und daß aus ihrer Fortsetzung die Pyramiden entstehen. Selbst Anatomen, welche sich sehr viel Mühe bei der Untersuchung der Structur des verlängerten Marks gegeben haben, wie *Voland* und *Rolando*, konnten die Pyramiden nur bis zu diesen sich durchkreuzenden Bündeln, nicht noch tiefer herab verfolgen. *Liedemann* und *Serres* behaupten, daß die erwähnte Durchkreuzung der Pyramiden schon bei sehr kleinen Thieren sichtbar sei.

Die Olivenbündel, oder die vorderen Rückenmarksbündel, nach *Ando*¹⁾, das 2te seitliche Bündelpaar nach *Keil*²⁾, *crura medullae oblongatae ad corpora quadrigemina* nach *Langenbeck*³⁾. Da die Pyramiden nicht an der Fortsetzung der vorderen Bündel des Rückenmarks sind, so fragt es sich, in welchem andern Theil der Medulla oblongata diese übergehen. Nach den hier angeführten Schriftstellern liegt die Olive zwischen den auseinander weichenenden Fasern dieses Bündels. Besonders genau haben das *Burdach*, *Rolando* und *Langenbeck* abgebildet. Die vorderen Pyramiden liegen wie 2 cylindrische Körper vor den vorderen Rückenmarksbündeln. Dieses sieht man vorzüglich deutlich in der Schnittfläche des quer durchschnittenen verlängerten Marks. Die Oliven liegen zwischen den auseinander weichenenden Fasern desselben, und es gehen auch an der Oberfläche Fasern dieses Bündels theils zwischen der Pyramide und der Olive, theils zwischen der Olive und dem strickförmigen Körper hin zu der vierten Hirnhöhle. An der vorderen Wand der vierten Hirnhöhle sieht man diese Bündel sich unbedeckt zu dem hinteren Theile der Hirnschenkel gehen und zwischen denselben die Wasserleitung bilden, welche zwischen den Hirnschenkeln und Vierhügeln in die 4ten Hirnhöhle in die 3te Hirnhöhle führt. Den Theil dieses Bündels, welcher zwischen der Olive und Pyramide liegt, nennt *Keil*⁴⁾ die Schleife. Er geht nach ihm an der concaven, der 4ten Hirnhöhle zugekehrten Oberfläche der Olive, theils zu dem hinteren Theile der Hirnschenkel, welcher durch schwarze Substanz vom vorderen geschieden ist, theils durch die Vierhügel hindurch zu den Chiasmis opticus. Dieses Bündel liegt übrigens an den Fasern der Pyramiden und den vom *Corpus olivare* ausgehenden Fasern so dicht an, daß die Gren-

Voland, Recherches anatomiques sur la moëlle allongée. Memorie della reale Accademia delle scienze di Torino, Tome XXIX, année 1822. Besonderer Abdruck p. 17.

Keil, im Archive für die Physiologie, 1809. B. IX. p. 490, 488. *Keil* beschreibt sie als ein starkes Bündelpaar, welches die Seiten des verlängerten Rückenmarks zwischen den (vorderen) Pyramiden und den hinteren Schenkeln des kleinen Gehirns einnimmt. „Dieses ist das mittlere Bündel, von welchem *Rosenthal* in seinem Beiträge zur Encephalotomie, Weimar 1815. S. 24 — 27, und *J. F. Meckel* in seinem Handbuche der Anatomie, B. 3. S. 458, sprechen, welches auf die Oliven losgehe, sie einschliesse und durch den Hirnnoten nach vorn zu den Vierhügeln bringe.“

Langenbeck, Icones anatomicae Neurologiae. Fasc. I. Tab. XXXI. fig. 4. i. fig. 31.

Keil, a. a. O. S. 505.

jen oft nicht mit Sicherheit gezogen werden können. Die Oliven, *corpora olivaria* ¹⁾, liegen zwischen den Fasern des beschriebenen Bündels. Jede Olive ist eine abgeplattete, ovale, weiße Erhabenheit, welche durch eine ziemlich bestimm begrenzte Oberfläche von den benachbarten Theilen unterschieden werden kann neben der Pyramide und etwas weiter nach hinten an der Oberfläche in der Gestalt eines ovalen unbedeckten Hügel hervortragt. Der größere Theil derselben ist im verlängerten Marke verborgen, sie liegt der Länge nach, und ihr innerer Rand grenzt dicht an die Mittelspalte. Schneidet man sie durch einen durch ihre Länge gehenden Schnitt in eine vordere und in eine hintere, oder durch einen quer durch das verlängerte Mark gehenden Schnitt in eine obere und in eine untere Hälfte, so bemerkt man, daß sie durch eine dünne, gelbliche, gefaltete Lage in einen etwas ins Graue fallenden ovalen platten Kern, und in eine weiße, die gelbe Lage umgebende Schale getheilt wird. Auf diesen Durchschnittsflächen nimmt sich diese dünne gelbliche Lage wie eine zackige Linie aus, die den Kern von allen Seiten, ausgenommen von der Seite, wo die Olive an die Mittelspalte stößt, umgibt. In dieser Stelle werden die beiden neben einander liegenden Oliven ihren unbedeckten Kern der Mittelspalte zu. Die Farbe des Kern fällt zwar etwas ins Graue, aber er ist dennoch weißer als die benachbarte graue Substanz im Innern des verlängerten Marks; auch ist der Kern nach Rolando aus Fasern, die strahlenförmig von der Mittelspalte aus in den Kern nach außen gehen, gebildet. Die Fasern, welche aus den Oliven hervorzukommen scheinen, vermengen sich mit den Fasern des vorderen Rückenmarksbündels, zwischen welchen jede Olive liegt, und die sich, nachdem sie theils vor, theils hinter die Olive weggegangen sind, am oberen Ende der Olive zum Theil vereinigen. Nach Langenbeck ²⁾ gehen die Fasern der Olive hinter denen der Pyramide durch die Substanz der Brücke hindurch, und in den hinteren Theil der Hirnschale über.

Es folgen nun hinter den vorderen Rückenmarksbündeln die krickförmigen Bündel, *corpora restiformia*, die auch die unteren Schenkel des kleinen Gehirns, *crura, processus cerebelli ad medullam oblongatam*, oder auch die hinteren Rückenmarksbündel genannt werden, und welche die dicht an die hinteren Mittelspalte liegenden sehr schmalen Stränge, die hinteren Pyramiden, *pyramiden posteriores*, zwischen sich liegen haben. Während die vorderen Pyramiden und die Olivenbündel (vorderen Rückenmarksbündel) die Verbindung des Rückenmarks mit dem großen Gehirn (mit dem Sehhügel und mit dem Vierhügel) bewirken, ist durch die hinteren Rückenmarksbündel und durch die hinteren Pyramiden eine Verbindung des Rückenmarks mit dem kleinen Gehirn bewerkstelligt.

Die hinteren Rückenmarksbündel werden an der Stelle, wo die Kreuzung der Pyramiden geschieht, durch graue Substanz, welche seitwärts am verlängerten Marke bis an die Oberfläche reicht, von den vorderen Rückenmarksbündeln getrennt. Sie vergrößern sich beträchtlich, während sie sich der Weite nähern, weichen aus einander, ragen an der Seite des verlängerten Marks hervor, und bedecken hier den Theil der vorderen Rückenmarksbündel, welcher hinter der Olive weggeht. Die zwischen ihnen gelegenen hinteren Pyramiden liegen immer dicht neben der hinteren Mittelspalte, und entfernen sich dabei in der Nähe der Brücke auch von einander, bilden daselbst gemeinschaftlich mit der hinteren Mittelspalte die Stelle, welche man mit dem Schnabel einer Schreibfeder, *calamus scriptorius*, vergleicht, und zeichnen sich hier durch eine kleine Answulst

¹⁾ Die Oliven haben von Biessens, weil sie eine ähnliche Gestalt haben, ihren Namen von der Olivenfrucht erhalten. Vorzüglich genau haben sie Brochassa, Reil, Rolando und Langenbeck theils beschrieben, theils abgebildet. *Prochassa, de structura nervorum. Vindobonae 1779. 8. Tab. I. p. 85 sq. bildet schon sehr gut die innere Structur derselben ab.*

²⁾ Langenbeck, *Icones anatomicae Neurologiae. Fasc. I. Taf. XXXI. Fig. 4. 4.* Die hinteren Pyramiden sind schon von Ruysch, *Epist. problem. XV. et Tab. XIV. brochassa, von Haller und Schaeffer bemerkt, von Wenzel und Gall, Pl. VI. ii abgebildet, aber nicht beschrieben, endlich von Reil, Archiv f. d. Physiol. B. IX. 1809. p. 491. Burdach und von Rolando a. a. O. p. 25 genau beschrieben worden.*

Betrachtung einzelner Hirnthteile. Medulla oblongata. 397

ng aus. Sie sind, wie man sieht, wenn man das verlängerte Mark quer durchschneidet, oben 2 ziemlich cylindrische, deutlich unterscheidbare, oft zum Theil zertheilte Bündel, die aus gewundenen Fasern bestehen, tiefer unten am Rückenmark sind sie 2 platte prismatische Streifen. An der Seite der hinteren Abtheilung der 4ten Hirnhöhle beugen sich die hinteren Rückenmarksbündel rückwärts, vereinigen sich mit den Schenkeln der Brücke und treten in das kleine Gehirn ein.

Nach der Beschreibung dieser Hauptbündel des verlängerten Marks, welche Innern an manchen Stellen allerdings so untereinander zusammenhängen, daß nicht durch ganz bestimmte Grenzen getrennt sind, ist nun das Verhalten der grauen Substanz zu untersuchen, welche tiefer unten die Mitte des Rückenmarks einnimmt. In der Nähe, wo sich die Fasern der Pyramiden zu durchkreuzen anfangen, nimmt die graue Substanz, welche zuvor 4 Hörner hatte, eine andere Gestalt an, denn ihre vorderen Hörner verschwinden, und die hinteren werden sehr groß, reichen endlich bis zur Oberfläche an der Seite des verlängerten Marks, und bilden eine graue, quer durch das verlängerte Mark gehende Masse, durch welche die vorderen Rückenmarksbündel von den hinteren und von den kleineren Pyramiden getrennt werden. Daher sieht man auch, wie Rolando bemerkt, neben der Stelle, an welcher die Durchkreuzung der vorderen Pyramiden geschieht, seitwärts an der Medulla oblongata zwischen den vorderen und hinteren Rückenmarksbündeln einen etwa 7 bis 8 Linien langen, und ungefähr 1 Linie dicken grauen Strang. Höher oben theilt sich die graue Substanz in getrennte, in jeder Seitenhälfte des verlängerten Markes liegende Abtheilungen, die oben am Schnabel der Schreibfeder an die Oberfläche der 4ten Hirnhöhle treten, die sie mit einer Lage grauer Substanz überziehen, welche selbst aber von einem, von der weichen Hirnhaut gebildeten, durchsichtigen Ueberzuge, Ependymium, bedeckt wird. Oben kommen daher die vorderen und hinteren Bündel wieder in eine unmittelbare Berührung unter einander. Rolando hat die Lage der grauen Substanz im verlängerten Marke sehr sorgfältig durch zahlreiche Versuche erörtert.

Widweilen findet man, daß eine von den Seitentheilen der Brücke oder des kleinen Gehirns ausgehende Lage dünner Fasern sich über die Oliven und Pyramiden wegschlägt und in die vordere Mittelspalte eindringt. Die Oberfläche, welche sich die 2 Rückenmarkshälften einander in der vorderen Mittelspalte zuwenden, zeigt dann deutliche Fasern, welche quer von vorn nach hinten laufen. Weissen gehen diese Fasern bogenförmig um das untere und obere Ende der Olive herum. Santorini, Malacarne, Gall und Spurzheim nennen sie *processus arciformes*. Rolando hat sie mit vorzüglicher Sorgfalt beschrieben.

Ferner ist schon bemerkt worden, daß da, wo die hinteren Rückenmarksbündel, *corpora restiformia*, oder *processus medullae ad cerebellum* aus einander weichen, die zwischen ihnen und dem hinteren Wurme des kleinen Gehirns befindliche Oeffnung der vierten Hirnhöhle von der weichen Hirnhaut geschlossen wird, welche von dem daneben liegenden *plexus choroideus* kommt, und daß dieser aber die auseinander weichenden *corpora restiformia* hingespinnne Theile der Haut bei Erwachsenen nicht selten, bei Embryonen, nach Ziedemann, immer innenwendig von einer dünnen Lage grauer Gehirnsesubstanz überzogen ist, welche gleich die beiden *corpora restiformia* durch eine Art von Brücke unter einander verbindet. Endlich ist zu erwähnen, daß J. F. Meckel¹⁾ beobachtet hat, daß auch die vorderen Pyramiden zuweilen nahe an der Stelle, wo sie in die Substanz der Brücke eintreten, durch eine kleine 1/2 Linie hohe markige, quere Commissur vereinigt werden.

Entwicklung des verlängerten Marks.

Hinsichtlich der Entwicklung des verlängerten Marks bei den Embryonen zu bemerken, daß die Durchkreuzung der Pyramiden von Ziedemann und Erxleben schon bei sehr kleinen Embryonen beobachtet worden ist, daß die Oliven von Carus schon im 3ten Monate, von J. F. Meckel bei 5monatlichen Embryonen, und von Ziedemann erst am Ende des 6ten Monats unterschieden wurden. Ziedemann sah bei Embryonen, daß die Fasern der Oliven theils zu den

¹⁾ Meckel, Handbuch d. Anatomie, B. 3. S. 451.

nimmt sich diese dünne gelbliche Lage wie eine zackige Linie aus, die von allen Seiten, ausgenommen von der Seite, wo die Olive an der Mittelspalte stößt, umgiebt. An dieser Stelle wenden die beiden nebenliegenden Oliven ihren unbedeckten Kern der Mittelspalte zu. Die Fasern fallen zwar etwas ins Graue, aber er ist dennoch weißer als die benachbarte Substanz im Innern des verlängerten Marks; auch ist der Kern nach außen aus Fasern, die strahlenförmig von der Mittelspalte aus in den Kern gehen, gebildet. Die Fasern, welche aus den Oliven hervorkommen, vermengen sich mit den Fasern des vorderen Rückenmarksbündels, zwischen jeder Olive liegt, und die sich, nachdem sie theils vor, theils hinter der Olive weggegangen sind, am oberen Ende der Olive zum Theil vereinigen. Die Fasern der Olive hinter denen der Pyramiden gehen die Substanz der Brücke hindurch, und in den hinteren Theil der Olive über.

Es folgen nun hinter den vorderen Rückenmarksbündeln die Strahlenbündel, *corpora restiformia*, die auch die unteren Schenkel des Gehirns, *crura, processus cerebelli ad medullam oblongatam*, und die hinteren Rückenmarksbündel genannt werden, und welche die hinteren Mittelspalte liegenden sehr schmalen Stränge, die hinteren Pyramiden, *pyramides posteriores*, zwischen sich liegen haben. Während die Pyramiden und die Olivenbündel (vorderen Rückenmarksbündel) die Verbindung des Rückenmarks mit dem großen Gehirne (mit dem Sehhügel und Vierhügel) bewirken, ist durch die hinteren Rückenmarksbündel die Verbindung des Rückenmarks mit dem kleinen Gehirne bewerkstelligt.

Die hinteren Rückenmarksbündel werden an der Stelle, wo die Pyramiden geschickt, durch graue Substanz, welche seitwärts des verlängerten Marks bis an die Oberfläche reicht, von den vorderen Rückenmarksbündeln getrennt. Sie vergrößern sich beträchtlich, während sie sich nähern, weichen aus einander, ragen an der Seite des verlängerten Marks hervor, und bedecken hier den Theil der vorderen Rückenmarksbündel, und der Olive weggeht. Die zwischen ihnen gelegenen hinteren Pyramiden liegen immer dicht neben der hinteren Mittelspalte, und entfernen sich in der Nähe der Brücke auch von einander, bilden daselbst gemeinschaftlich die Mittelspalte die Stelle, welche man mit dem Schnabel einer Feder, *calamus scriptorius*, vergleicht, und zeichnen sich hier durch eine klein

ist besetzt ist. Die erstere Platte ist inwendig eben und weiß, und äußerlich durch quere Falten uneben, die wie die Windungen des kleinen Gehirns aus weissen inneren und aus einer grauen äußeren Lage bestehen.

Die vordere Wand der vierten Hirnhöhle wird, wie schon oben gesagt worden, die hintere Oberfläche der Brücke und der Hirnschenkel gebildet.

Die Seitenwände der vierten Hirnhöhle werden durch die Seitentheile des kleinen Gehirns, die inwendig auch ein wenig ausgehöhlt sind, und durch die aus hervorkommenden Markschenkel gebildet, der obere Theil der Seitenwände nämlich durch die oberen Schenkel des kleinen Gehirns, welche zu den Seiten emporsteigen, processus cerebelli ad corpora quadrigemina, der untere durch die unteren Schenkel des kleinen Gehirns, processus cerebelli ad medullarum longam oder corpora restiformia, welche zum verlängerten Marke herunter und sich daselbst in die hinteren Rückenmarksbündel fortsetzen. Endlich der weite und weiteste Theil dieser Höhle durch die Seitentheile des kleinen Gehirns und durch die zur Brücke gehenden vorderen Schenkel des kleinen Gehirns, processus cerebelli ad pontem. Denn denkt man sich die Brücke, beide Seiten und das Mittelfstück des kleinen Gehirns als ein einziges Ganzes, so ist sie ein Ring dar, dessen Loch die vierte Hirnhöhle ist, dessen Reif durch die Brücke, hinten von den Seitentheilen und von dem Mittelfstücke des kleinen Gehirns gebildet wird.

Die vierte Hirnhöhle steht nun nach unten offen, aber ist daselbst von einer Membran geschlossen, mit welcher man zuweilen eine sichtbare Platte von Gehirnhäuten verbunden findet, oben verlängert sie sich in einen Canal, aquaeductus Sylvii, die Wasserleitung des Sylvius, der zwischen den Vierhügeln und den Markschenkeln zur dritten Hirnhöhle (d. h. zu dem zwischen den Sehhügeln liegenden engen Raume) emporsteigt. Inwendig ist die vierte Hirnhöhle glatt und weiß, und wie es scheint, von einer durchsichtigen Fortsetzung, der Epithelium (epithelium derselben) überzogen.

Auf der gewölbten vorderen Oberfläche der Brücke liegen bis zu einer gewissen Entfernung Quersfasern, welche aus der Mitte der einen Seitenhälfte des kleinen Gehirns in die Mitte der andern Seitenhälfte hinübergehen, an der concaven Seite der vierten Hirnhöhle zugetehrten Oberfläche der Brücke liegen keine Quersfasern, sondern nur Längensfasern, welche von den Olivenbündeln des verlängerten Marks zu den Vierhügeln, zu der Wasserleitung und zu den Hirnschenkeln, alle aber zu den Sehhügeln und zu dem großen Gehirne emporsteigen; man sieht hier formlose Materie. Zwischen beiden Lagen befindet sich ein Netzwerk der Brücke, welches aus Längensfasern und aus Quersfasern besteht, welche rechtwinklich durchkreuzen und durchflechten, aus Längensfasern nämlich, die Fortsetzung der Pyramiden sind, und zu den Hirnschenkeln, zum gefreiteten Mark und zum Sehhügel emporgehen, und aus Quersfasern, die von derselben Membran, als die schon früher erwähnten. Die zwischen diesen Fasern befindlichen Räume werden in der Brücke von grauer Substanz ausgefüllt.

Die Mittellinie der hinteren Oberfläche der Brücke befindet sich die Spalte, die Fortsetzung der hinteren Mittelspalte des verlängerten Marks, an beiden Seiten neben ihr sieht man 2 schmale Bündel, die fortgesetzten Nervenbündel des Rückenmarks, welche hier nicht mehr von den hinteren Häuten bedeckt werden, und zu der Gegend der Wasserleitung emporsteigen. Zwischen diesen Bündeln liegt eine Lage halbgrauer Substanz und von dem Epithelium bedeckt. In dieser mittlern vertieften Linie kommen mehrere unter dem Epithelium liegende weisse, meistens quer zu den mittlern Schenkeln des kleinen Gehirns laufende, auf beiden Seiten oft nicht symmetrisch liegende Streifen, die wie weisse Fasern aussehen, hervor. Man findet, daß sie sehr vielen Verschiedenheiten unterworfen sind, man mag nun ihre Zahl, oder ihre Größe, oder ihren Verlauf betrachten. Prochaska, Wenzel und J. F. Meckel sahen sie bisweilen nur oder auf beiden Seiten ganz fehlen. Bisweilen laufen einige aufwärts zu den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns. Zuweilen verflechten sie sich. Nach neueren Anatomen hängen einige derselben mit den Wurzeln des Hörnervens zusammen.

Mit diesen weissen Streifen darf man die queren grauen, von Wenzel genau beschriebenen Leisten nicht verwechseln, welche sehr beständig mit den Wurzeln des Hörnervens zusammenzuhängen scheinen. Sie sind dicker, gehen ganz bis zur Mittellinie, und liegen meistens symmetrisch. Auf jeder Seite

Wierhügeln emporsteigen, sich daselbst mit den der andern Seite vereinigen, ¹⁾ das Gewölbe des Aquaeductus Sylvii bilden, theils aber zum Schhügel gelangen.

Das verlängerte Mark der Säugethiere.

Die hinter der Oeffnung der 4ten Hirnhöhle über die Corpora restiformia hingepannte, die 4te Hirnhöhle verschließende graue Platte existirt, nach Ziemann, bei den Säugethieren das ganze Leben hindurch.

Kolando bemerkt, daß die Kreuzung der Pyramiden bei ihnen nicht einmal so deutlich als bei dem Menschen sei; ferner, (G. R. Treviranus ¹⁾) daß die vorderen Rückenmarksbündel, welche bei Säugethieren an der Stelle des Nerven des Menschen liegen, keinen solchen gezackten Kern enthalten, wie diese Sie sind hier von einer queren, von der Gegend des Ursprungs der Gehörner hervorkommenden Binde umgeben, welche Treviranus corpus trapezoideum nennt und welche quer über die Mittelspalte hinweggeht, während die processus arborescentes, die nach Kolando auch bei den Säugethieren vorhanden sind, höchstens bis zu der Mittelspalte gehen ²⁾. Je kleiner bei den Säugethieren die Brücke ist, desto größer ist diese Binde. Bei den Vögeln, wo die Brücke ganz fehlt, umgibt sie die ganze untere Fläche des verlängerten Marks, und ist im Uebrigen mit der Brücke verwechselt worden. Alle von Kolando untersuchte Säugethiere besaßen die zwischen den hinteren Rückenmarksbündeln befindlichen hinteren Pyramiden. Viele Säugethiere haben auch nach ihm die über das Ende des 4ten Ventrikels und über die Corpora restiformia hingepannte Lamelle.

Die Brücke.

Die Brücke, pons Varolii, oder der Hirnknoten, protuberantia annularis. Unter diesem Namen verstehe ich hier die Vereinigung von Querfasern, von Längensfasern und von grauer, die Zwischenräume erfüllender Substanz, durch welche ein etwa viereckiger, gebogener Hirnthheil gebildet wird, dessen längster Durchmesser quer zwischen den Seitentheilen des kleinen Gehirns liegt, dessen kürzerer Durchmesser von unten aufwärts, und von vorn nach hinten gegen die Mittelspalte des kleinen Gehirns gerichtet ist. Ihre vordere Oberfläche ist ein wenig der Länge nach und sehr stark der Quere nach gewölbt, und liegt an der Vereinigungsstelle des Grundtheils des Keilbeins und des Hinterhauptbeins, jedoch mehr in senkrechter Lage, als die Oberfläche dieses Knochens, und hat in ihrer Mitte eine Furche, in welcher die A. basilaris liegt. Ihre hintere Oberfläche ist ein wenig der Quere nach concav, und der von dem Mittelstück des kleinen Gehirns gebildeten Höhle zugekehrt. Das Mittelstück des kleinen Gehirns hat nämlich die Gestalt einer dicken Scheibe, aus welcher nach vorn ein keilförmiges Stückchen herausgeschnitten ist. Der äußere Rand dieser Scheibe ist durch sehr viele tiefe Einschnitte in querlaufende Zacken (Windungen) getheilt, die daselbst wieder von neuem durch kleinere quere Kerben jagig sind. Dieses scheibenförmige Mittelstück liegt nun so hinter der Brücke, daß die hintere Oberfläche der Brücke nach der inneren Stelle desselben gekehrt ist, wo ein keilförmiges Stück aus demselben fehlt. Hierdurch entsteht zwischen der Brücke und dem Mittelstück eine Höhle, welche man die vierte Hirnhöhle oder den Ventrikel des kleinen Gehirns nennt. Die hintere Wand dieser Höhle wird von jenem Ausschnitte des scheibenförmigen Mittelstückes des kleinen Gehirns gebildet, und vergrößert sich noch dadurch, daß von dem über dem Ausschnitte gelegenen ersten Zacken eine aus weißer und grauer Gehirnsstoff bestehende Platte (die vordere Hirnflappe, valvula cerebelli anterior) bis zu den Wierhügeln hinaufgeht, und daß von dem ersten Zacken unter dem Ausschnitte eine großentheils aus weißer Substanz gebildete dünnere Platte (die hintere Hirnflappe, valvula cerebelli posterior) herabhängt; und seitwärts an den Seitentheilen des kleinen

¹⁾ G. R. Treviranus und L. Ch. Treviranus, Vermischte Schriften anatomischen und physiologischen Inhalts. B. III. Bremen 1820. 4. Ueber die Verschiedenheiten der Gestalt und Lage der Hirnorgane in den verschiedenen Classen des Thierreichs, p. 12.

²⁾ Malacarne, Memorie della academia in Mantova. T. I. p. 87 nannte sie *Lastre midollare*, *Call* Querbrücke hinter der Varolibrücke.

erns befestigt ist. Die erstere Platte ist inwendig eben und weiß, und äußerlich durch quere Falten uneben, die wie die Windungen des kleinen Gehirns aus weißen inneren und aus einer grauen äußeren Lage bestehen.

Die vordere Wand der vierten Hirnhöhle wird, wie schon oben gesagt worden, durch die hintere Oberfläche der Brücke und der Hirnschenkel gebildet.

Die Seitenwände der vierten Hirnhöhle werden durch die Seitentheile des kleinen Gehirns, die inwendig auch ein wenig ausgehöhlt sind, und durch die ihnen hervorkommenden Markschenkel gebildet, der obere Theil der Seitentheile nämlich durch die oberen Schenkel des kleinen Gehirns, welche zu den Hügel emporsieigen, *processus cerebelli ad corpora quadrigemina*, der untere durch die unteren Schenkel des kleinen Gehirns, *processus cerebelli ad medullarum oblongatam* oder *corpora restiformia*, welche zum verlängerten Marke herunter gehen und sich daselbst in die hinteren Rückenmarksbündel fortsetzen. Endlich der hintere und weiteste Theil dieser Höhle durch die Seitentheile des kleinen Gehirns und durch die zur Brücke gehenden vorderen Schenkel des kleinen Gehirns, *processus cerebelli ad pontem*. Denn denkt man sich die Brücke, beide Schenkel und das Mittelstück des kleinen Gehirns als ein einziges Ganzes, so bilden sie einen Ring dar, dessen Loch die vierte Hirnhöhle ist, dessen Kreisbogen der Brücke, hinten von den Seitentheilen und von dem Mittelstücke des kleinen Gehirns gebildet wird.

Diese vierte Hirnhöhle steht nun nach unten offen, oder ist daselbst von einer Membran verschlossen, mit welcher man zuweilen eine sichtbare Platte von Gebirgsstoff verbunden findet, oben verlängert sie sich in einen Canal, *aquæeductus Sylvii*, die Wasserleitung des Sylvius, der zwischen den Vierhäugeln und Hirnschenkeln zur dritten Hirnhöhle (d. h. zu dem zwischen den Sehhügeln liegenden engen Raume) emporsieigt. Inwendig ist die vierte Hirnhöhle glatt und weiß, und wie es scheint, von einer durchsichtigen Fortsetzung, der Membran (epithelium derselben) überzogen.

In der gewölbten vorderen Oberfläche der Brücke liegen bis zu einer gewissen Entfernung nur Quersfasern, welche aus der Mitte der einen Seitenhälfte des kleinen Gehirns in die Mitte der andern Seitenhälfte hinübergehen, an der concaven Seite, der vierten Hirnhöhle zugekehrten Oberfläche der Brücke liegen keine Längensfasern, sondern nur Längensfasern, welche von den Nervenbündeln des verlängerten Marks zu den Vierhäugeln, zu der Wasserleitung und zu den Hirnschenkeln, alle aber zu den Sehhügeln und zu dem großen Gehirne emporsieigen; sieht man hier formlose Materie. Zwischen beiden Lagen befindet sich ein Theil der Brücke, welcher aus Längensfasern und aus Quersfasern besteht, welche rechtwinklich durchkreuzen und durchflechten, aus Längensfasern nämlich, die Fortsetzung der Pyramiden sind, und zu den Hirnschenkeln, zum gestreiften Mark und zum Sehhügel emporgehen, und aus Quersfasern, die von derselben Membran abgehen, als die schon früher erwähnten. Die zwischen diesen Fasern befindlichen Räume werden in der Brücke von grauer Substanz ausgefüllt.

In der Mittellinie der hinteren Oberfläche der Brücke befindet sich die Spinalspalte, die Fortsetzung der hinteren Mittelspalte des verlängerten Marks, an beiden Seiten neben ihr sieht man 2 schmale Bündel, die fortgesetzten Nervenbündel des Rückenmarks, welche hier nicht mehr von den hinteren Nerven bedeckt werden, und zu der Gegend der Wasserleitung emporsieigen. Die Membran liegt mit einer Lage halbgrauer Substanz und von dem Epithelium bedeckt. In dieser mittlern vertieften Linie kommen mehrere unter dem Epithelium liegende weiße, meistens quer zu den mittlern Schenkeln des kleinen Gehirns laufende, auf beiden Seiten oft nicht symmetrisch liegende Streifen, die wie weiße Fäden aussehen, hervor. Man findet, daß sie sehr vielen Verschiedenheiten unterworfen sind, man mag nun ihre Zahl, oder ihre Größe, oder ihren Verlauf betrachten. Prochaska, Wenzel und J. F. Meckel sahen sie bisweilen nur oder auf beiden Seiten ganz fehlen. Bisweilen laufen einige aufwärts zu den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns. Zuweilen verflochten sie sich. Nach den Anatomen hängen einige derselben mit den Wurzeln des Hörnervens zusammen.

Mit diesen weißen Streifen darf man die queren grauen, von Wenzel genau beschriebenen Leisten nicht verwechseln, welche sehr beständig mit den Wurzeln des Hörnervens zusammenzuhängen scheinen. Sie sind dicker, gehen ganz bis zur Mittellinie, und liegen meistens symmetrisch. Auf jeder Seite

ist nur eine solche Leiste, die aber oft in der Nähe der Mittellinien in mehrere getheilt ist.

Die Quersafern der Brücke liegen nicht ganz parallel. Rolando glaubt 3 Abtheilungen an derselben unterscheiden zu können, die obere und die untere Abtheilung hätten eine quere Lage. Die mittlere aber läge sehr oberflächlich und kreuzte sich mit der unteren, weil sie stärker gekrümmt wäre und deswegen an der Seite sehr aufwärts ginge. Sie soll, nach ihm, nicht nur mit den mittleren Schenkeln des kleinen Gehirns, sondern mit den *corporibus restiformibus* zusammenhängen, und dem Theile entsprechen, welchen G. R. Treviranus in den Säugethieren *corpus trapezoideum* genannt hat.

Kleines Gehirn, cerebellum.

Die von dem verlängerten Marke zum kleinen Gehirne übergehenden unteren Schenkel des kleinen Gehirns, die die Brücke bildenden mittleren Schenkel des kleinen Gehirns und endlich die mit den Vierhügeln in Verbindung stehenden oberen Schenkel des kleinen Gehirns vereinigen sich in der weißen Substanz des kleinen Gehirns. An der Vereinigungsstelle derselben liegt in der rechten und linken Seitenhöhle des kleinen Gehirns ein von einer gelblichen gefalteten Schale umgebener grauer Kern, *corpus ciliare*, der gezähnte Körper, welcher dem sehr ähnlich ist, welcher sich in dem Innern der Oliven befindet. Er ist runder und größer. Auf der Durchschnittsfläche eines senkrechten oder horizontalen, durch die Hemisphäre des kleinen Gehirns und durch die 4te Hirnhöhle geführten Schnittes zeigt sich die Schale dieses Kerns unter der Form einer zackigen, graugelblichen Linie, welche nicht in sich selbst zurückläuft, sondern an der Wand der 4ten Hirnhöhle in Verbindung tritt. In jeder Hemisphäre ist ein solcher Kern. Beide Kerne hängen nicht unter einander unmittelbar zusammen, daher sieht man von diesem Kerne nichts, wenn man das Mittelstück des kleinen Gehirns durch einen senkrechten Schnitt in 2 gleiche Hälften theilt.

Jeden von den 3 Schenkeln des kleinen Gehirns kann man, wenn man es in einem in Weingeiste erhärteten kleinen Gehirne in einer passenden Richtung in Stücken losreißt, so darstellen, daß er zu der Hemisphäre und zu dem Wurmblättern und Fasern zu schicken scheint. Man hat daher die Meinung, daß die Blätter und Fasern aller 3 Schenkel durch einander durchgehen, und daß an der Stelle dieser Durchkreuzung in jeder Seitenhälfte das *Corpus ciliare* liegt. Die Darstellung der Fasern eines Schenkels beruht aber darauf, daß die Fasern des andern Schenkel bei dem Auseinanderziehen der Hirnhälften abgebrochen werden, und daß nur diejenigen Fasern ganz bleiben, in deren Richtung die Theilung wirkt wird. In der That scheint eine solche Vorstellung von der Lage der Fasern im kleinen Gehirne bestätigt zu werden, wenn man das in Weingeiste erhärtete kleine Gehirn in der Nähe der tiefen Horizontalspalte in einer dieser Spalten in paralleler Richtung von hinten nach vorn in eine obere und in eine untere Hälfte zerreißt, denn diese Richtung ist ungefähr die mittlere zwischen den Richtungen der 3 Schenkel, und es werden dabei die Fasern keines der 3 Schenkel ganz abgebrochen. Bei dieser zuerst von Keil ausgeführten Operation sieht man, daß die Fasern jeder Hemisphäre des kleinen Gehirns nach der Eintrittsstelle der 3 Schenkel zu convergiren, daß sie in der Nähe der Peripherie in feinere Bündel zertheilt liegen, die so wenig von einander in der Richtung abweichen, daß man die Fasern der verschiedenen Schenkel noch nicht von einander unterscheiden kann, daß man aber, wenn man dem Durchkreuzungspunkte beim Auseinanderziehen näher kommt, dickere, zum Theil cylindrische Bündel durch einander durchgehen und sich ästig theilen sieht. Bei dieser Verfahrungsart laufen die Fasern im Mittelstücke ziemlich parallel und gerade von hinten nach vorn, da gegen convergiren die Fasern der Hemisphären nach dem *Corpus ciliare* zu. Sehr merkwürdig ist es aber, daß fast alle hierdurch sichtbar gewordenen Fasern an gewissen Stellen gemeinschaftlich eine kleine Beugung machen, und dann ihren Weg fortsetzen, daß also der Kern des kleinen Gehirns von einigen concentrischen Linien umgeben ist, an welchen die Fasern diese Beugung machen, und daß das kleine Gehirn sich in diesen Linien in mehrere hohle, um den Kern desselben herumgehende, in einander eingeschlossene Schalen theilen läßt, so daß Keil nachweist, daß die von einem Schenkel des kleinen Gehirns ausgegangenen Fasern keineswegs ununterbrochen bis zur Oberfläche des kleinen Gehirns fortgehen, ja

ren daß sie aus mehreren an einander-passenden und von einander leicht trennbaren Stücken bestehen.

Von dem Kerne des kleinen Gehirns gehen nach vielen Richtungen eine gewisse Anzahl dicker, weißer Markwände aus ¹⁾, von denen jede die Grundlage zu einem Hauptlappen des kleinen Gehirns bildet. Diese Markwände lösen sich an der Stelle, wo sie auf dem Kerne der Hemisphäre aufliegen, leicht los, und zwar so, daß die Trennungsfäche an der losgelöseten Wand concav ist, und also eine Rinne bildet, an dem Kerne der Hemisphäre aber convex ist, und also einen Vorsprung bildet, welchen Keil einen Riff nennt.

Jede solche Wand spaltet sich in mehrere dicke Markplatten, von denen jede die Grundlage eines von den vielen, an dem Hauptlappen befindlichen Nebenlappen ist. Auch diese dicken Platten lösen sich leicht von den Stellen los, wo sie an der noch dickeren Wand des Hauptlappens angewachsen sind, und die Trennungsfäche der Platte zeigt dabei eine ziemlich tiefe, spitz ausgehende Furche, während dagegen dieselbe an der markigen Wand des Hauptlappens einen spitz auslaufenden Vorsprung hat, der in die Furche eingriff, als noch beide Theile mit einander in Verbindung waren. Dasselbe findet nun auch da Statt, wo noch kleinere Rippen von diesen Lappen ausgehen. Die dünnsten weißen plattenartigen Projectionsen dieser vielfach gespaltenen Markplatten sind endlich von einer $\frac{1}{2}$ Linie bis $\frac{1}{4}$ Linie dicken Lage grauer Substanz überzogen, welche von einem Blättchen auf das andere, und von einem Lappchen auf das benachbarte Lappchen, und eben so von einem Lappen auf den benachbarten Lappen ununterbrochen durch die zwischen denselben liegenden Vertiefungen hindurch fortgeht. Auch diese graue Platte löst sich im erhärteten Zustande leicht von der weißen Unterlage ab, und läßt sich oft wie eine zusammengefaltete Haut in zusammenhängenden Stücken abheben. Nur in der großen horizontalen Furche an der Stelle, wo der Schenkel für die Brücke hervortritt, ist die Lage der grauen Substanz so dünn, oder zum Theil so ganz, daß man sie hier nicht vom Anfange einer Windung an gegenüber liegenden verfolgen kann. An diesem Schenkel liegt daher der untere Lappen der Hemisphäre des kleinen Gehirns sehr isolirt wie ein Marklappen, das von grauer Substanz überzogen ist, und an welchem man das Verhalten der Fasern im Kleinen sehr übersehbar wahrnehmen kann, welches an den größeren Theilen viel verborgener und verwickelter ist. Der graue Ueberzug ist sich an den Spalten, durch welche die Schenkel aus dem kleinen Gehirne hervortreten, und an der Öffnung, durch welche die Höhle des kleinen Gehirns nach außen offen steht: hier hängt er mit dem inneren Ueberzuge dieser Höhle zusammen, der in der Mitte zwischen grauer und weißer Substanz zu stehen scheint.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Markplatten oder die Markfasern, die gegenüber liegenden Schenkeln ausgehen, in einander ununterbrochen übergehen, z. B. daß die Markplatten und Fasern, die von dem rechten Schenkel der Brücke ausgehen, sich ununterbrochen in die Platten oder Fasern, die vom linken Schenkel der Brücke ausgehen, fortsetzen, und daß auf gleiche Weise in jeder Hemisphäre des kleinen Gehirns die Platten oder Fasern, die vom unteren Schenkel ausgehen, sich ununterbrochen in die Platten fortsetzen, die vom oberen Schenkel des kleinen Gehirns ausgehen. Ist diese Vermuthung richtig, so giebt es 2 Classen von Markplatten oder Markfasern im kleinen Gehirne, die an den mittleren Schenkeln (Brückenschenkeln) welche quere Ringe bilden, und also in sich selbst abgeschlossen sind, und die der untern und äußeren Schenkel (Rückenmarkschenkel und Vierhäuelschenkel) welche keine Ringe bilden und also nicht in sich selbst abgeschlossen sind, sondern Fortsetzungen derselben sind, die der Länge nach durch das Centrum des Nervensystems gehen.

Entwicklung des kleinen Gehirns und der Brücke beim Embryo und bei verschiedenen Thieren.

Sinsichtlich der Entstehung und Entwicklung des kleinen Gehirns und der Brücke bei dem menschlichen Embryo findet man unter andern Folgendes: Das

Keil. im Archive für die Physiol. B. VIII. 1808. p. 385 sq.

kleine Gehirn ist bei sehr kleinen Embryonen, nach Meckel ¹⁾ und Tiedemann, eine in eine einfache Querfalte erhobene Platte, welche von hinteren Hirnschenkeln ununterbrochen zu den Vierhügeln übergeht, die wieder aus einer auf eine ähnliche Weise gebildeten erhobenen Falte bestehen, aber anfangs sehr groß sind. Die 4te Hirnhöhle ist daher gleichfalls zu Zeit sehr groß und hängt nicht, wie später, durch einen engen Canal, aqueductus Sylvii, sondern ununterbrochen mit der 3ten Hirnhöhle zusammen. Nach Carus enthält das Corpus ciliare im 3ten Monate eine Höhle. Größe der Brücke steht mit der Größe der Hemisphären des kleinen Gehirns in bestimmten Verhältnissen. Bei kleinen Embryonen sind die Hemisphären verhältnismäßig dem Mittelstücke sehr klein, und bei ihnen ist es auch die Brücke. Dasselbe ist auch bei den Säugethieren Statt, und bei den Vögeln, wo es nur ein Rudiment der Hemisphären giebt, fehlt die Brücke ganz. Die Größe der Brücke steht daher im Verhältnisse zur Größe der Seitentheile, nicht aber zu dem Mittelstücke des kleinen Gehirns; dagegen mag die Größe des Mittelstücks in einem gewissen Verhältnisse stehen zur Größe der in dasselbe eintretenden untern und oberen Schenkel des kleinen Gehirns. Die Ausbuchtung der durch das Gehirn gehenden Längensfasern steht folglich weder bei Embryonen von verschiedenem Alter, noch bei verschiedenen Thierclassen in einem bestimmten Verhältnisse zu der Größe der im kleinen Gehirne und in der Brücke liegenden Querschnitte. Die Brücke bildet sich, nach Tiedemann, bei dem menschlichen Embryo zu der Zeit des 4ten Monats. Die Windungen des kleinen Gehirns entstehen, nach Meckel und Tiedemann, durch eine Faltung der anfangs glatten Haut.

Die Hirnschenkel, crura oder pedunculi cerebri, die Vierhügel, corpora quadrigemina, oder emittentia bigemina.

Die Hirnschenkel sind 2 dicker, ziemlich cylindrische, etwa $\frac{2}{3}$ eines Boll's aus Längensfasern bestehende Bündel, welche diejenigen Längensfasern enthalten theils (als Pyramiden) zwischen den Quersfasern der Brücke, theils (als Oliven einschließenden vorderen Rückenmarksbündel) hinter ihnen an der äußeren Seite der Brücke emporgestiegen sind. An ihrer Oberfläche sind sie weiß und haben sehr sichtbare, am rechten Hirnschenkel links und am linken rechtsgehende Furchen, und dazwischen gebogene Faserbündel, und werden, je höher sie emporsteigen, desto dicker. Zwischen ihnen liegt graue Substanz in einer tiefen, geraden Furchen, welche die Fortsetzung der vorderen Mittelspalte des verlängerten Marks ist. Diese graue Substanz verschließt die 3te Hirnhöhle von unten, steigt sehr senkrecht und nur ein wenig nach vorn geneigt empor, und wird dabei nach rechts und links auseinander, so daß die mit grauer Substanz gefüllte Vertiefung oben immer breiter wird.

Ihre hintere Seite bildet einen Theil der vorderen Wand der 4ten Hirnhöhle und des aqueductus Sylvii. Seitwärts sind sie mit den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns und mit den Vierhügeln verwachsen. Daher sieht man an der äußeren Seite eine Furchen emporsteigen, welche die Grenze zwischen ihnen und den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns anzeigt.

Am vorderen Rande der Brücke schlagen sich einige von ihr etwas abwärts liegende Quersfasern um die Hirnschenkel in die Furchen derselben. Jedes Bündel geht zuweilen nach der Gegend, wo der 3te Hirnnerv in dieser Gegend zum Vorschein kommt. Die vordere Lage der Fasern der Hirnschenkel ist die Fortsetzung der vorderen Pyramiden. Diese Pyramiden nämlich, welche bei dem Eintritt zwischen die Quersfasern der Brücke sehr schmal geworden waren, trennten sich hierauf in mehrere, durch jene Quersfasern und durch graue Substanz getrennte Bündel, sie vergrößern sich zugleich und vereinigen sich am oberen Rande der Brücke und bilden die vorderste Lage an den Hirnschenkeln. Zu dieser Lage kommt eine mehr hintere Lage hinzu, welche die Fortsetzung derjenigen Fasern des Oliven einschließenden vorderen Rückenmarksbündel ist, welche an der hohlen Seite der Brücke hinter den Quersfasern derselben emporsteigen. Es ist im Hirn

¹⁾ J. F. Meckel, Archiv für die Physiologie. B. I. p. 358.

den fortgesetzten Fasern der Pyramiden durch eine Lage dunkelgrauer (er) Substanz getrennt, bildet die vordere Wand der Aken Hirnhöhle, grenzt an die oberen Schenkel des kleinen Gehirns, *processus cerebelli ad corpora quadrigemina*, und bringt theils unmittelbar in die Mitte des Sehhügels, mit einem Bündel durch die Vierhügel hindurch, in den Sehhügel ein. Bündel, welches Keil und Langenbeck genau abgebildet haben, kommt am Hirnschenkel zwischen dem *Processus cerebelli ad pontem* und dem *us cerebelli ad corpora quadrigemina* an die Oberfläche des Hirnschenkel durch die Grundfläche der Vierhügel hindurch und breitet sich hier und hügel in eine Menge strahlenförmig auseinander weicher Fasern aus¹⁾. Neben der oberen Spitze der Olive und neben der Pyramide in die Brücke n, hinter ihren Quersfasern emporsteigenden Bündel, nennt Keil die *fe, lemniscus*.

: Vierhügel, *corpora quadrigemina*, hängen demnach so genau mit den nkeln zusammen, daß es, die Stelle ausgenommen wo die Wasserleitung diesen Theilen liegt, keine bestimmte Grenze zwischen ihnen giebt. Diese einander verschmolzenen Hügel, von einer sehr dünnen weißen Lage an berfläche überzogenen Hügel, sind nach oben und hinten gerichtet, und an i dahin gefehrten Oberfläche der Hirnschenkel angewachsen. Weil sie auf sen, strahlenförmig auseinander gehenden Fasern der Schleife aufliegen, und ihrer Oberfläche mit einer dünnen Lage weißer Substanz bedeckt sind, so in, wenn man sie durchschneidet, eine graue Lage zwischen 2 weißen Lagen. vorderen Hügel, *nates*, und die 2 hinteren, *testes*, sind ziemlich von gleiße. Bei den fleischstessenden Thieren pflügen, wie *Treviranus*²⁾ noch) bestätigt, die hinteren, bei den wiederkäuenden dagegen die vorderen zu sein. Sie vereinigen die hinteren Theile der Sehhügel, in die sie seitbergehen, und hierdurch die beiden Hirnhälften. Ein weißes, queres, an deren Rande der Vierhügel, dicht über der Oeffnung der Wasserleitung s Bündel, führt auch den Namen der hinteren Commissur, *commissterior*. Zugleich vermitteln sie und die zu ihnen übergehenden oberen l des kleinen Gehirns die Verbindung des kleinen Gehirns mit dem groi welchem dasselbe außerdem so sehr abgefordert ist. Diese Schenkel sind isten unter allen Schenkeln des kleinen Gehirns, fast wie eine Binde platt, Vierhügeln unter einander bogenförmig verbunden, und außerdem auch ie vordere Hirnklappe vereinigt, welche offenbar den Zweck hat, das Mitdes kleinen Gehirns mit den Vierhügeln zu vereinigen. Da, wo sie sich Vierhügel anlegt, befindet sich in der Mittellinie ein von ihr zu den Vierübergehender, dickerer Strang, *frenulum*. Seitwärts gehen von jedem der Vierhügel erhabene Streifen zu den Sehhügeln, und zwischen diesen i befindet sich an der Furche, welche die Vierhügel von den Hirnschenkeln in kleiner, ovaler, grüner Hügel, der innere Kniehöcker, *corpus geminternum*. Er ist nicht mit dem äußeren Kniehöcker, *corpus stum externum* zu vergleichen, welcher äußerlich weiß, und am Sehhügel südlich ist, und mit dem vom vorderen Paare der Vierhügel ausgehenden n Streifen in Verbindung steht. Die Kniehöcker, jene Streifen und dauch die Vierhügel, vorzüglich aber das *Corpus geniculatum externum*, mit dem Streifen des entspringenden Sehnerven zusammen.

r Sehnerv beugt sich an der Grenze des in den Sehhügel eindringenschenkelns zur Grundfläche des Gehirns herum, und bildet daselbst vorber cinereum die Vereinigung der Sehnerven, *chiasma nervorum opti-*

ß die Vierhügel die Verbindung des kleinen Gehirns mit dem großen besteht man bei kleinen Embryonen sehr deutlich, wo diese beiden Abtheilung des Gehirns von einer einzigen in 2 Falten erhobenen Membran gebildet Die Falte, welche dem kleinen Gehirne entspricht, ist anfangs beträcht-

1, im Archiv für die Physiologie. B. IX. 1809. Tafel XI. v. x.
 2) Langenbeck, *Icones anatomicae Neurologia*. Fasc. I. Tafel XXXI. k. m.
 Treviranus, *Vermischte Schriften*. 1820. B. III. 4. p. 72.

sich kleiner als die, welche den Vierhügeln entspricht. Unter dieser Falte befindet sich eben so gut als unter der, welche das kleine Gehirn darstellt, eine große Höhle, durch welche die 4te und die 3te Hirnhöhle ohne Absap in einander übergehen. Dadurch, daß der hohle Raum jener Falte durch feste Substanz ausgefüllt wird, verwandelt sich jene Höhle nach und nach in den engen *aqueo ductus Sylvii*. Bis zum 4ten oder 5ten Monate des Embryonallebens, nach *Carnus*, liegen die Vierhügel unbedeckt, dann aber wachsen die hinteren Lappen des großen Gehirns über sie hinweg.

Nach *Meckel* ist jene Falte, welche die Vierhügel darstellt, anfangs eine einfache Falte, welche zuerst durch einen Längeneindruck in 2 Seitenhälften, und bald darauf im 7ten Monat durch einen queren Eindruck in ein vorderes und ein hinteres Paar Hügel getheilt wird.

Merkwürdig ist es, daß die Vierhügel bei den Säugethieren größer als bei den Menschen sind, und daß sie bei denen vorzüglich groß sind, bei welchen, wie bei den Nagethieren, das übrige Gehirn verhältnismäßig sehr klein und sehr wenig ausgebildet ist. Sie sind bei manchen Säugethieren absolut größer als bei dem Menschen. Dieses ist um so schwerer zu erklären, weil wir, wie *Treviranus* bemerkt hat, keinen anderen Hirntheil kennen, der hierin den Vierhügeln gleiche und mit ihnen in einem bestimmten Verhältnisse der Größe stünde. Ihre Größe scheint folglich in einem gewissen Grade unabhängig von der Größe anderer Hirnthteile zu sein. Zwar hat *Gall* das vordere Paar der Vierhügel als die Ursprungsstelle der Sehnerven angesehen, und behauptet, daß auch die Größe desselben bei verschiedenen Thieren der Größe der Sehnerven entspreche. *Treviranus*¹⁾ hat indessen, wie bei der Beschreibung der Sehnerven gesagt worden wird, gezeigt, daß der Sehnerv an mehreren Stellen des Gehirns seinen Ursprung nehme, und daß die Vierhügel bei denjenigen Thieren, bei welchen, wie beim Maulwurfe, der Sehnerv ein fast unsichtbares, nicht bis zu den Vierhügeln gelangendes Fädchen ist, eine bedeutende Größe haben, und nicht kleiner sind als bei vielen Thieren, bei welchen der Sehnerv beträchtlich dick ist.

Vergleichung des großen Gehirns mit dem kleinen.

Es ist nicht zu verkennen, daß eine gewisse Aehnlichkeit zwischen der Bildung des kleinen und des großen Gehirns Statt finde. Seit *Gall* stimmen alle Anatomen darin überein, daß die Hemisphären des großen Gehirns mit den Hemisphären des kleinen Gehirns, der Balken mit der Brücke, die Hirnschenkel mit dem verlängerten Marke verglichen werden müssen. Aus dieser Vergleichung sieht man aber ein, daß das große Gehirn fast eine umgekehrte Lage hat.

Das kleine Gehirn und seine Brücke bilden nämlich zusammengenommen einen Ring. Dieser Ring besteht aus 2 Hemisphären und aus 2 dieselben verbindenden mittleren unpaaren Theilen, dem sogenannten Wurme (einer unmittelbaren Fortsetzung der Hemisphären) und der Brücke (einer weissen, aus einer Hemisphäre in die andere gehenden Markbinde).

Das große Gehirn bildet gleichfalls einen Ring, welcher aus 2 mit Bindungen versehenen Hemisphären und aus 2 dieselben verbindenden unpaaren Theilen besteht. An der Stelle des Wurms ist hier die graue Lage da, welche die Hemisphären vor den Hirnschenkeln auf der Grundfläche des Gehirns verbindet, die sich aber allerdings dadurch von dem Mittelstücke des kleinen Gehirns unterscheidet, daß sie wenig weisse Substanz enthält und keine Bindungen besitzt. Wäre diese Lage mit Bindungen versehen, so wäre die Aehnlichkeit derselben mit dem Wurme unverkennbar. An der Stelle des 2ten unpaaren Verbindungsstückes der aus queren weissen Fasern bestehende gewölbte Brücke, ist der Balken da, der auch aus queren weissen Fasern besteht, welche aus der Mitte der einen Hemisphäre des großen Gehirns in die Mitte der anderen Hemisphäre dringen. In die Seitentheile des Ringes des kleinen Gehirns treten 2 aus fortgesetzten Fasern des Rückenmarks bestehende untere Schenkel ein, und breiten sich denselben mit divergirenden Blättern und Fasern aus. Eben so treten 2 aus fortgesetzten Längensfasern des Rückenmarks bestehende Hirnschenkel in die 2

¹⁾ *G. R. Treviranus*, a. a. O. S. 76.

theile des Ringes des großen Gehirns ein, und breiten sich in denselben mit divergirenden Blättern und Fasern aus ¹⁾.

Fasern, welche die Fortsetzung der Hirnschenkel und des Balkens sind.

Der Sehhügel, *thalamus nervorum opticorum* (*Corpus striatum posterius* nach Vieussens, *Ganglion cerebri posticum*, nach Gall) und der gestreifte Körper, *corpus striatum*, (*Corpus striatum anticum* nach Vieussens, *Ganglion cerebri anticum* nach Gall) sind 2 an der inneren Seite jeder Hemisphäre des Gehirns in einer ovalen Vertiefung derselben emporragende, oben schon beschriebene Hügel.

In die Sehhügel, die weiter nach unten und hinten liegen und eine weißere Oberfläche haben, pflanzen sich von unten und von hinten die Hirnschenkel und die mit ihnen verschmolzenen Vierhügel ein. Die Fasern dieser Theile weichen in diesen Hügel auseinander, werden durch graue Substanz getrennt und vermehren sich, während sie durch dieselben hindurch gehen. Manche Fasern gehen erst durch den Sehhügel, und dann auch durch den gestreiften Körper hindurch, manche Fasern scheinen von der inneren Seite der Hirnschenkel aus nur in den gestreiften Körper überzugehen, ohne vorher durch den Sehhügel hindurch gegangen zu sein, nach anderen endlich (namentlich die nach hinten, nach außen und die nach unten auflaufenden Fasern) gehen nur durch den Sehhügel hindurch. Manche Bündel scheinen sich in dem gestreiften Körper in kleinere zu zertheilen und sich wieder untereinander zu vereinigen. An der Seite, an welcher diese Hügel mit der Marksubstanz der Hemisphären des großen Gehirns verschmolzen sind, gehen die fortgesetzten Fasern, wie die Federn eines Federbusches gekrümmt, zu fast allen Wiu-

¹⁾ Man kann diese Analogie, oder Vergleichung des großen und kleinen Gehirns, noch weiter verfolgen. Indessen thut man wohl, dabei vorsichtig zu sein, und Vermuthungen, welche selbst auf einer etwas entfernten Analogie beruhen, nicht für ausgemachte Wahrheiten zu halten. Ich bemerke daher, daß folgende Vergleichungen noch mehrere Einwendungen zulassen. Einige Bündel von Längensfasern, die Fortsetzungen der vorderen Rückenmarksbündel (der Nerven des verlängerten Marks), gehen an der concaven Seite der Brücke durch die Höhle des kleinen Gehirns zum großen Gehirn über, ohne sich in die Substanz des kleinen Gehirns zu verbreiten und zu endigen, und kommen zu den Sehhügeln und zu den Vierhügeln. Auf ähnliche Weise gehen auch von den in die Sehhügel des großen Gehirns eingetretenen Längensfasern einige Bündel, ohne sich lediglich in die Substanz des großen Gehirns auszubreiten, in die *Corpora candicantia*, und von da längs der Höhle des großen Gehirns als *fornix* bis an das Ende dieser großen Hirnhöhle fort. So wie jene Längensfasern des kleinen Gehirns an der concaven Seite der Brücke, und an der Wand der Höhle des kleinen Gehirns liegen, so liegen diese an der concaven Seite des Balkens und an der Wand der Höhle des großen Gehirns. Der Anfang der Höhle des großen Gehirns ist an dem *Aquaeductus Sylvii*, der die Höhle des kleinen Gehirns mit der des großen verbindet. Von hier aus erstreckt sie sich als 3te Hirnhöhle zwischen den Sehhügeln vorwärts, setzt sich hierauf mittels der Monro'schen Oeffnungen in die Seitenventrikel fort, und geht gekrümmt über den Sehhügel herum nach hinten, und endigt sich, indem sie sich unter dem Sehhügel weg nach vorn krümmt. Die Höhlen des großen Gehirns sind also wie Widderhörner gewunden, und das Ende dieser gewundenen Höhle ist das Ende des unteren Horns des Seitenventrikels. Daß auch das vordere Ende des Gehirns, wenn man den Verlauf der Längensfasern des Gehirns berücksichtigt, nicht an der Stirn, sondern da, wo sich das untere Horn des Seitenventrikels endigt, zu suchen sei, hat *Vaurenet (Laurenceot, Anatomie du cerveau dans les quatre classes d'animaux vertébrés, comparée et appliquée spécialement à celle du cerveau de l'homme; avec planches. Paris 1825, 8. Fig. XIII.)* durch eine ihm eigenthümliche Zergliederung des Gehirns anschaulich gemacht, und dieselbe Ansicht wird auch dadurch, wie das Gehirn beim Embryo wächst, sehr wahrscheinlich, denn indem es wächst, krümmt sich die Höhle des Gehirns spiralförmig, und das Ende der Hirnhöhle, welches man später das Ende des unteren Horns des Seitenventrikels nennt, ist bei der wachsenden sich krümmenden Höhle der vorausgehende Theil.

dungen des großen Gehirnes fort. Von dieser ersten Classe von Fasern ist eine 2te Classe von Fasern zu unterscheiden.

Von den meisten Windungen der Hemisphären des großen Gehirns kommen nämlich ziemlich querlaufende Fasern, welche ununterbrochen aus einer Hemisphäre in die andere gehen und dadurch in der mittleren Ebene des Körpers den Hirnbalken, so wie auch die vordere und hintere Commissur bilden. In der Nähe der Oberfläche der Windungen des großen Gehirns haben die von den Vierhügeln und von den Hirnschenkeln ausgegangenen, und die in dem Balken und in den Commissuren zusammenkommenden Fasern ziemlich eine und dieselbe Richtung, und hier lassen sich die Fasern an durch Weingeist erhärteten Gehirnen leicht darstellen. Ob nun diese 2 Classen von Fasern neben einander bis zur grauen Substanz des Gehirns gehen, oder ob sie sich früher unter einander verbinden und sich umbiegen und in einander fortsetzen, läßt sich nicht entscheiden. Reil glaubte einmal in einem wasserflüchtigen Gehirne einen unmittelbaren Uebergang der fortgesetzten Fasern des Hirnschenkels in die des Balkens gesehen zu haben. Auch Zedermann ist dieser Meinung günstig. Auf der Mitte ihres Verlaufs kreuzen sich beide Classen von Fasern, und an dieser Stelle lassen sie sich schwerer sichtbar machen, weil die eine durchrisfen werden muß, damit die andere weiter verfolgt werden könne, keine von beiden Classen von Fasern sich aber gut durchkreifen läßt, ohne daß die andere zugleich verletzt werde. An manchen Stellen der Wände des Seitenventrikels liegen die zu dem Balken laufenden Querfasern unbedeckt. Dieses ist namentlich an der Decke des Seitenventrikels nach innen zu und an einem großen Theile der Decke des hinteren Horns der Fall, denn hier sind sie nur vom Epithelium überzogen. In einer kleinen Entfernung neben dem gestreiften Körper und neben dem Sehhügel befindet sich demnach eine gekrümmte Stelle, in welcher sich die Fasern an der Brücke und die der Hirnschenkel zu durchkreuzen anfängen. An der Stelle, wo die obere Oberfläche des Balkens in die Hemisphären eindringt, befindet sich eine Spalte, an welcher die Windungen sich endigen, indem die äußere graue Masse derselben in die weiße Substanz der Windungen übergeht. Die weiße Masse dieser Windungen besteht aus horizontalen Blättern, welche selbst wieder aus von vorn nach hinten laufenden Fasern zusammengesetzt sind. Hier kommen daher 2 horizontale Lagen von Markfasern in Berührung, die sich leicht von einander trennen lassen, und von welchen die des Balkens aus Querfasern, die der Windungen aus horizontalen Längelfasern bestehen. Etwas ähnliches findet auch an der Decke des hinteren Horns Statt. Köst man die von dem Balken herrührende horizontale Lage, die die Decke dieses Horns zunächst bildet, ab, so kommt man auf eine 2te horizontale, von den Hirnschenkeln herrührende Lage von Fasern, welche eine ganz andere, der Länge nach gehende Richtung hat. — Langenbeck hat hierüber vorzüglich gute Abbildungen herausgegeben. Neben den Vierhügeln ragen die hinteren Spinen der Sehhügel hervor. Die Oberfläche, welche beide Sehhügel einander zuzehren, ist platt und grau, und ungefähr in der Mitte durch graue Hirnsubstanz, die graue Commissur, commissura mollis, vereinigt. An der Grenze der gewölbten oberen und der platten inneren Oberfläche der Sehhügel hört der weiße Ueberzug des Sehhügels plötzlich mit einem etwas aufgeworfenen Rande auf. An dieser Stelle sollen, nach Meckel, die Sehhügel an sehr kleinen Embryonen unter einander verwachsen sein. Dieser Rand setzt sich bei dem Erwachsenen hinten in den weißen markigen Lagen fort, durch welche beide Sehhügel unter einander vereinigt werden, und an welchem die auf dem vorderen Vierhügelpaare ruhende Zirbel, glandula pinealis, oder conarium, hängt.

Die graue Substanz, welche die Windungen überzieht. Substantia corticalis.

Diese graue Substanz bildet eine etwa 1 Linie, bis $1\frac{1}{2}$ Linie dicke Lage, welche über die an der Oberfläche der Windungen liegenden Enden der Markfasern des großen Gehirns ausgebreitet ist, und sich durch die Vertiefungen und über die Erhabenheiten der Windungen ununterbrochen fortzieht. Die Windungen scheinen dadurch zu entstehen, daß die beschriebenen Fasern der weißen Substanz an manchen Stellen kürzer, an manchen länger sind. Wo sie kürzer sind, entstehen die vertieften, da wo sie länger sind, die erhabenen Stellen der Windungen. Die graue Substanz, welche die Windungen und folglich auch die Enden

der bis zur Oberfläche reichenden weißen Fasern überzieht, besteht nicht aus Fasern, welche die Fortsetzung jener weißen Fasern wären. Wenn man die weißen Fasern eines in Weingeist erhärteten Gehirns auseinander reißt, so reißt zwar auch die graue Substanz so durch, daß sie eine faserige Bruchfläche erhält. Dieses rührt aber daher, daß sie im erhärteten Zustande in jeder Richtung leicht durchbricht, in welcher die weißen Fasern sich getrennt haben. Fängt man das Zerreißen bei der grauen Substanz an, so kann man an ihr keine Fasern sichtbar machen.

Die Lage grauer Substanz, welche die Windungen des Gehirns überzieht, kann man daher vielleicht als eine Lage von Hirnsubstanz betrachten, durch welche die Enden aller bis zur Oberfläche reichenden Hirnsfasern unter einander in Verbindung gebracht werden; und also als eine allgemeine Commissur für alle jene Hirnsfasern. Wäre diese Ansicht richtig, so würde man auch den Nutzen der Hirnwindungen einsehen, denn dieser würde darin bestehen, daß das Gehirn, vermöge einer Ausbeugungen und Einbeugungen eine viel größere Oberfläche erhielte, als es haben würde, wenn die Oberfläche platt wäre, eine Oberfläche, welche hinreichend groß wäre, damit an ihr alle Hirnsfasern sich endigen und mit der grauen Lage in Berührung kommen könnten. Hiermit würde man auch erklären können, warum das Gehirn bei Thieren, bei welchen es eine große Höhle, aber wenig Markfasern besitzt, ohne Windungen sein könne, weil nämlich bei einem solchen Gehirn alle jene Enden der Markfasern schon ohne dieß hinreichenden Platz an der Oberfläche des Gehirns finden.

Die sehr merkwürdige Einrichtung, vermöge welcher der graue Ueberzug der Windungen seine Blutgefäße von außen von der Pia mater erhält, welche überall mit unzähligen, 1 bis $1\frac{1}{2}$ Linien langen Zweigen senkrecht in sie eindringen, aber nicht in die darunter gelegene weiße Substanz übergehen, und vermöge welcher die Blutgefäße in die übrige Gehirnssubstanz von den Ventrikeln und von den grauen Oberflächen aus, an welchen das Gehirn keine Windungen hat, gelangen, und hauptsächlich in der Richtung der Markfasern laufen, läßt auf eine wichtige Verschiedenheit der grauen Rindensubstanz und der weißen Substanz schließen. Denn daraus, daß die Wege, auf welchen der grauen und der weißen Substanz Blut zugeführt wird, so sehr verschieden und von einander getrennt sind, und daß die Blutgefäße dieser in einer so innigen Berührung stehenden 2 Substanzen so wenig communiciren, läßt auf eine sehr verschiedene Verrichtung beider schließen, auf eine Verrichtung, die in beiden eine verschiedene Art der Zuführung des Blutes nöthig macht. Der viel größere Gefäßreichtum der grauen Substanz läßt uns namentlich mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuten, daß in ihr eine größere ernärende Thätigkeit herrsche, als in der weißen Substanz. Eine solche größere ernärende Thätigkeit kann aber aus verschiedenen Ursachen in der grauen Substanz des Gehirns nöthig sein, z. B. in dem Falle, wenn die Thätigkeit einer Markfaser eine Thätigkeit in einer großen Strecke in der grauen Substanz anregen könnte; denn unter diesen Umständen würde die graue Substanz fast immerfort in Thätigkeit erhalten werden, während in der Marksubstanz nur abwechselnd bald diese, bald jene Fasern thätig wären, und es würde dann auch die graue Substanz eines reichlicheren Blutzuflusses und einer reichlicheren Ernährung bedürfen, als die weiße.

Zirbel, glandula pinealis.

Von dem oberen Rande des Sehhügels, durch welchen die weiße obere Fläche des Sehhügels an die innere graue stößt, geht hinten ein weißer, aus Markfasern bestehender Bogen aus, durch welchen beide Sehhügel unter einander verbunden werden. An diesem Bogen hängt ein graues, weiches, rundliches, meistens etwas längliches, zuweilen herzförmiges Klümpchen, von unbeständiger Größe, das auf den ersten Anblick einer Drüse ähnlich ist, bei genauerer Betrachtung aber sich wie ein Hirntheil verhält. Bisweilen ist er hoch und vorn offen, so daß seine Höhle, nach Sömmerring, mit der 3ten Hirnhöhle in Verbindung steht. Auf dem markigen Bogen, an welchem die Zirbel hängt, oder auch in ihrer Substanz, finden sich, wie Sömmerring ¹⁾ zuerst bewiesen hat, im regelmäßigen Falle,

¹⁾ S. Th. Sömmerring, in Nöthig Dissert. de acervulo cerebri, und in Ludwig script. neurol. min. Tom. II. p. 322. sqq.

gestrichen, Dagegen aus Amphibien gefunden worden. Das erste Thier, an dem sie beobachtet wurde, war ein Affe, und wiederkehrenden Thieren ist sie, nach Treviranus³⁾, größer, bei Thieren kleiner als bei dem Menschen. Der Hirnsand wird aber, nach Treviranus⁴⁾ bezogen, nur bei dem Menschen, nicht bei den übrigen (die Affen nicht ausgenommen) gefunden.

Corpora candicantia, Fornix, Taenia, Pes hippocampi

Auf der unteren Seite, zwischen den auseinander weichenenden liegt graue Substanz, und über derselben eine dünne Lage weißer, oder im erharteten Zustande) faseriger Substanz, welche mit der inneren Hirnschale und mit der unter der Öffnung des aquaeductus Sylvii, und von da zum Trichter sich erstreckenden Substanz zusammenhängt, hilft den Boden der 3ten Hirnhöhle bilden. An dieser äußerst weichen liegen nun die beiden auf der Grundfläche des Gehirns sichtbaren Mammillen, corpora mammillaria, oder candicantia, 2 weiße Erhabenheiten die Form der menschlichen Brüste haben. In jedes Markkugelnchen weißer, gebogener, aus Längensfasern bestehender Schenkel ein, welcher der inneren Seite des Sehhügels in der grauen Substanz desselben verläuft, von jedem Markkugelnchen geht auch wieder an der nämlichen Seite gebogener Schenkel aus, der im Markkugelnchen mit vielen Fasern an der grauen, mit dem Tuberculum cinereum zusammenhängenden Substanz entspringt, und endlich an der vorderen Spitze des Sehhügels aus der grauen hervortritt, um den Sehhügel sich herumkrümmt und den Namen Fornix, erhält. Das beschriebene Markbündel von der Stelle an, wo es aus dem Markkugelnchen austritt, bis zu der, wo es mit demselben Markbündel auf der vorderen Seite zusammenstößt, heißt vorderer Schenkel, oder vorderes Sacculus, des Fornix. Da wo dieser vordere Schenkel noch in der grauen Substanz unter dem Sehhügel verborgen ist, sieht er durch Markfasern,

¹⁾ S. Th. Sömmerring, ebendasselbst.

²⁾ J. et C. Wenzel, de penitioribus structura cerebri hominis et brutiorum, 1812. Fol. c. tab. aen. p. 155 — 165.

³⁾ G. R. Treviranus, a. a. O. p. 19.

⁴⁾ Tiedemann, Icones cerebri simiarum, etc. p. 51.

abgehen, die aber oft schwer aufzufinden sind, mit dem Grenzstreifen zwischen Sehhügel und dem gestreiften Körper, und durch ein anderes Bündel von Nerven mit dem Markbogen, an welchem die Zirbel hängt, in Verbindung. Jeder Schenkel des Fornix krümmt sich um die vordere Spitze des Sehhügels in Höhe, und weil es hier eine Stelle giebt, wo er nicht an dem Sehhügel ansetzt, oder durch die weiche Hirnhaut mit dem Sehhügel verbunden ist, so ist hier zwischen dem Fornix und dem Sehhügel eine kleine Lücke, welche die Monroische Oeffnung, foramen Monroi, nennt. Durch diese Lücke setzt sich der 3te Ventrikel ununterbrochen in jeden der beiden Seitenventrikel. Von nun an legen sich die beiden Schenkel des Fornix an einander, und wie ein Saum am unteren Rande der vom Balken herabhängenden Scheidewand, mit welcher sie verwachsen, und durch einige in sie übergehende Fasern verbunden sind. Sie decken die zwischen den Sehhügeln befindliche Spalte, oder den 3ten Ventrikel von oben, und sind an die Sehhügel durch die Pia angeheftet. Da wo hinten die Scheidewand aufhört, legen sie sich an die Oberfläche des Balkens an und trennen sich wieder von einander, *crura fornicis*, unter einem Winkel, den man die *Leier*, *psalterium*, nennt. erwachsen nun mit den Fasern des Balkens, welche die Seitenwand des unteren Horns des Seitenventrikels bilden. Jeder Schenkel geht gekrümmt in das obere Horn über. Auf diesem Wege schiebt er, nach Keil, Fasern in die hinteren Höhlen. Im unteren Horne liegt nun der letzte Theil des Fornix, als *Fimbria* am concaven Rande des um den Sehhügel herumgekrümmten *Pes hippocampi major*, und ist durch den *Plexus choroideus* so mit dem Sehhügel verbunden, daß die Spalte zwischen dem Sehhügel und dem *Pes hippocampi major*, außerdem an der Grundfläche des Gehirns offen stehen würde, geschlossen ist. Der *Pes hippocampi major*, der große Seeperdefuß, oder der große Wulst, ist der freie wulstige Rand der sich hier endigenden Bindungen des hinteren Hirnlappens in der Gegend der *Fossa Sylvii*, an welchem die weiße Substanz der Hirnhöhlen in die graue Substanz der Oberfläche des Gehirns übergeht. Dieses ist namentlich an einem neben der *Fimbria* befindlichen grauen, ein wenig hervorragenden Längsstreifen der Fall, welchem manchen den Namen *Fascia denticulata* gegeben haben. Nach oben, neben dem *Pes hippocampi*, verläuft zuweilen ein kleiner Nebenwulst, *eminentia collateralis*, die auf dem Boden des hinteren Horns befindlichen Wulste führen, welche den Namen *Pes hippocampi minor*, oder *calcar avis*. Der *Pes hippocampi major* ist also das an den Windungen des großen Gehirns, was das Marksegel an den Windungen des kleinen Gehirns ist, die Stelle, an welcher die innere Oberfläche der Ventrikel in die äußere der Windungen übergeht. *Alzgr*, die Brüder *Wenzel* und *Gall* nannten sie eine nach innen gerichtete Hirnwindung. *Döllinger* und *G. R. Treviranus* erklärten sich diese Ansicht. *Treviranus* bemerkte sehr richtig, es gebe hier einen Zusammenhang des Markes mit der äußeren Schale des Gehirns. Nach ihm stößt das wulstförmige Ende des Markes des *Hippocampus* mit dem Markkerne und der grauen Substanz der Sylvischen Grube, und dadurch mit dem Anfange der Fasern der vorderen Commissur, mit den des gestreiften Körpers und mit dem letzten Theile des Geruchsnerven zusammen. Außerdem fand *Treviranus* anzugethieren, daß der concave Rand des gerollten Wulstes einen Seitenfortsatz am hinteren wulstförmigen Ende des Balkens erhält, der den weißen Saum bildet, welcher längs desselben liegt. Bei dem Menschen und bei dem Affen ist der *Pes hippocampi* nach *Treviranus* klein, bei den Raubthieren, Nagern, Säugern, Einhufern und bei den schweineartigen Thieren ist der obere, im unteren Horne liegende Theil desselben so breit, daß er den ganzen Sehhügel, und der Ratte sogar einen Theil des gestreiften Körpers bedeckt. Die Größe des *Hippocampus* steht bei den Säugethieren in keinem sich gleich bleibenden Verhältnisse zu der Größe der Hirnwindungen, wohl aber, wie es *Treviranus* meint, mit der des Geruchsnerven.

Die weiße Masse des *Pes hippocampi* geht nun die Substanz des Endes des Fornix über, und wird dabei schneller dünner, und erhält den Namen

limbria, Saum, des Pes hippocampi. Ueberblickt man daher den aus Längenfäsern bestehenden Fornix, so sieht man, daß er vorn fast der ganzen Länge nach der Hirnhöhle des großen Gehirns folgt, an der Wand derselben sich um den Sehhügel herumkrümmt, und an diesem Hügel größtentheils durch die Pia mater angeheftet ist.

Scheidewand, septum pellucidum, oder lucidum.

Zwischen dem vorderen Theile des Fornix und dem Balken befindet sich in der Mittellinie des Gehirns die Scheidewand. Sie hat vorn, wo der Fornix weit vom Balken absteht, eine beträchtliche Höhe, hinten, wo sich der Fornix an den Balken anlegt, endigt sie sich spitz. Sie ist nicht einfach, sondern aus 2 an einander liegenden, nicht mit einander verwachsenen, Blättern zusammengesetzt, die man durch Einblasen von Luft leicht von einander heugen und dadurch die Höhle der Scheidewand, ventriculus septi pellucidi (die manche auch die 3te Hirnhöhle nennen), sichtbar machen kann. Wenn bei der Wassersucht des Gehirns Wasser in dieser Höhle befindlich ist, so kann man bemerken, daß sie von einer zarten Haut ausgekleidet ist¹⁾. Diese Höhle hängt bei Erwachsenen, in regelmäßigen Falle, nicht mit den übrigen Hirnhöhlen durch eine Oeffnung zusammen, wohl aber steht sie, nach Ziedemann²⁾, bei Embryonen, mittels einer kleinen dreieckigen Oeffnung, welche sich zwischen dem vorderen Schenkel des Fornix und der vorderen Commissur befindet, mit der 3ten Hirnhöhle in Verbindung. Durch diese Oeffnung zieht sich auch die weiche Hirnhaut in die Höhle hinein. Uebrigens ist die Höhle der Scheidewand beim Embryo nicht auffallend groß, wie das bei den andern Ventrikeln der Fall ist. Die beiden Wände der Scheidewand bestehen zum Theil aus grauer Substanz, in welcher deutliche, vom Fornix ausgehende, auseinander weichende weiße Fasern zum Balken emporsteigen, die man, wie Ziedemann bemerkt, nicht als Fasern, welche vom Balken ausgehen, betrachten darf.

Quere Hirnspalte, grauer Hügel, Trichter und Hirnanhang.

Aus dem Vorhergehenden sieht man ein, daß es außer dem aquaeductus Sylvii noch eine 2te Stelle giebt, wo die Höhlen des großen Gehirns nicht durch Gehirnmasse geschlossen sind, die Querspalte nämlich. Sie fängt unter der Mitte des hinteren Randes des Balkens an. Zwischen ihm und den Vierhügeln ist nämlich eine Spalte, durch welche die Substanz an der Oberfläche der Vierhügel ununterbrochen in die Substanz an der Oberfläche der Hirnhöhlen, d. h. in die des Sehhügels und des gestreiften Körpers übergeht. Sie ist aber nicht, wie der aquaeductus Sylvii, offen, sondern durch die weiche Hirnhaut, welche hier in die Hirnhöhle eindringt, und durch die Spinwebenhaut geschlossen. Hier treten mit diesen Häuten beträchtliche Blutgefäße in die Ventrikeln des Gehirns herein, oder, wie die Vena magna Galeni, aus ihnen heraus. Diese Spalte setzt sich nun seitwärts zwischen dem untersten Theile des Sehhügels und dem hinteren Zapfen des großen Gehirns, der sich um den Sehhügel von unten her herum schlägt, fort. Denn wenn man den in den Sehhügel eindringenden Hirnschenkels auf der Grundfläche des Gehirns verfolgt, so findet man den Rand der Windungen, die den Sehhügel bedecken, hinten nicht durch Gehirnschubstanz am Sehhügel angewachsen, sondern durch die weiche Hirnhaut, die sich hier in die Hirnhöhle hineinschlägt und den Sehhügel überzieht, verschlossen. Die Windungen endigen an dieser Stelle mit einem freien wulstigen Rande, den man, wie oben bemerkt worden ist, den großen Seeferdefuß, pes hippocampi major, nennt, und der mit der vielfach gefalteten, durch Nebenfältchen und Zotten krausen Stelle der weichen Hirnhaut (plexus choroideus des unteren Horns) in Verbindung steht und an dem Sehhügel angeheftet ist. Vorn, in der Nähe der zwischen dem ver-

¹⁾ J. F. Meckel d. ä., Obs. sur la glande pinéale sur la cloison transparente, in Méin. de Berlin 1765, p. 96.

²⁾ Ziedemann, Anat. und Bildungsgeschichte etc. S. 169.

deren und hinteren Hirnlappen befindlichen queren Furche, welche man Fossa Sylvii nennt, setzt sich die graue Rindensubstanz der Hirnwindungen in die des grauen Hügel's (tuber cinereum) fort, und hierdurch hängt die Rindensubstanz der Windungen der rechten Seite mit der der linken Seite ununterbrochen zusammen. Durch den grauen Hügel ist die 3te Hirnhöhle von unten verschlossen.

In der Fossa Sylvii ist die graue Substanz nicht in Windungen gelegt. Sie ist aber von vielen Löcherchen durchbohrt, durch welche Blutgefäße (nicht wie anderwärts zur grauen Rinde), sondern tief in die Markmasse des Gehirns eindringen. Man nennt die an dieser Stelle gelegene durchlöcherete Gehirnschicht, nach Bichat d'Uzzy, Substantia perforata anterior.

Von der Vereinigung der Sehnerven geht die graue Platte zum Knie des Balkens über. Sie ist hier oft äußerst dünn, so daß die vordere Commissur durchschimmert.

Der graue Hügel geht in der Mitte in den Trichter, infundibulum, über, und vor dem Trichter vereinigen sich die Sehnerven untereinander und stehen daselbst mit der grauen Substanz in getauem Zusammenhange.

Der Trichter besteht äußerlich aus grauer Substanz, ist hohl, und geht mit seiner Spitze ziemlich in die Mitte des auf dem Türkenstall ruhenden, von der Hirnhaut umschlossenen Hirnanhanges, hypophysis, glandula pituitaria, hinein. Dieser längliche, quer liegende Hirntheil, dessen Querdurchmesser etwa $\frac{1}{2}$ Zoll, dessen 2 andere Durchmesser kaum $\frac{1}{4}$ Zoll messen, besteht aus 2 Lappen, aus einem vorderen viel größeren, bohnenförmigen, und einem hinteren kleineren, runden, in einer Grube des vorderen liegenden Lappen. Zwischen beiden Lappen tritt der Trichter hinein. Der vordere Lappen ist härter, und man unterscheidet inwendig in seiner röthlich braunen Substanz meistens eine etwas weißere Substanz. Der hintere Lappen ist weicher und mehr grau zu nennen. Bichat¹⁾ hat bisweilen im Hirnanhange oder auf seiner Oberfläche eine feste sandartige Substanz, Hirnsand, gefunden, ein Umstand, der eine gewisse Ähnlichkeit des Hirnanhanges mit der Zirbel andeutet.

Der Hirnanhang und die Zirbel werden, nach Tiedemann, zu Ende des 3ten Monats sichtbar.

Die vordere Commissur.

Dieser weiße, cylindrische, sehr bestimmt von den benachbarten Fasern unterscheidbare Strang, der im vordersten Theile der 3ten Hirnhöhle quer aus einer Hirnhälfte in die andere hinübergeht, liegt vor den vorderen Schenkeln des Fornix. Er dringt in den vorderen Theil des Corpus striatum ein, krümmt sich dann ein wenig nach hinten, und breitet sich mit vielen dünnen Fasern im vorderen Theile des hinteren Hirnlappens aus. Nach Tiedemann²⁾ sollen auch Fasern der Hirnschenkel im gestreiften Körper direct in die Fasern der vorderen Commissur übergehen.

Die Aderneße.

Die Aderneße, plexus choroidei, sind vielfach zusammengelegte, krause, mit zahlreichen geflügelten Arterien und Venen versehene Falten der Pia mater, welche in der Nähe der Stellen liegen, wo sie sich in die Höhlen des Gehirns einschlägt und die innere Oberfläche des Gehirns überzieht. Ein kleiner Plexus choroideus liegt auf jeder Seite neben der Querspalte, durch welche die 3te Hirnhöhle zwischen dem verlängerten Marke und dem kleinen Gehirne steht. Der Theil der Pia, der diese Höhle verschließt, scheint inwendig mit einer dünnen Lage Gehirnschicht überzogen zu sein, die von dem freien Rande der Windungen des kleinen Gehirns vom hinteren Markselge auf ihn übergeht. Jeder Plexus choroideus des kleinen Gehirns liegt daher an der Stelle, wo die Flocken mit dem hinteren Markselge zusammenhängen, und geht am vorderen Rande der Mandel und über dem Ursprunge des Nervus facialis, acusticus, glossopharyngeus und vagus hin, und steht durch den die 4te Hirnhöhle verschließenden Theil der Pia mater mit dem der anderen Seite in Verbindung. Zuwei-

¹⁾ Bichat, Anat. descript. T. III. p. 75.

²⁾ Tiedemann, a. a. O. S. 138.

sen findet man in demselben kleine weiße Klümpchen, die sogenannten Pachionischen Körper oder Drüsen.

Die Aderneze des großen Gehirns liegen an der großen Hirnspalte des großen Gehirns. Das untere Horn des Seitenventrikels würde auf der Grundfläche des Gehirns an der Stelle, wo die Hirnschenkel in die Sehhügel eintreten, offen stehen, hinge hier nicht die Pia mater, die das Gehirn äußerlich überzieht, mit dem freien Rande der Hirnwindungen des großen Gehirns, mit der Fimbria, zusammen, und befestete diesen Saum an den Sehhügel an. An dieser Stelle bildet sie den Plexus choroideus des unteren Horns. Dieser Plexus choroideus begleitet nun immerfort die Fortsetzung der Fimbria, den Fornix um den hinteren Theil des Sehhügels und auf der oberen Fläche desselben herum bis zur Monroischen Oeffnung. An dem hinteren Theile des Sehhügels bemerkt man in ihm ein meistens ovales, von Bicaq d'Azor und Wenzel beschriebenes Klümpchen welches oft selbst mit Pachionischen Körperchen bedeckt ist. An dieser Stelle sind die Faltungen des Plexus choroideus noch weit vielfacher und die Blutgefäße desselben ausgebehnter. Durch die Monroische Oeffnung geht der Plexus choroideus aus dem rechten und linken Seitenventrikel zur oberen Wand des 3ten Ventrikels über. Beide sind sehr dünn und laufen neben einander an der unteren Oberfläche des Fornix bis zu der Stelle, wo der 3te Ventrikel zwischen den Sehhügeln und dem hinteren Rande des Balkens durch die Pia mater verschlossen wird. Nach meinen Untersuchungen über die Entwicklung des Gehirns, bin ich geneigt anzunehmen, daß die Plexus choroidei ein verkämmerter und zusammen gefalteter Theil der Pia mater und der blasenförmigen Gehirnwand des veralteten Markes des kleinen Gehirns und des großen Gehirns sind.

Serum der Gehirnentrikel.

Die Ventrikel des Gehirns enthalten nach dem Tode eine geringe Menge eines etwas gelblichen Serum. In lebenden Thieren scheint in ihnen, wie Bohm Lieutaud und Portal gezeigt haben, nur ein Dampf vorhanden zu sein, der von den Gefäßen der weichen Hirnhaut ausgehaucht wird. Kaanow hat wenigstens gezeigt, daß man die Absonderung dieses Dampfs nach dem Tode durch Einspritzung von Wasser in die Adern anschaulich machen könne. Daß aus verletzten Ventrikeln eines lebenden Menschen eine große Menge Wasser in kurzer Zeit auslaufen könne, ist schon Theil I. S. 290. bemerkt worden.

Bei Gehirnwassersucht vermehrt sich diese Flüssigkeit ungemein, und dehnt, oft ohne eine beträchtliche Störung in den Seelenverrichtungen hervorzubringen, das Gehirn sehr aus.

Im gesunden Zustande berühren sich die Hirnthelle einander, und die Zwischen ihnen befindlichen Zwischenräume sind sehr klein. Bei jungen Embryonen dagegen ist eine große Ausdehnung der Gehirnentrikel, und die Gegenwart von vielem Wasser in ihnen der regelmäßige Zustand.

Ueber den Zusammenhang, in welchem die hauptsächlichsten Theile des Rückenmarks und Gehirns unter einander stehen.

Am Schlusse dieser Betrachtungen wäre nun eine Darstellung zu wünschen durch welche man eine Uebersicht über den Zusammenhang der einzelnen Theile des Rückenmarks mit den verschiedenen Hirnthellen, und über den Zusammenhang in welchem diese unter einander stehen, erhielte. Allein eine so genaue Kenntniß des Gehirns besitzt man noch nicht, um diese Aufgabe vollständig zu lösen. Ich will mich daher begnügen, einiges aus der Darstellung auszuhelien, welche Burdach¹⁾ hierüber zu geben versucht hat.

Das Rückenmark besteht nach Burdach aus den durch die vordere und

¹⁾ C. F. Burdach, vom Baue und Leben des Gehirns. B. I. Mit 2 K. Leipzig: 1819. 4. B. II. 1822. Mit 7 K. B. III. 1826. Mit 1 K. 4., der größten Sammlung anatomischer und physiologischer Beobachtungen über das Nervensystem. Wir besitzen.

durch die hintere Rückenmarkspalte getrennten 2 Seitenhälften, und aus dem diese beiden Seitentheile vereinigenden Kerne.

Jede von jenen Seitenhälften besteht erstlich aus 2 im Innern gelegenen grauen Strängen, aus einem vorderen und aus einem hinteren grauen Stränge;

zweitens aus der die grauen Stränge umgebenden weißen Substanz, welche selbst auf jeder Seite in 5 Stränge eingetheilt werden kann, nämlich

in einen sehr großen zwischen der vorderen und hinteren Reihe von Nervenwurzeln gelegenen Seitenstrang,

in die 2 neben den beiden Reihen von Nervenwurzeln gelegenen Stränge, in den vorderen äußeren, und in den hinteren äußeren Strang, und

in die die 2 kleinsten, nicht überall sichtbaren Stränge, welche neben den vorderen und dicht an der vorderen und hinteren Rückenmarkspalte liegen, in den vorderen inneren und hinteren inneren Strang.

Der unpaare Kern besteht theils aus grauer Masse, welche die 4 grauen Stränge unter einander vereinigt und den Rückenmarkscanal einschließt, und aus einer den Boden der vorderen und den der hinteren Rückenmarkspalte überziehenden Lage von weißen Grundfasern, welche die weiße Endstanz der beiden Seitenhälften unter einander verbindet.

Bei dem Uebergange in das verlängerte Mark, wird nur der Theil des Rückenmarkes, welcher bis jetzt den unpaaren Verbindungstheil desselben ausmachte, gleichfalls in paare Bündel gespalten, und zwar in 2 vordere und in 2 hintere.

Die 2 vorderen sind die vorn neben der Spalte liegenden Pyramiden. Sie entstehen hauptsächlich aus den weißen Grundfasern und aus der vorderen Hälfte der grauen Substanz des unpaaren Verbindungstheiles.

Die 2 hinteren sind die runden Stränge, welche hinten neben der Spalte in der 4ten Hirnhöhle liegen. Sie entstehen aus der hinteren Hälfte der grauen Substanz des unpaaren Verbindungstheiles und aus dem den Grund der hinteren Spalte bildenden weißen Ueberzuge.

Die doppelt vorhandenen Stränge des Rückenmarks verhalten sich, nach Burdach, bei ihrem Fortgange durch das verlängerte Mark so, daß auf jeder Seite

erstlich der vordere graue Strang den grauen Kern der Olive bildet, und der hintere graue Strang nach hinten und außen tretend sich mit dem hinteren äußeren Stränge zum Keilstrange vereinigt.

Zweitens, daß der vordere innere weiße Strang den grauen Olivenkern an seiner inneren Seite,

der vordere äußere weiße Strang den Olivenkern an seiner äußeren Seite überzieht und einschließt,

der weiße Seitenstrang an jeder Seite fortläuft,

der hintere äußere weiße Strang sich mit dem hinteren grauen Stränge zum Keilstrange vereinigt, und endlich

der hintere innere Strang den neben dem Ende der Rückenmarkspalte gelegenen zarten Strang bildet.

Die Bündel folgen also am verlängerten Marke, nach Burdach, so auf einander, daß neben der vorderen Rückenmarkspalte die Pyramiden, neben ihr der innere Olivenstrang, der graue Kern der Olive und der äußere Olivenstrang folgen, daneben der weiße Seitenstrang, neben ihm der Keilstrang, und neben ihm endlich dicht an der hinteren Rückenmarkspalte der zarte Strang liegen. Außer diesen Strängen kommt von der Stelle an, wo sich die 4te Hirnhöhle aufgethan hat, längs der Spalte in der 4ten Hirnhöhle der runde Strang zum Vorschein. Die Stränge, welche Burdach Seitenstrang und Keilstrang nennt, nannten Andere *corpora restiformia*.

Außerdem nimmt man, nach ihm, Fasern wahr, welche eine Vereinigung mehrerer von diesen Bündeln bewirken. Denn nach Burdach begeben sich Fasern der Seitenstränge zu den Pyramiden, und gehen in die sich durchkreuzenden Bündel der Pyramiden über, theils laufen Fasern, welche von den hinteren Bündeln kommen, an der Oberfläche des Rückenmarks fast quer über die Oliven weg zu den Pyramiden, theils endlich geht eine Fortsetzung der Oberfläche des Markes des kleinen Gehirns zu der weichen Hirnhaut, welche die 4te Hirnhöhle verschließt, und überzieht dieselbe inwendig.

Der größte Theil des Seitenstranges und des Keilstranges bildet auf jeder Seite den in das kleine Gehirn eindringenden Schenkel, *crus medullae oblongatae ad cerebellum*. Dieser geht durch das Ganglion des kleinen Gehirns, durch das *Corpus ciliare* hindurch, und bildet die Markstämme der Zapfen und Lappchen des kleinen Gehirns. Die Oberfläche dieser letzteren ist mit einer, die Blätter des kleinen Gehirns bildenden weißen und grauen Platte bedeckt.

Von der die oberflächlichste Lage des kleinen Gehirns ausmachenden weißen und grauen Platte, zum Theil auch vom Marke des kleinen Gehirns, gehen die beiden Brückenarme nach vorn um die vom Rückenmarke zum großen Gehirn aufsteigenden Bündel herum und bilden die Commissur des kleinen Gehirns. Von der die oberflächlichste Lage des kleinen Gehirns ausmachenden weißen und grauen Platte, zum Theil auch vom Marke des kleinen Gehirns gehen die oberen Arme des kleinen Gehirns zu den Vierhügeln, und bringen eine Vereinigung des großen und des kleinen Gehirns hervor. Das unpaare Mittelstück dieses Verbindungstheiles ist die vordere Hirnklappe.

Der zarte Strang und der runde Strang bilden mit dem inneren Theile des Keilstranges die Wand der 4ten Hirnhöhle an der Seite nach der Brücke zu. Einige mehr querlaufende Fasern des äußeren Olivenstranges und des runden Stranges bilden die Markleisten der 4ten Hirnhöhle. Die der Länge nach gehende Fortsetzung des runden Stranges (die Fortsetzung des unpaaren Theiles des Rückenmarks) nebst einem Theile des zarten Stranges, des Keilstranges und des Seitenstranges laufen längs der mittleren Ebene hin, die das Gehirn in eine rechte und linke Hälfte theilt, und bilden den Boden der Wasserleitung und der 3ten Hirnhöhle. Die Fasern der runden Stränge laufen bis zum Trichter, und der Hirnanhang ist also als das Ende des unpaaren Theiles des Rückenmarks anzusehen. Einige Fasern vereinigen sich vielleicht an der inneren Seite des Sehhügels, um die Schenkel der Zirbel zu bilden. In diesem Falle würde auch die Zirbel als ein 2tes Ende des unpaaren Theiles des Rückenmarks im Gehirne anzusehen sein.

Die äußeren Olivenstränge gehen hinter den Quersfasern der Brückenarme in die Höhe, und kommen in dem Winkel, welchen die zur Verbindung des kleinen und großen Gehirns dienenden oberen Arme des kleinen Gehirns mit den Brückenarmen bilden, und hinter den Hirnschenkeln zum Vorschein. Ihr hintere Lage stellt den Theil dar, den Keil die Schleife nennt, und so gehen sie in die Vierhügel ein, die dadurch ihre Form erhalten, daß 4 zusammenliegende Haufen grauer Substanz diese äußeren Olivenstränge bedecken, und daß eine Fortsetzung der Rinne des kleinen Gehirns, die sich unter der Form der *Valvula cerebelli* dahin erstreckt, die Vierhügel überzieht. Die beiden äußeren Olivenstränge vereinigen sich in den Vierhügeln unter einander, und der vordere wulstige Rand dieser Vereinigung, wenn er so weit reicht, und der Ueberzug der Vierhügel bilden vielleicht die sogenannte *commissura posterior*.

Die Fortsetzung des grauen Kerns der Olive, der vorderste Theil des äußeren Olivenstranges und die innere Portion des Seitenstranges gehen vom verlängerten Marke aus zu dem Sehhügel über, und zu ihnen kommt ein Theil der durch die Vierhügel gegangenen äußeren Olivenstränge (der Schleife) hinzu.

Der Pyramidenstrang und der innere Olivenstrang gehen erst in den Hirnschenkel über, unter dem Sehhügel zum gestreiften Körper fort, und zu ihnen kommen die von den Vierhügeln aus in den Sehhügel übergegangenen Bündel des äußeren Olivenstranges hinzu. Von den Sehhügeln und gestreiften Körpern aus gehen nun die Fasern strahlenförmig nach der äußeren Oberfläche des großen Gehirns, und haben noch an einigen von Burdach näher bestimmten Stellen Klumpen von grauer Substanz zwischen sich.

Den Fornix, die Scheidewand, den Balken und die vordere Commissur hält Burdach für Gehirnthteile, durch welche andere Gehirnththeile mit einander in Verbindung gebracht würden, und zwar durch die Scheidewand der untere Theil des Gehirns mit höher gelegenen Theilen desselben, durch die vordere, mit hinteren Stellen des Gehirns, durch den Balken und die vordere Commissur endlich rechts gelegene Theile mit links gelegenen. Auch ist er der Meinung, daß die Fasern des Hirnschenkels nirgends direct durch Umbeugung in die des Balkens übergehen.

Die Entwicklung des Gehirns ¹⁾.

Die Theile des Gehirns, welche aus Längensfasern bestehen und eine unmittelbare Verlängerung des Rückenmarkes sind, namentlich das verlängerte Mark und die als Hirnschenkel fortgesetzten Stränge desselben, sind bei den Vögeln und bei den Säugethieren, unter allen Theilen des Gehirns, am frühesten vorhanden. Sie bilden gewissermaßen den Grundtheil des Gehirns, aus welchem sich durch ein an verschiedenen Stellen ungleichförmiges Wachsthum die verschiedenen Hirntheile entwickeln. Auf gleiche Weise sind bei sehr kleinen Embryonen diejenigen Höhlen zuerst vorhanden, welche von diesen aus Längensfasern bestehenden Theilen eingeschlossen werden. Sie bilden zusammen einen ununterbrochenen Canal, der sich dadurch, daß er sich durch Wachsthum an manchen Stellen erweitert, an andern aber eng bleibt, in die 4te Hirnhöhle, in den *Aquaeductus Sylvii* und in die 3te Hirnhöhle verandelt.

Das Gehirn hat daher anfangs eine ähnliche Form, als das Rückenmark. Es gleicht 2 neben einander liegenden Strängen, welche zwischen sich einen Canal einschließen. Ob jene Stränge, wie Serres annimmt, ganz zu Anfange von einander getrennt sind, oder ob sie schon ursprünglich in der Mittellinie vorn und hinten durch Nervensubstanz unter einander zusammenhängen, läßt sich sogar am bebrüteten Eie, wo man den Anfang der Entwicklung des Gehirns am besten beobachten kann, und wo man daher die beste Gelegenheit hat, die erste Periode der Entwicklung des Gehirns und des Rückenmarkes zu beobachten, nicht mit Gewißheit entscheiden. Bär sah sie von allem Anfange vereinigt. Von der Zeit an, wo man das Gehirn und Rückenmark bei menschlichen Embryonen untersuchen kann, sind sie hinten am Rückenmarke und unten am Gehirne offenbar vereinigt. Vorn aber sind sie durch eine vertikale Linie, welche Meckel und Tiedemann für eine Spalte halten, getrennt, und gewiß sieht man hier den Canal deutlicher durchschimmern, als an anderen Stellen.

Wegen dieser großen Ähnlichkeit des Gehirns und Rückenmarkes darf man aber nicht behaupten, daß das Gehirn aus dem Rückenmarke hervorwache, vielmehr scheint, wie auch Burdach annimmt, der Theil

¹⁾ Dieser Gegenstand ist vorzüglich von J. F. Meckel d. j. und Tiedemann aufgeklärt worden. Nachher hat Serres seine Untersuchungen bekannt gemacht. Bär hat über die Entwicklung des Hühnchens im Eie die vollständigsten und genauesten Beobachtungen angestellt, und früher als diese Schriftsteller haben Carus und Döllinger interessante Bemerkungen über die Entwicklung des Gehirns bekannt gemacht.

der Stränge, aus welchem sich das Gehirn bildet, eben so früh zu entstehen, als der, aus welchem sich das Rückenmark bildet.

Das Gehirn unterscheidet sich sehr frühzeitig dadurch von dem Rückenmark, daß der hohle Strang, aus welchem es anfangs besteht, mehrere Beugungen auf- und abwärts macht und einige Einschnürungen hat. Denn da, wo das verlängerte Mark entsteht, macht er eine starke Beugung vorwärts und bildet einen Bogen, dessen Conexität nach unten und nach vorn gekehrt ist, da wo sich die Vierhügel entwickeln, macht er einen großen Bogen, dessen Conexität nach oben gerichtet ist, da endlich, wo am vordersten Ende des hohlen Stranges der Sehhügel und der graue Hügel, und die Hemisphären des großen Gehirns später entstehen, ist er nach unten und vorn gebogen. Hierdurch entstehen 3 hinter einander liegende unpaare, hohle Anschwellungen, von welchen bei sehr kleinen Embryonen die für das verlängerte Mark die größte, die für die Vierhügel von mittlerer Größe, und endlich die, wo später der Sehhügel und der graue Hügel entstehen, die kleinste ist. Letztere ist anfangs nicht einmal deutlich sichtbar. Außer den erwähnten unpaaren Anschwellungen befindet sich noch an dem vorderen Ende der letzten Abtheilung, vor der Stelle, an welcher sich die Sehhügel entwickeln, und neben ihr nach außen auf jeder Seite ein sehr kleiner hohler Hügel, die erste Spur der Hemisphären des großen Gehirns.

Von den Hemisphären des kleinen Gehirns ist bei so kleinen, 4 bis 6 wöchentlichen Embryonen noch nichts zu sehen, wohl aber bemerkt man über dem verlängerten Marke die erste Spur des Mittelstücks desselben, welches die Gestalt eines kleinen, queren, die aus einander gewichenen Schenkel des verlängerten Marks verbindenden Wulstes hat, der den vordersten Theil der erweiterten Höhle von hinten bedeckt, die später zur 4ten Hirnhöhle wird. Nir hat dieser Wulst ein unpaares Stück zu sein geschienen. Meckel und Liebermann behaupten, daß er anfangs durch eine Spalte an seiner hinteren Oberfläche in 2 Seitenhälften getheilt sei. Die Hemisphären des kleinen Gehirns entstehen später durch ein weiteres Wachsen der Seitentheile dieses Wulstes.

Die Gestalt des Gehirns ändert sich nun bald noch vielmehr dadurch, daß der in ihm eingeschlossene Canal einige erweiterte, und daß die ihn umgebende, aus Gehirnsstoff bestehende Wand einige verdickte Stellen bekommt. Der Canal erweitert sich namentlich an der Stelle, wo die 4te Hirnhöhle, welche zum Theil von den auseinander weichen den Strängen des verlängerten Marks gebildet wird, entsteht, ferner da, wo später der Aqueductus Sylvii liegt und die Vierhügel sich ausbilden. Denn bei den kleinsten Embryonen ist die vom Gehirn eingeschlossene Höhle sehr klein, und das Gehirn fast solide. Setzt im 3ten

und 4ten Monate vergrößert sie sich ungemein. Indem sich die obere Wand an der Stelle, wo die Vierhügel entstehen, blasenartig erhebt, bildet sich ein großer, unpaarer, hohler, aus einer dünnen Lage Gehirns-Substanz bestehender Hügel, der nicht durch eine Spalte in 2 Seitenhälften getheilt ist. Der quere Wulst, der das kleine Gehirn darstellt, und dieser Hügel sind 2 Falten einer und derselben aus Gehirns-Substanz bestehenden Membran, nämlich der oberen oder hinteren Wand der Röhre, welche anfangs das Gehirn darstellte. Die 4te Hirnhöhle und die in der hohlen Erhabenheit der Vierhügel eingeschlossene Höhle machen jetzt eine einzige ununterbrochene Höhle aus. Die Vierhügel scheinen anfangs überaus groß, sie sind es aber nicht in dem Grade, als sie es scheinen, denn ihre auffallende Größe rührt von der großen Höhle her, welche sie einschließen. Sie nehmen später auf eine doppelte Weise an Masse zu, durch wachsende Falten und durch das Dickerwerden der Membran, welche die Falten bildet. Dabei nimmt der hohle Hügel, der den Anfang der Vierhügel bildet, längere Zeit nicht sehr an Umfang zu, denn die Falten wachsen, wie ich mich überzeugt habe, nach innen, und verengern dadurch die Höhle, welche im ausgebildeten Gehirn so klein ist, daß sie nur einen engen Canal, den *Aquaeductus Sylvii* darstellt.

Auch das kleine Gehirn vergrößert sich auf diese doppelte Weise, aber die Falten desselben wachsen nach außen, und die Höhle desselben, die 4te Hirnhöhle, verengt sich daher nicht so sehr als die in den Vierhügeln befindliche. Zuerst entstehen Falten am Mittelfüße, dann entsteht zu beiden Seiten eine Erhabenheit, welche der Anfang der Hemisphären des kleinen Gehirns ist. Zu dieser Zeit erscheinen das Mittelfüß und die beiden Hemisphären des kleinen Gehirns als 3 abgeordnete Erhebungen, die nur dadurch unter einander zusammenhängen, daß sie Falten einer und derselben Membran sind. Sie scheinen sich später dadurch unter einander zu vereinigen, daß sich der zwischen ihnen gelegene Theil der Membran auch in Falten erhebt. Zuerst entstehen am kleinen Gehirn die Einschnitte, welche später sehr tief werden und die Lappen und Läppchen von einander scheiden. Später erst werden die kleinen Einschnitte sichtbar, durch welche auf der Durchschnittsfläche des kleinen Gehirns das Ansehen von Blättchen entsteht. Am Mittelfüße bilden sie sich etwas früher als an den Seitentheilen.

Die Brücke entsteht durch eine Verdickung der unteren Wand der Röhre, welche anfangs das Gehirn ausmachte. An dieser Verdickung kann man anfangs nicht jene Bogen von Querfasern erkennen, welche später die gewölbte Oberfläche der Brücke bedecken. Diese scheinen sich später in dem Grade zu vermehren, als sich die Oberfläche der Hemi-

sphären des kleinen Gehirns durch Faltung vergrößert. Es stimmt auch diese gleichzeitige Entwicklung der Hemisphären des kleinen Gehirns mit den Quersfasern der Brücke sehr mit dem Zwecke dieser Quersfasern, die Oberfläche der einen Hemisphäre mit der der anderen in Verbindung zu bringen, überein.

Die Sehhügel entstehen auch als eine Verdickung an der Wand der Röhre, welche den Grundtheil des Gehirns ausmacht. Aus diesem Grunde sind sie auch nicht hohl.

Die gestreiften Körper entstehen auf dieselbe Weise, aber etwas später als die Sehhügel, neben und vor ihnen.

Die Hemisphären des großen Gehirns bilden sich auf folgende Weise:

In den ersten 2 Monaten des Embryolebens liegen die Theile des hohlen Stranges, welche sich in den Sehhügel verwandeln, frei und unbedeckt da, und man bemerkt, wie J. F. Meckel zuerst gezeigt hat, an der äußeren und vorderen Seite von jedem derselben nur eine kleine aus Gehirns substanz gebildete, mit dem Sehhügel zusammenhängende Blase, als den ersten Anfang der Hemisphären.

Bei 4 monatlichen Embryonen geht die Hirns substanz der Sehhügel an der äußeren Seite derselben, unten neben dem Eintritte des Hirnschenkels in eine aus Gehirns substanz bestehende Membran über, welche sich über den Sehhügel nach vorn, oben und hinten, wie eine Kappe, herumschlägt, so daß zwischen ihr und dem Sehhügel eine große Höhle (der Seitenventrikel) entsteht, der zu dieser Zeit oval ist und noch nicht jene 3 Winkel besitzt, die man cornua nennt. Diese aus Gehirns substanz bestehende Membran, welche sich von der äußeren Seite des Sehhügels über denselben bis zu seiner inneren Seite herunterkrümmt, ist an der inneren Seite desselben nicht angewachsen, sondern schlägt sich da, wo bei Erwachsenen der Balken liegt, über dem Sehhügel nochmal in den Seitenventrikel hinein, den sie selbst gebildet hat. Schneidet man daher von dem oberen Theile der Hemisphären bei einem 4 monatlichen Embryo ein Stück ab, so findet man inwendig in dem außerordentlich großen Seitenventrikel einen sehr großen, sehr weißen, etwas steifen, zuerst von Döllinger, dann von Meckel und Tiedemann beschriebenen, Sack, welcher einerseits in die aus Gehirns substanz bestehende Membran übergeht, welche die Hemisphäre bildet, andererseits mit dem Sehhügel verwachsen ist. Dieser Sack muß offenbar mit Tiedemann¹⁾ für den hier sehr großen, in große Falten gelegten plexus choroideus gehalten werden, ob ich gleich nach meinen eigenen Unte-

¹⁾ Tiedemann, a. a. O. Tab. II. fig. 5.

ichungen nicht zu entscheiden wage, ob diese Haut nicht einen markigen Ueberzug besitze, wie auch Meckel ¹⁾ zu meinen scheint.

Es scheint hiernach, daß jene oben erwähnte kleine Blase, welche den Anfang der Hemisphären bildet, dadurch in die eben beschriebenen Theile verwandelt werde, daß sie viel schneller als der Sehhügel wachse, und sich demnach um den Sehhügel fast von allen Seiten herumbeuge, daß diejenige Wand der Blase, welche den Sehhügel zunächst umgiebt, sich in den Plexus choroideus des Seitenventrikels verwandle, indem sie häutig und dünn bleibt, während die andere Wand markig und dick wird und sich in die Hemisphäre verwandelt. Diese Wand ist daher desto dünner, je jünger der Embryo. Noch lange bleiben die Hemisphären ohne Windungen und also einer Blase ähnlich, längere Zeit als die Hemisphären des kleinen Gehirns. Endlich aber ungefähr im 5ten Monate, wenn diese Wand schon viel dicker geworden ist, bilden sich einzelne vertiefte, gekrümmte Linien, welche die Spuren der nach innen wachsenden Falten sind, und indem sich dann die zwischen den Furchen liegenden erhabenen Stellen nach außen hin vergrößern, und sich die Falten vervielfältigen, entstehen die Windungen des großen Gehirns.

Zuerst scheint sich der Theil der beiden Hemisphären des großen Gehirns auszubilden, an welchem die Hemisphären auch bei dem Erwachsenen nicht durch deutlich sichtbare Querfasern des Balkens untereinander verbunden sind, d. h. der Theil der vorderen Lappen der beiden Hemisphären, welcher nahe an der Vereinigung der Sehnerven liegt, und durch die graue Platte, welche bei dem Erwachsenen vom grauen Hügel zu dem Balken geht, verbunden ist. Daher ist anfangs beim Embryo zwischen den beiden Hemisphären kein weißer faseriger Balken, sondern nur eine vor den Sehnerven liegende, graue, die Hemisphären vereinigende Platte sichtbar. Sehr frühzeitig scheint aber auch der hinterste und unterste Theil der Hemisphäre vorhanden zu sein, zwischen welchem beim Erwachsenen die Fasern des Balkens nicht quer hinüberspannt sind, sondern zu welchem sie auf einem langen Umwege gelangen. Die Spitzen der hinteren Lappen, die bei dem Erwachsenen im hintersten Theile des Kopfes liegen, liegen bei kleinen Embryonen sehr weit vorn und sind sehr nach oben gerichtet, und man sieht daher bei Embryonen im 4ten Monate zwischen den Hemisphären nur ganz vorn und tief unten den noch sehr kleinen Balken. Der Zwischenraum zwischen dem Balken und den Vierhügeln, welcher bei Erwachsenen sehr klein ist, ist noch bei 4 monatlichen Embryonen sehr groß und nach

¹⁾ Meckel, Handbuch der Anatomie. B. 3. S. 576. 7.

zung zu bringen. Je größer nun die von grauer Substanz überzogene Oberfläche der Hemisphären ist, desto mehr quere Markfasern wird nach dieser Vermuthung der Balken enthalten, um alle Stellen beider Oberflächen in Verbindung zu bringen.

Im 4ten und im 5ten Monate sind die entstehenden Windungen der Hemisphären des großen Gehirns wirklich Falten einer aus Gehirnsubstanz bestehenden Haut. Denn zu dieser Zeit haben die Hemisphären noch die Form einer über die Sehhügel hinweggeschlagenen, eine große Höhle bildenden Membran. Die aus dem Sehhügel zu dieser Membran gehenden Fasern gehen nicht durch die Hirnhöhle hindurch auf dem kürzesten Wege zu den Punkten der Membran hin, zu welchen sie sich begeben, sondern sie gehen nur an einer Stelle von geringem Umfange in diese Markhaut über und laufen dann an derselben bis zu den entfernten Punkten derselben hin.

Anderß verhält sich's, nachdem sich die Windungen der Hemisphären völlig ausgebildet haben. Denn dann ist die Stelle, wo die Hemisphären mit den Fasern des Sehhügels und des Balkens zusammenhängen, sehr groß. Die Windungen sehen nur von außen an gesehen wie Falten aus, inwendig sehen sich diese scheinbar vorhandenen Falten in unzählige, sich federbuschartig vereinigende Fasern fort, welche einerseits in den gestreiften Körper und in den Sehhügel, andrerseits in den Balken und in die Commissuren übergehen und auf diesem Wege einander durchkreuzen. Sobald sich das Gehirn so weit entwickelt hat, ist eine Entfaltung desselben durch die Kunst der Anatomen, oder durch die Natur mittelst der Gehirnwasser sucht, unmöglich.

Die Gehirnsubstanz ist bei dem Embryo sehr weich, aber nach Petaſche ¹⁾ und Anderen schon bei 4 bis 6 monatlichen Embryonen deutlich faſerig, nach Meckel und Tiedemann sogar deutlicher faſerig als beim Erwachsenen. Bis zum 7ten Monate kann man die Theile, die später weiß sind, noch nicht von den Theilen, welche später grau bleiben, durch diese Farbe unterscheiden. Nach Meckel zeichnet sich um diese Zeit zuerst die mittlere Substanz des Rückenmarks durch ihre graueren Farbe vor der weißeren Substanz aus. Viele Theile des Gehirns, ob sie gleich faſerig sind, sehen nämlich wegen der großen Menge Blutes, die sie zu dieser Zeit zugeführt erhalten, grau aus, und sind an manchen Stellen sogar dunkler, als die graue Substanz, welche bleiben diese Farbe behalten soll. Dieses ist in manchen Theilen des großen Gehirns noch beim neugeborenen Kinde der Fall. Die zahlreichen Blut

¹⁾ *Petaſche, sylloge observationum; recus. in Halleri coll. diss. VI. p. 783. f. 80*

nd des Fornix Veranlassung gegeben haben, welche anfangs weit von einander abstehen.

Einen ähnlichen Gang der Entwicklung als die Hemisphären und es Balken nimmt auch der Fornix und der Pes hippocampi. Denn bald der Fornix im 3ten Monate sichtbar wird, sind auch an ihm schon die hintersten weit von einander abstehenden Schenkel unterscheidbar, die aber in der Schädelhöhle viel weiter nach vorn liegen als später, während der Theil des Fornix, an welchem beide Hälften des Fornix parallel neben einander laufen, fast noch gar nicht gebildet ist. Beim 4 monatlichen Embryo ist dieser hinterste Theil des Fornix verhältnißmäßig schon sehr groß, aber noch immer liegen die beiden Schenkel weit von einander entfernt und krümmen sich über die Stelle, wo er Sehhügel mit den Hemisphären zusammenhängt, nach hinten, und gehen bis an das Ende der Hirnhöhle fort, das aber eine solche Lage hat, daß man es noch nicht das untere Horn nennen kann.

Die Eminentiae candicantes machen, nach Ziedemann, vom Ende des 3ten Monats an, wo sie zuerst sichtbar werden, bis zu Anfang des 7ten Monats eine einzige Erhabenheit aus. Es ist schon oben bemerkt worden, daß sie bei den meisten Säugethieren auf ähnliche Weise, das ganze Leben hindurch, vereinigt sind.

Die Größe des Balkens scheint sowohl im ausgebildeten Zustande bei Menschen und Thieren, als auch während des Wachstums des Gehirns bei Embryonen in einem gewissen Verhältnisse zur Größe der Oberfläche des Gehirns zu stehen. Weil aber die Hemisphären längere Zeit eine sehr große, mit Wasser ausgebehnte Hirnhöhle haben, scheinen sie bei kleinen Embryonen, verglichen mit dem Balken, der sie untereinander verbindet, sehr groß zu sein. Indessen ist, weil die Hemisphären zu dieser Zeit keine Bindungen haben, ihre Oberfläche doch viel kleiner, als man auf den ersten Anblick glauben möchte. In dem Verhältnisse, als sich die Bindungen ausbilden und die Oberfläche des Gehirns an Größe zunimmt, wächst auch der Balken. Bis zum 5ten Monate sind die Bindungen der Hemisphären des großen Gehirns noch sehr undeutlich und der zwischen den Hemisphären liegende Balken noch sehr klein. Bei manchen Säugethieren, z. B. nach G. R. Treviranus bei den Insecten, Fledermäusen, Maulwürfen und Igel, so wie auch nach Ziedemann bei den Säugethieren und Ameisensressern fehlen die Bindungen das ganze Leben hindurch an den Hemisphären des großen Gehirns, und von mehreren dieser Thiere ist es bekannt, daß auch bei ihnen der Balken sehr klein sei.

Vielleicht liegt der Grund, daß die Größe des Balkens ungefähr der Größe der grauen Oberfläche des großen Gehirns entspricht, darin, daß die Fasern des Balkens den Zweck haben, die graue Substanz an der Oberfläche der einen Hemisphäre mit der grauen Substanz an der entsprechenden Stelle der Oberfläche der andern Hemisphäre in Verbin-

zung zu bringen. Je größer nun die von grauer Substanz überzogene Oberfläche der Hemisphären ist, desto mehr quere Markfasern wird nach dieser Vermuthung der Balken enthalten, um alle Stellen beider Oberflächen in Verbindung zu bringen.

Im 4ten und im 5ten Monate sind die entstehenden Windungen der Hemisphären des großen Gehirns wirklich Falten einer aus Gehirnsubstanz bestehenden Haut. Denn zu dieser Zeit haben die Hemisphären noch die Form einer über die Sehhügel hinweggeschlagenen, eine große Höhle bildenden Membran. Die aus dem Sehhügel zu dieser Membran gehenden Fasern gehen nicht durch die Hirnhöhle hindurch auf dem kürzesten Wege zu den Punkten der Membran hin, zu welchen sie sich begeben, sondern sie gehen nur an einer Stelle von geringem Umfange in diese Markhaut über und laufen dann an derselben bis zu den entferntesten Punkten derselben hin.

Anderß verhält sich's, nachdem sich die Windungen der Hemisphären völlig ausgebildet haben. Denn dann ist die Stelle, wo die Hemisphären mit den Fasern des Sehhügels und des Balkens zusammenhängen, sehr groß. Die Windungen sehen nur von außen angefaßt wie Falten aus, inwendig setzen sich diese scheinbar vorhandenen Falten in unzählige, sich federbuschartig vereinigende Fasern fort, welche einerseits in den gestreiften Körper und in den Sehhügel, andererseits in den Balken und in die Commissuren übergehen und auf diesem Wege einander durchkreuzen. Sobald sich das Gehirn so weit entwickelt hat, ist eine Entfaltung desselben durch die Kunst der Anatomen, oder durch die Natur mittelst der Gehirnwasserfucht, unmöglich.

Die Gehirnsubstanz ist bei dem Embryo sehr weich, aber nach *Petsche* ¹⁾ und Anderen schon bei 4 bis 6 monatlichen Embryonen deutlich faserig, nach *Meckel* und *Liedemann* sogar deutlicher faserig als beim Erwachsenen. Bis zum 7ten Monate kann man die Theile, die später weiß sind, noch nicht von den Theilen, welche später grau bleiben, durch diese Farbe unterscheiden. Nach *Meckel* zeichnet sich um diese Zeit zuerst die mittlere Substanz des Rückenmarks durch ihre graueren Farbe vor der weißeren Substanz aus. Viele Theile des Gehirns, ob sie gleich faserig sind, sehen nämlich wegen der großen Menge Blutes, die sie zu dieser Zeit zugeführt erhalten, grau aus, und sind an manchen Stellen sogar dunkler, als die graue Substanz, welche bleibend diese Farbe behalten soll. Dieses ist in manchen Theilen des großen Gehirns nach beim neugeborenen Kinde der Fall. Die zahlreichen Blut-

¹⁾ *Petsche*, sylloge observationum; recuss. in Halleri coll. diss. VI. p. 783. f. 84

Gehirn der Säugethiere mit dem des Menschen verglichen. 423

stöße im Innern des Gehirns haben bei ihnen deutlich die Richtung der Gehirnsfasern.

Die Gehirnhöhlen sind bei zweimonatlichen und noch jüngeren Embryonen sehr klein nicht nur an und für sich selbst, sondern auch im Verhältnisse zur Gehirns substanz, in welcher sie eingeschlossen sind. Bei den etwas älteren Embryonen nehmen sie sehr an Größe zu, verkleinern sich aber bei dem starken Wachstume des Gehirns in den letzten Monaten der Schwangerschaft wieder. Der Zweck dieser großen Hirnhöhlen scheint der zu sein, daß Raum für die nach innen zu wachsenden Hirntheile da sei. Wenn das Wachsthum des Gehirns vollendet ist, so stoßen die Hirntheile, welche die Hirnhöhlen begrenzen, an einander.

Das Gehirn der Säugethiere mit dem des Menschen verglichen.

Das Gehirn und Rückenmark des Menschen zeichnet sich in folgender Hinsicht vor den nämlichen Theilen bei den Thieren aus. Der Umfang des großen Gehirns mit dem Umfange der Nerven, oder des Rückenmarks, oder des kleinen Gehirns, oder der Vierhügel, oder der Corpora candicantia und des Bogens, oder endlich des Hirnanhangs, verglichen, wird bei dem Menschen viel größer gefunden als bei den Thieren, oder mit andern Worten: unter den Centraltheilen des Nervensystems ist das große Gehirn bei dem Menschen weit überwiegender, als bei den Thieren. Diese Bemerkung, welche man der Hauptsache nach *Sömmering*¹⁾ verdankt, und die dann von mehreren Anatomen, von *Wenzel*,

¹⁾ Siehe *Sömmering*, diss. de basi encephali p. 17., dessen Schrift über den *Reger* S. 57.; dessen *Hirnlehre* S. 169. Zweite Ausgabe S. 93. Tab. basos encephali. Fref. 1799. p. 6. Man vergleiche z. E. das kleinere Gehirn eines Pferdes, Ochsen — mit dem größeren des Menschen, und dagegen die dickeren Nerven dieser Thiere mit den dünneren des Menschen. Die meisten Säugethiere haben auch nach Verhältnisse ihres ganzen Körpers ein kleineres Gehirn; ja die Landthiere haben, einige der allergrößten Säugethiere ausgenommen, sogar ein absolut kleineres Gehirn, als der Mensch. Der 64 Fuß lange *Pottfisch* hat ein Gehirn, das nicht 3mal größer, als das menschliche ist. Doch kann man nicht allgemein behaupten, daß der Mensch nach Verhältnisse zum ganzen Körper das größte Gehirn habe, weil es in einigen kleineren Affen und Singvögeln wirklich in dieser Beziehung noch größer ist. *Sömmering* fand das Gehirn eines *Sajou* $\frac{1}{11}$, das eines Embryo von der *Simia Cynomulga* $\frac{1}{6}$ des ganzen Körpers ausmachen u. Tab. bas. encephal. p. 7. Ein vorzüglich kleines Gehirn haben die Amphibien und die Fische: es ist gleichsam nur ein kleiner Anhang des Rückenmarks. Unter allen Thieren hat der *Elephant* das größte Gehirn. Es ist absolut viel größer als das des Menschen. Nach *Perrault* wog es 9 Pfund. *Allen Roulin* fand es 10 Pfund. Das in der anatomischen Sammlung in *Berlin* befindliche Gehirn eines 75 Fuß langen gewöhnlichen *Walffisches* wiegt nur 5 Pfd. $10\frac{1}{4}$ Loth. Siehe diese Angaben bei *Rudolphi*, Grundriß der Physiologie. Th. II. S. 11. und 12.

Nach *Sömmering*s Beobachtungen variiert das Gewicht des menschlichen Gehirns, von 2 Pfund 11 Loth bis 3 Pfund $3\frac{3}{4}$ Loth. Unter 200 Gehirnen fand er keines von 4 Pfunden (*Hirnlehre* S. 24.). *Rudolphi* fand einmal bei einem Menschen das natürlich beschaffene Gehirn 4 Pfund und 24 Loth. *Rudolphi* Grundriß der Physiologie. B. II. p. 11.

Treviranus, Ziedemann und andern weiter ausgeführt worden ist, verdient um so mehr die Aufmerksamkeit der Physiologen, weil das Rückenmark und die Nerven, nachdem sie vom Gehirn durch einen Schnitt getrennt worden sind, bei denjenigen Thieren ihre auf die Erhaltung des Lebens sich beziehenden Verrichtungen in gewissem Grade noch längere Zeit fortsetzen können, bei welchen das Gehirn kein großes Uebergewicht über das Rückenmark und die Nerven hat, z. B. bei den Fröschen, das dagegen bei dem Menschen, wo dieses Uebergewicht des Gehirns am größten ist, auch die Abhängigkeit des Rückenmarkes vom Gehirn am größten zu sein scheint, so daß man also vermuthen darf, daß die einzelnen Abtheilungen des Nervensystems desto unabhängiger von einander sind, je gleichmäßiger das Rückenmark durch das Nervensystem verbreitet und je weniger es an einer einzelnen Stelle angehäuft ist.

Bei dem Menschen ist nicht nur das große Gehirn verhältnismäßig zum kleinen Gehirn und zum Rückenmark, sondern bei ihm sind auch das kleine Gehirn und das Rückenmark verhältnismäßig zu den Nerven größer, als bei den Säugethieren.

Bei den meisten Säugethieren sind ferner die Windungen des großen Gehirns mehr symmetrisch und regulärer, als bei dem Menschen, dem sich indessen hierin, nach Treviranus und Ziedemann, die Seehunde und die Beuteltiere nähern.

Das kleine Gehirn, dessen Hauptabtheilungen auch bei dem Menschen ziemlich symmetrisch sind, ist bei manchen Säugethieren symmetrischer, bei anderen weniger symmetrisch, als bei dem Menschen. Das letztere ist, wie Serres ¹⁾ bemerkt, bei denjenigen der Fall, bei welchen das Mittelstück des kleinen Gehirns seitwärts in einen oder in mehrere Bogen gekrümmt ist.

Kleine Verschiedenheiten des Gehirns des Menschen und der Säugethiere bestehen darin, daß die Corpora candidantia, nach Treviranus ²⁾ und Ziedemann ³⁾, nur bei dem Menschen 2 vollkommen getrennte Hügel sind, daß der innerste untere Lappen der Hemisphären des kleinen Gehirns, welchen Malacarne und Keil, die Mandel, tonsilla, nennen, nach Treviranus und Serres bei den Säugethieren, namentlich auch bei den Affen fehlt, eine Behauptung, der indessen Ziedemann nicht ganz beistimmt, weil er ihn doch beim Affen wahrgenommen zu haben glaubt; ferner, daß nur die Olive bei dem Menschen die gezackte gelbe Linie in ihrem Innern enthält, endlich, daß die Glandula pinealis der Säugethiere, nach Ziedemann, keinen Hirnsand einschließt.

Gefäße des Gehirns.

Die Blutgefäßstämme, welche dem Gehirn Blut zuführen oder Blut aus dem Gehirn wegführen, sind sehr groß und zahlreich. Dennoch ist

Das große Gehirn ist bei dem Menschen ungefähr 3 mal größer, als das kleine Gehirn. Bei Kindern scheint das Cerebellum nach Verhältnis kleiner zu sein. Das Cerebellum wiegt bei Erwachsenen nach Sömmerring 10 bis 12 Lot. (Hirnschre' s. 63.)

¹⁾ Serres a. a. O. 393. 394.

²⁾ G. R. Treviranus a. a. O. S. 14.

³⁾ Ziedemann, Icones cerebri simiarum et quorundam mammalium rariorum. Fol. c. Tab. V. Heidelbergae 1821.

s. *accessoriae*, nämlich die *Rami spinales* der *Arteriarum vertebraliū intercostalium, lumbarium, sacralium*. Jede derselben giebt im Canale des Rückgrats einen vorderen und einen hinteren Ast zu dem Rückenmarke, welche mit der *A. spinalis anterior* und *posterior* Gemeinschaft haben.

2) Die Venen des Rückenmarks gehen in äußerst dichte und zahlreiche Netze über, welche außerhalb der harten Rückenmarkshaut liegen. Diese oben beschriebenen Netze sind so groß, daß man glauben möchte, daß sie außer der Bestimmung, das Blut wegzuführen, noch die hätten, das Rückenmark warm zu halten und dieselbe, so wie auch die Rückenmarksnerven in den Intervertebrallöchern, vor Druck zu schützen.

3) Saugadern. Diese Gefäße sind zwar an den Gehirnhäuten, sowohl an der Oberfläche als in den Ventrikeln, gefunden worden. Sie treten durch die Foramen spinosum und jugulare aus der Schädelhöhle. Aber in die Substantia des Gehirns hat man sie noch nicht zu verfolgen vermocht.

Die Saugadern des Rückenmarks kennt man noch nicht ¹⁾.

Gehirnnerven, *nervi cerebrales*.

Uebersicht über die Zahl der Gehirnnerven und über ihre Verschiedenheit im Allgemeinen.

Es giebt, wenn man ihre Zahl vorzüglich nach der Zahl der Oeffnungen in der *Dura mater*, durch die sie durchgehen, und zugleich darzulegen bestimmt, ob sich ihre Wurzeln und ihre Stämme ohne Gewalt zu trennen lassen, getrennt darstellen lassen, 12 Paare ²⁾.

¹⁾ Ueber die Saugadern des Gehirns haben außer *Mascagni* folgende Schriftsteller geschrieben: *Steno*, in *Barthol. anat.* p. 475. *Nuck*, de invent. nov. p. 152. *Eruilshant's* Beschr. der Saugadern S. 175. und *Ludwig's* Note ebend. S. N. *Schreger* fand in einem Ochsenhirne Saugadern, die in den gestreiften Hügel gingen, wo sie ein gewöhnliches Netz bildeten, das deutlich von den Blutgefäßen unterschieden werden konnte. (*Schreger*, de vasis lymphaticis in plexu choroideo et corpore striato cerebri inventis. In dess. fragm. anat. et physiol. Lips. 1791. fasc. 1.) — In den Plexibus choroideis erscheinen nicht sehr selten *Hydatides*. — *Fischer* fand darin *Taenias hydatigenas*. (*S. Joh. Leonh. Fischer*, taeniae hydatigenae in plexu choroideo nuper inventae historia. Lips. 1779. 4.) Eine andere Species fand neulich in einem Menschengehirn *Löschge*, und zwar auf der weichen Hirnhaut. *Joh. Georg. Steinbuch* fand eben diese an einem Muskel derselben Leiche, untersuchte beide genauer, und hat sie in seiner trefflichen Inauguralchrift (de taenia hydatigena anomala. Erlang. 1801. 8.) beschrieben und abgebildet.

²⁾ Man pflegte noch kürzlich 9 Paare, nämlich das *Par acousticum* und das *Par faciale* für 1 Paar; und ebenso das *Par glossopharyngeum*, das *Par vagum* und das *Par accessorium* für 1 Paar zu zählen. Denn die 2 ersten Nerven hat man zuerst auf *Sommerring's*, die 3 letzteren auf *Andersch's* Vorschlag als verschiedene Nervenpaare angenommen. In der That liegen die Wurzeln und der Stamm des 7ten Paares den des 8ten, und die des 9ten den des 10ten und 11ten so nahe, daß man mit Recht zweifelhaft sein konnte, ob man sie als verschiedene Nervenpaare betrachten sollte.

Ehedem zählte man sogar nur 7 Paare, indem man das *Par olfactorium* seiner besondern Gestalt und Beschaffenheit wegen nicht mit zu den Nerven rechnete, und das *Par trochleare* seiner Kleinheit wegen übersah, oder doch nur als einen Ast des

Urstoff und Nährstoff zu nennen, scheint mir unpasend. Jeder Theil wird durch die ihn durchbringenden Blutgefäße ernährt.

Gefäße des Gehirnes.

1) Die Schlagadern des Gehirns sind: die beiden *Arteriae Carotides cerebrales*, welche, nachdem jede die *A. ophthalmica* abgegeben, dem vorderen Theile des großen Gehirns Blut geben; die beiden *Arteriae vertebrales*, welche sich in die *Arteria basilaris* vereinigen, dem kleinen Gehirne, der *Protuberantia annularis*, dem hinteren Theile des großen Gehirnes, Blut geben.

Diese vier Adern haben, wie gesagt, nach Verhältniß der Größe des Gehirns eine große Weite; es geht daher in einer gegebenen Zeit viel Blut durch das Gehirn hindurch. Die Wände dieser Schlagadern sind dünner und schwächer, als bei anderen Schlagadern, daher sie bei einer Congestion des Blutes ins Gehirn der Zerreißung leichter ausgesetzt sind als andere Arterien.

Sie zerästeln sich vielfältig in der weichen Hirnhaut, und ihre Aeste saßen sich mit dieser in die Vertiefungen zwischen die Windungen ein, so daß sie unter einander mit vielen Anastomosen Gemeinschaft haben.

Die Schlagadern der harten Hirnhaut des Gehirns sind schon oben S. 191. und 199 genannt.

2) Die Venen des Gehirns und seiner harten Hirnhaut ergießen sich in die Bluthöhlen, *sinus*, dieser Haut: Sowohl diese großen Venen als auch die meisten kleineren begleiten die entsprechenden Arterien nicht. Die Venen von den oberen Flächen des großen Gehirns gehen in den *Sinus longitudinalis*; von den inneren Flächen desselben in denselben und den *longitudinalis inferior*; vom *Corpus callosum* in diesen; von der Grundfläche des großen Gehirns in die *cavernosos superiores* und *transversos*; aus den *Plexibus choroideis* in den *quartus* und in die *transversos*.

Die auf der Oberfläche des Gehirns in der weichen Hirnhaut laufenden Venen laufen ebenfalls vielfältig zerästelt, und hängen durch netzförmige Verbindungen zusammen.

Die *Sinus transversus* nehmen unmittelbar das Blut aus dem *Sinus longitudinalis superior*, dem *quartus*, den *petrosis superioribus* und *inferioribus*, und dem *occipitalis posterior*, auf, haben mittelbar mit dem *longitudinalis inferior*, den *cavernosis*, dem *circularis*, dem *occipitalis anterior* Gemeinschaft, und können also alles Blut des ganzen Gehirnes empfangen.

Durch sie ergießt sich das Blut in die beiden *Venas jugulares internas*. Ein kleiner Theil des Blutes des Gehirns kann durch den *Sinus circularis foraminis magni* sich in die *Venas vertebrales* ergießen.

Die Bluthöhlen der Hirnschale haben durch dünne Venen (*emissaria Santorini*), welche durch Löcher der Hirnschale gehen, mit den äußern Venen des Kopfes Gemeinschaft. Diese sind namentlich diejenigen, welche 1) durch die *Foramina mastoidea* aus dem *Sinibus transversis* zu den *Venis occipitalibus*; 2) durch die *Foramina parietalia* aus dem *Sinus longitudinalis superior* zu denselben; 3) durch die *Foramina condyloidea anteriora* aus den *Sinibus transversis* zu den *Venis vertebralibus*; 4) durch die *Foramina spinosa*, 5) *ovalia* und 6) *rotunda*, aus den *Sinibus cavernosis* zu den *Plexibus pterygoideis* und endlich durch die Löcher der Siebplatte des Siebbeins in die Venen der Nase gehen.

Diese Venen sind jedoch unbeständig: man findet z. E. in einigen nur oder beide *Foramina parietalia* verwachsen; in einigen Köpfen nur ein *Foramen mastoideum*, in andern mehrere zc. Auch durch das *Foramen coecum* vor der Sahnenkammer des Siebbeins gehen feine Venen aus dem *Sinus longitudinalis superior* zu den Venen der Nase.

Die *Venae ophthalmicae*, da sie sich hinten in die *Sinus cavernosos*, vor in die *Venas faciales* ergießen, sind also auch als *Emissaria* anzusehen.

Gefäße des Rückenmarkes.

1) Die Schlagadern desselben sind: a. die *Arteria spinalis anterior*, welche an der vorderen Fläche, b. die *Arteriae spinales posteriores*, welche an der hinteren Fläche des Rückenmarkes hinabgehen; beide Aeste der *Arteriarum vertebrali-um*. c. Zu diesen kommen durch die *Foramina intervertebralia* *Arteriae spin-*

s accessoriae, nämlich die Rami spinales der Arteriarum vertebraliū intercostalium, lumbarium, sacralium. Jede derselben giebt im Canale des Rückgrats zwei vorderen und einen hinteren Ast zu dem Rückenmarke, welche mit der Arteria spinalis anterior und posterior Gemeinschaft haben.

2) Die Venen des Rückenmarks gehen in äußerst dichte und zahlreiche Netze über, welche außerhalb der harten Rückenmarkthaut liegen. Diese oben beschriebenen Netze sind so groß, daß man glauben möchte, daß sie außer der Bestimmung, das Blut wegzuführen, noch die hätten, das Rückenmark warm zu halten und zu erhalten, so wie auch die Rückenmarksnerven in den Intervertebrallöchern, vor dem Austritte zu schützen.

3) Saugadern. Diese Gefäße sind zwar an den Gehirnhäuten, sowohl auf der Oberfläche als in den Ventrikeln, gefunden worden. Sie treten durch die Foramen spinosum und jugulare aus der Schädelhöhle. Aber in die Substantia des Gehirns hat man sie noch nicht zu verfolgen vermocht.

Die Saugadern des Rückenmarks kennt man noch nicht ¹⁾.

Gehirnnerven, nervi cerebrales.

Uebersicht über die Zahl der Gehirnnerven und über ihre Verschiedenheit im Allgemeinen.

Es giebt, wenn man ihre Zahl vorzüglich nach der Zahl der Öffnungen in der Dura mater, durch die sie durchgehen, und zugleich danach bestimmt, ob sich ihre Wurzeln und ihre Stämme ohne Gewalt zu gebrauchen, getrennt darstellen lassen, 12 Paare ²⁾.

¹⁾ Ueber die Saugadern des Gehirns haben außer Mascagni folgende Schriftsteller geschrieben: Steno, in *Barthol. anat.* p. 475. Nuck, de invent. nov. p. 152. Cruikshank's Besch. der Saugadern S. 175. und Ludwig's Note ebend. S. R. Schreger fand in einem Ochsenhirne Saugadern, die in den gestreiften Hügel gingen, wo sie ein gewöhnliches Netz bildeten, das deutlich von den Blutgefäßen unterschieden werden konnte. (Schreger, de vasis lymphaticis in plexu choroideo et corpore striato cerebri inventis. In dess. fragm. anat. et physiol. Lips. 1791. fasc. 1.) — In den Plexibus choroideis erscheinen nicht sehr selten Hydatiden. — Fischer fand darin Taenias hydatigenas. (S. Joh. Leonh. Fischer, taeniae hydatigenae in plexu choroideo nuper inventae historia. Lips. 1779. 4.) Eine andere Species fand nentlich in einem Menschengehirn Loshge, und zwar auf der weichen Hirnhaut. Joh. Georg. Steinbuch fand eben diese an einem Stücke derselben Leiche, untersuchte beide genauer, und hat sie in seiner trefflichen Inauguralchrift (de taenia hydatigena anomala. Erlang. 1801. 8.) beschrieben und abgebildet.

²⁾ Man zählte noch kürzlich 9 Paare, nämlich das Par acusticum und das Par faciale für 1 Paar; und ebenso das Par glossopharyngeum, das Par vagum und das Par accessorium für 1 Paar zu zählen. Denn die 2 ersten Nerven hat man zuerst auf Sommering's, die 3 letzteren auf Andersch's Vorschlag als verschiedene Nervenpaare angenommen. In der That liegen die Wurzeln und der Stamm des 7ten Paares den des 8ten, und die des 9ten den des 10ten und 11ten so nahe, daß man mit Recht zweifelhaft sein konnte, ob man sie als verschiedene Nervenpaare betrachten sollte.

Ehedem zählte man sogar nur 7 Paare, indem man das Par olfactorium seiner besondern Gestalt und Beschaffenheit wegen nicht mit zu den Nerven rechnete, und das Par trochloare seiner Kleinheit wegen übersah, oder doch nur als einen Ast des

Die Gehirnnerven entspringen nicht wie die Rückenmarksnerven mit so deutlich einander entgegengesetzten vorderen und hinteren Wurzeln. Bei dem N. trigeminus nimmt man indessen 2 Wurzeln wahr, von welchen die dickere einige Ähnlichkeit mit der hinteren Wurzel eines Rückenmarksnerven hat und wie sie mit einem Ganglion versehen ist, die dünnere mit der vorderen Wurzel eines Rückenmarksnerven verglichen werden kann und wie diese an der Bildung des Ganglion keinen Theil nimmt. Ein ähnliches Verhältniß scheint auch nach Scarpa's *) Vermuthung bei dem N. vagus und accessorius Willisii statt zu finden. Scarpa ist nämlich der Meinung, daß diese beiden Nerven als ein einziger Nerv betrachtet werden sollten, und daß die Portion desselben, welche man N. vagus nennt, und die nach Scarpa **) in dem, oder unter dem Foramen jugulare einen besondern Nervenast bildet, mit der hinteren Wurzel eines Rückenmarksnerven zu vergleichen sei, während die andere Portion desselben, welche man N. accessorius Willisii nennt, mit der vorderen Wurzel eines Rückenmarksnerven eine Ähnlichkeit habe, und indem sie sich mit dem Nervenstamme des

Trigeminus annehm. Folgendes Schema erleichtert die Uebersicht über diese Nerven.

Neueste Nummern.	Namen.	Nummern vor Sömmerring; der Zeit	
1.	Par olfactorium	1.	—
2.	Par opticum	2.	1.
3.	Par oculorum motorium	3.	2.
4.	Par trochleare	4.	—
5.	Par trigeminum	5.	3.
6.	Par abducens	6.	4.
7.	Par faciale	7.	5.
8.	Par acusticum		
9.	Par glossopharyngeum	8.	6.
10.	Par vagum		
11.	Par accessorium		
12.	Par hypoglossum	9.	7.

Bis auf Achillini wurde das Par oculorum motorium als ein Theil des Trigeminus angesehen. Fallopius setzte das Par trochleare aber als das 8te Paar hinzu. Er sagt (obss. anat. Col. 1562. p. 249.), nachdem er die 7 Paare aufzählt hat: Unum adhuc superest nervorum par, ex iis, quae a cerebro vel medulla intra calvariam oriuntur, quod a divino Vesalio ob modestiam, ne numerum ab aliis anatomicis positum et confirmatum turbaret, pro distincto pari non est propositum, sed pro minori propagine tertii paris enumeratum..... Quoniam nihil commune habet cum tertio pari,..... ne novam parium confusionem, elegi pro octavo pari enumerare..... Wassa und Willis nahmen das Par olfactorium als das 1ste Paar, und Willis nahm das Par trochleare als das 4te Paar, betrachtete aber irrig das 1ste Paar des Rückenmarks als das 10te Paar der Gehirnnerven. (S. dess. nervor. descript. cap. 21. 22. 29.) Haller unterschied zwar schon die Nervenpaare richtig, behielt aber die alte Zählung bei. N. phys. IV. p. 203. sqq.

*) Antonii Scarpa, de gangliis nervorum, deque origine et essentia nervi intercostalis ad Henricum Weberum Anatomicum Lipsiensem epistola. Extrah. dagli Annali Universali di Medicina, Maggio e Giugno 1831. Milano 1831. 8. p. 8. Derselbe Ansicht hat gleichfalls Arnold aufgestellt.

**) Scarpa, in Act. Acad. chirurg. Vindob. Vol. I.

ragus verbindet, unter andern zur Bildung derjenigen Nerven beitrage, welche zu den Muskeln des Schlundes und des Kehlkopfs gehen.

So wie es nun durch die früheren Versuche von Ch. Bell und Magendie, und durch die neueren Versuche von J. Müller in Bonn ¹⁾ und Vanizza in Pavia ²⁾ ziemlich ausgemacht ist, daß die hinteren einen Nervenknoten bildenden Wurzeln der Rückenmarksnerven es Gefühl vermitteln, die vorderen Wurzeln aber die in den Muskeln von unserm Willen ausgehende Bewegung hervorrufen, so ist es auch nach Bells pathologische Beobachtungen und an lebenden Thieren angestellte Versuche sehr wahrscheinlich, daß die Nervenzweige, welche die Fortsetzung der großen, mit einem Nervenknoten versehenen Wurzel des N. trigeminus sind, nur das Gefühl vermitteln, keineswegs aber zur Hervorrufung von Bewegungen in den dem Willen unterworfenen Muskeln diene, daß dagegen die kleine Wurzel desselben, welche an der Bildung des Ganglion keinen Antheil nimmt, nur zu Muskeln gehe und die Bewegung derselben veranlasse und nicht dazu diene, Eindrücke fortzupflanzen, welche Empfindungen erregen, und daß folglich die mit dem Ganglion zusammenhängenden Aeste des N. trigeminus nur in so fern auch an der Erregung der Bewegung Antheil nehmen, als Fäden von der kleinen Wurzel zu ihnen treten ³⁾, und daß sie sich nur zu dem Zwecke auch zu Muskeln begeben, als auch die Muskeln ein Gefühl besitzen, vermöge dessen man sich unter andern der Größe der Anstrengung bewußt wird, welche man bei der Bewegung derselben anwende.

Er nahm wahr, daß wenn er den Infraorbitalast des N. trigeminus bei einem Heu durchschnitt, der Tastsinn an den Lippen und in der Gegend der äußeren Nase verloren ging, während diese Theile noch fortwährend willkürlich bewegt werden konnten, daß dagegen, wenn er bei einem andern Pferde den N. facialis durchschnitt, die Muskeln, welche die Lippen bewegen und die Nasenlöcher erweitern, lähmt wurden, so daß das Pferd das Heu nicht mehr mit den Lippen ergreifen konnte. Vanizza hat diesen Versuch in Gegenwart Scarpa's und Rigoni's in Pavia mit dem nämlichen Erfolge wiederholt, und sich und diese Gelehrten von der Richtigkeit dieser Thatsache überzeugt, und vorher schon hatte Joh. Müller bei Salamischen gefunden, daß alle mechanische Reizungen des N. infraorbitalis nicht ohne Zuckungen in den Muskeln der Schnauze zu bewirken, daß dagegen jede Zerrung des N. facialis jedesmal Zuckungen in den Gesichtsmuskeln und namentlich in denen der Schnauze, zu welchen beiderlei Nerven gehen, hervorruft.

Ist nun die Ansicht Bells und Scarpa's richtig, so zerfallen die Gehirnerven in 3 Classen,

¹⁾ Joh. Müller, Bestätigung des Bellschen Lehrsatzes, daß die doppelten Wurzeln der Rückenmarksnerven verschiedene Functionen haben, durch neue entscheidende Experimente in *Protophyt. Notizen*. März 1831. S. 117.

²⁾ Siehe Scarpa, de gangliis nervorum etc. p. 10.

³⁾ Ch. Bell, in *Phil. Transact.* 1826. P. II. Siehe auch *Annals of philosophy and philosophical magazine*. Aug. 1829. und *Magendie, Journal de physiologie*. T. X. 1830. p. 1 — 21. Tab. I. et II.

430 Austritt der Nerven aus dem Schädel. Ursprung derselben

- 1) in solche, welche nur der Empfindung dienen, wie der N. optorius, opticus, acusticus,
- 2) in solche, welche nur die Bewegungen vermitteln, wie der N. oculi motorius, patheticus, abducens, facialis, und vielleicht Hypoglossus und glossopharyngeus,
- 3) in solche, welche vermöge einer doppelten Wurzel sowohl die Empfindung als die Bewegung vermitteln, namentlich der N. trigeminus und der mit dem Accessorius vereinigt gedachte vagus.

Die 6 hinteren Gehirnnerven gehen durch Oeffnungen in der hinteren Schädelgrube, die 6 vorderen durch Oeffnungen in der vorderen und mittleren Schädelgrube aus dem Schädel. Nur der 1ste Gehirnnerv tritt durch die in der vorderen Schädelgrube befindliche Siebplatte ein. Dieser, der Geruchsnerv, ist auch der einzige Nerv, welcher von den vier vorderen Lappen der Hemisphären des großen Gehirns entspringt. Fast alle andern Gehirnnerven entspringen von dem Verbindungstheile des Gehirns, und zwar die 7 hinteren nahe bei einander hinter der Basis des Gehirns. Die Stellen, wo die Nerven entspringen, sind bei vielen noch nicht genau bestimmt, und es giebt nicht bei allen Nerven bestimmte graue Stellen an welchen sie ihren Anfang nehmen. Zwar weiß man, daß sich bei Thieren die Zahl der hügelartigen Abtheilungen des Gehirns vermehrt und vermindert, wenn gewisse Nerven mehr oder weniger ausgebildet sind, und man sieht an der Oberfläche mancher von diesen Hügeln ein Geflecht von Markfasern, dessen Zwischenräume durch graue Substanz erfüllt sind, und welches ununterbrochen in die Wurzeln der Nerven übergeht¹⁾. Allein die Hügel, welche am Gehirn der Menschen und der Säugethiere unterschieden werden, stehen, wie Treviranus²⁾ bewiesen hat, in keiner solchen Beziehung zu gewissen Nerven. Sie sind hier offenbar nicht bloß wegen der Nerven da, die an oder aus ihnen entspringen. So sind z. B. die Vierhügel und die Sehhügel, welche man als die Ursprungsstellen der Sehnerven ansieht, beim Maulwurfs, bei welchem der Sehnerv ein fast unsichtbares Fädchen ist, nicht kleiner als bei andern Thieren. Ueberhaupt entspringen die Fasern eines Nerven nicht immer neben einander von einer einzigen beschränkten Stelle des Gehirns, sondern nicht selten von verschiedenen, von einander ziemlich entfernten Stellen desselben.

Da nun unstreitig wenig darauf ankommt, ob mehrere Nerven in einer gemeinschaftlichen Scheibe eingeschlossen sind oder nicht, so leicht aber sehr viel davon abhängt, mit welcher Stelle des Gehirns sie zusammenhängen, so ist es leicht möglich, daß oft Fäden, die in verschiedenen Nerven liegen, eine gemeinschaftliche, und Fäden, die in einzelnen Nerven beisammen liegen, eine verschiedene Richtung haben.

Bei verschiedenen Thieren scheinen sogar, wie Treviranus bemerkt, d

¹⁾ Siehe die von mir gegebene Abbildung des Karpfengehirns in *Meckels Archiv* Bd. 1. St. 2. Tab. IV. Fig. 26.

²⁾ G. R. Treviranus, vermischte Schriften B. III. S. 87.

Vergleichung der Gehirnnerven hinsichtlich ihrer Dicke. 431

den Nerven nicht immer an der nämlichen Stelle des Gehirns zu entspringen. Dieser Umstand muß uns in unseren Folgerungen vom Ursprunge der Nerven bei den Säugethieren auf den bei den Menschen vorsichtig machen. Zugleich beweist er wohl, daß wir die wahren Enden der Nerven noch nicht kennen.

Die Gehirnnerven sind von verschiedener Dicke, und folgen, vom dicksten zum dünnsten, nach und nach ungefähr so auf einander.

N. trigeminus	N. acusticus	N. abducens.
opticus	vagus	accessorius Willisii
olfactorius	hypoglossus	glossopharyngeus
oculi motorius	facialis	trochlearis.

Der Geruchsnerf ist bei dem menschlichen Embryo bis zum 6ten Monate, bei vielen Säugethieren aber das ganze Leben hindurch hohl. Bei einigen hängt seine Höhle mit der Höhle des Gehirns zusammen. Bei sehr kleinen Vogelern glauben Bar auch den Sehs- und Gehörnerven hohl gefunden zu haben. Der Geruchsnerf und der Gehörnerv sind die beiden weichsten Gehirnnerven, was daher zu rühren scheint, daß die Bündel und Fäden derselben nicht so vielfältig von häutigen Scheiden eingeschlossen sind, als bei andern Nerven.

Alle Gehirnnerven zusammengenommen sind im Verhältnisse zur Größe des Gehirns viel dünner, als alle Rückenmarksnerven zusammengenommen im Verhältnisse zur Größe des Rückenmarks. Auch sind jene zusammengenommen absolut dünner, als alle Rückenmarksnerven.

Uebersicht über den Ort, wo die Gehirnnerven an der Oberfläche des Gehirns zum Vorschein kommen und wo sie zu dem Schädel hinausgehen.

Erstes Paar, Geruchsnerf, nervus olfactorius, entspringt mit 2 weißen und einer grauen Wurzel aus der Fossa Sylvii, von der grauen Substanz vor dem Chiasma nervorum opticorum und am hinteren Theile des vorderen Hirnlappens, ist dreiseitig prismatisch, liegt in einer Furche der vorderen Lappen, wird nur im Ganzen von der Pia mater umhüllt, ohne Fäden zu haben, die in einzelne neurilemmatische Canäle eingeschlossen wären. Er ist deswegen sehr weich, besteht aus weißer und grauer Substanz, bildet auf der Lamina cribrosa ossis ethmoidei eine sehr weiche graue Anschwellung, bulbus cinereus, ist beim Embryo bis zum 6ten Monate hohl, bei manchen Säugethieren aber bis zur Lamina cribrosa offenbar ein Theil des Gehirns, und mit einer Höhle versehen, die mit der Höhle der Seitenventrikel zusammenhängt, und theilt sich schon innerhalb der Schädelhöhle in eine große Menge von Fäden, welche durch die Löcherchen der Lamina cribrosa in die Nase gehen.

Zweites Paar, Sehnerv, nervus opticus, entspringt theils vom Corpus geniculatum int., einem an der Seite zwischen dem Thalamus und den Vierhügeln liegenden Hügel, und von den Vierhügeln, theils

von dem am Thalamus gelegenen Corpus geniculatum externum und vom Thalamus oder Sehhügel selbst, der aber noch wichtigere Verbindungen für den Hirnschenkel und für das große Gehirn zu haben scheint, und dabei auch bei denjenigen Thieren groß ist, die keinen oder einen sehr kleinen Sehnerven besitzen. Er geht an der Grenze, an welcher der Hirnschenkel in den Sehhügel eintritt, um den Hirnschenkel nach abwärts herum, bildet mit dem Tuber cinereum mit dem Sehnerven der entgegengesetzten Seite eine theilweise Vereinigung und Durchkreuzung, das Chiasma nervorum opticorum hängt auf diesem Wege mit den Hirnschenkeln und mit der grauen Substanz des Tuber cinereum zusammen und nimmt an demselben an Größe zu. Im Chiasma scheinen sich die inneren Bündel der Sehnerven zu kreuzen, während die äußeren auf ihrer Seite bleiben, auch bekommen daselbst die einzelnen Fäden Hüllen. Von hier aus geht jeder dieser beiden Nerven durch ein Foramen opticum in die Augenhöhle.

Drittes Paar, gemeinschaftlicher Augenmuskelnerve, nervus oculorum motorius, tritt aus der Spalte zwischen den Hirnschenkeln hervor. Man kann aber die Wurzeln noch weiter verfolgen. Es geht dann an der Seite des Türkensattels durch die Falte der Dura mater in die Fissura orbitalis superior.

Viertes Paar, der obere Augenmuskelnerve, nervus trochlearis, entspringt von der Valvula cerebelli am hinteren Rande der Vierhügel, schlägt sich um den Hirnschenkel nach abwärts, und kommt an der Seite vor der Brücke zum Vorschein, ist der längste und dünnste ungetheilte Nervenstamm, tritt in die Falte der Dura mater neben der vorderen Spitze des Felsenbeins, und von da zur Fissura orbitalis superior.

Fünftes Paar, der dreigetheilte Nerve, nervus trigeminus, kommt mit einer dicken und mit einer dünnen Portion an der Seite der Brücke zum Vorschein, indem er den Processus cerebelli ad pontem durchbohrt. Die dicke Wurzel kann man noch viel weiter nach der Medulla oblongata hin verfolgen. Der Stamm des Nerven dringt durch eine Spalte des an der Spitze des Felsenbeins angehefteten Tentorium in die mittlere Schädelgrube, unter die Dura mater hier schwillt die dicke Portion zwischen der Fissura orbitalis superior dem Foramen rotundum und ovale an, und bildet das Ganglion semilunare, an dessen Bildung die kleine Portion keinen Antheil nimmt, vielmehr in einer Furche unter demselben weggeht. Die 3 Äste des Ganglion gehen durch jene 3 Oeffnungen, und die kleine Portion mit dem 3ten Aste vereinigt durch das Foramen ovale aus dem Schädel.

Sechstes Paar, der äußere Augenmuskelnerve, nervus

abducens, kommt zwischen der Pyramide, Olive und dem hinteren Rande der Brücke zum Vorschein und geht schon hinter dem Processus clinoides posterior durch die harte Hirnhaut und dann in die mittlere Schädelgrube, und von da eben so wie das 3te und 4te Paar durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle.

Siebentes Paar, der Antlignerv, nervus facialis, und 8tes Paar, der Hörnerv, nervus acusticus. Sie treten beide an der Seite des hinteren Randes der Brücke hervor (der Facialis mehr nach innen), und lassen sich zu der Gegend verfolgen, wo die Medulla oblongata die Wand der 4ten Hirnhöhle bilden hilft. Beide Nerven gehen in den Meatus auditorius internus. Der kleinere Facialis liegt in einer Rinne des größeren, des Acusticus.

Neuntes und 10tes Paar, der Schlund-Zungennerv, nervus glossopharyngeus, und der umherschweifende Nerv, vagus. Beide kommen an der Spalte zwischen dem Corpus olivare und rostriforme neben einander zum Vorschein, der Glossopharyngeus mit wenigen, der Vagus mit vielen Fäden, und gehen jeder durch eine eigene Öffnung der Dura mater durch das Foramen jugulare.

Elftes Paar, der Weinnerv, nervus accessorius Willisii, entspringt an der Seite der Medulla spinalis zwischen den vorderen und hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven, hinter dem Ligamentum denticulatum, bis zum 5ten, 6ten oder sogar bis zum 7ten Halsnerven herab. Die hintere Wurzel des 1sten Halsnerven geht zuweilen ganz in ihn über, oder in andern Fällen empfängt umgekehrt der 1ste Halsnerv statt der hintern Wurzel einen Ast von ihm. In diesen Fällen findet sich an ihm ein Knötchen. Er geht durch das Foramen magnum occipitale in die Schädelhöhle. Einige Fädchen treten noch von der Medulla oblongata zu ihm hinzu, dann legt er sich an die Seite des Nervus vagus und geht durch das Foramen jugulare.

Zwölftes Paar, der Zungenfleischnerv, nervus hypoglossus, kommt zum Theil an der Spalte zwischen den Corporibus pyramidalibus und olivariis zum Vorschein, zum Theil entspringt etwas tiefer; er geht durch das Foramen condyloideum anterius aus dem Schädel.

Besondere Beschreibung des Ursprungs und des Laufs der einzelnen Hirnnerven.

I. Nervus olfactorius, der Riechnerv.

Der erste Nerv, oder der Riechnerv, der Geruchnerv (Nervus olfactorius s. primus) entspringt, wie schon oben bemerkt worden ist, mit 3 Wurzeln von dem hintern innern Theile der Grundfläche des vordern Lappens des großen Gehirns.

Die äußere längste Wurzel ist markig, entspringt am fernsten Theile der Grundfläche des vordern Hirnlappens, wo sie in die graue Masse eingelegt ist.

Die innere kürzere Wurzel ist auch markig, bisweilen zweifach entspringt ebenfalls am hintersten Theile der Grundfläche des vordern Hirnlappens, aber der Mitte näher. Beide markige Wurzeln vereinigen sich vorwärts gehend unter einem spitzen Winkel, und zu dieser kommt nun die dritte obere, welche grau ist, weiter vorn von einem kleinen Vorsprunge entspringt, und sich auf jene beiden legt, hinzu

Der aus 3 Wurzeln entstandene Nerv hat eine dreieckig prismatische Gestalt. In Kindern ist er rundlicher. Auswendig hat er gestreifte Streifen. Er ist schon bei Erwachsenen, noch mehr aber bei Kindern sehr weich, und enthält weiße und graue Masse, welche in der Mitte und auch auswendig Streifen bilden. Im Embryo ist er fast ganz weiß und verhältnißmäßig dicker als bei Erwachsenen.

Der Nerv geht nun in einer schmalen Furche, welche an der äußern Fläche des untern Hirnlappens, nahe am innern Rande derselben liegt, vorwärts zur Siebplatte. Hier liegt er nahe bei dem vordern Theile, denn nur der Hahnenkamm des Siebbeins und das andere Ende der Siebplatte scheiden hier beide Riechnerven von einander. Ueber der Siebplatte geht er in einen grauen Kolben (bulbus cinereus) *) in

*) Nach Haller, Sabatier und Fodéré und Andern entspringt der Geruchnerv mit 2 Wurzeln; nach Vicq. d'Azur mit 3 Wurzeln, nach Portal, Cuvier, Cuvier, Cuvier bald mit 2, bald mit 3 Wurzeln. Bisweilen vereinigen sich beide Wurzeln so mit einander, daß sie eine Insel von grauer Masse einschließen. Cuvier's Nervenlehre S. 204. Winslow (expos. anat. III. Nerve. 2) leitet den Ursprung des Geruchnerven vom untern Theile der gestreiften Substanz; eben dieses bestätigt Cuvier's Nervenlehre. (Hirnlehre 2te Ausg. S. 47.) Der französische Schriftsteller Cuvier und Rudolphi der Geruchnerv, aber dennoch haben den gestreiften Körper.

*) Malacarne (osserv. di chirurg. I. c. 5.) nennt ihn ein Ganglion. Cuvier sagt (annott. II. p. 30.) »nil bulbo cinereo magis ganglio affine in h. c.

licher aus grauer und markiger Masse gemischt, dicker als der Nerv und länglich rund ist, und so liegt, daß seine Länge von vorn nach hinten geht. Hier über der Siebplatte, also noch in der Hirnschale, theilt er sich in viele feine weiche Fäden. Diese treten durch die Löcher der Siebplatte und durch kleine Scheiben, welche als Fortsätze der äußeren Hirnhaut diese Löcher auskleiden, in die Nasenhöhle und verbreiten sich dann, feiner und weicher werdend, in der Schleimhaut derselben.

Diese Fäden liegen ziemlich in 2 Reihen. Die innere Reihe derselben geht durch die Löcher, welche der Mitte näher sind, und vertheilt sich am obern und mittlern, theils auch am untern Theile der Nasenwand; die äußere Reihe von Fäden geht durch die Löcher, welche näher am Rande der Siebplatte liegen. Diese Fäden vereinigen sich unter einander zu einem Geflechte und vertheilen sich an die Haut der Wände des Labyrinth der Nase und an den beiden obern Muschelknochen.

Hohl ist dieser Nerve bei dem Erwachsenen nicht ¹⁾, wohl aber, wie schon oben bemerkt worden ist, bei kleinen Embryonen ²⁾ und bei vielen Säugethieren, bei welchen er eine hohle, äußerlich graue, inwendig weiße, Verlängerung der Windungen der Hemisphären ist, die man den Riechkolben nennt, und deren Höhle mit der der Seitenventrikel bei einigen Gattungen der Säugethiere in unmittelbarer Verbindung steht. Nur die Affen, nach Cuvier, und die Affen und die Menschen, nach Gall, Treviranus und Tiedemann, haben Geruchsnerven, die den menschlichen ähnlich sind. Bei vielen Säugethieren, welche einen Riechkolben besitzen, entstehen aus der grauen Substanz der vordersten und der innersten Windungen, nach Gall, zahlreiche feine strahlenförmige Fäden, welche den Geruchsnerven bilden helfen ³⁾. Nach Treviranus fehlt denjenigen Thieren, welche einen Riechkolben haben, die vordere vorspringende Spitze des hinteren Hirnschenkels, und der Hippocampus ist sehr groß und hängt mit den Geruchsnerven zusammen, und auch nach Serres fließt bei mehreren der untersten Säugethierstammungen der Hippocampus mit dem Ursprunge des Geruchsnerven zusammen ⁴⁾.

Besonderheiten dieses Nerven, wodurch er sich auszeichnet, sind 1) seine geradte gestreifte Beschaffenheit, 2) seine dreieckig prismatische Gestalt, 3) seine Lage in jener Furche des Gehirns, 4) sein grauer Kolben, 5) die graue Masse in seiner Mitte, 6) seine Weichheit, die er jedoch mit dem Hörnerven gemein hat, daß er durch viele kleine Löcher der Hirnschale dringt.

Dieser Nerve ist Empfindungsnerve des Geruchs, vielleicht jedoch nicht allein, sondern mit ihm die Aeste des N. trigeminus, welche in die Nasenhaut gehen. Vielleicht sind aber auch die Aeste des 5ten Paares nur dem Ge-

perio. Eben dieser Meinung ist Messger (opusc. anat. I. p. 84.). Kwiakowsky de nervorum fluido, decussatione, gangliis. Regiomont. 1784. p. 12. und Rudolphi.

¹⁾ Wie schon Vesalius op. de rad. cornub. 660. richtig bemerkt hat.

²⁾ S. Sömmerring, de basi encephali, §. 28. 29. Nach ihm ist im menschlichen Embryo im 3ten Monate der Riechnerv deutlich hohl, so daß seine Hohligkeit mit der Seitenhirnhöhle des Gehirns in Verbindung steht. Götting. gef. Anzeig. 1796. 4tes Stüd. Sömmerring, über das Organ der Seelc. §. 18.

³⁾ J. O. Horst, Praes. Slevogt Diss. qua processus cerebri mamillares ex nervorum olfactoriorum numero exemptos disquisitioni submittit. recus. in Haller. disp. anat. sel. Vol. II. J. Weitbrecht, De vera significatione processus mammillarum cerebri in Commentar. Acad. sc. Petrop. T. XIV.

⁴⁾ Serres a. a. O. Tom. I. p. 285.

meingefühle gewidmet, und unter andern bestimmt, das Niesen zu bewirken. Dieser Ansicht scheinen die pathologischen Beobachtungen günstig zu sein, wo mit Zerschneidung der Ursprungsstellen der Geruchsnerven der Geruch aufgehört hatte. Da Gegentheile könnte man aus dem von Cuvier beobachteten gänzlichen Mangel der Geruchsnerven bei den Wallfischen schließen, wenn es sich beweisen ließe, daß sie das Vermögen zu riechen besäßen. Treviranus glaubt indessen auch bei diesen Thieren ein sehr kleines, kaum noch sichtbares Fädchen gefunden zu haben, was den Geruchsnerven vorstelle, was aber Rudolphi nicht fand.

Magendie's Experimente mit der Zerschneidung der Geruchsnerven und mit der Durchschneidung des 5ten Paares scheinen nichts für seine Meinung, daß welches das 1ste Paar nicht Geruchsnerv sein soll, beweisen zu können. Die Verletzungen, die den Thieren beigebracht wurden, waren zu groß, als daß man bei diesen Versuchen über den Geruch noch vor Täuschung sicher sein konnte.

II. Nervus opticus, der Sehnerv.

Der Sehnerv (nervus opticus) entspringt vom hintern untern Theile des Thalamus seiner Seite, ferner vom vorderen und hinteren Paare der Vierhügel ¹⁾ und vom Corpus geniculatum, einer neben den Vierhügeln nahe am Sehhügel gelegenen grauen Erhabenheit ²⁾. Er wendet sich rückwärts, abwärts, auswärts zur Grundfläche des Gehirns hinab, krümmt sich um das Crus cerebri seiner Seite herum, und geht nun unter demselben hin und empfängt dabei noch einige markige Fasern von der Grenze des Sehhügels. Dann kommen endlich beide Sehnerven in der Mitte der Grundfläche des Gehirns vor dem Trichter zusammen, hängen daselbst sehr genau mit der Substanz des grauen Hügel zusammen, und nehmen also auch zum Theil von ihr ihren Anfang, und bilden die Vereinigung der Sehnerven, chiasma nervorum opticorum. Jeder Sehnerv geht nun auswärts, tritt durch seine Oeffnung der här-

¹⁾ Santorini, Tabulae septendecim p. 32. — Bicq d'Azur glaubte die Nerven des Sehnerven bis in das Innere der Sehhügel hinein verfolgt zu haben, und giebt auch den Ursprung gewisser Fasern derselben an den Vierhügeln an. Treviranus hält es nicht für unwahrscheinlich, daß sich die Fasern unter den Vierhügeln bis zur Hirnklappe, wo der 4te Hirnnerv entspringt, fortsetzen. Serres behauptet bei jungen Embryonen des Menschen und der Säugethiere, den Sehnerven bis an die innere Oberfläche der Höhle der Vierhügel verfolgt zu haben, eine Ursprungsart, die noch ihm bei den Vögeln, Amphibien und Fischen das ganze Leben hindurch sichtbar ist. (Anatomie comparée du Cerveau. Paris 1824. T. 1. p. 318.). Gall sieht den Sehnerven auch vorzüglich von dem vorderen Vierhügelpaare, vom Corpus geniculatum externum und vom Tuber cinereum ab. Treviranus (Vermischte Schriften 1826. B. III. p. 106.) sah dasselbe, was Santorini, aber bei den Nagethieren fand er außerdem, daß der Sehnerv in einer sehr genauen Verbindung mit der Grundfläche des Gehirns und namentlich mit der Eminentia candidans stehe. Serres stimmt ihm in dieser letzteren Hinsicht bei. Aimé Mathei (Tentamen physiol. anat. de nervis in genere. Lugd. Batav. 1758. §. 10. bei Treviranus S. 107.) hat bei 2 Menschen einen Zusammenhang der Taenia mit der Wurzel des Sehnerven gefunden.

²⁾ Er ist zwar härter als der Nerven und Hörnerve, aber doch weicher, als die übrigen Nerven. Sömmerling Nervenlehre. 2te Ausg. §. 156.

en Hirnhaut und durch das Foramen opticum des Keilbeins in die Augenhöhle, geht in derselben unter dem *M. rectus superior* vorwärts, schräg auswärts und abwärts, in einem flachen, nach der Schläfe zu convergen Bogen. So erreicht er endlich die hintere Fläche des Augapfels, und tritt in ein seinem Eintritte bestimmtes Loch der Sclerotica, so daß der Ort seines Eintritts von oben und unten bestimmt in der Mitte, von der Schläfenseite und Nasenseite bestimmt, näher nach dieser, und also nach innen neben der Axt des Augapfels liegt.

Das Chiasma ist an jedem Sehnerven die Grenze zwischen dem hintern oder Hirnstücke, und dem vordern oder Augenstücke derselben.

In diesem Chiasma liegen sie nicht etwa bloß neben einander ¹⁾, sondern sie sind vereinigt, so daß sowohl das Mark, als die häutige Scheibe beider Nerven unmittelbar zusammenhängen. Man könnte zwar auf den ersten Anblick glauben, daß alle Fasern beider Sehnerven sich hier mit einander kreuzen, mithin der Sehnerv, welcher vom rechten Thalamus kommt, zum linken Auge, der, welcher vom linken Thalamus kommt, zum rechten Auge gehe; denn einestheils ist das bei allen Fischen und auch bei manchen Amphibien offenbar der Fall ²⁾; andernteils hat man beobachtet, daß in gewissen Fällen, bei gewisser krankhafter Beschaffenheit des einen Auges, oder des Augenstückes des einen Sehnerven, das Hirnstück des Sehnerven der andern Seite, oder, was weniger glaublich ist, auch der Thalamus der andern Seite merklich am Umfange abgenommen habe ³⁾; indessen haben mehrere

¹⁾ Vesalius versichert, die Sehnerven an der Stelle, wo sie gewöhnlich vereinigt sind, ganz getrennt gefunden zu haben, doch so, daß sie sich gegen einander beugten. (*De c. h. fabrica* IV. c. 4.) Batoroda sagt, indem er Vesal's Bemerkung anführt, er habe selbst beide Sehnerven getrennt gesehen. (*Anat. c. h.* VII. c. 3. p. 311.) Löfel erzählt, er habe beide Sehnerven ganz getrennt gefunden. (*Serutinum renum, Regiomont.* 1642. p. 59.)

²⁾ Bei den meisten Fischen gehen die Sehnerven bekanntlich über einander hin.

Nur bei einigen Fischen, z. B. bei den Rochen, geht ein Nerv durch den andern hindurch (*Sömmering, Nervenlehre, 2te Ausg.* §. 155.), was ich auch beim Häringe fand. (*Meckel's Archiv* 1827. St. 2.) Bei manchen Amphibien, z. B. beim Frosche, ist die totale Durchkreuzung nach Serres auch ganz offenbar (*Anatomie comp. du cerveau, Tome I. à Paris* 1824. S. p. 317. Pl. V. fig. 127.). Bei den Vögeln beobachtete *Petit* (*Mém. de l'academ. de Paris* 1735. 144. in der Octav. ausg. 194.), ferner *Carus* (Versuch einer Darstellung des Nervensystems, Leipzig 1814. Tab. IV.), später *Meckel* (*Archiv* B. II. 25.) und hierauf *Desmoulin*, daß sich der Sehnerv am Chiasma in horizontale Blätter spaltet, die durcheinander durchgehen, wie in einandergehobene Finger. Serres und Joh. Müller läugnen aber, daß die äußeren Facetten des Sehnerven bei ihnen an der Bildung der sich durchkreuzenden Blätter Antheil nehmen.

³⁾ Die ersten Bemerkungen hierüber sind von *Sömmering* (in den Hess. Beitr. II. IV.) an einem Eichhörnchen, zweien Pferden und an einem monströsen Ferkel, nachher auch an Hühnern und Enten gemacht worden. Blumenbach besitzt eins der von *Sömmering* deshalb untersuchten Pferdegehirne, an dem das Augenstück des Sehnerven des linken blinden Auges, und hingegen das Hirnstück des Sehnerven des

sorgfältige Anatomen ¹⁾ gezeigt, daß die Kreuzung der Sehnerven des Menschen nur eine theilweise (der inneren Bündel) sei, und daß die

rechten Thalamus mager und geschwunden; hingegen das Augennäuel des Sehnerven des rechten Auges, und das Hirsnäuel des Sehnerven des linken Thalamus viel stärker sind. Willmann fand bei einem Hunde, auf derjenigen Seite, wo derselbe blind war, den Augapfel kleiner, und nichts als eine dickliche, milchtrübe Masse enthaltend; der Nerv des kranken Auges war weit kürzer, dünner, glatter, grauer als der des gesunden Auges. Eben diese Veränderungen waren jenseits der Vereinigung auf der entgegen gesetzten Seite zu bemerken. Ein erhabener weißer Streifen des gesunden Nerven lief über den kranken nach der entgegen gesetzten Hirnhälfte. (Blumenbach's med. Bibl. II. 2. S. 391.)

Nach an Menschen sind solche Bemerkungen gemacht worden. Inerit von Sommering. Er fand den rechten Sehnerven am Augapfel halb grau und halb durchsichtig, auch dünner als den linken, und jenseits des chiasma denselben auf der linken Seite kürzer und schwächer. (Blumenbach Bibl. II. 2. S. 368.) — Bei einem epileptischen Manne, der zuweilen wahnsinnig war, fand er den rechten Sehnervel und den rechten Nerven da, wo er sich um das crus cerebri herum schlägt, viel dicker und größer als den linken, bis zum Orte der Vereinigung. Von dieser bis zum Auge war nicht der rechte, sondern der linke Nerv größer. (Noctig, de decuss. nerv. opt. p. 40. 41.) — In einem alten Manne, dem aus beiden Augen die Linse gezogen war, fand er den rechten Augapfel ganz verderben und zusammengefallen; den Nerven desselben dünner, härter und grauer, bis zum Chiasma; hinter demselben aber war der Sehnerv auf der linken Seite kürzer und dünner als auf der rechten, auch schien der linke Sehnervel kleiner. (Michaelis, über die Durchkr. d. Sehnerven S. 31.) — Phil. Michaelis fand bei einem Manne, der vor mehr als 30 Jahren sein rechtes Auge durch einen Schuß eingebüßt hatte, dasselbe klein, zusammengeschrumpft und mit einem bräunlichen Zellgewebe angefüllt; die räumliche Scheide des Sehnerven nur locker mit dem Nerven zusammenhängend, der nicht von ihm ausgefüllt, den Nerven selbst zu einem liniendicken ganz glatten Streifen zusammengeschrumpft, der nur in dem Grade, als er dem Orte der Vereinigung sich näherte, etwas mehr an Substanz zunahm. Der Nerve des gesunden Auges (auf dem auch einmal eine Zeitlang der schwarze Star gewesen) war dicker als gewöhnlich, und stand mit der ihn bekleidenden harten Hirnhaut an allen Stellen in der gewöhnlichen Verbindung. Am Orte der Vereinigung ließ sich keine Veränderung bemerken, außer daß das ganze chiasma dicker als gewöhnlich zu sein schien, doch auf keiner von beiden Seiten vorzugsweise. Der Unterschied der Nerven setzte sich kreuzend fort, so daß der gesunde Nerv mit derselben Stärke sich auf die rechte Seite begab, und sich mit einer an Dicke zunehmenden Wurzel um das crus cerebri schlug. Der kranke rechte Nerv hatte hinter der Vereinigung auf der linken Seite nicht die Hälfte der Stärke, die der gesunde hatte, und schlug sich auch mit einer schmaleren und dünneren Wurzel um das crus cerebri. Der linke Sehnervelhügel war kleiner und niedriger. (Grafse, Mag. für die Naturgesch. des Menschen, II. St. I. S. 142, und Michaelis, über die Durchkr. d. S. N. S. 24.) — Keveling fand an einem Weibchen das rechte rechte Sehnerven bis an den Ort der Vereinigung geschwunden; von hier aus war der Sehnerv auf der linken Seite bis zum Thalamus der linken Seite geschwunden. (Michaelis S. 27.) Noch einen Fall, der die Durchkreuzung bestätigt, soll Loder in Weingeist aufheben. (Michaelis, S. 31.) Folgende Anatomen haben eine vollkommene Durchkreuzung der Sehnerven gefaundet: Galen, de usu part. X. c. 12. »Quos si quis negligentius dissecuerit, alternare fore putaverit...; at non est ita.« — Varolius, de nerv. opt. p. 14. Car. Stephanus, de dissent. part. c. h. p. 247. Jul. Casserii pentasthes. V. c. 16. Plempii ophthalmogr. I. p. 19. Blasii commentar. in Vesling. synagoga p. 221. Santorini observ. anat. p. 63. Morgagni epist. anatt. XVIII. art. 40. (Winslow expos. anat. IV. Tête n. 137.). Licutaud essays anat. p. 346. Zinn, de oc. hum. p. 190. Mathei tentamen de nervis. L. B. 1758. p. 25. Vicq-d'Azyr in Mém. de l'ac. d. sc. de Paris 1781.

¹⁾ Für diese Ansicht haben sich unter andern Vicq-d'Azyr, Galvani, Adernann, Cuvier, die Brüder Wenzel, G. R. Treviranus und Joh. Müller erklärt.

äußeren Bündel auf der Seite, auf welcher sie vorher lagen, bleiben; und hiermit stimmen auch die Erfahrungen, die man bei der Halbblichtigkeit (Hemioptie) macht ¹⁾, sehr gut überein. Auch finden wir Beobachtungen von Fällen, wo sich die krankhafte Beschaffenheit des einen Auges oder des Augenhüchels eines Sehnerven in das Hirnstück des Nerven derselben Seite, oder auf demselben Thalamus fortgesetzt haben soll ²⁾.

¹⁾ Pravas in Archives générales de médecine. Paris 1825. Mai p. 59.

²⁾ Andreas Casatiplaus fand bei einer Schwäche des einen Auges den Sehnerven desselben dünner, und daß diese krankhafte Beschaffenheit sich hinter der Vereinigung nicht auf der andern, sondern auf derselben Seite fortsetzte. (Quaest. med. Vom. 1593. II. n. 10. fol. 22.) — Santorini fand den Nerven eines blinden rechten Auges dünner und graulich bis zu seinem Ursprunge, da der linke hingegen ganz weiß war. Auch am Orte der Vereinigung war der rechte Nerv grau, und deutlich vom linken zu unterscheiden. (Obs. anat. c. 3. §. 14.) — Cheselden fand den rechten Sehnerven bei beiden sonst gesund scheinenden Augen sehr viel dünner und misfarbig, und dieser Unterschied ging hinter der Vereinigung bis zum Gehirne hin (Philos. transact. XXVIII. n. 337. p. 281.). — Heiland erzählt, er habe gefunden, daß der Sehnerv eines fehlerhaften Auges vom Auge bis jenenseits der Vereinigung dünner und weisser war. (Eph. N. C. Dec. III. Ann. 7. Obs. 157. p. 277.) — Wexel hat 3 Fälle beobachtet, in denen der Sehnerv des blinden Auges nebst dem Gehirne derselben Seite kleiner und zusammengefallener als der andere war. (Ann. zu Haller's Grundriß, S. 386. §. 509.)

Ker mann (in der unten angeführten Schrift S. 388.) sucht die Kreuzung durch folgenden Fall zu widerlegen. An einem Menschen, dem das rechte Auge durch einen Schlag in der Kindheit zerstört worden war, fand er den rechten Sehnerven geschwunden und um mehr als um die Hälfte dünner; die harte Hirnhaut umschloß ihn nicht dicht, sondern war faltig; der Nerv selbst war zwar platt, aber wie zusammengebrückt. An der Vereinigung war der Nerv der kranken Seite dünner. Ob auch hinter derselben der rechte Nerv dünner war, will er nicht gewiß bestimmen, obwohl es ihm so schien. Aber am Orte des Uebergangs in den Gehirne war der rechte Nerv dünner, und der rechte Gehirne kleiner. Auch war der kranke Nerv rötlich grau, der andere weiß bis zum Gehirne hin.

Einige Bemerkungen beweisen weder für, noch wider die Kreuzung. Morgagni fand bei einem Manne, dessen rechtes Auge um die Hälfte kleiner, rauhig und angeschwollen war, in der Scheide des Sehnerven gar keine Nervensubstanz, sondern nur eine grauliche, zähe, dickliche, trübe Feuchtigkeit, bis einen Fingerbreit vom Auge. An der Vereinigung, und hinter derselben, war an beiden Nerven kein Unterschied. (De sed. et caus. morb. Ep. XIII. art. 8.) Bei einer Frau fand er das linke Auge fast eben so klein, aber weniger verdorben, der Sehnerv desselben war bis zur Vereinigung dünner, fester, inwendig grau. Hinter derselben war alles in beiden Nerven gesund. (L. c. Ep. XIII. art. 9.) Bei einem andern Menschen fand er das rechte Auge ganz verdorben, die Nervenhaut verknöchert, den Sehnerven dünner, fleischfarbig bis zur Vereinigung. Hinter derselben war alles in beiden Nerven gesund. (L. c. Ep. LII. art. 30.) Bei einem andern fand er das rechte Auge kleiner, den Sehnerven dünner, die Scheide desselben verdickt. Diese Beschaffenheit verlor sich nach hinten zu, und hinter der Vereinigung war kein Unterschied beider Nerven zu bemerken. (L. c. Ep. LXIII. art. 6.) Bei einem andern fand er den rechten Nerven von der Vereinigung bis in die Augenhöhle dünner und grauer. In der Augenhöhle war die Veränderung weniger merklich, und hinter der Vereinigung schienen beide Sehnerven völlig gesund. (L. c. Ep. LXIII. art. 5.) Spenklam fand bei einem Menschen, der das rechte Auge, wahrscheinlich durch einen Schlag, schon lange verloren hatte, den Sehnerven vom Auge bis zur Vereinigung dünn, eingeschrumpft und misfarbig. Hinter derselben war er, wie der Gehirne, so gesund und dick als der linke, und beide waren gar nicht verschieden. (De diff. in obs. anat. epicriai resp. J. G. Goldschmidt. Erlang. 1771. p. 36. sqq.) Michaelis

Das Hirnstück des Nerven ist breiter und glatter, und wird vom Sehhügel nach dem Chiasma zu allmählig schmaler und walzenförmig. Vom Chiasma bis zum Augapfel bleibt der Sehnerv gleich dick. Er ist nächst dem N. trigeminus der dickste Gehirnerv.

Der Sehnerv ist vom Sehhügel an mit einer weichen Scheide umgeben, welche eine Fortsetzung der weichen Hirnhaut ist, die den Sehhügel bekleidet. Wenn der Nerv durch das Loch der Sclerotica eingetreten ist, so verläßt ihn die weiche Hirnhaut, und scheint als Lamina fusca an die inwendige Fläche der Sclerotica zu gehen. Von der inwendigen Fläche der Scheide des Sehnerven gehen Fortsätze zwischen die Bündel des Nerven, welche dieselben mit kleineren canalartigen Hüllen umgeben. Keil hat gezeigt, daß diese letzteren den Bündeln des Hirnstücks des Nerven fehlen, und plötzlich am vorderen Theile des Chiasma ihren Anfang nehmen. (S. Th. I. Tab. II. Fig. 17.)

Ich fand bei einer Zerkörnung des linken Auges den Nerven denselben bis an die Bereinigung bis um die Hälfte kleiner als den rechten. Hinter der Bereinigung war kein Unterschied zu bemerken. Beide Nerven waren etwas weicher. (Grosse, Magazin für die Naturgeschichte des Menschen. II. St. I. S. 146, und Michaelis, über die Durchkr. S. 12.)

Es kann auch zuweilen der Sehhügel derselben Seite, an welcher das Auge und das Augentstück des Sehnerven krankhaft ist, zufällig kleiner sein. Zumal kann die mindere Größe des Sehhügels derselben Seite, und die des ihm zunächst liegenden Theiles des Sehnerven nichts beweisen, wenn dessenachtet der Sehnerv derselben Seite dicht hinter der Bereinigung nicht kleiner ist.

Manche Beobachtungen endlich sind einer theilweisen Durchkreuzung günstig. Die Brüder Wenzel beobachteten folgendes. Eine Frau von 24 Jahren hatte in ihrem 1ten Jahre die Pocken bekommen. Beide Augen litten, vorzüglich aber das linke, welches auch 18 Wochen blind blieb, 12 Jahre vor dem Tode ging es in Eiterung über. Der Nerv derselben war da, wo er in die Augenhöhle trat, merklich kleiner, grau, hornartig und etwas durchsichtig, und ward von seiner Scheide nur sehr locker umgeben. Wie er sich dem andern Sehnerven näherte, verlor sich das hornartige Aussehen etwas, die nach außen liegenden Fasern des rechten Auges mischten sich dem Nerven der rechten Seite auch nach der Bereinigung ein. Die inneren Nervenfasern aber gingen auf die linke Seite hinüber, und kreuzten sich also mit den Fasern des andern Auges. Das kranke Auge erhielt ebenfalls von beiden Nerven Fasern, so daß die äußeren von derselben, die inneren aber von der entgegengelegten Seite entgingen; doch war dies letzte nicht ganz drücklich. (De penitiori cerebri structura, p. 116, 119, und Michaelis S. 29.) — »Nenerlich hat Willmann Sömmerringen ein sehr gut erhaltenes Präparat des Gehirns einer Frau geschickt, die ein Auge durch den Krebs ganz verloren hatte. Es bekündigt eine theilweise Durchkreuzung, aber auch der Sehhügel derselben Seite ist offenbar größer.« (Michaelis S. 31.)

Woro sagt, er habe ein partielles Durchkreuzen der Fasern gesehen, aus denen die Sehnerven bestehen. (Ueb. das Nervensystem, S. 31.) Ueber das Verhalten der Nervenfasern des Sehnerven im Chiasma sehe man nach Sam. Thom. Sömmerring, über die Bereinigung der Sehnerven. In den Heftlichen Beiträgen zur Geschichtsamkeit und Kunst, 2. u. 4. St. — J. E. Willmann über die Durchkreuzung der Sehnerven. In Blumenbach's med. Biblioth. II. 2. S. 391. — Franc. Nicol. Noethig praes. Sam. Thom. Sömmerring, de decussatione nervorum opticeorum. Mogunt. 1786. 8. — J. F. Ackermann, de nervorum opticeorum inter se nexu. Abgedruckt in Blumenbach's Bibl. III. 2. — Phil. Michaelis, über die Durchkreuzung der Sehnerven. Halle 1790. 8. — Wenzel, de penitiori cerebri structura. Cap. XI. p. 109. — Joh. Müller, zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinnes. Leipzig 1826. 8. S. 95.

Indem der Sehnerv in die Augenhöhle tritt, geht die auswendige Matte der harten Hirnhaut in die Knochenhaut der Augenhöhle über, die inwendige bleibt bei dem Sehnerven, und wird zur äußeren festen Scheide (*vagina dura*) desselben. Indem der Nerv in das Loch der *Sclerotica* tritt, endigt sich seine harte Scheide, und wird durch Zellgewebe mit der *Sclerotica* verbunden. Schneidet man an dieser Stelle den Sehnerven ab, erweicht daselbst das Mark und preßt es aus den canalartigen Scheiden der Bündel des Sehnerven aus, so stellen sich diese durchschnittenen canalartigen Scheiden unter der Form eines Siebes, *lamina cribrosa*, dar, das aber nicht von den Fasern der *Sclerotica* oder der *Chorioidea* gebildet wird¹⁾.

Der ganze Nerv tritt also in das Loch des hintern Theils der *Sclerotica* und durch das Loch der Aderhaut, und breitet sich dann in die Nervenhaut des Auges aus, so daß diese seines Markes Fortsetzung ist.

Indem er durch das Loch der *Sclerotica* hineintritt, wird er allmählig (conisch) dünner. Auch ist hier an seinem Nervenmarke bei alten Menschen eine bräunliche oder schwärzliche Farbe bemerklich. Die Nervenhaut besteht bei dem Menschen, und nach *Treviranus* auch bei den meisten Thieren, nicht aus einzeln unterscheidbaren Fasern. Indessen fand er doch die Nervenhaut beim Narwall deutlich aus Fasern zusammengesetzt, und dasselbe sahen, wie er auch anführt, *Valsalva*, *Morgagni*, *Zinn* und *Haller* beim Hasen und Schweine²⁾.

Dieser Nerv hat schon in einiger Entfernung vom Augapfel in seiner Mitte die *Arteria centralis*, welche in ihm einen feinen cylindrischen Canal (*Porus opticus*) ausfüllt, und näher am Augapfel auch die *Vena centralis* neben sich hat. Weiter hinten, wo die *Arteria centralis* noch nicht in ihm liegt, enthält er keinen Canal.

Uebrigens erhält der Sehnerv auch in der Hirnschale dünne Schlagadern aus der *Carotis cerebralis*, und in der Augenhöhle aus der *A. ophthalmica*, und den *Ramis ciliaribus* derselben.

Besonderheiten dieses Nerven sind: 1) seine Vereinigung mit demselben Nerven der andern Seite; 2) seine weiche Scheide, welche nicht bloß seine einzelnen Bündelchen, sondern den ganzen Nerven umgibt; 3) seine harte Scheide, welche so offenbar eine Fortsetzung der harten Hirnhaut ist; 4) seine Endigung in der Nervenhaut. Dieser Nerv ist Empfindungsnerve des Gesichts.

¹⁾ *Jacob*, *Medico-chirurgical Transactions* by the medical and chirurgical Society of London. Vol. XII. und *G. R. Treviranus*, *Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Sinneswerkzeuge des Menschen und der Thiere*. Heft I. Bremen 1828. Fol. p. 76.

²⁾ *Valsalva*, *Opera* p. 142. — *Morgagni*, *Ep. anat.* XVII. §. 40. — *Zinn*, *Commentar. soc. reg. Gotting.* T. IV. 268. *Descriptio oculi hum.* c. III. §. 3. *G. R. Treviranus* a. a. O. S. 76.

III. Nervus Oculi motorius, der gemeinschaftliche Augenmuskelnerb.

Der dritte Nerv, oder der gemeinschaftliche Augenmuskelnerb, *nervus oculi motorius s. tertius*, entspringt aus dem innern Theile der untern Fläche des *Crus cerebri*, zwischen dem vordern Rande der ringförmigen Erhabenheit und der *Eminentia caudicaria* seiner Seite mit mehreren Wurzeln, deren einige weiter nach innen und hinten, andere weiter nach außen und vorn entspringen. Die innersten Wurzeln beider Nerven sind nahe bei einander ¹⁾. Der Nerv ist anfangs glatter, nachher erhält er eine rundliche Gestalt. Er ist dicker als der *N. acusticus*, doch viel dünner als der *N. opticus*. Er geht schräg auswärts vorwärts, entfernt sich allmählig von dem der andern Seite, geht zwischen der *Arteria superior cerebelli* und der *profunda cerebri* durch ²⁾, unter dem *N. opticus* hin, tritt neben dem Türkensattel unter die harte Hirnhaut ³⁾, und dann durch die *Fissura orbitalis superior* in die Augenhöhle. Bei dem Durchgange durch die *Fissura orbitalis superior* liegt er weiter unten als der *N. trochlearis* und der Augenhöhlenast des 5ten Paares.

Endlich kommt er zwischen den beiden Köpfen des *M. rectus externus*, mit dem *N. abducens* und dem *nasalis* in ein Bündel verbunden, in den konischen Raum, welcher von den geraden Augenmuskeln umgeben wird, und liegt neben dem *N. opticus* weiter nach außen.

In der Augenhöhle theilt er sich nun in 2 Aeste, welche schon vor seinem Eintritte in die Augenhöhle durch eine Furche unterschieden waren.

¹⁾ Sömmerring hat den Ursprung dieses Nerven oft bis fast auf die Wand der Augenhöhlen durch die schwarze Masse verfolgt. (Ueber das Organ der Seele, S. 19.) Auch Zinn sagt: »Originem trahunt satis profundae, ut fibrae, quo sunt interiores, eo profundiori loco nascantur, et nonnullae ad ipsam commissuram anteriorem pertingere videantur.« (De oculo hum. c. 9. §. 4. p. 175. Ed. Wrisberg). Galt verfolgte ihn bis weit unter die Brücke. — Malacozzi beschrieb ein Bündel, welches vom obern Schenkel des kleinen Gehirns und von der Seite der *Valvula cerebelli* (an welcher auch der 4te Hirnnerv entspringt) entspringt und sich mit dem Anfange des *Nervus oculorum motorius* zu verbinden scheint. — Rolando (Recherches anatomiques sur la moëlle allongée, Mem. della Reale Accademia della Scienze di Torino T. XXIX. Tab. I. Fig. 1—3.) ist der Meinung, er entspringe nicht von den Hirnschenkeln, d. h. von den fortgesetzten Basen der Pyramiden, sondern von den über denselben liegenden fortgesetzten Fasern der deren Rückenmarksbündel.

²⁾ Bisweilen geht die *Arteria cerebri profunda* mitten durch seinen Stamm. Sömmerring, Nervenlehre, 2te Ausgabe S. 161.

³⁾ Nach Sömmerring's Untersuchungen verbindet er sich hier mit einem oder mit 3 Fäden die von dem an der *Carotis* gelegenen Geflechte zu ihm gehen.

1) Der obere Ast ist dünner, liegt an der äußeren Seite des N. opticus, steigt über den N. opticus hinauf, giebt dem M. rectus superior einige Aeste und endigt sich endlich im levator palpebrae superioris.

2) Der untere Ast ist viel dicker, geht unter dem N. opticus auf dem M. rectus inferior gerade vorwärts, bleibt nur in einer kurzen Strecke ungetheilt, und theilt sich dann in 3 Aeste: a) der innere Zweig des unteren Astes geht schräg einwärts unter dem N. opticus zu den M. rectus internus; b) der untere Zweig ist dünner als jener, und geht gerade vorwärts in den M. rectus inferior. Bisweilen kommen dieser und der folgende aus einem gemeinschaftlichen Aste. c) Der äußere Zweig giebt eine Wurzel zum Ganglion ophthalmicum, geht zwischen dem M. rectus externus und dem rectus inferior vorwärts, unter dem Augapfel und in den M. obliquus inferior.

Dieser Nerv versorgt also den Levator palpebrae und die meisten Muskeln des Augapfels, nämlich nur den M. rectus externus und den Trochlearis nicht, denn jeder von diesen erhält einen besondern Gehirnnerven.

IV. Nervus trochlearis, der Rollmuskelnerb.

Der vierte Nerv, oder der obere Augenmuskelnerb, oder Rollmuskelnerb, nervus trochlearis, s. patheticus, s. quartus, der dünnste aller Nervenstämme des ganzen menschlichen Körpers, entspringt hinter den Vierhügeln, aus dem Marke des Processus cerebelli ad corpora quadrigemina und der Valvula cerebelli, mit einer einfachen, zweifachen oder dreifachen Wurzel, so nahe bei dem andern Seite, daß er mit ihm bisweilen zusammenhängt ¹⁾. Seine Wurzeln, wenn mehrere da sind, vereinigen sich sogleich in einem Nervenstamme. Dieser Nervenstamm geht auswärts, an der äußeren Seite des Crus cerebri abwärts herum, und kommt so zur Grundfläche des Gehirns, wo er zwischen dem hinteren Theile des großen und dem vorderen Theile des kleinen Gehirns, an der Seite des Hirnknoten, nicht weit von dem N. trigeminus erscheint. Er hängt an einer Stelle mit dem N. trigeminus durch Zellgewebe locker zusammen, geht hierauf über dem inneren Theile des Felsenbeines neben dem Sattel durch die für ihn bestimmte Oeffnung der harten Hirnhaut über dem Sinus cavernosus hin, und dann durch die Fisura orbitalis superior in die

¹⁾ Zuweilen scheinen sich, wie ich selbst beobachtet habe, einige Fasern dieser Nerven an der Ursprungsstelle zu durchkreuzen.

III. Nervus Oculi motorius, der gemeinschaftliche Augenmuskelnerb.

Der dritte Nerv, oder der gemeinschaftliche Augenmuskelnerb, nervus oculi motorius s. tertius, entspringt aus dem innern Theile der untern Fläche des Crus cerebri, zwischen dem vordern Rande der ringsförmigen Erhabenheit und der Eminencia canaliculata seiner Seite mit mehreren Wurzeln, deren einige weiter nach innen und hinten, andere weiter nach außen und vorn entspringen. Die innersten Wurzeln beider Nerven sind nahe bei einander ¹⁾. Der Nerv ist anfangs glatter, nachher erhält er eine rundliche Gestalt. Er ist dicker als der N. acusticus, doch viel dünner als der N. opticus. Er geht schräg auswärts vorwärts, entfernt sich allmählig von dem der andern Seite, geht zwischen der Arteria superior cerebelli und der profunda cerebri durch ²⁾, unter dem N. opticus hin, tritt neben dem Lärtenfattel unter die harte Hirnhaut ³⁾, und dann durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle. Bei dem Durchgange durch die Fissura orbitalis superior liegt er weiter unten als der N. trochlearis und der Augenhöhlenast des 5ten Paares.

Endlich kommt er zwischen den beiden Köpfen des M. rectus externus, mit dem N. abducens und dem nasalis in ein Bündel verbunden, in den konischen Raum, welcher von den geraden Augenmuskeln umgeben wird, und liegt neben dem N. opticus weiter nach außen.

In der Augenhöhle theilt er sich nun in 2 Äste, welche schon vor seinem Eintritte in die Augenhöhle durch eine Furche unterschieden waren.

¹⁾ Sömmering hat den Ursprung dieses Nerven oft bis fast auf die Wand der Hirnhöhlen durch die schwarze Masse verfolgt. (Ueber das Organ der Seele, §. 19.) Nach Binn sagt: »Originem trahunt satis profundas, ut fibrae, quo sunt interiores, eo profundiori loco nascantur, et nonnullae ad ipsam commissuram anteriorem pertingere videantur.« (De oculo hum. c. 9. §. 4. p. 175. Ed. Wrisberg). Gall verfolgte ihn bis weit unter die Brücke. — Malacarne beschreibt ein Bündel, welches vom obern Schenkel des kleinen Gehirns und von der Seite der Valvula cerebelli (an welcher auch der 4te Hirnnerv entspringt) entspringt und sich mit dem Anfange des Nervus oculorum motorius zu verbinden scheint. — Rolando (Recherches anatomiques sur la moëlle alongée, Mem. della Reale Accademia della Scienze di Torino T. XXXIX. Tab. I. Fig. 1—3.) ist der Meinung, er entspringe nicht von den Hirnschenkeln, d. h. von den fortgesetzten Säulen der Pyramiden, sondern von den über denselben liegenden fortgesetzten Basen der vordern Rückenmarksbündel.

²⁾ Bismillon geht die Arteria cerebri profunda mitten durch seinen Stamm. Sömmering, Nerventafel, 2te Ausgabe S. 161.

³⁾ Nach Boer's Untersuchungen verbindet er sich hier mit einem oder mit 2 Fäden, die von dem an der Carotis gelegenen Geflechte zu ihm gehen.

1) Der obere Ast ist dünner, liegt an der äußeren Seite des N. opticus, steigt über den N. opticus hinaus, giebt dem M. rectus superior einige Aeste und endigt sich endlich im levator palpebrae superioris.

2) Der untere Ast ist viel dicker, geht unter dem N. opticus auf dem M. rectus inferior gerade vorwärts, bleibt nur in einer kurzen Strecke ungetheilt, und theilt sich dann in 3 Aeste: a) der innere Zweig des unteren Astes geht schräg einwärts unter dem N. opticus in den M. rectus internus; b) der untere Zweig ist dünner als jener, und geht gerade vorwärts in den M. rectus inferior. Bisweilen kommen dieser und der folgende aus einem gemeinschaftlichen Aste. c) Der äußere Zweig giebt eine Wurzel zum Ganglion ophthalmicum, geht zwischen dem M. rectus externus und dem rectus inferior vorwärts, unter dem Augapfel und in den M. obliquus inferior.

Dieser Nerv versorgt also den Levator palpebrae und die meisten Muskeln des Augapfels, nämlich nur den M. rectus externus und den Trochlearis nicht, denn jeder von diesen erhält einen besondern Gehirnnerven.

IV. Nervus trochlearis, der Rollmuskelnerve.

Der vierte Nerv, oder der obere Augenmuskelnerve, oder Rollmuskelnerve, nervus trochlearis, s. patheticus, s. quartus, der dünnste aller Nervenstämme des ganzen menschlichen Körpers, entspringt hinter den Vierhügeln, aus dem Marke des Processus cerebelli ad corpora quadrigemina und der Valvula cerebelli, mit einer einfachen, zweifachen oder dreifachen Wurzel, so nahe bei dem der andern Seite, daß er mit ihm bisweilen zusammenhängt ¹⁾. Seine Wurzeln, wenn mehrere da sind, vereinigen sich sogleich in einem Nervenstamme. Dieser Nervenstamm geht auswärts, an der äußeren Seite des Crus cerebri abwärts herum, und kommt so zur Grundfläche des Gehirns, wo er zwischen dem hinteren Theile des großen und dem vorderen Theile des kleinen Gehirns, an der Seite des Hirnknoten, nicht weit von dem N. trigeminus erscheint. Er hängt an einer Stelle mit dem N. trigeminus durch Zellgewebe locker zusammen, geht hierauf über dem inneren Theile des Felsenbeines neben dem Sattel durch die für ihn bestimmte Oeffnung der harten Hirnhaut über dem Sinus cavernosus hin, und dann durch die Fisura orbitalis superior in die

¹⁾ Bisweilen scheinen sich, wie ich selbst beobachtet habe, einige Fasern dieser Nerven an der Ursprungsstelle zu durchkreuzen.

444 4tes Paar, N. trochlearis; 5tes Paar, N. trigeminus.

Augenhöhle. Bei dem Eintritte in die Augenhöhle liegt er über dem N. oculi motorius und abducens weiter nach außen, als der N. oculi motorius, und dicht an der innern Seite des N. frontalis, mit welchem er nach Sömmering und Boek nicht selten durch einen starken Faden verbunden ist.

In der Augenhöhle geht er schräg aufwärts, vorwärts, einwärts zum mittleren Theile des Bauches des M. trochlearis, und vertheilt sich in demselben mit mehreren Fäden. Uebrigens giebt er bis hieher keinen Ast ab, und versorgt also bloß jenen einzigen Muskel. Warum er sich nur zu diesem einzigen Muskel vertheile, und warum dieser Muskel allein einen besonderen ganzen Nervenstamm erhalte, das ist noch nicht mit hinlänglicher Wahrscheinlichkeit bestimmt worden¹⁾. Da er weit hinten in der Hirnschale entspringt, und von seinem Ursprunge an bis zum M. trochlearis keinen Ast abgiebt, so ist er der längste Nervenstamm des menschlichen Körpers.

V. Nervus trigeminus, der dreiaästige Nerv.

Der fünfte Nerv oder der dreiaästige oder der dreigetheilte Nerv, nervus divisus s. trigeminus, s. sympathicus medius²⁾, s. quintus, kommt an dem äußeren Theile jeder Hälfte des Hirnknotens, da wo der Processus cerebelli ad pontem in derselben übergeht, zum Vorschein.

Er entspringt mit 2 Wurzeln; die dickere und längere Wurzel besteht aus vielen³⁾, (nach Sömmering bisweilen bis auf 100) Fäden von verschiedener Dicke, und kommt aus einer Spalte des Hirnknotens hervor. Die kleine Wurzel entspringt weiter vorn und oben, so daß sie mit jener einen Winkel macht, und besteht aus weniger, (aus drei, vier, fünf, sechs, —) aber dickeren Fäden, welche selbst in einige Bündel vereinigt sind und dicht neben der dicken Wurzel ein wenig tiefer zwischen den Fasern der Brücke hervorkommen, zuweilen aber auch durch die nämliche Spalte in der Brücke gemeinschaftlich mit der dicken Wurzel gehen. Diese kleinere Portion des Nerven scheint auch weicher und weißer zu sein, als die größere.

Nach Santorini's Beschreibung läßt sich die dicke Wurzel zwischen den Quersfasern der Brücke nach hinten verfolgen. Eine Portion derselben dringt da selbst tief in die Brücke ein, ohne daß es sich bestimmen läßt, ob sie daselbst mit den in der Brücke emporsteigenden Fasern des verlängerten Markes in Verbindung

¹⁾ Otto, seltene Wahrnehmungen, 1816. S. 108, fand einmal, daß der N. nasociliaris von ihm entsprang.

²⁾ Der Name divisus, auch der Name trigeminus (Winslow expos. anat. III. Nerves N. 28.) sind ihm angemessen, weil er sich, ehe er aus der Hirnschale heraustritt, in 3 Aeste theilt. Der Name sympathicus medius ist ihm wegen seiner wichtigen Verbindungen mit andern Nerven gegeben worden, ist aber nicht gut gewählt.

³⁾ Wisberg glaubt (S. 4.), daß die Zahl der Fäden nach der Geburt zunehmen.

siehe. Eine 2te Portion dieser Wurzel, welche sich durch ihre Weichheit auszeichnet, läßt sich bis in die Medulla oblongata verfolgen. Hier liegt sie nach Santorini ¹⁾ fast zwischen den Oliven und Pyramiden, nach Wrisberg ²⁾ an den Fasern der Pyramiden, nach Riemeyer ³⁾, Boß ⁴⁾ und J. F. Meckel ⁵⁾ in der Furche zwischen den Oliven und corpus testiforme, endlich nach Rolando ⁶⁾ und Langenbeck ⁷⁾ zwischen den Fasern des corpus testiforme.

Aus der großen und der kleinen Portion wird ein Nervenstamm zusammengesetzt, welcher der dickste aller Hirnnerven, plattrundlich und auf der rechten Seite gemeinlich etwas dicker als auf der linken ist.

Er tritt über dem oberen Rande des Felsenbeins durch eine längliche Oeffnung zwischen die auswendige und inwendige Platte der harten Hirnhaut.

Die größere Wurzel breitet bei diesem Durchgange durch die harte Hirnhaut ihre Fäden aus, so daß ein platter Wulst, intumescencia plana nervi trigemini ⁸⁾, oder ganglion semilunare Gasseri entsteht, welcher im Querdurchschnitte halbmondförmig, nämlich nach oben platt, nach unten convex, mit vielen Blutgefäßen durchzogen, und daher röthlich ist. Dieser Wulst ist mittelst einer zelligen Scheibe, armilla, mit der umgebenden harten Hirnhaut fester verbunden. Der Nerv nimmt in diesem Wulste an Dicke zu, und theilt sich in demselben in 3 Äste.

Die kleinere Wurzel geht, ohne sich merklich auszubreiten, und ohne in den Wulst einzutreten (obwohl einige Fädchen aus ihm zu derselben zu gehen scheinen) hinter der größeren Wurzel herab und in den 3ten Ast des Nerven über ⁹⁾.

Er geht aber dabei nicht durch den Sinus cavernosus selbst ¹⁰⁾, sondern

¹⁾ Jo. Dom. Santorini, observationes anatomicae. Venetiis 1724. 4. p. 64, 65.

²⁾ H. A. Wrisbergii observationes anatomicae de quinto pare nervorum ocellulari. Göttingae 1777. rec. in Ludwig. Script. neurol. min. sol. T. I. 266.

³⁾ G. H. Riemeyer, über den Ursprung des 5ten Nervenpaares des Gehirns in Reil's Archiv für die Physiologie 1812. B. XI. p. 79, 80.

⁴⁾ H. E. Boß, Beschreibung des 5ten Nervenpaares und seiner Verbindung mit andern Nerven, vorzüglich dem Gangliensystem. Weizen 1817. Fol., letzte Tafel.

⁵⁾ Meckel d. j., Handb. d. menschl. Anat. B. III. S. 709, 710.

⁶⁾ Rolando, Recherches anatomiques sur la moëlle allongée, lues etc. 1822. p. 25.

⁷⁾ Langenbeck, icones anatomicae. Neurologia Fasc. I. Tab. XX und XXI. p. 2, Tab. XXI. fig. 3. leitet ihn vom erus medullae ad corp. quadrigeminum (von den vorderen Rückenmarksbündeln) her.

⁸⁾ Bei Meckel (de quinto pare §. 33.) Taenia nervosa; bei Wrisberg (de quinto pare p. 11.) intumescencia semilunaris. Winslow (n. 29.) nennt ihn ein ganglion; dafür nahm ihn auch Gasser, und daher nennt ihn Hirsch (anat. parva quinti p. 14.) ganglion Gasseri, auch ganglion semilunare. — Meckel (p. 21.) und Wrisberg (§. 12.) nehmen ihn nicht für ein ganglion.

⁹⁾ Prochaska, de struct. nerv. Tab. II. fig. 5. 6. Gött. gelehrte Anzeigen 1782. Zugabe, 21. St. S. 335. — Sömmerring, Nervenlehre §. 222. — Paletta, (de nervis crotaph. et bucc.) hat beobachtet, daß diese kleinere Portion besonders den N. crotaphiticus und buccinatorius bilde, und theilt daher den ganzen Nerven in 5 Äste.

¹⁰⁾ Wie Bienenfels (neurographia p. 16.) und Winslow (n. 29. 30.) irrig annehmen.

neben demselben, an seiner äußeren Seite vorbei, und wird durch die Wand selbst von ihm geschieden¹⁾. Nach einigen Anatomen, namentlich auch nach neuesten Untersuchungen von Arnold, soll der Knoten einige Fäden an die h. Hirnhaut abgeben. Auch empfängt er, wie von mir²⁾ bei Säugethieren, von Boeck und Arnold beim Menschen gezeigt worden ist, einige Fäden dem an der Carotis cerebialis liegenden Geslechte des Nervus sympathicus.

Die 3 Aeste dieses Nerven, in welche er sich theilt, während noch zwischen den Platten der harten Hirnhaut liegt, sind:

1) Der Ramus orbitalis s. ophthalmicus, der Augenhöhle aß, der dünnste und oberste Ast, der für die Iris, die Thränen drüse, die Stirne, und für einen Theil der Nasenhaut bestimmt ist, nach Boeck 1 oder 2 Fäden von dem an der Carotis liegenden Geslechte des sympathischen Nerven aufnimmt und durch die obere Augenhöhlenpalte in die Augenhöhle geht.

2) Der Ramus maxillaris superior, der Oberkieferast, für einen Theil der Nasenhaut, für die oberen Zähne, für den Gaumen, und für einen Theil der Wangenmuskeln und Wangenhaut bestimmt ist, und durch das Foramen rotundum die untere Augenhöhlenpalte geht, und

3) Der Ramus maxillaris inferior, der Unterkieferast, dickste und unterste, für die Zunge, für die unteren Zähne, für Muskeln der unteren Kinnbacke und für die Haut derselben bestimmte Ast. Er geht durch das ovale Loch aus dem Schädel heraus. Alle 3 Aeste weichen unter einem spitzen Winkel von einander ab, Winkel zwischen dem 1sten und 2ten ist aber spitziger, als der zwischen dem 2ten und 3ten.

Die große Portion des Nerven steht also mit allen Sinnesorganen in Verbindung, denn sie geht zur Haut, zur Zunge, zur Nase zum Ohre (nämlich das Fädchen zum N. communicans faciei) zum Auge. Die Rami nasales sind vielleicht Empfindungsnerven des Geruchs; der Ramus lingualis ist gewiß der Empfindungsnerv des Geschmacks.

Die kleine Portion des Nerven gelangt nach den Untersuchungen von Paletta und Ch. Bell nur zu Muskeln, und zwar vorzüglich zu den Kaumuskeln, zum Masseter, Temporalis, zu dem Pterygideus externus und internus, zum Buccinator, zu den Lippenmuskeln und zu dem Mylohyoideus. Die Zweige derselben mischen sich zum Theil den Aesten der großen Portion bei, und gehen mit Fäden derselben vereinigt zu diesen Muskeln hin.

¹⁾ Meckel, de quinto pare §. 34. Haller, elem. phys. IV. p. 209.

²⁾ E. H. Weber, Anatomia comparata nervi sympathici. Lipsiae 1817. p. 11.

Erster Hauptast, Nervus s. Ramus ophthalmicus oder orbitalis.

Der Augenast des 5ten Nerven (*ramus ophthalmicus s. orbitalis*) ist der oberste und dünnste, viel dünner als die beiden anderen. Er geht neben dem *Sinus cavernosus* schräg aufwärts und vorwärts, tritt durch die *Fissura orbitalis superior* in die Augenhöhle, liegt im Eintritt weiter nach außen, als der *N. tertius, quartus* und *sextus*, und theilt sich dabei wieder in 3 Aeste, *ramus nasalis, lacrymalis* und *frontalis*, welche schon vor dem Eintritte in die Augenhöhle unterschieden werden können und nur dicht neben einander und durch Zellgewebe verbunden liegen, dann in der Augenhöhle divergiren, und allewärts vor- und aufwärts gehen.

Ramus nasalis oder *naso-ciliaris*, der Nasenast oder der Nasenaugenast.

Der Nasenast (*ramus nasalis s. naso-ciliaris*) ist von mittlerer Dicke, liegt tiefer und mehr nach innen als die anderen beiden Aeste, geht den *Ramus ciliaris* zu dem *ganglion ophthalmicum*, welcher öfter beschrieben wird, geht mit dem *N. abducens* und *oculi motorius* zwischen den beiden Köpfen des *M. rectus externus* in den fossischen Raum der geraden Augenmuskeln, dann schräg über dem Sehnerven und unter dem *M. rectus superior* zur inneren Wand der Augenhöhle und theilt sich daselbst in Zweige, vorher aber an der Stelle, wo er über den Sehnerven weggeht, schickt er 1 oder 2 dünne Ciliarnerven, welche, ohne in das *Ganglion ophthalmicum* einzutreten, zu der Iris gehen.

1) *Ramus nasalis*, geht an der inneren Wand der Augenhöhle, durch das vordere *Foramen ethmoidale* in ein Knochenanälchen, welches ihn zur Siebplatte in die Hirnschale unter die harte Hirnhaut führt, von da kommt er durch eine der vorderen Oeffnungen der Siebplatte des Siebbeines in den vorderen oberen Theil der Nasenhöhle, und wird dabei ein wenig dicker. Er giebt hier einige kleine Zweige an die Schleimhaut, und kommt zwischen dem unteren Rande des Nasenknochens und dem Nasenknorpel auf den Rücken der Nase und geht dicht auf dem Knorpel in 2 Zweige getheilt zur Haut der Nasenspitze und zu dem Nasenflügel herab.

Dst giebt er schon, während seines Verlaufs in dem Knochenanälchen, einen Zweig zur Schleimhaut an der äußeren Wand der Nasenhöhle, der zum vorderen Ende der unteren Nasenmuschel herabgeht, einen andern zur Schleimhaut an der Scheidewand der Nase, und bisweilen einen zarten Zweig aufwärts und vorwärts zum

Fünftes Paar. Erster Ast des N. trigeminus.

Rücken der äußeren Nase. Nachdem er durch die Siebplatte wieder die Nasenhöhle getreten ist, geht er in einer Furche des Nasenbeines zwischen dem Periosteum und der Nasenhaut hinab, giebt in der Nähe des unteren Randes des Nasenbeines einen Ast, der zur Nasenscheidewand und zu der inneren Haut der Nase bis an die Nasenlöcher läuft und bringt dann da, wo der Knorpel des Nasenrückens angewachsen ist zur äußeren Nase hervor, liegt hier unter dem Compressor nasi, und endigt sich mit einem Zweige in die Haut der Nasenspitze und in die innere Haut am Nasenloche, mit einem zweiten in die Haut des Nasenflügels.

Der erstere Zweig vereinigt sich mit einem Aste des Infraorbitalnerven, der 2te giebt, wie Boë¹⁾ behauptet, auch Muskelzweige zum Compressor nasi und depressor alae nasi. Bisweilen sind 2 Ethmoidalnerven vorhanden. Der 2te geht dann durch das mittlere Loch und bleibt in der Nasenhöhle.

2) Ramus infratrochlearis geht unter der Rolle des M. trochlearis zum inneren Augenwinkel, verbindet sich daselbst mit einem Aste des N. frontalis oder supratrochlearis, vertheilt sich im Thränensacke und dessen Muskel, in der Carunkel, und tritt, in mehrere Zweige getheilt, aus der Augenhöhle hervor, welche sich im Orbicularmuskel der Augenlider und in der Haut der Stirne und der Nasenwurzel endigen²⁾.

Ganglion ciliare³⁾.

Der kleine Nervenknoten der Irisnerven (ganglion ciliare s. ophthalmicum) liegt an der äußeren Seite des Sehnerven, ein bis zwei Linien weit von dem Eintritte desselben, durch Zellgewebe mit ihm verbunden, unter dem verbundenen Kopfe des M. rectus superior und rectus externus im Fette verborgen⁴⁾; ist länglich viereckig, nach dem Sehnerven hin etwas concav, nach außen convex.

Er hat vorzüglich 2 Wurzeln. Die kurze und dicke Wurzel giebt der S. 443. angeführte Ast des N. oculorum motorius. Sie giebt

¹⁾ Siehe Boë, Beschreibung des 5ten. Nervenpaares 1817, und außerdem dessen Handb. der praktischen Anatomie 1820. 8. p. 170. 340.

²⁾ Nach Langenbeck (Icones anatomicae, Neurologia Fasc. III. Tab. XXII. S. 2. 3.) giebt der von der Lamina cribrosa in die Nase übergegangene N. ethmoidalis einen Ast zur Schleimhaut der Stirnhöhle.

³⁾ Die erste Bemerkung des Ganglion ophthalmicum s. in Polycarp. Gottlieb Sacher diss. de cataracta. Lips. 1705. 4. Die erste Abbildung auf Halleri tab. baseos cranii in Iconum fascic. I.

⁴⁾ Man den M. rectus externus nahe an seinem Ursprunge abschneiden und aufwärts zu sehen.

zum Ganglion aufwärts. Die andere viel längere und dünnere Wurzel ist ein Ast des N. naso-ciliaris des Trigemini, entspringt schon vor dem Eintritte dieses Nerven in die Augenhöhle, bleibt aber noch einige Zeit dicht mit dem Stamme durch Zellgewebe verbunden; und tritt von hinten und oben in das Ganglion. Selten ist diese Wurzel doppelt, und noch seltener sind beide Wurzel-Neste des N. oculi motorius ¹⁾. Nach Boek ²⁾ steht der Knoten entweder unmittelbar mit den Geflechten des sympathischen Nerven an der inneren Carotis durch Nervenfäden in Verbindung, oder wenigstens mittelbar, indem eine oder beide Wurzeln desselben, oder die Nerven-äste, die diese Wurzeln abgeben, Nervenfäden von ihm aufnehmen. Hierüber siehe die Beobachtungen unten bei der Beschreibung des sympathischen Nerven, wo Ribes, Boek, H. Esouquet, Pirzel, Arnold und Langenbeck in dieser Rücksicht angeführt worden sind.

Nervi ciliares.

Die Nerven der Iris (nervi ciliares) sind feine Nerven, doch von verschiedener Dicke, die, einen oder zwei ausgenommen, welche vom N. naso-ciliaris unmittelbar abgegeben werden, alle aus dem Ganglion ciliare entspringen. Sie liegen in 2, bisweilen in 3 Bündeln neben einander, welche vom vorderen Theile des Knotens entspringen und meistens dicht am Sehnerven zur Sclerotica gehen. Einige zartere Fäden gelangen indessen auch auf größeren Umwegen, die sie durch das den Sehnerven umgebende Fett machen, zur hinteren Seite des Augapfels ³⁾.

Außer diesen Nerven kommen noch einer oder 2 Nervi ciliares an der Stelle aus dem N. naso-ciliaris selbst, wo er schräg über den Sehnerven hinget, und gehen auf dem Sehnerven vorwärts. Einer derselben verbindet sich mit einem Faden des Ganglion und setzt mit ihm einen Nerven zusammen, der mit den anderen vorwärts geht. Bisweilen kommt auch ein Eilarnerv aus der langen oder der kurzen Wurzel des Knotens besonders hervor.

Alle diese Nervi ciliares gehen zum hinteren Theile des Augapfels, durchbohren daselbst die Sclerotica in schiefer Richtung, liegen dann zwischen der Sclerotica und der Aderhaut, werden platt, und gehen daselbst ungefähr 12 bis 16 an der Zahl am ganzen Umfange der äußerlichen Aderhaut an allen Seiten des Augapfels vorwärts bis zum

¹⁾ Morgagni, epist. XVI. §. 59. Meckel, de quinto pare p. 38. Joh. Gottfr. Zinn, descr. oculi hum. cap. IX. §. 8. Tab. VI. fig. 1. — Boek, a. a. O.

Das Verhalten des Augenknoten bei den Thieren hat Friedemann's Schüler, (Ferd. Muck, diss. de ganglio ophthalmico et nervis ciliaribus animalium. Landsh. 1815. 4.) sehr gut beschrieben. Einige Beobachtungen darüber sehe man auch in meiner Schrift: Tractatus de motu iridis. Lips. 1821. 4. — Requin hat bewiesen, daß auch beim Pferde ein Ganglion ophthalmicum vorhanden sei, wo es Wack nicht finden konnte.

²⁾ Boek, Handb. der prakt. Anatomie. 1820. 8. p. 202. 203; die anderen Schriftsteller siehe citirt bei der Beschreibung des sympathischen Nerven.

³⁾ Boek, Handbuch der praktischen Anatomie. 1820. 8. 1. p. 339. Siehe auch unten die Beschreibung des N. sympathicus

Orbicularis ciliaris, ohne unterwegs der Aderhaut Fäden zu geben ¹⁾.

Am Orbicularis ciliaris theilt sich jeder Nerv in 2 Aeste, die von demselben bedeckt werden und sich nach und nach in feinere in die Zeit tretende Aeste zertheilen ²⁾.

b. Ramus lacrymalis.

Der Thränenast (nervus lacrymalis) ist der dünnste und am meisten nach außen liegende Ast. Er geht dicht unter dem Gewölbe der Augenhöhle schräg vorwärts, aufwärts und auswärts zur Thränendrüse. Ehe er sie erreicht, oder in ihr selbst, theilt er sich in 2 Fäden, welche sich bisweilen durch einen Faden innerhalb der Thränendrüse wieder mit einander verbinden.

Der äußere, welcher dünner ist, tritt unter die Knochenhaut der äußeren Wand der Augenhöhle und daselbst in eine Furche oder in ein Canälchen des Wangenknochens, in welchem ein Ast des Subcutaneus malae emporsteigt und sich mit ihm verbindet. Von einer Stelle dieser zusammenstoßenden Nerven geht in der Regel ein Nervenfaden in die Schläfengrube, meistens in einem Canälchen, zuweilen in einer Rinne des Wangenbeins, hinüber, der sich daselbst mit dem N. facialis, seltener auch mit dem Temporalis superficialis des 3ten Astes des Trigemini verbindet.

Der innere, welcher dicker ist, tritt auch in die Drüse, theilt sich in derselben in mehrere Aeste, welche sich unter einander verbinden, ein an der concaven Seite der oberen Thränenröhre liegendes Netz bilden, dünnere Zweige zur unteren Thränenröhre oder zur Conjunctiva, und einen stärkeren Zweig zum M. orbicularis palpebrarum schicken, der sich mit einem Zweige des N. supraorbitalis und des N. facialis verbindet. Boet ist der Meinung, daß sich einige Aeste wirklich zwischen den Läppchen der Thränenröhre endigen, was aber noch ungewiß ist ³⁾.

¹⁾ Einige haben angenommen, daß sie der Aderhaut Fäden geben (Le Cat. tr. des sens. p. 154.).

²⁾ J. G. Meckel d. ä. glaubte im Orbicularis ciliaris, wenn er ihn einige Zeit tangierte, kleine weiße, ziemlich regelmäßig von einander abgehende Pünktchen zu bemerken, in welche auf der einen Seite Nerven übergingen, und von welchen auch Nervenfasern ausgingen, die sich zur Iris begaben. Er hielt sie für kleine Nervenknäute.

Boet glaubte an den in der Iris sich verbreitenden Zweigen kleine Answelungen bemerkt zu haben. — Heister nahm an, daß Aeste der Ciliarnerven auch in das Corpus ciliare gingen; Zinn aber fand nie ein einziges Fäserchen derselben in dieselbe hineingehen (de ocul. hum. p. 192.) Nach Tiedemann und Langenbeck sollen Fäden des Ganglion ophthalmicum mit der A. centralis retinae in den Sphincter und in den Augapfel eindringen. Siehe unten die Beschreibung des N. sympathicus.

³⁾ Boet, Beschreibung des 5ten Nervenpaares S. 20, erwähnt einen Fall, wo er einen dünnen Ast vom äußeren Zweige des Thränennerven sich mit einem Ciliarnerven verbinden und mit ihm in Begleitung der äußeren langen Ciliarterie in den Augapfel eindringen sah.

c. Ramus frontalis.

Der Stirnast (ramus frontalis), welcher der dickste und oberste Ast ist, geht dicht unter dem Gewölbe der Augenhöhle über den Levator palpebrae superioris fort. In der Nähe seines Eintritts in die Augenhöhle nimmt er eine kurze Strecke hindurch den N. patheticus in seine Scheide auf. Bisweilen giebt er sofort einen Faden, welcher zwischen dem M. obliquus superior fortgeht, an der inneren Seite der Augenhöhle sich mit dem N. infratrochlearis verbindet, und ein Nestchen durch den Sinus frontalis hindurch zum M. corrugator supercilii ¹⁾ schickt.

Dann theilt er sich näher oder entfernter vom Margo supraorbitalis in 2 Äste:

1) Ramus frontalis maior s. supraorbitalis, der dickere Ast, geht in 2 Äste getheilt durch die incisura supraorbitalis, oder durch das Foramen supraorbitale, steigt zur Stirne hinauf. Beide Zweige gehen bedeckt vom M. frontalis aufwärts, und schicken theils tiefliegende Äste zur behaarten Haut des Kopfes, theils oberflächlichere, welche dem M. frontalis und der Haut der Stirne angehören.

2) Ramus frontalis minor s. supratrochlearis, geht nach innen vorwärts, über der Rolle zur Augenhöhle hinaus, giebt unmittelbar vor der Rolle ein Nestchen dem N. infratrochlearis, läuft hierauf bedeckt vom M. orbicularis, dem Frontalis und dem Corrugator aufwärts, vertheilt sich in diesen Muskeln und in der Haut.

Zweiter Hauptast, Nervus maxillaris superior.

Der Oberkiefernerv (ramus maxillaris superior) ist der 2te Ast des N. trigeminus, und viel dicker als der erste. Er geht durch das runde Loch des Keilbeins, gerade vorwärts aus der Hirnschale heraus und kommt so an die Stelle, wo die Fissura spheno-maxillaris und orbitalis inferior zusammenstoßen.

1) Nervus subcutaneus malae.

Hier giebt er zuerst den Wangenhautnerven. Dieser dünne Nerv geht durch die Fissura orbitalis inferior, und dann (oft) in einer Furche am großen Flügel des Keilbeins, meistens unter der Knochenhaut, in der Augenhöhle vorwärts, und theilt sich in einen oberen und in einen unteren Zweig. Der obere Zweig giebt 2 Fäden, die sich mit dem N. lacrymalis und facialis verbinden.

¹⁾ Siehe *Wrisberg*, not. 125. ad *Haller*, prim. lin. Nach ihm kommen dieser Ast des N. frontalis und der N. infratrochlearis in ein Ganglion zusammen, aus dem der Ast in den Sinus frontalis geht. *Blumenbach*, de sinub. frontaliib. p. 10. 11. und *Bock* a. a. O., der keinen Faden im Sinus frontalis bleiben sahe.

Der eine geht nämlich am vorderen Ende der Fissura orbitalis inferior in ein Gänälchen, oder in eine Furche des Wangenbeins über und verbindet sich mit einem Aste des Thränennerven, der andere Zweig tritt in eine in der Schläfengrube befindliche Furche, oder in ein Gänälchen, welches bis an den Stirnsfortsatz zu einem Aste des N. facialis führt ¹⁾. Der untere Zweig durchbohrt die Knochenhaut der Augenhöhle, geht unter dem M. rectus bis zur Augenhöhlenfläche des Wangenbeins und von da durch den Knochen hindurch, einfach oder in 2 Zweige gespalten ins Gesicht, und gehört dem Orbicularis palpebrarum, unter welchem er zum Vorschein kommt, und der Haut der Wange an.

Im oberen Theile der Fissura sphenomaxillaris giebt der N. maxillaris superior den Ramus sphenopalatinus, und dann den Alveolaris, und seine Fortsetzung geht als N. infraorbitalis fort.

2) Nervus sphenopalatinus.

Der Stamm des N. sphenopalatinus, des Keilbeingaugennerven, ist sehr kurz, geht ziemlich senkrecht hinab, und theilt alsbald seine beiden Hauptäste in den Ramus pterygoideus und palatinus. Gewöhnlich befindet sich an dieser Theilungsstelle ein dreieckiger oder unregelmäßig viereckiger, zuweilen herzförmiger Nervenknoten, ganglion sphenopalatinum Meckelii ²⁾, der an der äußeren Seite des Foramen sphenopalatinum liegt. Dieses Ganglion giebt, wenn es vorhanden ist, den Vidianus, die Palatinos, die Nasales superiores und den Nasopalatinus. J. J. Meckel d. Ä. behauptete, daß dieser Knoten dann vorhanden sei, wenn der N. sphenopalatinus aus 2 Portionen bestehe, welche neben einander aus dem N. maxillaris superior entsprängen, und sich mittelst des Knotens vereinigten. Hirtzel sah diesen Knoten nur selten fehlen. Arnold ³⁾ behauptet diesen Knoten niemals fehlen gesehen zu haben, und sieht daher die zu dem Knoten gehenden Aeste des N. sphenopalatinus als die eine vom 5ten Nervenpaare kommende, den Ramus profundus des N. Vidianus als die 2te vom sympathischen Nerven kommende Wurzel dieses Knotens an, und betrachtet den Ramus superficialis des N. Vidianus, die Nervos palatinos, die Nervos nasales superiores und den N. nasopalatinus als die constanten Aeste des Ganglion. Mir scheint dieser Knoten ein zum sympathischen Nerven gehörender Knoten zu sein, der mit dem N. sphenopalatinus zusammenhängt, und der auf der einen Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den N. nasopalatinus Scarpa in die Ho-

¹⁾ Bisweilen vereinigt er sich auch außerdem mit einem Aste des N. temporalis superficialis des Trigeminus. Bisweilen kommt auch noch aus der erwähnten Verbindung mit dem Lacrymalnerven noch ein besonderer durch den Wangenknochen zur Schläfengrube gehender Zweig.

²⁾ Meckel, in mém. de Berlin 1749. p. 84. Scarpa, annotatt. anatom. II. p. 67.

³⁾ F. Arnold, der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen in anatomischer und physiologischer Hinsicht bearbeitet. Mit 10 Kt. Heidelberg und Leipzig 1831. 4. p. 79.

höhle schießt. Denn dieser Ast ist deswegen für einen Theil des sympathischen Nerven zu halten, weil er sich zuweilen oder vielleicht immer mit demselben Nerven von der andern Seite auf eine sichtbare Weise vereinigt, was, so viel wir wissen, bei keinem andern Aste eines Gehirnnerven stattfindet. Hirzel ¹⁾ will einmal eine Verbindung des Ganglion sphenopalatinum mit dem Sehnerven beobachtet haben, welche durch einige Fäden geschah, die durch die Fissura orbitalis inferior in die Augenhöhle drängen und sich da mit dem Sehnerven verbinden, so er in die Augenhöhle trete. Arnold fand diese Fäden auch, sah aber nur, daß sie sich mit der Scheide des Sehnerven verbanden, während Hirzel glaubt, daß es ihm einmal geglückt sei, dieselben in die Substanz des Sehnerven hinein verfolgen ²⁾.

A. Nervus Vidianus oder pterygoideus.

Der zurückgehende Ast oder Flügelast (ramus pterygoideus recurrens s. Vidianus) geht in dem Canalis Vidianus durch den obersten Theil des Processus pterygoideus rückwärts und theilt sich in 2 Äste.

a. Ramus petrosus s. superficialis sieht nicht röthlich, sondern wie der Ast eines Gehirnnerven weißlich aus, geht durch die sehnigknorpelige Substanz zwischen dem Keilbeine und Felsenbeine zur Höhle der Hirnschale hinauf, und in einer Rinne der vorderen Fläche des Felsenbeines schräg auswärts rückwärts zum Hiatus des Fallopiischen Canals, tritt in denselben hinein und vereinigt sich mit dem N. facialis, der durch diesen Canal geht.

b. Ramus sympathicus s. profundus sieht röthlicher und wie in Ast des N. sympathicus aus, geht durch die sehnigknorpelige Masse zwischen dem Ende des Felsenbeins und dem Anfange des Processus pterygoideus, tritt in den Canalis caroticus, geht durch denselben zwischen der harten Hirnhaut des Canals und der Carotis cerebralis erst rückwärts, dann hinab, vereinigt sich schon im Canale (seltner erst, nachdem er aus demselben herausgekommen), mit einem oder 2 Ästen des N. sympathicus, welche zu dem N. abducens von der Carotis interna emporsteigen, und geht mit diesen in das an der Carotis interna liegende Geflecht des N. sympathicus und in den an den 2 obersten Halswirbeln liegenden obersten Halsknoten über. Man hat hinreichenden Grund, ihn als einen Ast zu beschreiben, der vom N. sympathicus zum Ganglion sphenopalatinum heraufsteigt. Hier wurde er nur des Zusammenhanges wegen erwähnt, und es wird daher von ihm bei der Beschreibung des N. sympathicus noch einmal die Rede sein.

B. Äste, welche durch das Foramen sphenopalatinum in die Nasenhöhle gehen.

a. Der Schlundkopfzweig, (ramus pharyngeus) gelangt durch das Foramen sphenopalatinum in die Nasenhöhle, geht dann an der

¹⁾ L. Hirzel, Diss. inaug. med. sist. nexus nervi sympathetici cum nervis cerebralibus; o. Tab. Heidelberg. 1824. 4. p. 38.

²⁾ Tiedemann sah einmal eine Verbindung des Ganglion sphenopalatinum und des

454. 5tes Paar, 2ter Ast; Nasenzweige. N. pterygopalatinus.

unteren Seite des Körpers des Keilbeins in einer Furche nach hinten, tritt oben an der Choana narium heraus, und giebt Zweige zur Schleimhaut der Nase, der Trompete und zum Pharynx.

b. Die oberen Nasennerven, nervi nasales superiores, sind 4 bis 5 kleine Zweige, welche von der inneren Oberfläche des Ganglion sphenopalatinum abgehen, gleichfalls die sehnige, das Foramen sphenopalatinum verschließende Haut durchbohren und sich an der Schleimhaut der Seitenwand der Nase verbreiten.

c. Der Nasengaugennerv, N. nasopalatinus Scarpa¹⁾ welcher auch durch das Foramen sphenopalatinum vom Ganglion sphenopalatinum in die Nasenhöhle gelangt, und daselbst oben unter dem Keilbeinkörper bogensförmig zur Nasenscheidewand geht, hier einige Zweige an die Schleimhaut giebt²⁾, und nun zwischen der Schleimhaut und dem Periosteo nach vorn zum Boden der Nasenhöhle und zum Foramen incisivum herabsteigt, in welchem er sich bei seinem Uebergange in die Mundhöhle mit dem Nerven der anderen Seite, und meistens auch, nach Boetj., mit einem Endzweige des vorderen Zahnnerven vereinigt und im vordersten Theile der Haut des harten Gaumens und in dem Zahnfleische endigt. Zuweilen scheint an der Vereinigungsstelle ein Knötchen befindlich zu sein³⁾.

C. Ast, welcher durch den Canalis pterygopalatinus zum Gaumen geht.

Der Gaumenast, ramus palatinus s. pterygopalatinus, weicht, indem er abwärts geht, vom N. pterygoideus unter einem rechten Winkel ab, tritt in die Grube zwischen dem processus pterygoideus des Keilbeins, dem Oberkiefer und Gaumenbeine hinab, und theilt sich in 3 Äste, die zuweilen, wenn das Ganglion sphenopalatinum da ist, aus ihm einzeln entspringen.

a. Nervus palatinus maior s. anterior ist die Fortsetzung des N. palatinus. Sieht, wenn das Ganglion sphenopalatinum fehlt,

ciliare durch einen ziemlich dicken durch die Fissura orbitalis inferior in die Augenhöhle gehenden Faden. Siehe Arnold a. a. O. p. 81.

¹⁾ A. Scarpa, Annotationes anatomicae II. c. 5.

²⁾ Nach Brisson und Arnold, dem nach Scarpa soll er keine solchen Zweige abgeben.

³⁾ Nach Arnold soll eine solche Vereinigung nicht immer, und ein Knötchen niemals vorhanden sein. Mit Unrecht hält sich Hipp. Eloquet für den Entdecker dieses Ganglion, er ist in den Handbüchern der Anatomie schon längst angeführt worden, z. B. in der Hildebrandtschen Ausgabe, 1802. p. 372. Arnold (über den Ophthalmoceleberg 1825. a. S. 23.) läugnet, daß es hier einen wahren Knoten gäbe. — Ueber die Nerven der Nase sehe man: J. Gottl. Haase, de nervis narium internis. Lips. 1791. 4. und Anton Scarpa, de nervis nasalibus interioribus opere quinto nervorum cerebri, in anatom. annotat. cap. IV. V. VI.

einigen erst die Nervos nasales superiores, und den N. nasopalatinus, geht dann im Canalis pterygopalatinus anterior hinab, bt durch Löcher des senkrechten Theiles des Gaumenbeines 1 oder 2 Nasennerven, nervi nasales inferiores, welche sich in der Schleimhaut der unteren Nasenmuschel, und wenn 2 da sind, in der des unteren Nasenganges verbreiten. Auch schiebt er bisweilen in diesem Canale ein Astchen, das durch ein besonderes Canälchen zwischen dem Canalis pterygopalatinus anterior und posterior abwärts auswärts zum Gaumen geht, und sich in der Gaumenhaut vertheilt.

Der N. palatinus maior kommt auf dem Gaumen aus der unteren Oeffnung seines Canals heraus, und theilt sich in einen äußeren in der Bahnhaut der Backenzähne und der angrenzenden Theile der Gaumenhaut angehörenden Ast, und in einen oder 2 innere, längere in der Gaumenhaut und in dem vorderen Theile des Zahnsfleisches sich endigende Äste.

b. Nervus palatinus posterior s. minor, ist dünner als jener, geht durch den Canalis pterygopalatinus posterior hinunter, kommt aus der unteren Oeffnung desselben an der unteren Fläche des Processus pyramidalis des Gaumenbeines heraus, und vertheilt sich im Lector veli, im Velum palatinum, im Zäpfchen und in der Mandel.

c. Nervus palatinus externus s. minimus, ist noch dünner, als der Posterior, und unbeständig. Er geht durch einen 3ten Canal zwischen dem Processus pyramidalis des Gaumenbeines und der letzten Nasenhöhle hinunter, und endigt sich im Velum palatinum, in der Mandel und in dem Zäpfchen 1).

3. Nervus alveolaris posterior maxillae superioris.

Der hintere Zahnnerv des Oberkiefers, N. dentalis posterior, entspringt von dem N. maxillaris superior, nachdem er den Nervus sphenopalatinus abgegeben hat; geht abwärts und theilt sich in 2 Äste, welche bisweilen jeder besonders entspringen. Der hintere Zweig geht in den oberen Theil des Buccinator, und schiebt zuweilen auch einen Ast zum hintersten Backenzahne und zu dem ihn umgebenden Zahnsfleische, oder auch zum M. pterygoideus, denn er ist sehr veränderlich. Der vordere größere Zweig, den man den hinteren Zahnnerven des Oberkiefers nennt, geht durch ein Loch an der hinteren Seite des oberen Kinnbeins in den Sinus maxillaris, läuft dafelbst in einer bogensförmig

1) Doch sah keine Nervenäste vom Ganglion sphenopalatinum sich zur Haut des Sinus sphenoidalis oder maxillaris verbreiten. Zwar sah er zuweilen einen Nervenast, welcher vom Ganglion sphenopalatinum durch die Keilbeinhöhle, oder am Körper des Keilbeins unter der Knochenhaut emporstieg, allein dieser Ast endigte sich nicht in der Höhle, sondern verband sich mit dem 6ten Nervenpaare.

gekrümmten Furche hin und kommt mit der äußeren Oberfläche der Haut des Antrum Highmori in Berührung, jedoch ohne ihr Zweig zu geben, und verbindet sich endlich mit 1 oder mit 2 Ästen des vorderen, von dem N. infraorbitalis kommenden Zahnnerven. Er giebt kleine Zweige zu den Wurzeln der 3 hinteren Backenzähne und zu dem zwischen ihnen liegenden Zahnfleisch.

4. Nervus infraorbitalis.

Der Unteraugenblutnerv ist der letzte und dickste Ast des N. maxillaris superior, oder eigentlich die Fortsetzung desselben. Er geht vorwärts durch den Canalis infraorbitalis.

Im Durchgange durch diesen Canal giebt er, außer unbeständigen Ästen, welche durch Eschschrauben in den Sinus maxillaris hinabgehen, und sich mit dem Verbindungszweige des vorderen und des hinteren Zahnnerven vereinigen, den Ramus alveolaris anterior oder dentalis anterior maxillae superioris. Dieser geht aus dem Canalis infraorbitalis durch ein Loch in ein zwischen den Platten des Oberkiefers gelegenes Gändchen, welches erst nach außen herabgeht und sich dann nach innen bis zum vorderen Nasenflügel wendet. Auf diesem Wege schickt der Nerv erst einen Zweig, oder einige Zweige nach hinten, welche sich mit dem hinteren Zahnnerven verbinden, und zuweilen ein Geflecht bilden. Aus ihm entspringen die Nerven für die vorderen Backenzähne und für das zwischen ihnen gelegene Zahnfleisch. Dann gehen Äste des vorderen Alveolarnerven zu dem Eckzahne, zu den Schneidezähnen und zu dem zwischen ihnen gelegenen Zahnfleisch. In jede Wurzel geht ein äußerst weicher Nerv und endigt sich im Zahnsäckchen. Die für das Zahnfleisch bestimmten Äste durchbohren ziemlich regelmäßig die Zahnzellenwand zwischen je 2 Zahnzellen. Der Endzweig des vorderen Alveolarnerven geht meistens zu dem Foramen incisivum und verbindet sich da mit dem N. nasopalatinus. Bisweilen entspringen vom Verbindungsaste mit dem hinteren Alveolarnerven ein Ast, welcher ins Gesicht zum M. buccinator und levator anguli oris kommt, und ein anderer, welcher zur Schleimhaut in den unteren Nasengang geht.

Aus der vorderen Oeffnung des Canalis infraorbitalis kommt dann der N. infraorbitalis unter dem Levator labii superioris proprius ins Angesicht und theilt sich in 2 Äste.

Der innere Ast spaltet sich gewöhnlich in den inneren Nerven des unteren Augenlieds und in den oberen und unteren Nasenhautnerven, der äußere Ast aber in den äußeren Nerven des unteren Augenlieds und in 3 Lippenerven.

Der innere Nerv des unteren Augenlieds, n. palpebralis inferior internus, geht nämlich hinter dem M. levator labii supe-

oris in die Höhe, kommt zum M. orbicularis und zu der Haut des unteren Augenlieds, und verbindet sich mit dem N. facialis und zuweilen auch mit dem N. infratrochlearis, schießt auch Fädchen zur Thränenarterie, zum Thränenfalte und zu der Haut der Nasenwurzel.

Der äußere Nerv des unteren Augenlieds, n. palpebralis superior externus, durchbohrt den M. levator labii superioris und geht zum M. orbicularis des unteren Augenlieds und zu der Haut desselben in die Höhe, und verbindet sich auch mit dem N. facialis und subcutaneus malae. Bisweilen ist auch nur ein einziger Nerv für das untere Augenlid vorhanden.

Der obere Hautnerv der Nase, n. subcutaneus nasi superior, geht zwischen dem M. levator labii superioris und dem Levator labii superioris alaeque nasi in mehrere Äste gespalten hervor zur Haut der Nase und zu den Muskeln derselben. Er verbindet sich mit dem N. facialis, und am Rande des Nasenflügels mit dem N. ethmoidalis.

Der untere Hautnerv der Nase, n. subcutaneus nasi inferior, geht zwischen dem M. levator labii superioris, dem Levator alae nasi und dem Depressor alae nasi zur Haut der beweglichen Nasenseidewand und der Nasenspitze, giebt auch jenen Muskeln und dem Orbicularis oris Zweige, und verbindet sich nahe an seinem Ursprunge mit dem N. facialis, und dann mit dem zuvorgenannten und dem folgenden Aste.

Die 3 bis 4 Oberlippennerven, nervi labiales superiores, liegen hinter dem M. levator labii superioris strahlenförmig herab, einigen sich unter einander, mit den zuvorerwähnten Ästen, und mit den Ästen des N. facialis. Hierdurch entsteht ein zwischen dem M. levator labii superioris und dem M. levator anguli oris gelegener Nervus. Von ihm gehen Äste in die Haut der Lippen zu dem M. orbicularis oris, zum Compressor und depressor nasi und zur Schleimhaut der Lippen 1).

Dritter Hauptast, nervus maxillaris inferior.

Der Unterkiefernerve, ramus maxillaris inferior, liegt etwas tiefer nach außen, als der Maxillaris superior, ist dicker, als dieser, die Dicke unter allen 3 Ästen des N. trigeminus. Nur ein kurzer Theil desselben liegt in der Hirnschale. Er geht durch das ovale Loch des Keilbeins abwärts aus der Hirnschale heraus, und theilt sich alsbald in 8 Äste, die in 2 Bündeln liegen.

Das obere Bündel enthält 5 dünnere Nerven: 1) ramus massetericus; 2) und 3) temporales profundi; 4) buccinatorius; 5) pterygoideus.

1) Joh. Gottl. Haase, (Fros. Lips.) progr. de nervo maxillari superiore s. de secundo ramo quinti paris nervorum cerebri. Lips. 1793. 4.

4. Ramus buccinatorius.

Der Backennerv ist der dickste aller Äste des oberen Bündels, entspringt gewöhnlich mit 2 Wurzeln, welche einen Ast der A. meningea media umfassen, und ist bisweilen der Stamm eines oder mehrerer von den 3 so eben beschriebenen Nerven. Er umfaßt zuweilen mit 2 Bündeln die A. temporalis und geht durch den M. pterygoideus externus, oder zwischen ihm und dem M. pterygoideus internus hindurch und vorwärts hinab, giebt ihm und dem M. temporalis einige Ästchen, tritt zwischen dem M. pterygoideus externus und temporalis in das Fett, das den hier befindlichen Zwischenraum ausfüllt, giebt dem hinteren Theile des M. buccinator Äste, und endigt sich dann im Gesichte in der Nähe des Mundwinkels. Zwei oder 3 Äste gehören dem Buccinator, dem Levator und Depressor des Mundwinkels und dem Orbicularis oris an, und haben mit dem N. facialis, auch mit dem Infraorbitalis Gemeinschaft. An den Arteriis coronariis labiorum machen die Äste dieses Nerven und des N. facialis Schlingen, welche dieselben umgeben.

5. Ramus pterygoideus.

Dieser ist der dünnste und kürzeste Zweig. Er geht nämlich zwischen dem M. pterygoideus externus und dem Anfange des M. circumflexus palati von der Eustachischen Röhre zum M. pterygoideus internus hinab, und vertheilt sich in ihnen.

6. Ramus alveolaris maxillae inferioris.

Der Zahnnerv des Unterkiefers, oder der im engeren Sinne sogenannte N. maxillaris inferior, ist der dickste Zweig des 3ten Astes, geht, anfangs mit dem N. lingualis verbunden, zwischen dem M. pterygoideus externus und dem Internus hinab; verläßt den N. lingualis, der mehr nach innen liegt; tritt zwischen dem Äste der unteren Kinnbacke und dem M. pterygoideus internus in den Canal der unteren Kinnbacke. Bisweilen wird er mit dem N. lingualis durch einen Ast verbunden.

Ehe er in den Canal tritt, giebt er einen dünnen Muskelast, den Nervus mylohyoideus ab, der nach Bell von der kleinen Portion des N. trigeminus herkommt. Dieser läuft in einer Furche an der inneren Seite der unteren Kinnbacke vorwärts, zur unteren Fläche des M. mylohyoideus und theilt sich in 2 Äste. Einer derselben geht zwischen dem M. mylohyoideus und dem vorderen Bauche des M. digastricus vorwärts, giebt beiden Äste, krümmt sich zwischen den beiden Musculis digastricis zum Kinne hinauf und verliert sich daselbst.

Fünftes Paar, 3ter Ast. N. alveol. inf.; lingualis 461

andere vertheilt sich im vorderen Bauche des *M. digastricus*, weilen erhält auch der *M. hypoglossus* und die Submaxillärdrüse einen neuen Zweig.

Der *N. alveolaris* selbst geht im Canale der unteren Kinnlade bis zum Foramen mentale anterius fort, und giebt den Zähnen, unter den Wurzeln er fortgeht, ihre Nerven. Am Foramen mentale theilt sich in 2 Aeste.

1) Der kleinere, *Ramus dentalis*, geht unter den vorderen Zähnen bis zur Mitte fort, erhält verschiedene Verbindungszweige vom *Ramus mentalis*, und giebt an jeden Zahn so viel Fäden, als derselbe Wurzeln hat, und außerdem noch zwischen je 2 benachbarten Zähnen 1 Faden zum Zahnfleische.

2) Der größere, *Ramus mentalis*, geht aus dem Foramen mentale auf die äußere Fläche der unteren Kinnlade heraus, und theilt sich, bedeckt vom *Depressor anguli oris*, in 3, bisweilen nur in 2 Aeste. Zwei derselben, *rami inferiores*, steigen zur Unterlippe, der mehr außen liegende auch zum Mundwinkel hinauf, vertheilen sich im *Depressor anguli oris*, im *M. quadratus menti*, im unteren Theile des *M. orbicularis oris*, in der Haut, und haben mit dem *N. facialis* Verbindung. Der 3te geht über dem Rande der unteren Kinnlade vorwärts zum Rinne, vertheilt sich im *Depressor anguli*, im *M. quadratus*, in der Haut, und hat Verbindungen mit dem *N. facialis*.

7. *Ramus lingualis s. gustatorius*.

Der Geschmacksnerv, oder der Zungenast des *Nervus maxillaris inferior*, geht anfangs mit dem *N. alveolaris inferior* verbunden, dann von ihm nach innen abweichend, an der inneren Seite des *Condylus* der unteren Kinnlade, hinter dem *M. pterygoideus internus*, in einer Kestchen giebt, einwärts hinab, giebt auch Kestchen an die Unterlippe und an den *M. mylopharyngeus*, lenkt sich dann über der *Glandula submaxillaris* vorwärts, und geht an der äußeren Fläche des *M. hypoglossus* fort. Hier begleitet er den *Ductus Whartonianus*, der zwischen ihm und dem *N. hypoglossus* vorwärts geht, lenkt sich im Vorwärtsgehen allmählig einwärts, unter dem *Ductus* weg, so daß er sich dem *N. hypoglossus* nähert; hat durch einige Kestchen mit dem *N. hypoglossus* Gemeinschaft, giebt auch einige Kestchen in die *Glandula sublingualis*, und in das Zahnfleisch; dann tritt er zwischen dem *M. styloglossus* und *genioglossus* in die Zunge selbst, theilt sich zuerst in 2, hierauf in mehrere Aeste, welche nach den Rändern und der Spitze der Zunge hingehen, und endlich, gleichsam wie Quasten, in Fäserchen gespalten sind und fast bis in die Zungenwurzeln verfolgt werden können.

An seinem hinteren oberen Theile, unweit seines Abganges vom N. alveolaris, nimmt er von hinten einen aus der Fissura Glaseri zu ihm herabkommenden Nervenzweig, die Saite des Paukenfells, chorda tympani, unter einem nach oben sehr spitzen Winkel auf, und ist dadurch in merkwürdiger Verbindung mit dem N. facialis, dessen Ast sie ist.

Indem er über der Glandula submaxillaris sich vorwärts lenkt, giebt er 2 oder 3 Aeste, oder zuweilen nur einen Ast, welche sich bisweilen in ein ovales Nervenknötchen, ganglion maxillare Meckelii ¹⁾ begeben, das über der Glandula maxillaris liegt, und aus welchem 5 bis 6 Fäden divergirend in die gedachte Drüse hinabgehen. Einer oder der andere dieser Fäden geht über den M. hypoglossus vorwärts, kommt mit einem Aste des N. hypoglossus zusammen, und scheint zum M. genioglossus zu gelangen. Dieses Knötchen liegt immer nahe am Nervenstamme, denn jene Aeste, aus denen es entspringt, sind nur kurz. Bisweilen liegt es dicht an ihm.

8. Ramus auricularis s. temporalis superficialis.

Der oberflächliche Schläfennerv entspringt mit einer doppelten Wurzel, einer oberen vom Stamme, und einer unteren vom Ramus alveolaris. Die obere geht vom Foramen ovale vor der A. meningea media schräg rückwärts hinab; die untere hinter derselben auswärts hinaus; so wird die A. meningea media von ihnen umschlungen ²⁾, und beide kommen an der äußeren Seite derselben hinter dem Condylus der unteren Kinnbacke in den Stamm dieses Nerven zusammen. Dieser Stamm geht hinter dem Processus condyloideus der unteren Kinnbacke, zwischen ihm und den Meatus auditorius auswärts und abwärts, und dann durch den oberen Theil der Parotis gegen das äußere Ohr hinauf.

Auf diesem Wege giebt er 2 Aeste, oder einen Ast, der sich in 2 theilt, welche hinter dem Condylus der unteren Kinnbacke rückwärts zum Gehörgange hinaufsteigen (rami meatus auditorii ³⁾). Der untere Gehörgangnerv geht durch die Parotis an der unteren Fläche des Gehörganges auswärts und rückwärts, tritt zwischen dem Knochen und dem Knorpel auf die innenwärtige Fläche des Gehörganges. Der obere hat zuweilen mit dem vorigen einen gemeinschaftlichen Stamm,

¹⁾ Meckel entdeckte dasselbe (de quinto pare. §. 100. p. 95.). Haller sagt «de-
fuisse vidi.» (Elem. phys. IV. p. 218.) und Wisberg «minime in omni-
bus.» (De nervis art. venasque comit. §. 15.) Haase vermigte es in vielen.
(Nervor. anat. p. 74.)

²⁾ Haller, de nervor. in arterias imperio. §. 13.

³⁾ Meckel, de quinto pare. §. 104.

geht auch durch die Parotis und an der vorderen Fläche des Gehörganges rückwärts, und spaltet sich nach Boek in 2 Zweige, von welchen der eine Zweig zur Haut der Ohrmuschel, der andere durch eine Spalte unter der oberen Wand des Gehörganges in die Paukenhöhle zum Trommelfelle kommt und sich mit der Chorda tympani verbindet.

Hinter der A. temporalis giebt er 2 oder 3 dickere Aeste (rami communicantes faciales). Einer derselben geht unter dem Condylus der unteren Kinnbacke auswärts und vorwärts, und vereinigt sich mit dem oberen Aste des N. facialis unter einem sehr spitzigen Winkel. Der andere tiefere geht hinter der A. temporalis an der hinteren Seite des Condylus der unteren Kinnbacke auswärts, dann, von der Parotis bedeckt, an der äußeren Fläche des Condylus vorwärts, theilt sich in 2 oder 3 Aeste, welche sich mit den Aesten des oberen Astes des N. facialis vereinigen. Bisweilen vereinigt er sich auch ungetheilt mit demselben. Beide Aeste umschlingen die A. temporalis.

Während seines Durchgangs durch die Parotis giebt die Fortsetzung des Nerven dieser Drüse einige Aeste, und außerdem einen Ramus auricularis, welcher, durch die Parotis gehend, unter der A. temporalis hervorkommt, um diese und die Vena temporalis hinauf zum Tragus und zu dem vorderen Theile der Helix des Ohres geht ¹⁾.

Nach der Abgabe dieser Aeste geht der N. auricularis unter der A. und dem N. temporalis zum äußeren Ohre hinauf, und theilt sich in 2 Aeste, von welchem ein hinterer Ast, ramus auricularis mit der A. auricularis anterior zum Ohre hinaufsteigt, einen Ast der Helix und dem M. auriculae anterior und einen anderen aufsteigenden dem M. attollens giebt, und sich über dem Ohre in der Haut endigt. Ein vorderer Ast, ramus temporalis subcutaneus, theilt sich in viele Aeste, welche auf der A. aponeurosis temporalis aufsteigen, und in der Haut derselben, auf einer Seite der Stirn und des Scheitels sich vertheilen, und nach vorn mit den Aesten des N. facialis, des Supraorbitalis und bisweilen mit einem Aste, er durch die Vereinigung des Superficialis malae und des Lacrymalis entsteht, in Verbindung sind.

VI. Nervus abducens, der äußere Augenmuskelnerv.

Der sechste Nerve, oder äußere Muskelnerv des Auges, N. abducens, s. indignatorius, s. sextus, kommt an der Furche zwischen der hinteren Grenze des Hirnknotens und den Corporibus pyramidalibus zum Vorschein, und entspringt so, daß er mehr von dem Corpus pyramidale, als vom Hirnknoten seinen Anfang zu nehmen scheint ²⁾.

¹⁾ Bisweilen fehlt dieser Ast, und wird aus dem Ramus auricularis des 3ten Halsnerven ersetzt. (Weckel S. 106.)

²⁾ Sein Ursprung hat mancherlei Verschiedenheiten. Auch ist bisweilen der Ursprung des einen Nerven dieses Paares von dem des andern verschieden. (S. Morgagni

Widweilen ist eine kleine Wurzel desselben von dem übrigen Theile durch ein Blutgefäßchen abgefordert. Diese bleibt sogar in manchen Fällen von dem übrigen Theile auch beim Durchgange durch die harte Hirnhaut getrennt, so daß sie durch eine besondere Oeffnung derselben geht.

Anfangs, wo der Nerv noch platt ist, geht er unter der Protuberantia annularis vorwärts, bringt dann hinter und unter der Sattellehne in die harte Hirnhaut ein, geht an der Seite des Türkensattels vorbei und zwischen den Venen, die den Sinus cavernosus bilden, hindurch¹⁾, und wird durch Zellgewebe an die Carotis cerebialis, an deren äußerer Seite er vorbeigeht, angeheftet. Von hier tritt er durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle.

In der Augenhöhle ist er mit dem N. oculi motorius und dem nasalis in ein Bündel verbunden, und kommt zwischen den beiden Köpfen des M. rectus externus in den konischen Raum, der von den geraden Augenmuskeln umgeben wird, geht dann vorwärts auswärts zum M. rectus externus, und vertheilt sich in demselben mit mehreren Fäden, die in dessen innenwärtige Fläche treten. Auf dem beschriebenen Wege nimmt er da, wo er an der äußeren Seite der 3ten Biegung der Carotis cerebialis vorbeigeht, im Sinus cavernosus, 1 oder 2, oder auch 3 Fäden auf, die vom Geflechte des N. sympathicus an der Carotis cerebialis zu ihm aufsteigen, auf, oder wenn man sich lieber so ausdrücken will, so giebt er dieselben rückwärts ab. Daß er sie empfange, ist indessen deswegen wahrscheinlicher, weil der Winkel, den diese Fäden mit dem

epist. anat. XVI. §. 47. Santorini obs. anat. p. 66. Zinn de oc. hum. p. 180. Soemmerring, de basi enceph. p. 141. Dess. Nervenlehre §. 222. 2te Ausg. §. 186.) Morgagni, Santorini und Wedel unterscheiden eine Wurzel des Nerven, welche sich zuweilen in die Brücke einpflanzt, von einer andern, welche sich mit der vorderen Pyramide verbindet. Malacarne (Neuroencefalotomia p. 193 u. p. 310) sagt: In que cerevelli umani nei quali e patentemente triplice da entrambe le parti l'origine di queste coppie di nervi, allora una lastra nasce dalla sommità delle fascie midollari coperte dal margine inferiore del ponte, e lo trafora. La seconda spicasi dalle fascie medesime tosto liberata dal ponte. E la terza dal fianco esteriore delle fascie e si mantiene separata dalle altre due sino al foro della dura madre; anzi tra questa e le altre passa ben soventi un rosso vasellino. Siehe Rolando a. a. O. p. 13. — Gall, indem er sich auf den Ursprung dieses Nerven bei den Säugethieren stützt, bei welchen die Brücke nicht so weit nach hinten reicht, sagt: die Nerven kämen nur von den Pyramiden, längs welcher sie sich weit verfolgen ließen. (Anat. und Physiol. des Nervensist. B. I. 204.) — Eben so bildet ihn Langenbeck ab. (Icones anat. Tab. XX. c.) — Rolando (Recherches anatomiques sur la moëlle allongée p. 13) sah den Nerven gleichfalls längs den Pyramiden herabgehen, vermuthet aber, daß er von den vorderen Rückenmarksbündeln entspringe. Dem Serres gelang es nur zuweilen, den 6ten Hirnnerven an der inneren Seite der Olfiven bis zu diesen Bündeln zu verfolgen, öfters gingen sie aber bis zur Basis der Pyramiden. Serres a. a. O. Tom. I. p. 340.

¹⁾ Nach Gennari's (de orig. nerv. intercostal. p. 21) Beobachtung wird er, indem er durch den Sinus cavernosus geht, von einer zarten Scheide, die eine Fortsetzung der harten Hirnhaut ist, begleitet, so daß er nicht unmittelbar vom Blute berührt wird.

interen Stücke des Stamms bilden, spitz ist, und weil der Nervus abducens, wie Winslow zuerst bemerkt hat, vor diesen Fäden, d. h. weiter nach vorn zu, so nach Erhaltung dieser Fäden etwas dicker ist, so daß er durch sie verstärkt zu werden scheint. Zuweilen sind es noch mehr als 3 Fäden, die auch manchmal korbformig unter einander verflochten sind. Etwas weiter vorn bedeckt der Nerv den an der Carotis liegenden Zellknoten des sympathischen Nerven, und nimmt, nach Boek, auch von ihm ein Fädchen auf.

Uebrigens giebt er bis zu seiner Endigung in jenem Augenmuskel einen Ast von sich ab, versorgt also bloß diesen. Warum er aber bloß diesen Muskel versorge, und warum also dieser Muskel einen besonderen Nervenstamm erhalte, das wissen wir eben so wenig, als warum er dem 4ten Hirnnerven etwas Aehnliches Statt findet.

VII. Nervus facialis, der Antlignerv.

Der Antlignerv, nervus facialis, s. communicans faciei, nimmt am hinteren Rande des Hirnknotens, wo derselbe mit dem verengerten Marke zusammenschließt, zwischen dem der Mitte viel näher liegenden N. abducens und dem Gehörnerven, der weiter nach außen, aber dicht neben ihm liegt, zum Vorschein. Ehedem zählte man diesen Nerven und den N. acusticus für einen Nerven, weil beide dicht neben einander entspringen, einander begleiten, und zusammen in den Meatus auditorius internus treten; und nannte diesen, um ihn von jenem weicheeren Sinnesnerven zu unterscheiden, portio dura nervi acustici. Allein er ist vom Anfange bis zu Ende so sehr von ihm unterschieden, und scheint so wenig Gemeinschaft durch communicirende Aeste mit ihm zu haben, daß ihn Sommering und die meisten Anatomen nicht ihm als einen vom Gehörnerven verschiedenen Nerven ansehen.

Sommering¹⁾ konnte gar keine Verbindung des N. facialis und acusticus durch Nervenfasern entdecken. Die Fäden, welche vom N. facialis zu ihm, nach Martin und Meckel²⁾, in den Vorhof zu gehen scheinen, konnten Scarpa³⁾ nicht auffinden. Wrisberg hat zwar, wie wir sogleich weiter unten sehen werden, im Grunde des Gehörganges Fäden von dem Gehörnerven abtreten und sich an den Antlignerven anschließen gesehen, allein diese Fäden entspringen, nach ihm, getrennt von der Wurzel des Acusticus und Facialis zwischen den Wurzeln dieser beiden Nerven, und können daher als Fasern desjenigen Nerven angesehen werden, mit dessen Stamme sie sich zuletzt vereinigen. Swan⁴⁾ sah beim Menschen und beim Schafe eine Verbindung des Gehör- und Antlignerven am Ende des inneren Gehörganges. Auch nach Arnold⁵⁾ findet selbst eine doppelte Verbindung Statt, indem nach ihm auch ein Fädchen vom N. facialis zum Gehörnerven zurücklaufen soll, welches selbst zum N. facialis von dem von Arnold am 3ten Aste des 5ten Paares entdeckten Ohrknoten

¹⁾ Sommering, Abbildung des menschl. Gehörganges. Frankfurt. 1806. Fol. p. 26, 71.

²⁾ Siehe Haller, De part. c. h. praecip. fabrica VIII. 363.

³⁾ Scarpa, disquisitiones de auditu et olfactu, p. 52, beruht aber vielleicht auf der Aeusserung Sommering's de basi encephali p. 152, die das hier Gesagte jedoch nicht enthält, sondern von der portio intermedia Wrisbergii handelt.

⁴⁾ J. Swan, Medico-chirurgical Transactions etc. London 1818. B. IX. 422. sqq. und Joh. Swan's gekrönte Preisschrift über die Behandlung der Fohlfraukheiten des Nerven, aus dem Englischen übersezt von Francke. Leipzig. 1824. 8. S. 21.

⁵⁾ Arnold, über den Ohrknoten. Heidelberg 1828. 4. S. 18.

Hildebrandt, Anatomie III.

gelangen soll. Uebrigens hatte schon Galen ¹⁾ den Unterschied dieser beiden Nerven eingesehen.

Der größere Theil dieses Nerven entspringt zwischen dem Corpus restiforme und dem die Oliven einschließenden Rückenmarksbündel. Ein besonderer kleinerer Theil desselben (portio intermedia Wisbergii ²⁾) entspringt neben ihm, weiter nach außen, zwischen ihm und dem N. acusticus, mit einzelnen Fäden, deren Anzahl verschieden ist, und vereinigt sich erst in ein Nervenstämmchen, und dann mit dem größeren Theile des Nerven. Diese Vereinigung geht bisweilen erst im Sinu acusticus vor sich. Einige Fasern der Wurzeln liegen unter der vorderen Oberfläche der 4ten Hirnhöhle, etwas tiefer als die des N. acusticus. Sie sind daselbst von dem grauweißen Ueberzuge der 4ten Hirnhöhle und von den Wurzeln der Hörnerven bedeckt. Langenbeck ³⁾ leitet die Fasern des Nerven von den vorderen Rückenmarksbündeln her, welche er *corpora medullae ad corpora quadrigemina* nennt, und die an jener Oberfläche der 4ten Hirnhöhle von der Stelle an sichtbar werden, wo die *Corpora restiformia* sich einander weiden. Sie gehen nach ihm vor dem Corpus restiforme zwischen der Substanz der Medulla oblongata nach außen. J. F. Meckel leitet ihn zum Theil von den Fasern des Corpus restiforme ab.

Der N. facialis geht in einer rinnenförmigen Vertiefung des Gehörnerven und durch Zellgewebe mit ihm zusammenhängend, auswärts abwärts, und tritt in den mit einer Fortsetzung der harten Hirnhaut ausgekleideten Meatus auditorius internus. Hier aber verläßt er den Gehörnerven, tritt in das obere Grübchen, und so in den Fallopischen Canal. In diesem geht er quer durch das Felsenbein nach vorn, nimmt da durch den Hiatus den Ramus superficialis des N. Vidianus auf ⁴⁾, macht eine knieförmige Beugung, an welcher er etwas angeschwollen ist, und geht nun in einem Canale, der sich in der Substanz der inneren Wand der Pauke befindet, und über dem oberen Rande der Fenestra ovalis weggeht, nach hinten, dann hinter der Pauke hinab, und zum Foramen stylomastoideum wieder hinaus.

Bei seinem Durchgange durch den Fallopischen Canal schiebt der N. facialis ein Nestchen zum Tensor tympani, ein anderes zum M. stapedius, und endlich einen besonders merkwürdigen Nerven, die Saite der Pauke, chorda tympani, welche im absteigenden Theile des Canales vom Stamme des N. facialis unter einem, nach dem

¹⁾ Galenus, De nervor. dissect. c. VI. Ed. Froben. p. 106.

²⁾ Soemmerring, de basi enceph. III. Sect. 7. p. 151. Wisberg, not. 101. ad Hall. pr. lin. — Rolando, Mem. della reale academia della scienza di Torino. Tom. 29.

³⁾ Langenbeck, Icones anatomicae. Neurologia. Tab. XXXIII.

⁴⁾ Nach Soemmerring (Nerventehre S. 250.) nimmt er den Ramus petrosus vom Vidianus auf, sondern er giebt ihn demselben, weil dieser wie ein absteigender Nerv gegen den 4ten Ast des Trigemini hin dicke wird.

Fortgange des Stammes zu, sehr spitzen Winkel entspringt, anfangs gemeinschaftlich mit dem Stamme abwärts geht, dann den Stamm, unweit des Ausganges desselben aus dem Foramen stylomastoideum, verläßt, durch ein besonderes Canälchen in die Paukenhöhle tritt, unter dem kurzen Schenkel des Amboses weggeht, sich in den hinteren unteren Theil der Furche, in der das Paukenseil ausgespannt ist, begiebt, in einer gewissen Strecke mit dem Paukenseile zusammenhängt, hierauf zwischen dem längeren Schenkel des Amboses und dem Handgriffe des Hammers vorwärts geht ¹⁾, sich neben dem M. mallei externus durch eine Oeffnung der Fissura Glaseri einwärts vorwärts hinabkrümmt, hier wahrscheinlich Aestchen den kleinen Muskeln des Hammers und des Steigbügels giebt ²⁾, und endlich vor dem Ursprunge des M. levator veli und des Circumflexus palati an der inneren Seite des N. alveolaris inferior schräg vorwärts zum Zungenaste des 5ten Nerven hinabgeht und sich mit ihm unter einem nach oben sehr spitzen Winkel vereinigt.

In seinem Canale und in der Paukenhöhle ist dieser Nerv weich, im Ausgange aber aus demselben erhält er eine harte Scheide und wird auch dadurch dicker.

Er ist als abgehend vom Antlagnerven, und als zukommend zum Zungenerven anzusehen, weil sein Winkel an jenem nach dem Fortgange desselben zu spitz, an diesem nach dem Fortgange desselben zu stumpf ist.

Der Nutzen des sonderbaren Durchganges dieses Nerven durch die Pauke und seiner nachmaligen Verbindung mit dem Zungenerven ist nicht bekannt ³⁾.

¹⁾ Meckel, de quinto pare p. 92. fig. I. X.

²⁾ Caldani, (de chordae tympani officio. In dess. commentationib. anat. Fascic. I. Gott. et Lips. 1799. n. I.), behauptet, Zweige der Chorda tympani in die Muskeln des Hammers und des Steigbügels verfolgt zu haben. Langenbeck (Icones anat. Neurologia Fasc. II. Tab. XXVII. c.) bildet einen zum M. mallei externus gehenden Zweig der Chorda tympani ab. Boer beschreibt eine Verbindung der Chorda tympani mit dem durch den äußeren Gehörgang in die Trommelföhle einbringenden Zweige des N. temporalis superficialis aus dem 3ten Aste des Trigemini. (Beschreibung des 5ten Nervenpaares, S. 49.) Hirzel erwähnt einen Ast der Chorda tympani zum M. tensor tympani (M. mallei internus). Arnold dagegen (Liedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie III. S. 157) sah niemals, daß die Chorda tympani innerhalb der Paukenhöhle einen Zweig abgegeben hätte.

³⁾ Ribes, p. Cloquet und Hirzel haben den Ramus superficialis des N. Vidianus, die Chorda tympani und das vom N. lingualis des Trigemini zum Ganglion der Untertieferdrüse gehende Fädchen als ein und dasselbe Fädchen beschrieben. Nach H. Cloquet (traité d'anatomie descriptive. Paris 1822, 2me éd. p. 200) und nach Hirzel nämlich ist die Chorda tympani die Fortsetzung des Ramus superficialis N. Vidiani, welcher sich nur an den N. facialis anlegt und sich nicht mit ihm verbindet. Während seines Verlaufs vom Hiatus canalis Fallopii bis zum Uebergange in die Paukenhöhle soll dieser Nervenast, nach Hirzel, auf dem Promontorio ein Fädchen vom Plexus caroticus des N. sympathicus (aus der Jacobson'schen Nervenastomose) aufnehmen. Nachdem weiterhin die Chorda tympani durch die Fissura Glaseri aus der Paukenhöhle getreten ist, tritt sie in die Scheide des N. lingualis des Trigemini, vereinigt sich aber nach Ribes, Cloquet und Hirzel auch hier nicht mit ihm, sondern läßt sich bis zu der Stelle verfolgen, wo die Nerven der Glandula submaxillaris aus dem Nervus lingualis hervorkommen. Hier erst

Ramus occipitalis minor von unten und vom N. occipitalis des 2ten Halsnerven Gemeinschaft. Er giebt nach Boeck capitalis und zuweilen auch dem M. retrahens einen Zweig

Ramus stylohyoideus et biventericus ist der unter beiden Zweigen. Er theilt sich selbst wieder in 2 Zweige, auch besonders entspringen, in den Ramus stylohyoideus M. stylohyoideus und styloglossus Aeste giebt, und in biventericus. Dieser ist der hintere und größere, vertheilteren Bauche des M. biventer, und giebt zuweilen eine denselben, welcher mit dem N. glossopharyngeus Gem Beide Nerven hängen, nach Boeck, durch sehr dünne Fäden, welche capitalis und auricularis posterior herabgehen, mit dem Plexus n. lium des N. sympathicus zusammen. Außerdem kommen unbest aus dem N. facialis hervor, welche durch die Glandula parotis mit dem Parotidengeflechte, mit dem N. auricularis magnus des 3ten und mit dem Plexus nervorum mollium aus dem N. sympathicus

Wenn der N. facialis diese beiden Aeste abgegeben hat bedeckt von der Parotis vorwärts, und theilt sich hinter temporalis in 2 oder 3 Aeste. Beide sind sogleich an der Sy unter sich, zuweilen auch mit einem Aeste des N. temporalis facialis des trigeminus, verbunden. Zuweilen entstehen hier welche um das Ende der Carotis facialis herumgehen.

1) Der obere Ast, ramus superior, geht vorwärts sich sehr bald wieder in 2 Aeste, welche sich unweit ihres unter einander bogenförmig verbinden, und nach Boeck mit den temporalis umschlingenden Verbindungszweigen des N. temporalis superior trigeminus vereinigen, und auch noch zuweilen dünne Aeste vom N. facialis und vom unteren Aeste aufnehmen. Aus diesem Geflechte gehen Aeste durch die Glandula parotis hindurch zur Haut, und verbi

lesten des N. auricularis magnus, andere kleine Zweige vereinigen sich an den Ästen der A. carotis facialis mit dem Gefäßgeflechte des sympathischen Nerven.

Dann gehen 3 größere Äste, die Schläfennerven, rami temporales, von ihm aufwärts über dem Jochbogen zur Schläfe, und vereinigen sich unter einander und mit benachbarten Nerven mit dem N. supraorbitalis, lacrymalis und subcutaneus malae und mit dem temporalis superficialis. Die Zweige gehen zur Haut, zum M. attollens auris, zu dem Orbicularis palpebrarum und zu dem M. frontalis.

Hierauf kommen aus jenem Geflechte 2 Wangenzweige, rami nasales oder zygomatici, die vorwärts über den Jochbogen nach vorn gehen, und mit dem so eben erwähnten und den sogleich zu beschreibenden Ästen verbunden sind, und auch mit dem Subcutaneus malae anastomosiren. Sie geben dem Jochmuskel, dem Orbicularis palpebrarum und der Haut an.

Nun entspringen ungefähr 3 oder 4 Äste, welche man Backennerven, rami buccales, nennt, die sich selbst wieder mannichfaltig theilen, sich unter einander vereinigen und dicht über dem M. masseter und in dem Fette der Backe über und unter dem Stenon'schen Ausführungsgange der Parotis nach vorn gehen, und das Backengeflecht bilden.

Mit diesem Geflechte hängen dünne Zweige des unteren Astes des N. facialis, welche durch die Parotis emporsteigen, ferner Äste des N. infraorbitalis und uccinatorius durch Anastomosen zusammen. Man vergleicht die Form dieses Geflechtes mit den Umrissen der durch die Schwimmhaut verbundenen Fehen eines Amsfußes, pes anserinus, und nennt es deswegen plexus anserinus. Die Zweige dieses Geflechtes gehören der Haut der Wange, der Backe, der Oberlippe, des Mundwinkels, des unteren Augensiefs und der Nase, ferner auch dem M. zygomaticus major und minor, dem Levator labii superioris und anguli oris, Levator labii superioris alaeque nasi und Depressor anguli oris an ¹⁾.

2) Der untere Ast, ramus inferior, geht, hinter dem Winkel des Unterkiefers, in der Parotis schieb vorwärts und abwärts, giebt mehrere kleinere unbestimmte Äste zu dem Plexus anserinus und Verbindungsweige zu dem N. buccinatorius des trigeminus gegen das Kinn hin, außerdem aber Zweige zu dem im Gesichte liegenden Theile des M. platysma myoides, zu dem M. depressor oris, hinter welchem er ingeht, und zu dem M. quadratus menti, und vereinigt sich mit dem Ramus mentalis des N. alveolaris inferior, und bildet dadurch das Mentalgeflecht. Endlich theilt er sich in 2 größere Hautnerven.

a) Ramus subcutaneus maxillae inferioris, geht über dem Winkel des Unterkiefers aus der Parotis hervor, vor dem M. masseter hin, erbinde sich mit den Backenästen, und läuft am Rande der unteren Kinnlade als Ramus marginalis maxillae inferioris vorwärts.

b) Ramus subcutaneus colli theilt sich in 2 oder in 3 Äste, die bisweilen schon getrennt vom Ramus inferior kommen. Diese gehen in oberen Theile der Seite des Halses hinter dem Aste der unteren

¹⁾ Nach Scarpa Anat. annotat. Lib. I. Mut. 1779. 4. c. 11. p. 78. finden sich an den Stellen, wo sich der N. facialis mit den Ästen des Trigemini verbindet im Geflechte verschiedene zerstreute Knötchen.

Kinnlade abwärts, den Ramis subcutaneis vom 3ten N. cervicalis entgegen, vereinigen sich mit ihnen, und bringen auch zum Theil in den M. platysma myoides.

Der N. facialis ist ein sehr wichtiger Nerv des Angesichts. Von ihm hängen, nach Bell's ¹⁾ Vermuthung, die mannichfaltigen, halb unwillkürlichen, mannlichen Bewegungen der Gesichtsmuskeln beim Lachen, Weinen und andern Gemüthsbewegungen ab. Diese Vermuthung wird sehr dadurch unterstützt, daß wie schon Sömmering, Shaw und Serres bemerkt haben, die in das Gesicht gehenden Nerven bei den Säugethieren gar nicht in Proportion zur Größe des Gesichts stehen, sondern daß sie, die Affen abgerechnet, sehr klein sind. Das Niemenspiel ist auch bei den Säugethieren, wenn wir die Affen wegrechnen, sehr unvollkommen. Der Ohrzweig des Facialisnerven ist dagegen, wie schon Cuvier bemerkt hat, bei den Thieren, deren äußeres Ohr sehr groß ist, sehr beträchtlich. Nach E. Bell verursacht die Verletzung desselben nicht den Verlust des Empfindungsvermögens, und nach Brughton soll die Verletzung desselben keinen Schmerz erregen.

VIII. Nervus acusticus, der Hörnerv.

Der Gehörnerv, nervus acusticus, oder auditorius, oder portio nervi paris septimi entspringt an der vorderen Wand der 4ten Hirnhöhle, und also von der concaven Oberfläche des Hirnknoten (pons). Er wird daselbst von dem grauweißen Ueberzuge der 4ten Hirnhöhle bedeckt ²⁾. Er lenkt sich um das verlängerte Mark hinab, von dem er

¹⁾ Siehe oben S. 361.

²⁾ Picolesomini und Sömmering behaupteten, die weißen queren Streifen oder Markfäden, welche daselbst sehr sichtbar sind, gingen in die Gehörnerven über und wären die Wurzeln desselben. Sömmering und Prochaska sahen zwar selbst, daß sich diese weißen Streifen oft mehr oberhalb oder unterhalb verlieren, und größtentheils nicht mit den Wurzeln des Gehörnerven zusammenhängen. Die Schwärze Benzels (de penitiori cerebri structura p. 183) zeigten, daß jene weißen Streifen nur bei dem Menschen, aber bei keinem Säugethiere sichtbar wären, und daß sie sich auch bei dem Menschen nicht zu den Gehörnerven begäben. Sie, Rudolphi und viele neuere Anatomen läugnen daher, daß dieselben für Wurzeln des Gehörnerven gehalten werden dürften, dagegen beschrieben sie graue Keisten, taeniae cinereae, an unterer Theile der vorderen Wand der 4ten Hirnhöhle, welche die Wurzeln des Hörnerven bildeten. Gall (Anatomie und Physiologie des Gehirns, Bd. I. S. 210.) leitet einige Fasern, durch welche der Hörnerv verstärkt werde, von diesen grauen Keisten ab. Er behauptet aber, daß der Hörnerv hauptsächlich von einer Querbinde entspringe, welche zwischen dem rechten und linken Hörnerven liege. Diese Querbinde werde bei dem Menschen von dem hinteren Theile der Quersfasern der Brücke bedeckt; bei den Säugethieren dagegen, weil die Brücke bei ihnen schmal ist, liege sie frei. Es sei diese Binde dieselbe, welche schon Willis (Cerebri anatom. Amstelodami 1667. in 12. p. 27.) beobachtet hätte. Malacarne nannte diese Binde lastre midollare, G. R. Treviranus aber trapezium. Ihre Quersfasern gehen nach Treviranus (vermischte Schr. Bd. 3. 1820.) zur Gegend des Ursprungs der Hör- und Nallignerven. Serres behauptet, daß ein eben so deutlicher Zusammenhang des Hörnerven mit jener Binde bei dem menschlichen Embryo, als bei allen andern Säugethieren sichtbar sei. (Anat. comp. du cerveau T. I. p. 433, 431.) Bei dem Erwachsenen aber schneidet der Nerv von dem Corpus rotundum zum Borscheria zusammen. Treviranus und Serres behaupten, daß die Größe der Taenia cinerea Benzels bei verschiedenen Säugethieren nicht mit der Größe des Hörnerven abersinkommen, und beide glauben daher, daß die Ansicht, daß einige von den weißen

Zuwachs erhält, tritt am hinteren Rande des Processus cerebelli ab protuberantiam annularem, zwischen ihm und dem verlängerten Marke zur Grundfläche des Gehirns hinab, wo er dann, neben dem N. facialis, weiter nach außen liegt. Er scheint hier noch Mark von der Protuberantia annularis zu empfangen, und wird dadurch so dick, daß er dem N. oculi motorius ziemlich gleich ist.

Er ist sehr weich, jedoch nicht so sehr als der Geruchsnerve. An der Seite, an welcher der N. facialis an ihm liegt, ist er seiner Länge nach rinnenförmig vertieft, und in dieser Vertiefung geht jener Nerv, der beträchtlich dünner als er ist, fort.

Er geht also, vom N. facialis begleitet und durch Zellgewebe mit ihm verbunden, auswärts abwärts, und tritt in den mit einer Fortsetzung der harten Hirnhaut ausgekleideten Meatus auditorius internus.

Hier trennen sich seine beiden Äste von einander, welche schon vorher verschieden waren, aber neben einander lagen.

Der dickere Ast, der Nerv für die Schnecke, nervus cochleae, bringt in die Löcherchen ein, welche in den Modiolus der Schnecke führen.

Der dünnere Ast, nervus vestibuli, der Vorhofsnerv, geht durch kleine Löcherchen, von welchen viele an 2 Stellen im unteren Grübchen des Meatus auditorius internus, ein größeres im oberen Grübchen desselben befindlich sind, in das Vestibulum.

Der Vorhofsnerv, N. vestibuli, theilt sich nämlich in 3 Bündel, das dickste von ihnen bringt in das obere Grübchen des Meatus auditorius internus, und von da durch kleinere Löcherchen zu den 2 Ampullen des oberen und äußeren halbcirkelförmigen Canals und zu dem Sacculus oblongus, das mittlere Bündel geht in dem unteren Grübchen des Meatus auditorius internus durch kleine Löcherchen zum Sacculus rotundus, das kleinste und unterste Bündel geht in dem unteren Grübchen des Meatus auditorius internus zu der Ampulla des hinteren halbcirkelförmigen Canals. Am Sacculus oblongus sieht man, daß die Nervenzweige, wenn man sie durch das Vergrößerungsglas betrachtet, noch deutlich aus unter einander verflochtenen Fädchen und Fäserchen bestehen; endlich scheinen sie aber, wenn sie in seine Haut eindringen, zu einem weißen Nervenbrei zu werden, an welchem kaum etwas Fasriges deutlich mehr unterschieden werden kann. Die zu den häutigen Ampullen der halbcirkelförmigen Canäle gehenden Zweige bringen in die Haut derselben ein, laufen aber nicht längs der halb-

Querscheiben zum Ursprunge des Hörnerven beitragen, noch nicht als widerlegt anzusehen sei. Rolando leitete die Wurzel des Hörnerven theils von einigen weißen, theils von den grauen Streifen her (a. a. O. p. 36.).

cirkelförmigen Canäle fort. An der Ampulle weichen die Fäden einander, und umfassen, in 2 Portionen getheilt, die Ampulle. Nette des N. vestibuli sind nach Scarpa ¹⁾ sehr weich. Sie sitzen an der zwischen 2 Lagen Wasser schwebenden Haut der E und Ampullen des Labyrinth's. Diese Stelle der Endigung scheint gerichtet zu sein, daß dem Gehörnerven die Erzitterungen von dem Labyrinth's mitgetheilt werden können.

Der dickere Ast des Gehörnerven, der Nerv der Schnecke *vus cochleae*, tritt nach vorn in die Spindel, *modiolus*, der S ist etwas gewunden, und schieft durch die Gänge des *Modiolus* (*ctus spiralis foraminulosus*) erst dickere, dann dichter liegen zugleich kleinere Fäden zwischen die Platten der *Lamina spiralis* in die Spitze der Spindel ²⁾. Sie sind auch netzförmig unter e verflochten, gelangen bis zum Umfange des knorpeligen Theiles der *Scala* zug Seite desselben zum Vorschein. Diese Nette sind nicht so weich, des N. vestibuli, und lösen sich nicht in eine breiartige Nervensubstanz. Diese Art der Endigung an der *Lamina spiralis*, welche mit der Knoche des Schädels ein Continuum bildet, macht es, wie ich an einem andern gezeigt habe, wahrscheinlich, daß hier dem N. cochleae Erzitterungen der festen Substanz mitgetheilt werden, und daß der Nerv der Schnecke geschickt sei, die Schwingungen zu empfinden, welche durch die Kopfbewegungen durch zu dem Gehörorgane fortgepflanzt werden und also unter andern der eigenen Stimme.

Merkwürdig ist es übrigens, daß die 3 Empfindungsorgane des Geruchs, des Gesichts und des Gehörs mit keinem Nerven eine zuverlässig bewiesene sichtbare Gemeinschaft haben, und sich auch nicht mit dem N. sympathicus.

IX. Nervus glossopharyngeus, der Schlundzungenerv.

Der Schlundzungenerv oder Zungenschlundnerv *glossopharyngeus*, wurde bis auf Andersch und Sömmerring als ein Theil des N. vagus betrachtet. Andersch nannte ihn den 9ten Hirnnerven. Er entspringt ungefähr mit 4 Fäden dicht neben dem N. vagus näher an der Brücke, und also zwischen ihm und dem N. facialis von den hinteren Bündeln (*corporibus restiformibus*) verlängerten Markes, an der zwischen dem *Corpus restiformis* und den Oliven befindlichen Furche ³⁾. Er geht unter dem Plexus

¹⁾ Anton Scarpa, de nervo auditorio. In *disquis. anat. de auditu*. c. 3. Tab. VI. VII. VIII.

²⁾ A. Monro, on the brain, the eye and the ear. Edinburgh 1790.

³⁾ Girardi und Sömmerring leiteten einige Fädchen desselben aus dem 9ten ab.

deus des kleinen Gehirns, mit welchem er zusammenhängt, neben dem N. vagus zum Foramen jugulare, das durch die harte Hirnhaut größtentheils verschlossen ist. Die harte Hirnhaut hat nämlich daselbst 2 kleine von einander getrennte Oeffnungen. Die vorderste oder oberste von ihnen dient dem N. glossopharyngeus, die größere hintere oder untere dient den 2 folgenden Nerven zum Durchgange. Eine von der Dura mater gebildete Scheidewand, und später die Vena jugularis trennt diese Nervenpaare vom Glossopharyngeus.

Nach Andersch ¹⁾, Sömmerring und J. J. Meckel geht vom N. glossopharyngeus auf dem Wege zu diesem Loche ein Nervenfaden zum N. vagus hinüber.

Etwa 4 Linien weit von der Stelle, wo er durch die harte Hirnhaut durch die erwähnte Oeffnung hindurchgetreten ist, schwillt er in ein kleines, ovales, einige Linien langes Knötchen, ganglion petrosum glossopharyngei an, das mit dem N. vagus und mit dem Ganglion cervicale supremum des N. sympathicus in Verbindung steht, und mittelst eines durch das Felsenbein in die Paukenhöhle dringenden Fadens mit dem Ramus superficialis des N. Vidianus und mit dem Stamme des sympathischen Nerven zusammenhängt, und Zweige zur Haut der Paukenhöhle schießt ²⁾.

¹⁾ Andersch, descr. nerv. card.; recus. in Ludwig. script. neurolog. min. I. II. p. 114.

²⁾ Diesen Knoten nebst dem in die Paukenhöhle dringenden Faden scheint Andersch zum ersten Mal beschrieben zu haben. Den in die Paukenhöhle tretenden Nervenfaden hat von seiner Verbindung aus, die er mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus eingeht, J. O. Herold (diss. inaug., qua quaedam de nervo intercostali notantur, Praesid. Casim. Schmiedelio. Erlangae 1754. 4. p. 6. u. 7.) beschrieben. Eben denselben Nervenfaden hat von dem N. glossopharyngeus aus, (der damals als Theil des N. vagus betrachtet wurde) Dom. Cotunni (de aquaeductibus auris humanae internae. Diss. anat. Viennae 1774. 8. §. 80. p. 145, siehe bei Kilian p. 40 wörtlich angeführt), in die Paukenhöhle verfolgt. Auch Ehrenritter (Salzburger medicinisch-chirurgische Zeitung 1790. B. 4. S. 319.) gab die Lage des Ganglion petrosum und des in die Paukenhöhle dringenden Astes desselben an. Indessen ist die allgemeine Aufmerksamkeit der Anatomen auf den Knoten und den erwähnten Ast desselben erst seitdem gelenkt worden, nachdem Ludwig Jacobson der Soc. reg. Hafniensis in dem Aufsatz über diesen Gegenstand vorlegte (Acta regia soc. med. Hafniensis Vol. I. p. 229. 1818. 8. Rosenmüller, Bodt, Wuser, S. Cloquet, Schleich, Ehrmann, Hirtzel, Langenbeck und Arnold haben im Wesentlichen die Richtigkeit der Jacobsonschen Beschreibung bestätigt. Nur Kilian hat die Sache nicht finden können. Literarische Nachrichten und mehrere eigene Untersuchungen und Beschreibungen der gefundenen Varietäten enthält die Abhandlung von Hirtzel in Liebermann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie, Bd. 1. S. 219 u. folg., und die Schrift von Arnold, Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems, Heidelberg u. Leipzig 1831. 4.

In meiner Schrift (Anatomia comparata N. sympathici, cum Tab. aen. Lipsiae 1817. 1 Jahr früher, ehe Jacobsons Abhandlung erschien) habe ich, ohne in Jacobsons Arbeiten zu wissen, den Knoten des N. glossopharyngeus bei den Vögeln, und seine Verbindung mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus, die mit dem N. facialis und endlich die mit dem N. vagus beschrieben. Es heißt da S. 38: Nervus glossopharyngeus et vagus per duos canales osseos in ipso cranii reconditos exeunt, ibique ganglion cervicale supremum tegunt.

cirkelförmigen Canäle fort. An der Ampulle weichen die Fäden aus einander, und umfassen, in 2 Portionen getheilt, die Ampulle. Die Nester des N. vestibuli sind nach Scarpa ¹⁾ sehr weich. Sie endigen sich an der zwischen 2 Lagen Wasser schwebenden Haut der Säcchen und Ampullen des Labyrinth's. Diese Stelle der Endigung scheint so eingerichtet zu sein, daß dem Gehörnerven die Erzitterungen von dem Wasser des Labyrinth's mitgetheilt werden können.

Der dickere Ast des Gehörnerven, der Nerv der Schnecke, *nervus cochleae*, tritt nach vorn in die Spindel, *modiolus*, der Schnecke, ist etwas gewunden, und schiebt durch die Gänge des *Modiolus* (*tractus spiralis foraminulosus*) erst dickere, dann dichter liegende und zugleich kleinere Fäden zwischen die Platten der *Lamina spiralis* und in die Spitze der Spindel ²⁾. Sie sind auch neßförmig unter einander verflochten, gelangen bis zum Umfange des knorpeligen Theiles der Spiralsplatte, und kommen daselbst vorzüglich an der der *Scala* zugekehrten Seite desselben zum Vorschein. Diese Nester sind nicht so weich, als die des N. vestibuli, und lösen sich nicht in eine breiartige Nervensubstanz auf. Diese Art der Endigung an der *Lamina spiralis*, welche mit der Knochenmasse des Schädels ein Continuum bildet, macht es, wie ich an einem anderen Orte gezeigt habe, wahrscheinlich, daß hier dem N. cochleae Erzitterungen von einer festen Substanz mitgetheilt werden, und daß der Nerv der Schnecke vorzüglich geschickt sei, die Schwingungen zu empfinden, welche durch die Kopfknochen hindurch zu dem Gehörorgane fortgepflanzt werden und also unter andern auch die der eigenen Stimme.

Merkwürdig ist es übrigens, daß die 3 Empfindungsnerven des Geruchs, des Gesichts und des Gehörs mit keinem andern Nerven eine zuverlässig bewiesene sichtbare Gemeinschaft haben, namentlich auch nicht mit dem N. sympathicus.

IX. Nervus glossopharyngeus, der Schlundzungenerv.

Der Schlundzungenerv oder Zungenschlundnerv, *N. glossopharyngeus*, wurde bis auf Andersch und Sömmerring als ein Theil des N. vagus betrachtet. Andersch nannte ihn den 8ten Hirnnerven. Er entspringt ungefähr mit 4 Fäden dicht neben dem N. vagus näher an der Brücke, und also zwischen ihm und dem N. facialis von den hinteren Bündeln (*corporibus restiformibus*) des verlängerten Markes, an der zwischen dem *Corpus restiforme* und den Oliven befindlichen Furche ³⁾. Er geht unter dem *Plexus choro-*

¹⁾ Anton Scarpa, de nervo auditorio. In disquis. anat. de auditu. Sect. II c. 3. Tab. VI. VII. VIII.

²⁾ A. Monro, on the brain, the eye and the ear. Edinburgh 1797.

³⁾ Girardi und Sömmerring leiteten einige Fädchen desselben aus dem 8ten Strikt ab.

is des kleinen Gehirns, mit welchem er zusammenhängt, neben dem vagus zum Foramen jugulare, das durch die harte Hirnhaut größtentheils verschlossen ist. Die harte Hirnhaut hat nämlich daselbst 2 kleine einander getrennte Oeffnungen. Die vorderste oder oberste von ihnen ist dem N. glossopharyngeus, die größere hintere oder untere ist den 2 folgenden Nerven zum Durchgange. Eine von der Dura mater gebildete Scheidewand, und später die Vena jugularis trennt die Nervenpaare vom Glossopharyngeus.

Nach Andersch¹⁾, Sömmerring und J. F. Meckel geht vom N. glossopharyngeus auf dem Wege zu diesem Loch ein Nervenfaden zum N. vagus über.

Etwa 4 Linien weit von der Stelle, wo er durch die harte Hirnhaut in die erwähnte Oeffnung hindurchgetreten ist, schwillt er in ein kleines, rundes, einige Linien langes Knötchen, ganglion petrosum glossopharyngei an, das mit dem N. vagus und mit dem Ganglion cerebri supremum des N. sympathicus in Verbindung steht, und besteht aus einem durch das Felsenbein in die Paukenhöhle dringenden Faden, der mit dem Ramus superficialis des N. Vidianus und mit dem Endknäuel des sympathischen Nerven zusammenhängt, und Zweige zur innern Seite der Paukenhöhle schiebt²⁾.

Andersch, descr. nerv. card.; recus. in Ludwig. script. neurolog. min. T. II. p. 114.

Diesen Knoten nebst dem in die Paukenhöhle dringenden Faden scheint Andersch zuerst beschrieben zu haben. Den in die Paukenhöhle tretenden Nervenfaden hat von seiner Verbindung aus, die er mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus eingeht, Jo. Gerold (diss. inaug., qua quaedam de nervo intercostali notantur. Praesid. Casim. Schmiedelio. Erlangae 1754. 4. p. 6. u. 7.) beschrieben. Eben denselben Nervenfaden hat von dem N. glossopharyngeus aus, (der damals als Theil des N. vagus betrachtet wurde) Dom. Cotunni (de aquaeductibus auris humanae internae. Diss. anat. Viennae 1774. 8. §. 80. p. 145, siehe bei Kllian p. 40 wörtlich angeführt), in die Paukenhöhle verfolgt. Auch Ehrenritter (Salzburger medicinisch-chirurgische Zeitung 1790. B. 4. S. 319.) gab die Lage des Ganglion petrosum und des in die Paukenhöhle dringenden Astes desselben an. Inzwischen ist die allgemeine Aufmerksamkeit der Anatomen auf den Knoten und den erwähnten Ast desselben erst seitdem gelenkt worden, nachdem Ludwig Jacobson der Soc. reg. Hafniensis einen Aufsatz über diesen Gegenstand vorlegte (Acta regia soc. med. Hafniensis Vol. I. p. 229. 1818. 8. Rosenmüller, Voß, Wüper, S. Cisoquet, Lobstein, Ehrmann, Hirzel, Langenbeck und Arnold haben im Wesentlichen die Richtigkeit der Jacobson'schen Beschreibung bestätigt. Nur Kllian hat die Nerven nicht finden können. Literarische Nachrichten und mehrere eigene Untersuchungen und Beschreibungen der gefundenen Varietäten enthält die Abhandlung von Hirzel in Kiedemann und Kreviranus Zeitschrift für Physiologie, Bd. 1. S. 219 u. folg., und die Schrift von Arnold, Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems. Heidelberg u. Leipzig 1831. 4.

In meiner Schrift (Anatomia comparata N. sympathici, cum Tab. aen. Lipsiae 1817. 1 Jahr früher, als Jacobson's Abhandlung erschien) habe ich, ohne von Jacobson's Arbeiten zu wissen, den Knoten des N. glossopharyngeus bei den Vögeln, und seine Verbindung mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus, die mit dem N. facialis und endlich die mit dem N. vagus beschrieben. Es heißt daselbst p. 38: Nervus glossopharyngeus et vagus per duos canales osseos in diploë cranii reconditos exeunt, ibique ganglion cervicale supremum tegunt.

474 Neuntes Paar der Gehirnnerven, N. glossopharyngeus.

An dem vorderen Ende des Foramen jugulare, d. h. auf der zwischen dem Foramen jugulare und dem Canalis caroticus befindlichen Scheidewand befindet sich ein Loch, welches einen Nervenfasern des Ganglion petrosum zum hinteren Theile des Bodens der Paukenhöhle führt. Von hier gehen 2 Canäle aus, und in ihnen 2 Aeste jenes Nervenfadens. Der eine Canal geht über das Vorgebirge aufwärts und nach vorn, und führt einen Verbindungsfaden in den Fallopischen Canal zu der Stelle des oberflächlichen Astes des Vidianischen Nerven, wo er sich mit dem N. facialis zu vereinigen im Begriff ist. Auf diesem Wege giebt er ein Fädchen zur Haut der Fenestra ovalis. Der andere Canal geht unter dem Vorgebirge von hinten nach vorn, und führt einen Ast durch eine Oeffnung des Carotischen Canals zu einem Faden des Carotischen Geflechtes des sympathischen Nerven, oder zu dem vom Ganglion cervicale supremum herabsteigenden Faden. Außerdem geht noch von der Stelle, von wo jene 2 Canälchen in der Paukenhöhle aus einander gehen, ein Fädchen des Nerven zur Haut des runden Fensters.

Nach Arnold's ¹⁾ Untersuchungen giebt der in die Paukenhöhle getretene Ast, sogleich nach seinem Eintritte einen Zweig zur Membrana tympani secundaria, dann einen Zweig in den Canalis caroticus, hierauf ein Fädchen in die Tuba Eustachii, welches sich in den Schleimdrüsen derselben verliert, schickt nun ein Fädchen zur Haut des ovalen Lochs, und endlich die 2 letzten Fäden, welche sich so endigen, daß der eine zu dem kleinen Knoten geht, welchen Arnold am 3ten Ast des 5ten Paares entdeckt zu haben glaubt, und der andere in den Canalis caroticus zum tiefen Ast des Vidianischen Nerven gelangt. Langenbeck ²⁾ bildet in einem Falle 3 zu der Haut der Fenestra rotunda gehende Zweige, einen zur Haut des ovalen Fensters, einen zum M. mallei externus et internus, einen in den Canalis caroticus zum N. sympathicus, und endlich einen zum Ramus superficialis des N. Vidianus gehenden Zweig ab.

Außerdem beobachteten Andersch ³⁾ und neuerlich Hirzel (dreimal) einen aus dem Ganglion petrosum zum N. vagus gehenden Zweig, und Hof ⁴⁾, daß das Ganglion meistens einen Faden vom Ganglion cervicale supremum des N. sympathicus empfangt, und unbestimmte Fädchen an den N. vagus und accessorius schickt.

Der Stamm des N. glossopharyngeus geht an der vorderen und äußeren Oberfläche der Carotis cerebralis, der er eine kleine Strecke hindurch ziemlich fest anhängt, herab, tritt hierauf an die Seite des M. stylopharyngeus und von da zu dem M. hyoglossus.

Aeste zum N. vagus, sympathicus und zum Plexus pharyngeus.

Schon oben, wo er an der Carotis cerebralis anliegt, giebt er meistens einen Zweig, welcher mit dem Ramus pharyngeus des N. vagus sich vereinigt, der bisweilen sogar stärker als dieser ist, und zum Schlundkopfgeslecht gelangt. Immer verbindet er sich auf irgend

Nervus glossopharyngeus in ganglion intumescit, quod ramo transversario satis crasso cum nervo vago conjunctum est. Ex eo, praeter primum ramum cum nervo vago conjunctum, bis alium ramum prodire vidi, qui in canalem caroticum intrans in hoc canali cum nervo sympathico et faciali conjungitur. Tertius ramus ad carotidem facialem descendens ramos ejus comitatur et speciem nervorum vasculosorum habet, etc.

¹⁾ Arnold in Liebermann und Treviranus's Zeitschrift für die Physiologie, Bd. III. 1829. S. 150.

²⁾ Langenbeck, Icones anatomicae. Neurologia Fasc. III. Tab. XVII. XVIII. XXV. bis XXVIII.

³⁾ Andersch a. a. L. S. 116. Hirzel a. a. O. S. 251.

⁴⁾ Hof. Handbuch der praktischen Anatomie. Bd. 1. S. 191.

eine Weise mit den an der Carotis externa liegenden Gefäßnerven, plexus nervorum mollium des Sympathicus. Zuweilen bildet ein an der Carotis herabgehender Ast an demselben einen platten Knoten, der aus einem sehr dichten Nervengeflechte besteht. Dst hängt auch der N. glossopharyngeus noch besonders mit dem Stamme des N. vagus, bisweilen auch mit dem Ganglion cervicale supremum des sympathischen Nerven, oder mit einem von den vor ihm aufsteigenden Ästen zusammen ¹⁾. Dann giebt er noch einen mit dem Ramus pharyngeus des N. vagus sich verbindenden sehr beständigen Ast, der vorzüglich das Schlundkopfgeslecht mitbilden hilft. Zur Bildung dieses Schlundkopfgeslechtes tragen außer dem N. glossopharyngeus und dem N. vagus auch ein mit den Zweigen des N. vagus hinzukommendes Ästchen des N. accessorius und Äste des N. sympathicus bei, die entweder unmittelbar aus dem Ganglion cervicale supremum, oder mit den Arterien aus dem Plexus nervorum mollium abgehen.

Weil nun diese Äste der Zahl und der Ordnung nach, in welcher sie abgehen, viele Verschiedenheiten zeigen, und weil die zu der Zunge, zu den Schleimdrüsen derselben und zur Mandel gehenden Äste vielfach mit jenen Ästen zusammenhängen, so läßt sich die Lage derselben nicht im Einzelnen beschreiben ²⁾.

Der Zungenast.

Der zur Zunge gehende Ast des N. glossopharyngeus ist der größte Zweig desselben. Er geht nach vorn, und, wie schon erwähnt worden ist, am M. stylopharyngeus herab. (Nach Andersch durchbohren diesen Muskel mehrere Zweige desselben, die zur Tonsille gelangen.) Nach mehreren Anatomen erhält auch der Muskel selbst Zweige von ihm. Hierauf tritt er unter dem M. styloglossus und der Mandel zur Zunge, und verbreitet sich an der Wurzel derselben, giebt der Tonsille kleine Zweige, und bildet zwischen den auf dem Rücken der Zungenwurzel gelegenen Schleimdrüsen ein Netz. Andersch und Sömmerring haben von hier aus Fäden zu den Papillis vallatis verfolgt, (welche Andersch papillas erectas nennt), und außerdem sah Andersch ²⁾ viele Äste durch das Fleisch der Zunge zur Haut derselben und zu den kleineren Papillen bringen, und zwar einige so weit davon, daß sie nur noch $\frac{1}{2}$ Zoll von der Spitze der Zunge entfernt waren. Auch Wrisberg hat seitwärts vom blinden Loch der Zunge Fäden in die Papillen derselben verfolgt.

¹⁾ Boz fand auch einmal eine Verbindung mit dem 3ten Halsnerven a. a. O. S. 192.

²⁾ Andersch a. a. O. S. 120.

X. Nervus vagus, der Stimmnerv.

Ursprung des Nerven, seine Anschwellungen und sein Weg im Allgemeinen.

Der Stimmnerv oder der herumschweifende, oder der Lungenmagennerv, das zehnte Paar, das herumschweifende Paar, nervus vagus, s. pneumogastricus (nach Chaussier) entspringt dicht neben dem N. glossopharyngeus von der Seite der hinteren Schenkel (corpora restiformia) des verlängerten Markes, an der Furche zwischen diesem Schenkel und der Olive, mit vielen, meistens in einer Reihe dicht neben einander liegenden Fäden. Nach Sömmerring und J. F. Meckel d. J., lassen sich oft einige Fäden bis zur vorderen Wand des 4ten Ventrikels verfolgen, die jedoch Haller und Gall nicht finden konnten. Er geht durch die 2te weiter unten und hinten gelegene Öffnung, welche die harte Hirnhaut an der Stelle bildet, wo sie das Foramen jugulare verschließt, hindurch, und liegt dann im Foramen jugulare in einem von der Dura mater gebildeten Canale von der Vena jugularis abgefordert. Sogleich bei seinem Austritte aus der Schädelhöhle schwillt der Nerv an und bildet nach dem Zeugniß mehrerer Anatomen ein kleines Ganglion, das nach Arnold mit dem N. accessorius in einem ähnlichen Verhältnisse steht, als die Ganglia spinalia zu den der vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven stehen. Es ist immer mit dem Ganglion cervicale supremum, und oft oder nach Arnold immer mit dem Ganglion glossopharyngei durch ein Fädchen verbunden. Oft besitzt der N. vagus auch etwas tiefer da, wo er vor dem Ganglion cervicale supremum herabsteigt, eine 2te längliche Anschwellung, welche seine vielfach verflochtenen Bündel hervorbringen ¹⁾, und welche mit einem dicken Aste des N. accessorius Willisii, oft auch mit dem Ganglion cervicale supremum, mit dem N. hypoglossus und mit der Nervenschlinge des 1sten und 2ten Halsnerven in Verbindung tritt,

¹⁾ Arnold in seiner Schrift: Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, in anatomischer Hinsicht bearbeitet. Heidelberg 1831. 4. p. 105. beschreibt außer den erwähnten Zweigen einen nach hinten zum N. facialis abgehenden Ast des Knotens, welcher sich theils zum Stamme, theils zu dem hinteren vom N. facialis entspringenden Ohrzweige desselben begiebt. Dieser Nervenzweig nimmt nach Arnold ein Fädchen vom Ganglion petrosus des N. glossopharyngeus auf, geht hierauf durch ein in der Grube des Foramen jugulare befindliches Loch in der Canalis Fallopii, und tritt in denselben ungefähr 1 oder 1½ Linie über dem Foramen stylomastoideum ein. Hier verbindet er sich durch einen am Stamme des Nerven emporsteigenden und durch einen an ihm herabsteigenden Zweig mit dem N. facialis, und schiebt noch ein 3tes Fädchen, das durch ein Canälchen des Processus mastoideus hindurchbringt und gespalten an der vorderen Seite des Processus mastoideus zum Ohrtrichter und zu dem R. auricularis posterior des N. facialis geht, mit welchem sich dieser letztere Fäden verbindet.

und zuerst von Scarpa, und dann von Sömmerring als ein wirklicher Knoten anerkannt worden ist ¹⁾. Das zwischen diesen 2 Anschwellungen befindliche, hinter der Carotis cerebralis gelegene Stück des Nerven liegt an dem N. hypoglossus so dicht an, daß beide Nerven daselbst in einer gemeinschaftlichen Scheide eingeschlossen zu sein scheinen.

Von nun an geht der N. vagus zwischen der Carotis communis und Vena jugularis interna am Halse herab, dann vor der A. subclavia in die Brusthöhle, und hierauf hinter der Lungenwurzel weg zur Speiseröhre. An dieser vereinigen sich beträchtliche Aeste des N. vagus der rechten und der linken Seite mit einander, und endlich gehen die Endzweige des Nerven mit der Speiseröhre durch's Zwerchfell zum Magen und zur Leber.

Uebersicht über die Zweige des Nervus vagus.

Seine wichtigsten Zweige sind 1) der über der 2ten Anschwellung des Nerven entspringende, einfache oder doppelte, mit Aesten des Accessorius, Glossopharyngeus und Sympathicus verbundene Nervus pharyngeus ²⁾; 2) der ein wenig tiefer aus der 2ten Anschwellung des Vagus, oder dicht unter ihr entspringende, mit dem N. sympathicus und mit dem Recurrens anastomosirende Nervus laryngeus superior; 3) der in der Brusthöhle entspringende, um die A. subclavia dextra,

¹⁾ Die Verbindung des N. vagus mit dem Ganglion cervicale des N. sympathicus haben Haller, Huber, Swanoff, Girardi, Sömmerring, Boef, Eloquet und Hirtzel beobachtet. Hirtzel fand sie bei 4 Leichen jedesmat, und zwar an der oberen Anschwellung. (Tiedemann, Zeitschrift für Physiologie Bd. 1. S. 225. Auch Arnold, Bd. 5. S. 149, sah die Verbindung nie fehlen. Die unterhalb des Foramen jugulare gelegene tiefere Anschwellung wurde von Willis mit dem Namen plexus gangliiformis besetzt, und von Huber (De nervo interoostali, de nervis octavi et noni paris deque accessorio, Gottingae 1744. p. 16) und von Prochaska (De structura nervorum. Tab. II. Fig. VII. c.) beschrieben. Auch Scarpa (Abhandl. der k. k. Joseph-Akademie, Bd. 1. Wien 1787. p. 401. Taf. X. und Sömmerring, vom Bau des menschl. Körpers, 2te Ausg. 1800. Bd. 5. S. 147, hatten die Anschwellung des N. vagus da, wo er sich mit dem N. accessorius verbindet, für einen wahren Knoten. Wuser giebt die Geschichte der Entdeckung dieses Knotens, und fand selbst eine obere und eine untere gangliöse Anschwellung des N. vagus (De c. h. gangliorum fabrica atque usu. Berolini 1817. p. 88.) Schon Ehrenritter beschrieb ein in dem Foramen jugulare liegendes Ganglion (nach einer Anzeige in der Salzburger med.-chirurg. Zeitung 1790. Bd. 4. S. 319), und neuerlich ist dasselbe, wie gesagt, von Arnold beständig gefunden worden. Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie, Bd. 3. 1829. S. 147. Es steht nach ihm nicht mit dem N. accessorius, der nur an ihm anliegt, wohl aber mit einem beständigen Zweige des Ganglion cervicale supremum des N. sympathicus und mit dem Ganglion petrosum des N. glossopharyngeus in Verbindung. Ich habe an dem Stamme des Vagus bei seinem Austritte aus dem Schädel bei den Froschen beständig einen Knoten gesehen, bei manchen von den von mir untersuchten Fischen war er außerordentlich groß. Bei den Karpfen besaßen sogar die meisten von den von diesem Knoten ausgegangenen Aeste selbst wieder Knoten. Siehe Anatomia comparata nervi sympathici 1816, und Meckels Archiv 1824. Taf. IV. Fig. 26.

²⁾ In dieser Gegend giebt der N. vagus bisweilen einen Ast, der in den Stamm des N. vagus wieder zurückläuft. (Sömmerring's Nervenlehre, S. 207. S. 231.)

oder um die Aorta auf der linken Seite herumgebogene, zwischen Kehlkopf und Speiseröhre in die Höhe laufende Nervus recurrens oder Nervus laryngeus inferior; 4) ferner einige theils am Halse, theils in der Brust von ihm entspringende, mit dem Herzgeflechte des N. sympathicus verbundene unbestimmtere Fäden; 5) viele in der Brusthöhle gegebene, mit der Arterie und den Luströhrenästen in die Lungen einbringende, mit einigen wenigen Fäden des N. sympathicus verbundenen Lungenerven; 6) Speiseröhren-, Magen- und Lebernerven.

Beschreibung der Zweige des N. vagus im Einzelnen.

1) Der N. pharyngeus, der Schlundkopfzweig steigt an der Carotis cerebralis nach vorn herab, vereinigt sich mit einem Zweig des N. glossopharyngeus, die aus dieser Vereinigung hervorgehenden Äste bilden zusammen und mit einem 2ten Aste des N. glossopharyngeus ein Geflecht, plexus pharyngeus, in welchen auch Fäden des sympathischen Nerven, die zuweilen vom Ganglion cervicale supremum direct kommen, zuweilen mit der A. pharyngea vom Plexus nervorum mollium hinzutreten. Der N. accessorius scheint insofern Theil an der Bildung dieses Geflechtes zu haben, als er sich oben mit dem Stamme des Vagus vereinigt. Die Fäden aus diesem Geflecht begeben sich zum mittleren und unteren Constrictor.

2) N. laryngeus superior, der obere Kehlkopfnerve, oder auch der Kehlkopfaast, ramus laryngeus superior des N. vagus entspringt etwas tiefer, doch höher, als wo der Kehlkopf liegt (bisweilen mit 2 Wurzeln), geht hinter der Carotis cerebralis schräg einwärts und abwärts und theilt sich in den größeren und mehr quergehenden inneren Ast und in den dünneren, mehr senkrecht herabgehenden äußeren Ast. Er erhält bisweilen ein Fädchen vom N. sympathicus, tritt zwischen dem Zungenbeine und dem Schildknorpel hinein, und vertheilt sich in der Haut des Kehlkopfs, des Kehlbedels und des Schlundes, auch in den inneren Muskeln des Kehlkopfs, kommt namentlich zu dem M. arytaenoideus, cricothyreoideus und thyreoarytaenoideus. Der äußere Ast vereinigt sich mit 1 oder 2 Fäden aus dem Ganglion cervicale supremum und vertheilt sich dann im Constrictor infimus des Schlundes, im M. cricothyreoideus und in der Schilddrüse. Bisweilen geht ein Astchen des N. vagus an der Carotis cerebralis hinab und vertheilt sich in ihrer Masse. Bisweilen vereinigt sich ein Astchen des Vagus mit dem N. hypoglossus oder mit dem Ramus descendens desselben, oder mit dem 1ten Halsnerven.

Wenn der N. vagus diese Äste abgegeben hat, so geht er, wie schon gesagt worden, zwischen der A. carotis und Vena jugularis interna am Halse hinab, und hinter der V. anonyma und vor der A. subclava

via hindurch in die Brust. Er ist bis hierher ein rundlicher Strang, der aber durch kleine Einschnitte uneben und dadurch in mehrere sich verlettende oder verschlechte Bündel getheilt ist. An manchen Stellen wird er auch von netzförmig vereinigten Fäden umgeben ¹⁾.

3) Auf dieser ganz beträchtlichen Strecke giebt er keinen Ast, ausgenommen am unteren Theile des Halses, und im oberen Theile der Brust einen größeren, oder 2, 3, oder 4 kleinere unbeständige Fäden zu den großen Gefäßstämmen.

4) Nervus laryngeus inferior ²⁾. Der rechte N. vagus giebt vor der Arteria subclavia dextra, der linke tiefer unten vor dem hinteren Theile des Bogens der Aorta, den zurückgehenden Ast, oder unteren Kehlkopfsast, Ramus recurrens s. Laryngeus inferior ³⁾. Dieser geht erst unter einem spitzen Winkel vom Stamme abwärts, dann schlägt er sich an der rechten Seite unter der A. subclavia, auf der linken Seite viel tiefer unter dem Bogen der Aorta durch, nach hinten zu herum, und steigt wieder rückwärts und nach innen (an der linken Seite vor der Speiseröhre) zum unteren Theile des Kehlkopfs hinauf. Auf diesem Wege giebt er einen Ast, der sich mit dem N. vagus vereinigt, Aeste zum Plexus cardiacus, zum Plexus pulmonalis anterior hinab, Aeste zur Speiseröhre, zur Luftröhre; endlich wenn er zum Kehlkopfe kommt, zur Schilddrüse, zum Constrictor infimus des Schlundes, zu dem M. cricoarytaenoideus posticus und lateralis und zu dem M. thyreoarytaenoideus, und verbindet sich innerhalb des Schilddrüsensackes mit einem Aste des N. laryngeus superior ⁴⁾.

5) Nervi pulmonales. Nachdem der N. vagus so weit herabge-

¹⁾ Prochaska, de structura nervorum. Tab. II. fig. 7. p. 114. Reil, de structura nervorum. Tab. I. fig. 2 — 4.

²⁾ Schon dem Galenus war dieser Nerv bekannt (de us. part. VII. 14.)

³⁾ Auf der rechten Seite wurde einmal ein 2ter N. recurrens minor gefunden. Siehe Wrisberg, not. 82. ad Hall. pr. lin. phys. und obs. de nerv. visc. abd. §. 12.

⁴⁾ Magendie (Physiologie, übersetzt von Heusinger 1820. I. S. 206.) behauptet, die Musculi thyreoarytaenoides erhielten nur vom Laryngeus inferior, und der M. arytaenoideus nur vom N. laryngeus superior Zweige, daher entsände nach der Durchschneidung dieser Nerven Stimmlosigkeit, denn das Zusammenwirken dieser Muskeln ist nach Magendie zur Hervorbringung der wahren Stimme unentbehrlich. Nach H. Etouart, der in der neuesten Ausgabe seiner Anatomie die von Rudolphi (Grundriß der Physiol. II. S. 374) widerlegte Angabe der Vertheilung der Kehlkopfnerven verlassen hat, erhält im Gegentheile sowohl der Arytaenoideus, als der Thyreoarytaenoideus seine Nerven vom oberen N. laryngeus. Traité d'anat. descr. Paris 1822. 2. éd. Tom. II. p. 126. 129. Nach Rudolphi, Schlemm und ihm bekommt auch der M. cricothyreoideus Zweige vom N. laryngeus inferior. Zukünftige Untersuchungen müssen noch erst lehren, ob die Natur bei der Vertheilung dieser Nervenäste vom oberen oder unteren Kehlkopfnerven einer einfachen Regel folge. Beim Pferde erhält nach J. G. Theile (Diss. de musculis nervisque laryngeis. Jenae 1825. 4. Tab. III. fig. 2.) der Arytaenoideus sowohl vom oberen als vom unteren Kehlkopfnerven Aeste.

kommen, lenkt er sich hinter dem Aste der A. pulmonalis und dem Bronchus schräg rückwärts hinab, und giebt die Nerven der Lunge seiner Seite, welche von allen Seiten mit den Ästen der A. pulmonalis (vorzüglich aber an der hinteren Seite, am wenigsten von vorn) in die Lungen eindringen, sich unter einander verbinden und den Plexus pulmonalis bilden.

Wrisberg sah einen Ast, der aus dem rechten N. vagus nach dem Abgange des N. recurrens entspringt, zwischen der A. anonyma und dem rechten Bronchus vorwärts durchging und sich in 2 Ästchen theilte, deren einer ein N. cardiacus wurde, der andere zur Lunge hinabging, und mit einem anderen Aste des N. vagus ein Ganglion pulmonare zusammensetzte, welches hinter der Endigung der V. azyga in die V. cava lag, und seine Fäden zur Lunge schickte ¹⁾.

Aus diesen Plexubus, und von den einzelnen Lungenästen des N. vagus gehen Ästchen in die Substanz der Lunge; und vertheilen sich theils in den Luftröhrenzweigen, theils auch in den Ästen der A. pulmonalis und in denen der Vena pulmonalis.

6) Rami oesophagei. So kommen beide nervi vagi sich einander näher, indem sie im cavum mediastini posticum rückwärts einwärts zur Speiseröhre und an derselben hinabgehen. Der linke lenkt sich mehr vorwärts, der rechte mehr rückwärts. Sie theilen sich auf diesem Wege in Äste, welche sich hier und da von beiden Seiten her mit einander verbinden und so die Plexus oesophageos ausmachen, deren Ästchen sich in der Wand der Speiseröhre verbreiten, theils auch zur Aorta gehen. Der Plexus anterior gehört mehr dem linken, der Posterior mehr dem rechten Nerven an.

7) Rami gastrici, hepatici, coeliaci etc. Endlich kommen beide nervi vagi, nämlich die Plexus oesophagei, mit der Speiseröhre durch das Foramen oesophageum des Zwerchfelles in die Bauchhöhle.

Der Plexus oesophageus anterior giebt einige Äste rechts zum concaven Bogen des Magens, welche sich meist auf der vorderen Fläche desselben, bis zum Pylorus hin vertheilen, und sich auch mit den Leberästen der Ganglia coeliaca verbinden, und dann vorzüglich zu dem linken Lappen der Leber gehen. Einige Fäden dieses Plexus gehen auch zum Magen hin.

Der Plexus posterior umgiebt das Ostium oesophageum und theilt sich in viele Äste, deren einige am concaven Bogen rechts zum Pylorus gehen, und sich vorwärts und rückwärts am Magen vertheilen; andere an der A. coronaria sinistra des Magens zur A. coeliaca hinaufgehen und sich mit den Gangliis coeliacis vermischen; andere endlich an der A. hepatica theils zum Pankreas, theils mit der A.

¹⁾ Wrisberg, not. 75. ad Hall. pr. lia.

gastro-epiploica zum unteren Theile des Magens, zum Zwölffingerdarme, zum rechten Lappen der Leber und zur Gallenblase kommen.

Nach Broughtons ¹⁾ Versuchen soll der N. vagus, wenn er gestochen oder gekniffen wird, keinen Schmerz, der sich durch Zucken oder Auffahren zu erkennen gäbe, verursachen, sondern es soll auf eine solche Verletzung nur ein Keuchen wie beim gehemmten Athmen folgen. Dergleichen Versuche scheinen mir aber schwerlich sichere Resultate zu geben.

XI. Nervus accessorius, der Beinerv.

Der Beinerv, nervus accessorius Willisii ²⁾ entspringt vom oberen Theile des Rückenmarks an seiner Seite desselben, zwischen den vorderen und den hinteren Wurzeln bis zum 4ten, 5ten, 6ten, bisweilen bis zum 7ten Halsnerven hinab. In dem Zwischenraume zwischen je 2 Nerven erhält er immer einen vom hinteren Strange des Rückenmarks (d. h. von der hinteren Hälfte des Seitenstranges, nach Bellingeri) entspringenden Faden. Er liegt auch dem hinteren Strange des Rückenmarks näher als dem vorderen, denn er liegt zwischen dem Ligamentum denticulatum und den hinteren Wurzeln. Je weniger tief er am Rückenmarke hinabreicht, desto dicker sind die Fäden, die seine Wurzeln bilden. Sehr oft, jedoch nicht immer, vereinigt er sich mit der hinteren Wurzel des 1sten Halsnerven, und ist an dieser Stelle ein wenig dicker. (Siehe die Beschreibung des 1sten Halsnerven). Selten vereinigt er sich auch mit der des 2ten Halsnerven. Am verlängerten Marke erhält er etwa noch 4 längere Fasern, welche nicht einfach, sondern mit mehreren wiederholt getheilten Fäden entspringen. Diese Form kommt den vom Rückenmarke entspringenden Fäden nicht zu ³⁾.

An der Stelle, wo der Stimmnerv die harte Hirnhaut zu durchbohren im Begriff steht, gesellt er sich zu ihm, geht meistens eine Strecke zwischen den Blättern der harten Hirnhaut hin, ohne eine eigenthümliche Scheide von ihr zu bekommen, und wird dann im Foramen jugulare in die dem N. vagus gehörende Scheide mit aufgenommen, so daß er mit ihm fast einen Nerven ausmacht. In jedem Falle legt er sich wenigstens sehr dicht an den Vagus an, und ist von einer gemeinschaftli-

¹⁾ London medical and physical Journal, Jun. 1823.

²⁾ Willis nervor. descr. cap. 23. p. 120.

³⁾ Nach Rolando (Recherches anatomiques sur la moëlle allongée, Memoire della reale Acad. d. sc. di Torino. Tom. XXIX, besonderer Abdruck. S. 24.) entspringen diese zusammengesetzten Wurzeln von den hinteren Strängen des verlängerten Marks (corpora testiformia), die etwas tieferen einfachen aber von der hinteren Seite der vorderen Stränge. Ueberhaupt glaubt er mit Gewißheit behaupten zu können, daß wenigstens einige Wurzeln, sowohl von denen, die aus dem Rückenmarke kommen, als von denen, welche von der medulla oblongata entspringen, von den hinteren Strängen ihren Anfang nehmen. Bellingeri hatte behauptet, daß sie nur von den mittleren großen Seitensträngen des Rückenmarks ihren Anfang nähmen.

chen Hülle umgeben; nimmt jedoch an der Bildung des im Foramen jugulare liegenden Knotens des N. vagus keinen Antheil. Der N. accessorius geht folglich am Rückenmarke, zum großen Loch des Hinterkopfs hinauf, durch dasselbe in die Hirnschale, tritt an den Nervus vagus, und geht mit ihm zum Foramen jugulare wieder aus der Hirnschale heraus. Er hat also einen sehr sonderbaren Gang, und ist weder ganz als Nervus encephali, noch ganz als Nervus spinalis anzusehen ¹⁾.

Beim Ausgange aus dem Foramen jugulare spaltet er sich in einen kleineren inneren, und in einen größeren äußeren Ast.

1) Der innere Ast, ramus internus, giebt selbst wieder einen oder 2 Zweige, welche über den N. vagus vorwärts gehen, sich mit einander vereinigen und mit einem Aste des N. vagus zum Ramus pharyngeus kommen, und einen anderen Ast, der an der hinteren Seite des N. vagus zu dem unteren Knoten desselben hinab geht, und sich daselbst in mehrere Fäden theilt, die sich mit dem N. vagus vermischen. Die Äste des N. vagus sind daher zum Theil von diesem N. accessorius herzuweisen.

2) Der dickere äußere Ast, ramus externus, desselben geht hinter und an dem Ramus cerebialis der Vena jugularis interna und hinter dem N. hypoglossus, mit ihm eine kurze Strecke hindurch durch Zellgewebe verbunden, hinab, dann schräg rückwärts abwärts zu dem M. sternocleidomastoideus, den er entweder durchbohrt, oder an dessen inneren Seite er nach hinten geht. Er giebt demselben Äste, die mit den Ästen des 3ten Halsnerven Gemeinschaft haben, wird durch einen Zweig, der von dem 3ten Halsnerven und von dem 2ten Halsnerven, oder von dem beide Halsnerven verbindenden Bogen kommt, verstärkt, gelangt zur inneren Fläche des M. cucullaris, in welchem er sich zertheilt, und sich zuweilen mit einem vom 4ten und 5ten Halsnerven

¹⁾ Haase beschreibt ihn daher mit Recht unter den gemischten Nerven (nervor. anat. Sect. IV. p. 115.), welche Wisberg unterscheidet. (Not. 99. ad Hall. pr. lin.) Hildebrandt beschrieb ihn hier wegen seiner genauen Verbindung mit dem N. vagus; auch weil er gemeinlich als ein Theil des 8ten Nerven beschrieben wurde.

Scarpa und Arnold nehmen an, daß er sich zum N. vagus so verhalte, wie die kleine Portion des N. trigeminus zur großen, und wie die vordere Wurzel des Rückenmarksnerven zur hinteren. Sie glauben daher, daß er nur ein Bewegungsnerv, der N. vagus aber ein Empfindungsnerv sei. Ob mit dieser Ansicht nicht die Verbindung, die der N. accessorius Willisii so häufig mit dem Ganglion spinale des ersten Rückenmarksnerven eingeht, und die Behauptung Rosand's, daß er zuverlässig auch Fäden von den hinteren Rückenmarksbündeln erhalte, im Widerspruche stehen, müssen spätere Untersuchungen lehren. Ueber diesen Nerven sehe man vorzüglich nach:

Joh. Friedr. Lobstein de nervo spinali ad par vagum accessorio. Argent. 1760. 4. und

Anton Scarpa de nervo spinali ad octavum accessorio. In actis med. chir. Vindob. T. Tab. X.

von kommenden Fäden vereinigt. Dieser Nerv dient also zur Bewegung des *M. cucullaris*, des *M. sternocleidomastoideus*, und zur Verstärkung des *N. vagus*. Warum er einen so sonderbaren Gang habe, ist nicht bekannt. Er ist der einzige Gehirnerv, welcher zu Muskeln des Rumpfes geht, die sonst nur vom Rückenmarke ihre Nerven erhalten. Nach den Versuchen von *Ch. Bell* ¹⁾ werden, wenn man den *N. accessorius* bei Thieren durchschneidet, diejenigen Bewegungen der genannten Muskeln unterbrochen, welche beim Athmen mitwirken. Nach *Bellingeri* ²⁾ bringt er die mimischen Bewegungen hervor, durch welche man Geduld und Untermüthigkeit zeigt, indem man den Kopf nach hinten, die Schultern aber in die Höhe zieht. Der vordere mit dem Knoten des *N. vagus* verbundene Ast hat nach ihm vielleicht unwillkürliche Berrichtungen, nach *Scarpa's* und *Arnold's* Vermuthung dient er zur Hervorbringung der Bewegung und trägt zur Bildung derjenigen Nervenäste bei, die der *N. vagus* zu den Muskeln des Pharynx und Larynx schickt.

XII. Nervus hypoglossus, der Zungenfleischnerv.

Der Zungenfleischnerv, oder das zwölfte Paar, *nervus hypoglossus s. loquens*, ³⁾ entspringt mit verschiedenen von einander entfernten Wurzeln vom vorderen Theile seiner Hälfte des verlängerten Markes, theils höher, aus der Furche zwischen dem *Corpus pyramidale* und dem *Corpus olivare*, theils tiefer, und sogar noch unweit des Hinterhauptlochs. Die einander nahen Wurzeln verbinden sich in Bündelchen, diese Bündelchen ferner in noch größere Bündel, und diese convergirend in einen Nervenstamm, der bisweilen bei seinem Ausgange aus dem Schädel in 2 bis 3 Bündel getheilt ist, und dann als durch 2 oder 3 Löcher der harten Hirnhaut geht.

Die Bündelchen dieses Nerven gehen vor der *A. vertebralis* zum *Foramen condyloideum anterius* nach außen, oder umfassen sie auch zum Theil schlingenartig. Nach seinem Ausgange krümmt er sich abwärts, lenkt sich um den *N. vagus* an der äußeren Seite, zwischen ihm und dem *N. accessorius*, vorwärts hinab, geht an der äußeren Seite der *Carotis cerebralis* und der *Carotis facialis* vorbei, und liegt sowohl hinten, als vorn an der inneren Seite des hinteren Bauchs des *M. digastricus*, bildet einen nach unten gekehrten Bogen, kommt so zur äußeren Fläche des *M. hyoglossus*, und bringt am *M. genioglossus* in das Fleisch der Zunge ein.

Da, wo er am *N. vagus* vorbeigeht, wird er eine kleine Strecke hindurch durch Zellgewebe mit ihm sehr genau verbunden; auch steht er durch einen oder durch einige Fäden mit dem Knoten und mit dem

¹⁾ *Ch. Bell*. Siehe *Magendie Journal de Physiologie*. p. T. 1. p. 189.

²⁾ *C. F. Bellingeri*, De medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus. Augustae Taurinorum. 1825. 4. p. 116.

³⁾ Gewöhnlich wurde er *nervus nonus* genannt. Haller gab ihm den Namen *lingualis medius*. Die schiedlichen Namen Zungenfleischnerv und *loquens* rühren von *Sömmering* her.

Stamme des *N. vagus*, und mittelst dieses Knotens, auch mit dem *N. accessorius*, mit dem hinteren Aste des 1sten Halsnerven und mit dem Ganglion cervicale supremum des sympathischen Nerven in Verbindung.

Nachdem er vom *N. vagus* vorwärts abgewichen, giebt er am Anfange des Bogens, den er nun bildet, den absteigenden Ast, *Ramus descendens n. hypoglossi* s. *N. descendens colli internus*, der bisweilen aus 2 mit einander sich vereinigenden Fäden zusammengesetzt wird.

Dieser Nerv geht zuweilen aus dem Knoten des *N. vagus* hervor, oder nimmt auch in manchen Fällen aus dem Stamme des *N. vagus*, oder aus dessen Knoten, oder vom *N. sympathicus*, oder endlich vom 1sten Halsnerven einen Faden, oder 2 Fäden auf, und giebt dem *Omo-hyoideus*, dem *Sternohyoideus* und dem *Sternothyreoideus* Zweige, und bisweilen auch einen Ast zu dem an der *A. subclavia* befindlichen Geflechte des *N. sympathicus*.

Indem er über dem *M. mylohyoideus* am *Hyoglossus* hinget, liegt er weiter nach innen, als der *Ramus lingualis* vom fünften Nervenpaare, hat mit demselben durch Aestchen Gemeinschaft, giebt Aest dem *M. mylohyoideus*, dem *Geniohyoideus*, dem *Styloglossus*, und vertheilt sich endlich im *Genioglossus*.

Dieser Nerve versorgt also das Fleisch der Zunge, und die den Kehlkopf und das Zungenbein von der Stelle bewegenden Muskeln, und dient mithin unter andern beim Sprechen.

Beschreibung der Rückenmarksnerven.

Der Rückenmarksnerven sind dreißig bis ein und dreißig Paar, nämlich:

- 1) Acht Halsnerven (*nervi cervicales*).
- 2) Zwölf Rückennerven oder Rippennerven (*nervi dorsales* s. *intercostales*).
- 3) Fünf (oder sechs) Lendennerven oder Bauchnerven (*nervi lumbares*).
- 4) Fünf oder sechs Kreuzbeinnerven (*nervi sacrales*).

Die *Nervi lumbares* und die obersten *Nervi sacrales* sind die dicksten; dann folgen die *Cervicales*. Die mittleren *Nervi dorsales* dagegen sind die dünnsten. Will man bei dieser Vergleichung noch mehr ins

zelne eingehen, so muß man die Nerven in folgender Ordnung zusammenstellen: Die dicksten Rückenmarksnerven sind die beiden untersten *Nervi lumbares*, der oberste *Nervus sacralis*, dann folgen der 3te, 2te und 1ste *Nervus lumbalis*, dann der 2te und 3te *sacralis*; hierauf die 4 unteren *Nervi cervicales*, 1ste *dorsalis*, dann der 4te, der 3te und 2te *cervicalis*, dann die übrigen *sacrales* und endlich der oberste *cervicalis*, und die 2 untersten *sacrales*. Diese sind die dünnsten.

Der Stamm, der durch die Vereinigung der vorderen und der hinteren Wurzeln jedes Rückenmarksnerven an dem vorderen Ende jedes *Ganglion spinale* entsteht, (Siehe S 378.) ist dicker als die Wurzeln, bevor die Bildung des *Ganglion spinale* waren, und theilt sich jederzeit in einen hinteren Zweig, der hinter der Wirbelsäule, meistens zwischen den *Processibus spinosis* und *transversis* gegen die Muskeln und zur Haut geht, und in einen vorderen Zweig, mit Ausnahme der 2 ersten Rückenmarksnerven, der größere ist, und näher einen Ast zu dem sympathischen Nerven schickt. Sowohl dieser als die übrigen Äste bekommen nach *Scarpa*¹⁾ und *Wußer* die beiden Wurzeln der Rückenmarksnerven Fäden. Die benachbarten Äste der Hals-, Lenden- und Kreuzbeinnerven vereinigen sich fast immer durch gewisse Zweige gegenseitig zu Bogen oder zu Zweigen, die sich oft von neuem theilen und vereinigen. Hierdurch entstehen Schlingen und Geflechte, aus welchen Nerven, die einen bestimmten Namen erhalten, ihren Anfang nehmen. Das Geflecht, welches die obersten Halsnerven hierdurch bilden, heißt *plexus cervicalis*; das, welches die 4 unteren Halsnerven und der 1ste Rückenerv bilden, heißt *plexus brachialis*, weil aus ihm die Nerven des Arms entspringen; das Geflecht, welches die 5 Lendennerven und die 6 Kreuznerven bilden, heißt *plexus lumbalis* und *sacralis*. Bei den Rückenerven fehlt diese Vereinigung meistens, und an den hinteren Ästen der Hals-, Lenden- und Kreuzbeinnerven findet sie nur auf eine unbeständige Weise Statt.

Nervi cervicales, die Halsnerven.

Es giebt 8 Halsnervenpaare. Das erste geht zwischen dem Hinterhauptbeine und dem Atlas heraus; die folgenden 7 zwischen den Halswirbeln, also das 2te zwischen dem 1sten und 2ten, u. s. w., das 8te zwischen dem 7ten Halswirbel und dem 1sten Rückenwirbel.

Scarpa, *Anatomicarum annotationum*, Lib. I. p. 23.

Neuerlich glaubt aber *Scarpa* beobachtet zu haben, daß die Fäden, welche von den Rückenmarksnerven zum dem *N. sympathicus* gehen, nur von der hinteren Wurzel entspringen. (*De Gangliis nervorum, deque origine et essentia Nervi intercostalis*. Milano 1831. p. 11.)

Die vier oberen Halsnerven zusammengenommen betrachtet.

Zwischen den Fäden, aus welchen die Wurzeln der 4 oberen Halsnerven bestehen, kommen häufiger Verbindungen vor, als zwischen den der 4 unteren Halsnerven.

Vordere Kette.

Die vorderen Kette der 4 oberen Halsnerven sind viel dünner als die der 4 unteren, und die anastomosirenden Zweige, durch welche sie unter einander in Verbindung stehen, bilden Bogen. Zwischen den vorderen Ketten des 2ten und 3ten, des 3ten und 4ten, und endlich des 4ten und 5ten Halsnerven giebt es außer den erwähnten anastomosirenden Zweigen zum Theil noch kleinere, weniger constante Verbindungsfäden.

Verbindungsfäden, die zu dem *N. sympathicus* gehen.

Aus den bogenförmigen Verbindungsfäden, oder auch zuweilen unmittelbar aus den vorderen Ketten entspringen Nervenfäden, welche in die am Halse gelegenen Knoten des sympathischen Nerven übergehen. Die von den 2 oder 3 obersten Verbindungsbogen gehen meistens in das Ganglion cervicale supremum, die vom 4ten kommen meistens zum Ganglion cervicale medium, wenn es überhaupt vorhanden ist. Zuweilen jedoch geht nach Boeck ein solcher Verbindungsfaden vom 4ten Verbindungsbogen, auf einem ziemlich verborgenen Wege, durch den *Canalis vertebralis* längs der *A. vertebralis* zum Ganglion cervicale inferum.

Verbindungsfäden, die zu Gehirnnerven gehen.

Es gehen auch einige Verbindungsfäden von den vorderen Ketten der 2 bis 3 obersten Halsnerven oder von ihren Verbindungsbogen zu dem *Ramus descendens* des *N. hypoglossus*, ferner von dem obersten Verbindungsbogen zwischen dem 1ten und 2ten Halsnerven zu dem *N. vagus* oder auch zuweilen zum Stamme des *Hypoglossus*, und endlich von dem 2ten Verbindungsbogen ein oder mehrere Äste zu dem *N. accessorius Willisii*.

Hautnerven.

Außerdem entspringen von den vorderen Ketten des 2ten, des 3ten und des 4ten Halsnerven Hautnerven: namentlich vom 2ten Verbindungsbogen, oder vom 3ten Halsnerven allein, der hinter dem Ohre am Hinterhaupte emporsteigende, zum Theil auch dem Ohre angehörende *N. occipitalis minor*, der kleine Hinterhauptnerv, zuweilen von eben daher noch ein 2ter sich gleichfalls am Hinterhaupte und am Nacken verbreitender Hautnerv, ferner vom 3ten Verbindungsbogen.

oder vom 3ten Halsnerven allein, der zum Ohre gehende *N. auricularis magnus*, der große Ohrnerv, dann der ebenda entspringende *N. subcutaneus colli*, der Hautnerv des Halses, der mit einem Zweige zum mittleren Theile des Halses mit einem 2ten Zweige zur Gegend der unteren Kinnlade geht, und sich um den äußeren Rand des *M. sternocleidomastoideus* herum beugt. Zuweilen entsteht auch vom 4ten Halsnerven ein veränderlicher, mit den vorigen beiden verbundener Hautnerv für den Hals. Endlich geht von dem 4ten Halsnerven oder von dem zu dem 5ten Halsnerven gehenden Verbindungsbogen ein vorderer, ein mittlerer und ein hinterer Oberschlüsselbeinnerv oder *Supraclavicularnerv*, *N. supraclavicularis*, ab. Die vorderen von diesen Nerven gehen über das Schlüsselbein, der hinterer geht über das Schulterblatt zur Haut der Brust und der Schulter. Zuweilen sind 4 solche Nerven da. Zuweilen entspringen alle diese 3 Nerven aus einem, öfter jedoch aus mehreren Stämmchen ¹⁾.

Uebersicht über die Muskeln, welche von den vier oberen Halsnerven Zweige bekommen.

Hierher gehören erstlich: die Seitenmuskeln, nämlich die *M. intertransversales colli*, der *Obliquus capitis inferior*, der *Scalenus medius*, und der *Levator anguli scapulae* ²⁾. Ferner die vorderen Muskeln, nämlich der *M. rectus capitis anticus minor* und *major*, und der *Longus colli*. Außer ihnen enthalten die zwischen dem Zungenbeine und der Brust gelegenen Muskeln, welche vom *Ramus descendens N. hypoglossi* Fäden empfangen, mittelbar Zweige von den Halsnerven, denn der *N. hypoglossus* nimmt, wie wir gesehen haben, Verbindungsfäden von mehreren oberen Halsnerven auf. Endlich erhält auch das Zwerchfell vom 4ten und 5ten Verbindungsbogen Nervenfasern. Die Hauptwurzel des *Zwerchfellnervens*, *N. phrenicus*, entspringt vom 4ten Halsnerven ³⁾.

¹⁾ Soel fand einmal, daß einer dieser Nerven das Schlüsselbein durchbohrt und dann zur Haut der Brust ging. (Die Rückenmarksnerven S. 39.)

²⁾ Nach Soel bekommen auch der *M. occipitalis*, der *Attollens auris*, die *Retrahentes*, der *Tragicus* und *Antitragicus* Nerven vom *N. occipitalis minor* und vom *N. auricularis magnus*, und nach eben demselben empfängt der *M. platysma myoides* Nerven vom *N. subcutaneus colli*. Dagegen erhält nach ihm der *Sternocleidomastoideus* von diesen Nerven keine Zweige.

³⁾ Nach Ehr. Jac. Baur in seiner trefflichen Schrift (*Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani*, Tübingae 1818. 4. p. 14.) scheidet der 4te Halsnerv auch Nette zu den *M. subclavius* und *omohyoideus* und außerdem kleine Zweige zu den die *A. subclavia* umgebenden Nervengeflechten. Von diesen letztern sagt er: „Sed et subtiliora filamenta arteriam subclaviam adeunt, ubi cum filis nervi sympathici, qui a ganglio cervicali infuso aut thoracico primo proficisci solent, conjunguntur, nec non cum ramulis noviter accedentibus nervorum cervicalium inferiorum, haud raro etiam cum filamentis rami descendentes nervi hypoglossi.... In hac arteria plexus itaque formatur, e quo filamenta tanquam radices profundiores nervi phrenici saepissime exeunt, nec non ramuli in arteria subclavia tam ad cor, quam ad brachium proficiscuntur, et porro cum ramis arteriae subclaviae divagantur, nominatim cum *A. thyreoidea inferioris* et *mammaria interna*. Hi nervuli hac in arteria versus interiora ac deorsum deducuntur in cavum pectoris cum ramis, qui a nervis dorsalibus ac-

Hintere Nests.

Die hinteren Nests der 3 oberen Halsnerven sind durch Verbindungsfasern vereinigt. Ein wichtiger, von ihnen entspringender Hautnerv ist der am Hinterhaupte zunächst der Mittellinie desselben verbreitete, vom 2ten Halsnerven entspringende große Hinterhauptnerv, *N. occipitalis magnus*, ferner ein vom 3ten Halsnerven kommender kleiner an der hinteren Seite des Halses emporsteigender Hautnerv, der die Nackenmuskeln durchbohrt, zuweilen kommt noch ein kleinerer mehr querlaufender Hautnerv vom 4ten Halsnerven, der hinten an der Mitte des Halses liegt.

Zu bemerken ist übrigens, daß die größeren Hautnerven wie der *Occipitalis magnus*, *minor* und der *Auricularis magnus* zuweilen aus Bündeln, die von mehreren Halsnerven kommen, ihren Anfang nehmen, und daß jeder von ihnen auch meistens einige Muskelzweige abgibt.

Uebersicht über die Muskeln, welche von den hinteren Nests der vier oberen Halsnerven Zweige bekommen.

Solche Zweige bekommen der *Rectus capitis posticus minor* und *major*, der *Obliquus superior* und *inferior*, der *Multifidus spinae*, die *Intertransversales*, zuweilen auch der *Rectus capitis lateralis*, ferner der *Transversalis cervicalis*, *Trachelomastoideus*, *Splenius capitis*, *Semispinalis colli* und der *Cucullaris* (vom 3ten Halsnerven).

Die vier obersten Halsnerven im Einzelnen.

Nervus cervicalis primus.

Der erste Halsnerv ¹⁾ ist mit den 2 untersten Kreuzbeinnerven der dünne unter allen Rückenmarksnerven. Dieser Nerv entspringt zuweilen nur mit einer Wurzel, und ist dadurch den Gehirnnerven ähnlich. Diese kommt wie die des *N. hypoglossus* vom vorderen Bündel des Rückenmarkes. Immer ist die vordere Wurzel dicker als die hintere. Sehr oft ist die hintere Wurzel durch einen Nervenast mit dem *Accessorius Willisii* verbunden, zuweilen geht sie ganz und gar in ihn über, zuweilen hängt sie nur mit demselben zusammen. An dieser Stelle des Zusammenhanges bildet sie zuweilen ein Geflecht ²⁾. Er geht durch

cedunt, junguntur, comitantque arteriam thymicam ortam a mammaria interna in cavum mediastini anticum, ubi vero ulterior disquisitio adipis copia impeditur.“

Auch *Gömmerring* und *Veipers* sahen Nests des 1ten Cervicalnerven zu der *Arteria subclavia* gehen (*Gömmerring* in seiner Schrift vom Bau des menschlichen Körpers. Th. 5. S. 270. und *Veipers* in *Ludwig scriptores neurol.* min. sel. T. IV. p. 44.)

¹⁾ *Winslow* nennt ihn *infra-occipitalis*. (*Expos. anat.* III. Nerves. n. 154.)

²⁾ *Morgagni*, *Epist. anat.* XVI. 8. Ferner auch *Vicq d'Azyr*, *Mém. de l'Ac. de Paris* 1781. p. 396. Siehe *J. F. Meckel. Handb. d. menschl. Anat.* III. 662.

Beschreibung der vier oberen Halsnerven im Einzelnen. 489

Spalte zwischen dem Atlas und dem Hinterhauptbeine unter der A. vertebralis zweifen auch über ihr) heraus, giebt vielleicht dieser einige Aestchen ¹⁾, und ist sich in 2 Zweige.

1) Der vordere Ast ist dünner, geht an der inneren Seite der A. vertebralis über dem Querfortsage vorwärts, giebt kleine Aeste zum M. rectus lateralis und zum Rectus anticus minor und major, geht dann vor dem Querfortsagewärts, und vereinigt sich mit dem vorderen Aste des 2ten Halsnerven in einem Bogen. Aus diesem Bogen gehen ein Ast zum N. vagus, ein Ast oder 2 Aeste zum Nervus hypoglossus, und ein Ast oder 2 Aeste zum Ganglion cervicale primum; bisweilen geht auch ein Ast zum Ramus descendens des N. hypoglossus, oder es fehlen auch die Verbindungsweige, die unmittelbar zum N. hypoglossus gehen, ganz, wo dann diese Verbindung mittelbar durch den zum N. vagus gehenden Zweig bewirkt wird. Wislows und Sabatier ²⁾ beschreiben auch ein Nervenweige des 1sten Halsnerven, welcher sich in den Wirbelcanal zu der A. vertebralis begiebt und sich mit einem Aste des 2ten Halsnerven verbindet ³⁾.

2) Der hintere Ast geht aufwärts rückwärts in den dreieckigen Raum zwischen den beiden M. M. obliquus und dem M. rectus posticus major, giebt den hinabgehenden Ast, der den M. obliquus inferior durchbohrt, und mit dem hinteren Aste des 2ten Halsnerven sich vereinigt; einen, der sich im M. rectus posticus major und minor vertheilt; einen zum M. complexus; und einen zum M. obliquus superior.

Der erste Halsnerv zeichnet sich dadurch aus, daß sein vorderer Ast kleiner als sein hinterer, daß er zuweilen nur eine vordere Wurzel hat, und endlich, daß er keinen einzigen Ast zur Haut schiekt.

Nervus cervicalis secundus.

1) Der vordere Ast geht unter dem unteren schiefen Kopfmuskel vorwärts, und vereinigt sich, wie schon gesagt, durch einen Zweig mit dem vorderen Aste des ersten Halsnerven, und durch einen 2ten abwärtssteigenden Zweig mit dem 3ten Halsnerven in einem Bogen. Die Nerven, welche aus dem ersten Bogen entspringen, sind schon erwähnt worden; aus dem 2ten Bogen entspringt ein Faden, der sich zum Ramus descendens des Hypoglossus begiebt, ferner kommen aus ihm meistens einige Fäden, die sich mit dem Accessorius Willisii vereinigen. Auch communiciren die vorderen Aeste des 2ten und 3ten Halsnerven, oft noch mehrere kleinere Zweige, und bisweilen geht von ihnen ein Faden zum Ganglion cervicale supremum des sympathischen Nerven.

2) Der hintere Ast, welcher gegen die Regel dicker ist, als der vordere, giebt einen Ast aufwärts, der mit dem hinteren Aste des ersten Halsnerven zusammenkommt, und schiekt dann einen Zweig abwärts, der sich mit dem hinteren Aste des dritten Halsnerven vereinigt. Hierauf giebt er einige Zweige zu den Nackenmuskeln, geht an der auswendigen Seite des M. obliquus inferior und des M. rectus posticus major, an der inwendigen Seite des M. complexus hinauf, giebt ferner bisweilen dem M. multifidus, ferner dem Biventer, Complexus und dem Sternocleidomastoideus, verbindet sich mit dem Beinerven, durchbohrt den M. biventer und cuticularis, und heißt nun Nervus occipitalis major. Er geht hierauf hinter dem Ramus occipitalis des 3ten Halsnerven am Hinterkopfe bis zum Scheitel hinauf, und theilt sich erst in 2, und dann in viele Aeste, welche mit den Aesten des ebengenannten Ramus occipitalis vom 3ten Halsnerven Gemeinschaft haben. Seine Verbindung desselben mit dem Facialis supraorbitalis und Temporalis superficialis konnte Bock nicht darstellen ⁴⁾.

¹⁾ *Wrisberg*, de nervis arteriis venisque comitantibus. §. 30. In syll. p. 66. Diese Fäden hat *Wrisberg* bis auf die Basilararterie verfolgt. *Bock* konnte sie nicht finden, sah aber Fäden zu dem Halsgelenke gehen. *Bock*, die Rückenmarksnerven etc. Leipzig 1827. 8. S. 20.

²⁾ *Sabatier*, sur les nerfs de la dixième paire; in *Mém. prés. à l'Ac. des sc. de Paris*. T. VII. abgedruckt in dessen *Traité d'anat.* T. III.

³⁾ *Handbuch der menschl. Anat.* III. 667.

⁴⁾ *Summerring* führt den *Murray* Diss. de sensibilitate ossium morbosa an, nach

490 Beschreibung der vier oberen Halsnerven im Einzelnen.

Nervus cervicalis tertius.

1) Der vordere Ast giebt einen Ast zum N. sympathicus; einen Verbindungsweig an der V. jugularis interna hinab, welcher mit dem Ramus descendens des N. hypoglossus zusammenkommt; einen Verbindungsweig rückwärts hinab, der sich mit einem Aste vom hinteren Aste des 4ten Halsnerven verbindet, und Aeste dem M. splenius, complexus, levator anguli scapulae schiebt. Hierauf vereinigt sich der vordere Ast mit einem herabgehenden Aste vom vorderen Aste des 2ten Halsnerven und mit dem N. accessorius Willisii, und giebt endlich den Nervus occipitalis minor. Dieser erhält vom hinteren Aste des 2ten Halsnerven einen herabkommenden Ast, schiebt zuweilen selbst einen Ast zum N. accessorius, geht hinter dem M. splenius fort, durchbohrt ihn und den M. cucullaris, giebt beiden Aeste, steigt zum Seitentheile des Hinterkopfs, hinter dem äußern Ohre und vor dem N. occipitalis major hinauf, und vertheilt sich daselbst, in Gemeinschaft mit diesem und dem Auricularis. Bisweilen verbindet er sich mit dem N. occipitalis magnus.

Wenn der vordere Ast des 3ten Halsnerven diesen Ramus occipitalis abgeben hat, so giebt er einen absteigenden Ast, der sich mit dem vorderen Aste des 4ten vereinigt, krümmt sich hierauf zur inwendigen Fläche des M. sternocleidomastoideus, und theilt sich in 2 Aeste. Nämlich

a. in den Nervus auricularis magnus. Er geht um den äußern Rand des M. sternocleidomastoideus herum, tritt auf dessen äußere Fläche, und dann zum Ohre schräg vorwärts hinauf, wo er sich in 2 Aeste theilt. Der vordere geht gegen den vorderen Rand des M. sternocleidomastoideus, giebt ein Fädchen zum folgenden Ramus subcutaneus colli, und vertheilt sich am äußern Ohre in Gemeinschaft mit dem N. facialis. Der hintere geht gegen den hinteren Rand des M. sternocleidomastoideus hinauf, zu den M. M. retrahentibus des Ohrs.

b. Ramus subcutaneus colli. Er geht auch, weiter unten liegend, als je ner, um den äußern Rand des M. sternocleidomastoideus herum, tritt auf dessen äußere Fläche, und theilt sich in einen oberen Ast, welcher sich mit den ihm entgegenkommenden Ramis subcutaneis und massetericis des N. facialis vereinigt, und sich auch am obersten Theile des Halses, und an der unteren Kinnbacke vertheilt, und in einen unteren Ast, der sich abwärts an der Seite des Halses bis gegen die Mitte hin verbreitet.

2) Der hintere Ast hat Gemeinschaft mit dem Nervus occipitalis major und mit dem hinteren Aste des 2ten Halsnerven, giebt Aeste dem M. complexus splenius, multifidus, dem Cucullaris und anderen Muskeln des Nackens, schiebt auch einen Zweig zur Haut am oberen Theile des Halses.

Nervus cervicalis quartus.

Der vierte Halsnerv giebt oft einen in den Vertebralescanal gehenden und von da zum unteren Halsknoten des sympathischen Nerven gehenden Zweig, und theilt sich dann in den vorderen und in den hinteren Ast.

1) Der vordere Ast nimmt einen vom vorderen Aste des 3ten Halsnerven zu ihm herabkommenden Ast auf, und giebt dann die Hauptwurzel des Nervus phrenicus, welche oft aus dem 4ten Nervenbogen hervorkommt.

Außerdem ist der vordere Ast durch 1 oder 2 Fäden mit dem Stamme, oder mit dem obersten, oder mit dem mittleren Halsknoten des sympathischen Nerven verbunden. Zuweilen durchbohrt ein solcher Verbindungsweig den M. longus colli. Der Nerv verbindet sich nun oft durch einen Faden mit dem 3ten Halsnerven, und giebt 2 bis 4 Oberschlüsselbeinnerven, Nervi supraclaviculares, welche über dem inneren, mittleren und äußeren Theile des Schlüsselbeins zur Haut der Brust, der Achsel und des Rückens hinabgehen.

2) Der hintere Ast giebt einen Ast rückwärts, der sich mit einem auch hinabgehenden Zweige des vorderen Astes des 3ten Halsnerven vereinigt, und vertheilt sich im M. multifidus, und in den benachbarten Nackenmuskeln.

welchem sich auch Fäden dieses Nerven bis in die Substanz des Hinterhauptbeins auf der Protuberantia heften sollen. Wod konnte sie gleichfalls nicht finden.

Die vier unteren Halsnerven zusammengenommen betrachtet.

Der oberste von ihnen hängt nicht immer durch einen Communicationszweig mit dem vierten Halsnerven zusammen. Auch communiciren die vier unteren Halsnerven nicht durch bogenförmig sich vereinigende Nervenfasern, sondern indem die Nervenfasern benachbarter Nerven unter einem spitzen Winkel zusammenkommen und sich zu größeren Bündeln verbinden. Ehe sie sich in einen hinteren und in einen vorderen Ast theilen, geben sie oft einen oder 2 Nervenfasern zu dem unteren Halsknoten oder zu dem obersten Rückenknoten des sympathischen Systems ab, welche durch den Canalis vertebralis hinabsteigen.

Vordere Nester.

Sie sind ausgezeichnet dick, und helfen vorzüglich die Armer-nerven bilden. Sie treten zwischen den Musculis intertransversalibus colli und zwischen dem Scalenus anterior und medius hervor.

Mehrere von ihnen geben Fasern für den mit vielen Wurzeln entspringenden N. phrenicus, den Zwerchfellnerven, ab, ferner einen Verbindungs-zweig zum mittleren oder unteren Halsknoten des sympathischen Nerven.

Der 5te und 6te, zuweilen auch der 7te Halsnerv giebt einen Fasern zu einem mit mehreren Wurzeln entspringenden und also zusammengesetzten Muskelnerve zu dem N. thoracicus posterior. Außerdem giebt der 5te Halsnerv noch einen Muskelnerve, den N. dorsalis scapulae. Beide Nerven betrachtet C. Bell als einen hinteren Athmungs-nerven. Von diesen größeren Muskelnerve soll, wenn die hinteren Nester der 4 unteren Halsnerven beschrieben worden sind, die Rede sein.

Hintere Nester.

Die hinteren Nester aller 4 unteren Halsnerven schicken zu den hinteren Nackenmuskeln Zweige, und der des 7ten und 8ten Halsnerven giebt ihnen Zweige zur Haut des Nackens und der Schulter ab.

Uebersicht über die Muskeln, welche von den vorderen Nesten der vier unteren Halsnerven Zweige bekommen.

Sie gehen theils zu Muskeln, welche hinten und an der Seite gelegen sind, namentlich zu den Musculis intertransversalibus anterioribus, zu dem M. serratus anticus major, levator scapulae, rhomboideus major und minor, scalenus anterior medius und anterior, theils zu vorderen Muskeln des Halses, namentlich zu dem M. longus colli, rectus capitis anticus major und minor, und zum Zwerchfelle.

Uebersicht über die Muskeln, welche von den hinteren Ästen der vier unteren Halsnerven Zweige bekommen.

Solche Zweige bekommen die Musculi interspinales, der M. multifidus spinae, der semispinalis, die Musculi intertransversales posteriores, der M. transversalis cervicis, der M. splenius capitis und colli, der M. biventer cervicis, der M. complexus, cervicalis descendens, trachelomastoidens und cucullaris.

Nervus phrenicus.

Der Zwerchfellnerv, nervus phrenicus, oder diaphragmaticus, entspringt beständig vom vorderen Aste des 4ten Halsnerven, erhält aber auch oft vom 3ten Halsnerven meistens auch vom 5ten oder vom 6ten und 7ten Halsnerven, bisweilen endlich von den beiden obersten Ästen des Plexus brachialis Fäden. Die oberste Wurzel desselben geht nicht selten von dem zwischen dem 3ten und 4ten Halsnerven befindlichen Verbindungsbogen aus.

Mit dem Ganglion cervicale medium und infimum steht er nach Boe ¹⁾ un mittelbar in Verbindung, weil er oft mit den Fäden verbunden ist, welche von den Halsnerven zu dem N. sympathicus gehen. Niemals sah ihn Boe mit dem N. hypoglossus mit dem N. vagus und mit dem 2ten Halsnerven verbunden, und eben so wenig fand er Zweige, welche der Nerv an den M. rectus anticus major scalenus, an die Thymusdrüse, an die obere Hohlvene, oder endlich an den Herzbeutel gegeben hätte.

Indessen haben Haller, Wrisberg, Ephr. Krüger ²⁾ und Chr. Jac. Baur eine Verbindung des N. phrenicus mit dem Ganglion cervicale infimum oder mit dem thoracicum primum zuweisen gesehen. Haller und Wrisberg sahen auch zuweilen eine Verbindung des N. phrenicus mit dem Ramus descendens des N. hypoglossus. Chr. Jac. Baur ³⁾ endlich behauptet nach eigenen Beobachtungen, daß der N. phrenicus dem Herzbeutel, da wo er mit ihm durch lockeres Zellgewebe verbunden ist, mehrere Äste zu geben pflege. Diefes sei öfters auf der rechten als auf der linken Seite der Fall. Dasselbe sagte schon vor ihm G. Coopmann ⁴⁾. Wrisberg ⁵⁾ dagegen konnte niemals solche Fäden finden.

Der Nervus phrenicus geht von seinem Ursprunge an dem äußern Rande des M. rectus anticus major vor dem obern Ende des M. scalenus anticus, vor dem Plexus brachialis, dann vor der A. subclavia, hinter der V. subclavia, schräg einwärts abwärts in die Brust, ferner vor den Vasis pulmonalibus, zwischen dem Herzbeutel und der Brusthaut zur obern Fläche des Zwerchfells hinab.

Der rechte Zwerchfellnerv liegt während seines Durchgangs durch die Brust weiter vorn, als der linke, und geht an der rechten Seite der Vena cava superior vorbei.

¹⁾ Haller, Elem. phys. III. p. 89. — Wrisberg, de nervis viscerum abdominalium. Sect. I. §. 7. (sah diese Verbindung mit dem N. hypoglossus in 57 Fällen 5 mal). — Ephr. Krüger, De nervo phrenico. Lipsiae 1759. §. 16.

²⁾ Chr. Jac. Baur, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani thoracis praesertim abdominisque. Tubingae 1818. 4. p. 18.

³⁾ G. Coopmann, Neurologia p. 419.

⁴⁾ Wrisberg, a. a. O. Sect. I.

Auf der obern Fläche des Zwerchfells theilt er sich in mehrere Äste, welche, nach Boë nicht durch Quersäben mit einander verbunden, sich in kleinere Äste vertheilen, die sich in dem fleischigen Theile des Zwerchfelles verbreiten, so daß die dickern Äste rückwärts, die dünnern vorwärts gehen.

Auf der rechten Seite durchbohrt ein hinterer größerer Zweig, ramus phrenico-abdominalis, das Zwerchfell, indem er entweder durch das Loch der Hohlvene, oder nahe neben demselben zur untern Seite des Zwerchfells übergeht, dem Lententheile desselben Fäden giebt, und sich mit den Fäden verbindet, welche als Plexus phrenicus neben der A. phrenica vom Plexus coeliacus des sympathischen Nerven heraufsteigen. An dieser Stelle entsteht ein Ganglion, Ganglion phrenicum. Der linke Zwerchfellnerv liegt etwas weiter nach hinten, ist etwas länger als der rechte, weil er sich um die Spitze des Herzens krümmen muß. Der Zweig, welcher von ihm zur untern Seite des Zwerchfells übergeht, durchbohrt das Zwerchfell, geht aber auch meistens durch das Foramen oesophageum, und steht durch viel dünnere Zweige mit dem sympathischen Nerven in Verbindung. Knochen finden sich nach Boë gewöhnlich nicht an ihm, und wenn sie in ältern Fällen da sind, so sind sie doch sehr klein.

Der hintere Schulterblattnerv. Nervus dorsalis scapulae.

Er entspringt vom 5ten Halsnerven, begleitet die A. dorsalis scapulae, mit welcher er an der innern Oberfläche des M. rhomboideus minor und major herabgeht. Er hängt mit dem hinteren Brustnerven durch einen Zweig zusammen, und giebt dem Serratus anticus major, dem Levator scapulae und den Rhomboideis Äste.

Hinterer Brustnerv. Nervus thoracicus posterior ¹⁾.

Dieser Nerv entspringt nach Boë vom vorderen Aste des 5ten, 6ten und 7ten Halsnerven. Die von diesen Nerven kommenden, ihn zusammensetzenden Nervenfäden durchbohren nämlich den M. scalenus medius und vereinigen sich nahe über dem vorderen Rande des M. serratus anticus major. Der hierdurch entstandene Stamm geht an der obern Oberfläche des Muskels gerade herab, und giebt demselben an vielen Stellen Zweige.

¹⁾ Diesen Nerven und den vorhergehenden, mit welchem er häufig zusammenhängt, nennt Boë den äußeren Athmungsnerven.

Das Armgeflecht, *plexus brachialis.*

Die Nerven des Armes entstehen aus einem Geflechte, *Plexus brachialis*, in welches 5 Nerven des Rückenmarks, nämlich die 4 unteren Halsnerven und der oberste Rückenerv sich vereinigen, unter denen gemeiniglich der 6te und 7te Halsnerv die dicksten sind.

Alle Nerven dieses ganzen Geflechtes gehen über der *A. subclavia* zwischen dem *M. scalenus anticus* und *medius* durch, geben Aclam Aeste diesen Muskeln, und den nahen Nackenmuskeln bisweilen auch Fäden zum *N. sympathicus magnus* und zum *phrenicus*. Sie vereinigen sich hierauf zum Armgeflechte, theils ehe sie zwischen jenen beiden Muskeln heraustraten, theils nachdem sie herausgetreten sind. Dieses Geflecht reicht von den Halswirbeln bis zu der Stelle der Achselhöhle, welche in gleicher Höhe mit der 2ten und 3ten Rippe liegt. Die Bahn, Lage und Verflechtungsart der Bündel, in welche sich hier die genannten Nerven spalten, ist veränderlich, und auf beiden Seiten nicht übereinstimmend. Nachdem aus diesem Geflechte eine Anzahl Nerven für den Arm hervorgegangen sind, verflechten sich zwar die Hauptstämme nicht mehr, wohl aber die in jedem derselben eingeschlossenen Bündel, und so wirkt, wie *Monro* bewiesen hat, ein solcher Austausch von Nervenbündeln bewirkt, daß zuletzt jeder beträchtliche Nervenzweig Fäden von fast allen den Rückenmarksnerven zu enthalten scheint, welche den *Plexus brachialis* zusammensetzen, und welche zur Bildung der Hauptstämme beitragen.

Die *Arteria axillaris*, welche anfangs auf der der Brust zugekehrten Seite des *Plexus brachialis* liegt, geht unten so durch ihn hindurch, daß sie an der dem Arme zugekehrten Seite der Nerven zu liegen kommt.

Nachdem die zu dem *Plexus brachialis* gehörenden Nerven zwischen dem *Scalenus anterior* und *medius* herausgetreten sind, geben sie die *Nervos thoracicos anteriores*, den *Nervus suprascapularis*, und die *Nervos subscapulares*.

Nervi thoracici anteriores.

Die äußeren Brustnerven sind von unbeständiger Anzahl (2 bis 3), kommen vom gemeinschaftlichen Stamme des *N. medianus* und des *Musculo-cutaneus*, oder von der Vereinigung des 5ten und 6ten, und des 7ten und 8ten Halsnerven, gehen an der Brust hinab, und vertheilen sich zum *M. pectoralis major* und *minor*. Sie begleiten die *Arterias thoracicas anteriores*, und ein Faden scheint zum *Acromialgelenke* des Schlüsselbeins zu gelangen.

Nervus suprascapularis.

Der Oberschulterblattnerv kommt vom 5ten, zuweilen auch vom 6ten Halsnerven, oder vom 5ten und 7ten, geht rückwärts durch die Incisura suprascapularis des Schulterblattes, und vertheilt sich in die Muskeln des Schulterblattes, dem M. supraspinatus, infraspinatus, teres minor und subscapularis, und begleitet also die A. transversa scapulae.

Nervi subscapulares.

Die Unterschulterblattnerven entstehen vorzüglich von den 4 unteren Halsnerven hervorgegangenen Stämmen. Ihre Zahl ist nicht bestimmt. Es sind ihrer ungefähr 3. Nicht selten entspringt einer von ihnen vom N. axillaris. Einer von ihnen, der lange Unterschulterblattnerv, N. subscapularis longus geht zwischen dem M. serratus anticus major und dem Subscapularis herab zum vorderen Theile des Latissimus dorsi, in welchem allein er sich endigt. Jeder Nerv ist zuweilen ein Ast des N. radialis ¹⁾.

Nervenstämme des Arms.

Ihrer sind, wenn man den Hautnerven hinwegrechnet, welcher vom 2ten Brustnerven zu entspringen pflegt, sieben. Die 2 ersten sind nur Hautnerven; die übrigen Muskel- und Hautnerven zugleich. Die 3 letzten durchlaufen die ganze Länge des Arms, und endigen sich als Hautnerven in den Fingerspitzen. Ihnen muß man jedoch den in den Fingerspitzen so sehr ausgebildeten Tastsinn zuschreiben. Die hier zu beschreibenden Nerven des Arms will ich sogleich auflisten und dabei die Zahl der Halsnerven oder derjenigen Rückenmarksnerven beifügen, von welchen sie entspringen ²⁾.

- 1) Nervus cutaneus internus minor, welcher oft ganz fehlt und in seinem Ursprunge unbestimmt ist.
- 2) Nervus cutaneus internus major oder cutaneus medius 8. 1.

Nach Santorini gehört er sowohl dem M. serratus anticus major als dem Latissimus dorsi an, und verbindet sich auch mit den an der Seite der Brust zwischen dem Brustbein hervordringenden Zweigen der Intercostalnerven. (Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani thoracis praesertim abdominalisque. Tubingae 1818. 4. p. 17 et 23. Er nennt diesen Nerv N. thoracicus longus.

Siehe hier die Zahlen her, wie sie von Antonio Scarpa (Anatomicarum annotationum Lib. I. De nervorum gangliis et plexibus p. 94) angegeben worden sind, bemerke aber, daß die Natur hinsichtlich dieser Zahlen keine bestimmte Regel beobachtet, was auch Scarpa selbst sagt.

3) Nervus musculo-cutaneus	5. 6. 7.
4) Nervus axillaris	5. 6. 7.
5) Nervus medianus	5. 6. 7. 8.
6) Nervus radialis	6. 7. 8.
7) Nervus ulnaris	7. 8. 1.

1. Nervus cutaneus internus minor.

Der innere Hautnerv, nervus cutaneus internus ¹⁾ liegt dicht an der Arteria axillaris, geht an der innern Seite des Oberarms unter der Haut herab, vereinigt sich mit dem hinteren inneren Hautnerven, und theilt sich in einen Ast, der sich in der Haut, die den M. triceps bedeckt, in Zweige theilt und in einen zur Gegend des Olecranon herabgehenden Ast. Dieser Nerv fehlt bisweilen ganz, und wird von Scarpa nicht mit unter den aus dem Plexus brachialis entspringenden Nerven aufgezählt.

2. Nervus cutaneus medius oder internus major.

Der mittlere Hautnerv, nervus cutaneus internus major s. medius, geht an der innern vordern Seite des Oberarms in der Gegend des N. medianus, dicht unter der Fascia herab, giebt einen oder 2 Hautzweige, die sich über der Fascia zu der den Biceps bedeckenden Haut begeben, durchbohrt etwa in der Mitte am Oberarme die Fascia, schiebt einige Nester über die V. mediana am Ellenbogen herab, und andere zur Haut am Condylus internus, und theilt sich am Ellenbogengelenke in 2 Nester.

1) Ramus cutaneus ulnaris geht über die Vena basilica hin, giebt Nester zur Haut unterhalb des Olecranon Nester, welche die V. mediana umschlingen, geht dann längs der Ulna zur Hand hinab, und verbreitet sich in der Haut.

2) Ramus cutaneus palmaris geht vor oder hinter dem Ende der Medianvene zur Beugeseite des Unterarms und dicht unter der Haut hinab, und endigt sich in der Gegend des Os pisiforme, wo er sich mit dem Handrückenaste des Ulnarnerven verbindet.

3. Nervus musculo-cutaneus, oder cutaneus externus.

Der äußere Muskelhautnerv, oder der äußere Hautnerv, nervus cutaneus externus oder perforans Casseri, geht, vom N. medianus abweichend, an der innern Seite des M. coracobrachialis hinab, durchbohrt denselben meistens unter einem sehr spitzen Winkel, so, daß er an die äußere Seite desselben gelangt, und liegt nun

¹⁾ *Klein*, Cap. V. p. 35. 299.

nachdem er beiden Aeste abgegeben hat, zwischen ihm und dem M. biceps ¹⁾).

Dann geht er am Oberarme zwischen dem M. biceps und dem M. brachialis internus hinab, durchbohrt hinter der Sehne des Biceps die Fascia, giebt kleine Hautzweige, und theilt sich, höher oder tiefer, in 2 größere Hautäste.

Der innere ist dünner, und geht vor dem Supinator longus an der inneren Seite des Radius bis zur Handwurzel.

Der äußere Ast, der an der innern Seite des Latus radiale bis zur Hand hinabgeht, und sich nach und nach in der Haut vertheilt, geht oben unter der V. mediana hinweg. In der Gegend des Flexor radialis und M. palmaris longus, theilt er sich nach und nach in Aeste, welche in die Haut gehen. Am Vorderarme begleitet dieser Ast die Vena cephalica, und in der Ellenbogenbuge schlagen sich gemeinlich einige Aeste desselben über diese Vene hinüber.

4. Nervus axillaris.

Der Achselnerv, nervus axillaris s. articularis, giebt Aeste zur Haut und den Drüsen der Achsel, geht zum untern Rande des Schultergürtels hinab, giebt zuweilen Aeste zum M. teres major und subscapularis, schlägt sich dann zwischen jenen 2 Muskeln und dem M. triceps an das Schulterblattgelenk rückwärts herum, begleitet also die A. circumflexa scapulae, und giebt einen Hautnerven, der sich um den hinteren Rand des Deltamuskels herumwendet.

Die Fortsetzung desselben geht mit der A. circumflexa humeri posterior in den Teres minor zur Haut und in den Deltamuskel.

5. Nervus medianus.

Der Mittelnerv, nervus medianus, ist nächst dem N. radialis der wichtigste Nerv des Arms, umfaßt gemeinlich, indem er sich spaltet, der aus 2 Wurzeln entsteht, die Arteria axillaris, giebt Fäden zum Stamme des Nervus cubitalis und cutaneus internus ab, meist auch einen Ramus cutaneus, der seltner aus jenem Stamme kommt, und geht dann an der innern Seite des Oberarms, auf der Arteria brachialis, und weiter unten an ihrer inneren Seite bis in das Interstitium cubiti. Er liegt hierauf zwischen dem Pronator teres und dem Supinator longus, und wird unter der Aponeurosis des M. biceps geborgen. Die Arterie selbst erhält auf diesem Wege von ihm kleine Zweige.

¹⁾ Ein kleiner Ast bringt nach Klint mit einer A. nutritia in den Oberarmknochen. (Klint §. 3.)

Größere Zweige giebt er aber bis hierher meistens nicht. Nur zuweilen verbindet er sich hinter dem Biceps durch einen Quersweig mit dem N. musculo-cutaneus.

Im Interstitium cubiti durchbohrt er entweder den M. pronator teres, oder geht unter ihm weg, giebt einen Ast zum Pronator teres, der einen Zweig durch den Muskel zur Haut schickt, ferner einen Zweig zum Flexor radialis, und kleinere Zweige zum Flexor sublimis.

Außerdem entspringt hier der wichtige Nervus interosseus volaris, den manche Anatomen auch den tiefen Ast des N. medianus nennen, (der bisweilen von einem Faden des Nervus radialis, welcher das Ligamentum interosseum durchbohrt, verstärkt wird.) Er giebt Aeste dem Flexor longus pollicis, dem Flexor profundus, dann geht er die Vasa interossea begleitend hinab, und schickt dem Flexor profundus, dem Flexor pollicis longus, und dem Pronator quadratus Aeste.

Die Fortsetzung des Stammes des Nervus medianus oder sein oberflächlicher Zweig geht zwischen dem Flexor sublimis und dem Flexor profundus hinab, giebt unterweges einen Ast dem Flexor sublimis, und einen langen Hautnerven für die Hohlhand ¹⁾.

Nun theilt er sich erst in 2 Aeste, geht mit den Beugeflecken unter dem Ligamentum carpi proprium durch (oder theilt sich erst unter diesem). Während dieses Durchganges giebt er einen Ast zum Abductor pollicis, und einen Ramus communicans zum Ramus volaris des N. ulnaris, und spaltet sich hierauf von neuem, so daß 4 Zweige entstehen.

Seine Rami digitales volares gehen unter der Aponeurosis palmaris an den Beugeflecken des M. sublimis hinab zu den Fingern, für welche sie bestimmt sind. Diese Aeste sind: ein Ast für die Radialseite des Daumens; ein Ast für die 2 einander zugekehrten Seiten des Daumens und des Zeigefingers; ein Ast für die einander zugekehrten Seiten des Zeigefingers und des Mittelfingers, und endlich ein Ast für die einander zugekehrten Seiten des Mittelfingers und des 4ten Fingert. Mehrere dieser Zweige geben Aeste zur Haut und zu einigen Lumbri-
calmuskeln.

6. Nervus radialis.

Der Speichennerv, nervus radialis, ist der dickste aller Nerven des Arms, liegt anfangs zwischen der A. axillaris und dem N. cubi-

¹⁾ Dieser die Fascia des Vorderarms durchbohrende Hautnerv entspringt zuweilen aus der Vereinigung des Musculo-cutaneus und des Ramus dorsalis des N. radialis.

alis, begleitet dann die A. profunda brachii, giebt einen Hautzweig zu dem Theile der Haut, welcher den Anconaeus longus bedeckt; einen Ast zu dem Anconaeus longus selbst, und Aeste zum Anconaeus internus und externus. Vor dem zu dem Anconaeus internus gehenden Zweige kommt, nach Poë, ein langer Faden, welcher neben der A. collateralis ulnaris zur Kapsel des Ellenbogengelenks geht.

Nun geht der Nerv in dem Zwischenraume zwischen den 3 Köpfen des Triceps hinter dem Oberarmknochen herum, und giebt den oberen äußeren Hautnerven des Arms, der zwischen dem Brachialis internus und Supinator die Fascia durchbohrt, und sich auf der Streckseite des Unterarms zuweilen bis zur Hand herab verbreitet. Der N. radialis schickt nun einen Ast zum Flexor radialis, einige zum Supinator longus und brevis, und theilt sich dann in den Ramus superficialis und profundus.

Der tiefe Ast, ramus profundus, könnte auch N. interosseus dorsalis heißen, denn er geht zu den nämlichen Theilen als die A. interossea dorsalis, mit dem Unterschiede jedoch, daß er nicht das Ligamentum interosseum durchbohrt, sondern um den Radius herum zur Rückenseite des Vorderarms geht, indem er meistens den Supinator revis durchbohrt, bisweilen um ihn herumgeht. Er gebt den am Rücken des Vorderarms liegenden Streckmuskeln an, und erstreckt sich auch zur Kapsel des Handgelenks.

Der oberflächliche Ast, ramus superficialis, giebt Aeste den Extensoribus radialibus, und geht neben der A. radialis hinab.

Der vordere Ast desselben hat Gemeinschaft mit dem N. musculospiritalis, giebt Aeste dem Abductor brevis, dem Opponens, und wird dann Ramus dorsalis radialis Pollicis.

Der hintere Ast geht zwischen dem Os metacarpi pollicis und Indicis gegen den Handrücken hinab, giebt Hautzweige zur Haut der Handwurzel und der Mittelhand, und spaltet sich wieder in 2 Aeste: Der eine Ast, nachdem er kleine Zweige zur Haut gegeben, und einen zwischen den Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers einringenden Faden abgegeben hat, spaltet sich gabelförmig in den N. dorsalis ulnaris pollicis und in den N. radialis indicis.

Der andere Ast, nachdem er kleine Hautzweige zur Mittelhand gegeben hat, spaltet sich in den N. dorsalis ulnaris indicis und in den N. radialis digiti medii. Dst spaltet sich dieser letztere Ast nochmals, und schickt also einen Zweig, der den einander zugewendeten Rändern des Mittel- und Ringfingers Aeste giebt. Bisweilen kommen auch diese letzteren Aeste aus einer Verbindung des Radial- und Ulnarnerven auf den Handrücken.

7. Nervus ulnaris.

Der Ellenbogennerv, *nervus ulnaris s. cubitalis*, wird durch einen Faden mit dem *N. radialis* Gemeinschaft hat, liegt anfänglich hinter den *Vasis axillaribus*, geht an der innern Seite des Oberarms hinab, und giebt bisweilen einen innern Hautnerven des Oberarms, welcher sich in der Haut am *Olecranon* etwas tiefer herab vertheilt; der Ulnarnerv erreicht nun die Vertiefung am *Condylus internus*, und durch dieselbe ¹⁾ zum Unterarme, wo er am *Latus ulnare* liegt.

Noch in jener Vertiefung giebt er einen Ast dem *Flexor ulnaris*, geht dann neben der *Arteria ulnaris* längs der *Ulna* zwischen *Flexor ulnaris* und dem *Sublimis* hinab, giebt unterwegs einen 2. Ast dem *Flexor profundus*; einen langen Ast, der sich um die *A. ulnaris* herumkrümmt, und zur Haut der *Vola* hinabgeht, theilt sich an der Handwurzel in 2 Äste:

Der Handrückenaast, *ramus dorsalis*, kommt zwischen *Flexor ulnaris* und der *Ulna* auf den Rücken der Hand und zugleich durch die *Fascia*, giebt *Ramos cutaneos* zu dem benachbarten Theile der Haut der Hand, schieft ferner einen *Ramus carpeus dorsalis*, und theilt sich dann in *Ramos digitales dorsales*, nämlich in den *Ramus ulnaris digiti minimi*, und in 2 Zweige, von welchen der eine den 2. und 3. an der zugewendeten Seiten des 5ten und 4ten Fingers, der andere den einander zugewendeten Seiten des 4ten und des 3ten Fingers stimmt ist. Der letztere Zweig verbindet sich mit dem Rückenast des Speichennerven, und ist zuweilen so dünn, daß er nur die Verbindung bewirkt, und daß die 2 zuletzt genannten Seiten der Finger vom Ulnarnerven ihre Nervenfasern erhalten, oder daß wenigstens die Ulnarseite des 3ten Fingers noch vom Radialnerven ihre Nerven erhält.

Der Hohlhandast, *ramus volaris*, ist die Fortsetzung des Stammes. Er lenkt sich zwischen dem *Os pisiforme* und dem *Ligamentum carpi volare proprium* auf die Hohlhandseite der Handwurzel, giebt einen Ast zum *Abductor digiti minimi*, schieft die beiden *Ramos volares digiti minimi*, und den *Ramus volaris ulnaris digiti quarti*, welcher sich mit einem Ast des Medianernerven vereinigt, und einen *Ramus profundus*, der sich so, wie der *Arcus profundus* der *A. ulnaris* unter den Beugemuskeln verbirgt und gegen das *Ligamentum radiale* der Hand hinkrümmt, und den *M. M. lumbricalibus* und *interossei* Äste giebt.

¹⁾ Wenn man sich an diese Stelle stößt, so fühlt man einen empfindlichen Schmerz, von einem elektrischen Stöße, der sich bis in den kleinen Finger hinab erstreckt.

Verbreitung der Nerven an den Fingern.

Jeder Finger hat 2 größere Hohlhandzweige, die an seinen 2 Rändern fortgehen und 2 dünne Rückennerven, welche an den 2 Rändern jedes Fingers bis an das 2te Gelenk gehen. Nur bei dem Daumen erstrecken sich die Rückenzweige bis zur Nagelwurzel.

Sowohl jene als diese geben längs den Fingern Nestchen zur Haut derselben.

Der Hohlhandnerv jedes Fingers giebt nach Boë in der Nähe des ersten Fingergelenks einen ansehnlichen Ast zum Rücken des Fingers, der sich am ersten Gelenke mit Zweigen des Rückennerven verbindet, und sich dann zur Haut des Rückens des 3ten Gliedes begiebt. Jeder Rückennerv und Hohlhandnerv der Finger giebt eine Menge kurzer Zweige zur Haut. Diese Zweige vereinigen sich, nach Boë, nicht an der Mittellinie jedes Fingers und eben so wenig an der Spitze, wo sich die Endäste auf jeder Seite mehrfach spalten. Einige Zweige bringen aber nahe am Knochenende durch die Flechenscheide, und gehen in die Kapseln der Fingergelenke über.

Es ist sehr merkwürdig, daß die Anastomosen, welche an den Gesichtsnerven und an den Rückenmarksnerven in der Nähe der Wirbelsäule so häufig sind, nach den Enden der Extremitäten hin immer seltener werden. Beständig sind hier nur die Verbindungen zwischen dem Endaste des Musculo-cutaneus und dem Rückenaste des N. radialis, des Cutaneus medius und dem Rückenaste des N. ulnaris, des N. radialis und des Ramus dorsalis nervi ulnaris, endlich die des N. medianus und des Ramus volaris n. ulnaris ¹⁾.

Uebersicht über die Haut- und Muskelnerven, welche von den vier unteren Halsnerven und vom Verbindungszweige des ersten Brustnerven entspringen.

Zuerst wollen wir die am Halse, dann die an der Schulter und an dem Oberarme, und endlich die am Oberarme, Vorderarme und an der Hand gelegenen Muskeln nennen, welche von den 4 unteren Halsnerven Aeste erhalten. Die Muskeln am Halse wollen wir selbst wieder in hintere Muskeln, Seitenmuskeln und vordere Muskeln unterscheiden: Eben so wollen wir zuerst die Hautnerven am Halse und dann die am Arme aufzählen.

¹⁾ Siehe K. Boë in seinem werthvollen Werke: Die Rückenmarksnerven nach ihren ganzen Verläufe, Verteilungen und Verbindungen, nebst Abbildungen derselben auf 4 R. Leipzig 1827. S. 78.

502 Uebersicht d. Haut u. Muskeläste der vier unt. Halsnerven.

Uebersicht über die Halsmuskeln, welche von den vier unteren Halsnerven Zweige erhalten.

Von den hinteren Nerven derselben erhalten Zweige die *Musculi inter-spinales und intertransversales posteriores*, der *M. multifidus spinae, semispinalis cervicis, splenius capitis und colli, biventer cervicis, complexus, cervicalis descendens, trachelomastoideus und cucullaris*.

Von den vorderen Nerven derselben erhalten Zweige theils die Seitenmuskeln, namentlich die *Musculi intertransversales anteriores*, der *M. serratus anticus major, levator scapulae, rhomboideus major und minor, scalenus posterior, medius und anterior*, theils die vorderen Muskeln, namentlich der *M. longus colli, rectus capitis anticus major und minor*, und das Zwerchfell.

Uebersicht über die Schulter- und Armmuskeln, welche Nerven aus dem Plexus brachialis bekommen ¹⁾.

Der *M. supraspinatus und infraspinatus* erhält seine Nerven von dem *N. suprascapularis*, der *M. pectoralis major und minor* bekommt sie von den *Nervis thoracicis externis*, der *M. subscapularis, teres major, latissimus dorsi, teres minor*, und *deltoideus* empfangen sie aus den *Subscapularnerven und Achselnerven*.

Uebersicht über die Muskeln des Oberarms, Unterarms und der Hand, die ihre Nerven von den Stämmen der Armnerven erhalten.

Die Beugemuskeln des Oberarms und des Vorderarms, namentlich der *M. coraco-brachialis biceps und brachialis internus* bekommen ihre Nerven vom *N. musculo-cutaneus*.

Die Streckmuskeln des Oberarms und des Vorderarms, namentlich die 3 Köpfe des *M. triceps*, erhalten ihre Nerven von dem *N. radialis*.

Die auf dem Rücken des Vorderarms gelegenen *Supinatoren* und die Streckmuskeln der Hand und der Finger bekommen ihre Nerven vom *N. radialis*, die sehr tiefliegenden Streckmuskeln der Hand und der Finger von einem Aste desselben, von dem *N. interosseus dorsalis*.

Die *Pronatoren*, die Beugemuskeln der Hand und der Finger, namentlich der *M. flexor carpi radialis, der M. palmaris longus, der M. flexor digitorum communis sublimis und profundus*, bekommen ihre Nerven vom *N. medianus*, und zwar die tiefliegenden Muskeln vom *Ramus interosseus volaris* desselben.

Der *N. ulnaris* giebt nur einigen Beugemuskeln Nerven, namentlich dem *Flexor digitorum profundus* und dem *Flexor carpi ulnaris*.

Die kurzen an der Hand gelegenen Muskeln erhalten ihre Nerven vom *N. medianus und ulnaris*, nicht vom *N. radialis* und zwar alle diese Muskeln erhalten sie von der Hohlhand aus, namentlich der *M. palmaris brevis* die kurzen Muskeln am Ballen des kleinen Fingers und die *M. interossei interni und externi* sämtlicher 4 kleineren Finger vom *N. ulnaris*, vorzüglich vom *Ramus profundus* desselben, der in der Hohlhand neben dem *Arcus profundus* der Arterien liegt. Die meisten *Lumbricalmuskeln* (Beuger des ersten Gliedes der Finger) und die kleinen Muskeln am Ballen des Daumens erhalten ihre Nerven vom *N. medianus*.

Uebersicht über die Hautnerven am Halse.

Die von den hinteren Nerven entspringenden Hautnerven schlagen sich theils wie der *N. occipitalis magnus* hinten am Kopfe bis zum Scheitel hinauf, theils gehen einige derselben, die aber nicht immer vorhanden sind, am mittleren und unteren Theile des Rückens nach hinten.

¹⁾ Koch (a. a. S.) in der Berrede, hat gezeigt, daß der *M. teres minor und subscapularis* ihre Nerven nicht vom *N. suprascapularis*, wie Hildebrandt (siehe oben S. 495) und die meisten anderen Anatomen annehmen, erhalte, sondern von den *Subscapular- und Achselnerven*. Nach ihm schicken auch die *Nervi thoracici anteriores* gar keine Hautnerven und keine Nerven für die *Mamma ad*.

Die von den vorderen Aesten entspringenden Hautnerven bewegen sich nicht wie an der Brust bogenförmig um den Hals nach vorn herum, sondern verhalten sich wie die an der Brust befindlichen Seitenäste der vorderen Hautnerven. Sie schlagen sich zum Theil am Kopfe hinauf, zum Theil an der Brust und Schulter hinab. Der 3te, 4te und 5te Halsnerv sind der Mittelpunkt, von welchem diese Nerven ausgehen. Vom 3ten Halsnerven geht nämlich an der Seite des Kopfs hinauf der N. occipitalis minor und auricularis magnus, an der Seite des Halses um den M. sternocleidomastoideus nach vorn herum läuft, der vom 3ten Halsnerven entspringende, mit dem N. facialis communicirende mittlere Hautnerv des Halses, und zuweilen noch einer aus dem 4ten. Endlich kommen aus ihnen die über die Schulter und an der Brust eine kleine Strecke herabgehenden Supraclavicularnerven. Besondere vordere Hautnerven giebt es am Halse nicht.

Uebersicht über die Hautnerven des Arms.

Der N. phrenicus, der N. dorsalis scapulae, der N. thoracicus posterior, der N. suprascapularis, die Nervi subscapulares, und die Nervi thoracici externi sind Muskelnerven, und scheinen keine Hautnerven abzugeben. Der N. cutaneus medius und der Cutaneus internus dagegen sind nur Hautnerven.

Ein oberer Hautnerv des Arms, der zu dem den Deltoideus bedeckenden Theile der Haut geht, und sich hinten um diesen Muskel herumkrümmt, entspringt vom N. axillaris, (die übrigen Hautnerven der Schulter kommen von den Supraclavicularnerven).

Die hinteren Hautnerven am Oberarme, die zu dem den Triceps bedeckenden Theile der Haut gehen, entspringen vom N. cutaneus internus, und von einem aus dem 2ten Rückenerven abgehenden Hautaste.

Die Hautnerven für den Rücken des Vorderarms entspringen von dem zwischen dem M. brachialis internus und M. triceps hervorkommenden Hautaste des Radialnerven.

Die Hautnerven für die innere Seite des Oberarms kommen vom N. radialis und cutaneus medius, die für den Rücken und für die Polarseite des Vorderarms in der Nähe der Ulna kommen aus dem Cutaneus medius. Diese Hautnerven reichen meistens bis an die Hand herab.

Die Hautnerven für die Rücken- und Polarseite des Vorderarms in der Nähe des Radius entspringen vom N. musculo-cutaneus, und reichen meistens bis zur Haut der Hand hinab.

Die Hohlhand bekommt einen besondern beträchtlichen Hautnerven vom Medianus, und einen nicht unbeträchtlichen Hautnerven vom Ulnaris.

Der Handrücken erhält dagegen nur kleinere Aeste vom N. radialis und N. ulnaris.

Nervi pectorales, die Brust- oder Rückenerven.

Ihrer sind in der Regel 12 auf jeder Seite. Der erste liegt zwischen dem 1sten und dem 2ten Brustwirbel, der letzte zwischen dem 12ten Brustwirbel und dem ersten Lendenwirbel. (Hallers nahm nur 11 Brustnerven an und zählte den 12ten zu den Lendenerven.)

Rechnet man den 1sten Brustnerven hinweg, so sind die übrigen, mit den 4 unteren Halsnerven und mit den Lendenerven verglichen, sehr dünn. Häufig verbinden sie sich innerhalb des Wirbelcanals durch Fäden, welche von der Wurzel des einen zur Wurzel des anderen Nerven herübergehen. Bei den 2 ersten ist diese Verbindung am bedeutigsten. Dagegen vereinigen sich, wie Boë bewiesen hat, die vordern

und hintern Aeste der Rückenmarksnerven nicht durch constante und in der Regel vorhandene anastomosirende Zweige. Nahe am Zwischenwirbelloche spaltet sich jeder Nerv in den größeren vorderen und in den kleineren hinteren Ast.

Bordere Aeste der Brustnerven, oder die Zwischenrippennerven. Nervi intercostales.

Jeder vordere Ast verbindet sich durch einen oder 2 Fäden mit dem benachbarten Knoten des sympathischen Nerven, oder mit dem Grenzstrange desselben. Anfangs liegen die vorderen Aeste in der Rinne am unteren Rande der Rippen über dem M. intercostalis, und sind unter den Sehnenfasern der innern Intercostalmuskeln verborgen. Hierauf verlassen sie diese Rinne, und liegen unter dem unteren Rande der Rippen. Die 3 obersten Intercostalnerven liegen indessen nach Baur zuweilen in der Mitte des Zwischenrippenraums, oder neben dem oberen Rande der tieferen Rippe, welche diesen Raum einschließen hilft. Alle Zwischenrippennerven, mit Ausnahme der oberen, gehen nach Baur zwischen den äußeren und inneren Intercostalmuskeln hin. Nur die oberen fand er oft zwischen der Pleura und den Intercostalmuskeln liegend.

Die Aeste benachbarter Intercostalnerven vereinigen sich nach Bock zuweilen, indem dieser oder jener Ast über die benachbarte Rippe zu dem nächsten Zwischenrippenraume herab oder hinauf geht.

Jeder Intercostalnerve giebt mehrere kleinere Aeste, an die Intercostalmuskeln, zu dem M. serratus posticus superior oder zu dem inferior, dann 2 größere Aeste zu den Intercostalmuskeln, einen nämlich hinten und einen zweiten etwas weiter vorn. Dieser letztere geht zwischen dem M. intercostalis externus und internus am oberen Rande der nächst tieferen Rippe vorwärts, und gehört dem M. intercostalis internus an. Zuweilen sind an seiner Statt 2 kleinere Aeste vorhanden.

Nur sehr kleine und unbestimmte Nervenfäden gehen zum Serratus anticus major.

Außer diesen Muskelästen giebt jeder Intercostalnerve vom 2ten Brustnerven an, nach Baur und Bock ungefähr auf der Hälfte seines Wegs, einen Hautnerven für die Seite der Brust oder des Bauchs, den man den äußeren Hautnerven nennt.

Der vom 2ten bis 7ten Brustnerven entspringende äußere Hautnerv tritt zwischen den Zacken des Serratus anticus major, der vom 8ten bis 11ten Brustnerven kommende tritt zwischen den Zacken des Obliquus externus hervor zur Haut. Jeder ist schon da, wo er noch zwischen diesen Muskeln verborgen liegt in 2 Zweige gespalten, von welchem der eine sich nach Bock quer nach vorn, der andere quer nach hinten um die Brust oder um den Bauch herum schlägt.

Jene vorderen Zweige der äußeren Hautnerven sind vieler, zumal die, welche vom 8ten bis 11ten Unterrippennerven entspringen, denn diese übertreffen noch die nämlichen Nette an Umfang, welche vom 2ten bis 7ten Unterrippennerven abgegeben werden. Sie gehören der Haut an, sind indessen nicht überall nur der Haut bestimmt, sondern die vom 8ten bis 11ten Unterrippennerven entspringenden geben auch einen Faden an den *M. obliquus externus*. Unstreitig sind sie eben deswegen etwas dicker.

Die hinteren Zweige der äußeren Hautnerven sind im Allgemeinen kleiner, schlagen sich nach hinten herum, und verbreiten sich in der Haut der Seite und in der des Rückens, welche den *Latissimus dorsi* bedeckt.

Die Fortsetzung des Stammes der Intercostalnerven geht bei dem 2ten bis 7ten Intercostalnerven an den Rippen und Rippenknorpeln bogenförmig nach vorn. Sie bringt, nachdem sie kleine Zweige zu den Intercostalmuskeln und hier und da zu dem *M. triangularis sterni* gegeben hat, an dem Rande des Brustbeins durch den großen Brustmuskel, jedoch nach *Boa*, ohne ihm Zweige zu geben, verbreitet sich daselbst, bildet die vordersten Hautnerven der Brust, und gehet mit einem Aste den äußeren Hautnerven entgegen.

Nach *Baur* sollen auch von diesen vorderen Enden der 6 oberen Intercostalnerven Nette zum *M. triangularis sterni* gehen, auch sollen dünne Zweige zur *A. mammaria interna* gelangen. Da, wo diese Arterie die *A. pericardiacophrenica* abgiebt, kommt nach ihm ein sehr dünner Zweig zu dem pericardium um am Zwerchfelle; auch begleiten, wie er behauptet, kleine Nestschen des 5ten, 6ten und 7ten Intercostalnerven die anderen Nette der *A. mammaria interna*, vorzüglich den *Ramus epigastricus* derselben. Einmal glaubt er sogar ein Fädchen zur *Veura* verfolgt zu haben ¹⁾.

Die Fortsetzung des Stammes des 8ten bis 11ten Brustnerven ist stärker als die der höher oben gelegenen Brustnerven. Diese Nerven treten, nachdem sie auch kleine Zweige zu den Intercostalmuskeln gegeben haben, hinter den Knorpeln der falschen Rippen (der Bauchrippen) und zwischen den Sacken des Zwerchfells ²⁾, und dann zwischen dem *M. obliquus internus* und *transversus* in ziemlich querrer Richtung vorwärts, und zugleich etwas abwärts, geben diesen 2 Muskeln Zweige, verbinden sich hier und da unter einander ³⁾, treten dann in die

¹⁾ *Chr. Jac. Baur*, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani, thoracis praesertim abdominalisque. Tubingae 1818. 4. p. 23, 24. Auch *Vieussens* (*Neurographia univers.* Francof. 1690. p. 440) und *Frotscher* (*Descriptio medullae spinalis ejusque nervorum* p. 16) erwähnen Nette die zum *Mediastino anteriori* gehen.

²⁾ An dieser Stelle sollen sie nach *Baur* mehrere Nervenweige dem Zwerchfelle abgeben, die aber *Boa* nicht gefunden hat.

³⁾ Nach *Baur* entstehen durch Theilung jener Nervenweige 8 bis 10 Nerven, welche in querrer Richtung verlaufen und sich alle regelmäßig unter einander verbinden, so daß alle diese, vom 1sten bis zu dem 11ten Brustnerven entspringenden, Nerven sich unter einander vereinigen. Der vom 11ten Brustnerven entspringende Zweig vereinigt sich aber selbst wieder mit dem vom 11ten Lendenerven kommenden.

Scheide des Rectus abdominis, liegen an dessen hinterer Oberfläche und geben ihm selbst Zweige, schicken aber auch einige durch ihn hindurchgehende Äste zur Haut des Bauchs, welche den äußeren Hautnerven des Bauchs entgegen gehen ¹⁾.

Uebersicht über die Muskeln, welche von den vorderen Ästen der Brustnerven Zweige erhalten.

Hierher gehören erstlich die Seitenmuskeln, namentlich der Serratus posticus superior und inferior, der Serratus anticus major und die Musculi intercostales externi und interni. Ferner die vorderen Muskeln, namentlich der Triangularis sterni, Rectus abdominis, Obliquus externus, Obliquus internus, Transversus und der Pyramidalis.

Hintere Äste der Brust- oder Rückennerven.

Sie sind kleiner als die vorderen, und theilen sich zwischen den Processibus transversis der Wirbel in einen inneren und in einen äußeren Ast.

Die äußeren Zweige sind nicht bei allen hinteren Ästen der Rückennerven gleich groß.

Die von dem 1sten bis zu dem 7ten Rückennerven entspringenden äußeren Zweige sind kleiner. Diese bringen zwischen dem M. longissimus dorsi und sacro-lumbalis hervor, geben diesen Muskeln, dem Transversalis cervicis, und den Levatoribus costarum Äste und schicken nur hier und da kleine Äste, welche den Latissimus dorsi (ohne ihm Zweige zu geben) durchbohren, zur Haut.

Vom 8ten oder 9ten Rückennerven an sind diese äußeren Zweige der hinteren Äste dicker. Sie durchbohren da die Sehne des Serratus posticus inferior und des Latissimus dorsi, und gehen nur zur Haut, an der sie bis zur Hüftgegend herab und noch weiter verfolgt werden können.

¹⁾ Nach Baur bilden der 7te, 8te und der 9te Intercostalern, indem sie sich unter einander vereinigen, einen Nervenstamm oder 2 Nervenstämme, welche an der Origin der an einander stehenden Rippenknorpel vorwärts gehen, dann zwischen die obersten Insertionen des M. rectus eindringen und bis zur Haut der Hüftgegend fortgehen. Die Äste des 10ten und 11ten und des 12ten dagegen durchbohren die Scheide des M. rectus, da wo die Sehne des M. obliquus internus sich in 2 Lappen theilt. Von diesen letzteren Nerven, welche sich sehr oft unter einander vereinigen, gehen nach ihm mehrere Äste zur A. epigastrica. In beiden Seiten dieser Arterien findet man immer 2 Nervenäste, welche an der Stelle, wo sich die Sehnen des Obliquus internus und des Transversus vereinigen, dieselbe durchbohren, und zwischen ihr und der Bauchhaut zum Nabel gehen, und zur Vena umbilicalis und zu den Arteriis umbilicalibus mit großer Ruhe verfolgt werden können. Die an den Arteriis umbilicalibus befindlichen Nerven gehen an ihnen nach dem Nabel zu. Die an der Vena umbilicalis gehen aufwärts nach der Leber zu, zum Nabelstrange kann man sie im Embryonen nicht verfolgen. Niele sah, daß diese 2 Nerven bei dem Kalbsfötus im Reiz führten. (Diss. inaug. qua investigatur, utrum funiculus umbilicalis nervis polleat, an careat. Tubingae 1817. p. 22.)

Die der Mittellinie näheren inneren Zweige der hinteren Rückennervenäste sind auch nicht von gleicher Dicke. Aber hier sind umgekehrt die der oberen Rückennerven (bis zum 7ten) die dickeren. Diese gelangen an die Oberfläche des Multifidus spinae, verbinden sich daselbst hier und da vorzüglich oben mit einander, geben dem M. multifidus spinae, semispinalis colli und dorsi; dem M. semispinalis und den Musculis interspinalibus Zweige, durchbohren dann nahe an den Dornfortsätzen die oberflächlicheren Lagen der Rückenmuskeln (den M. splenius, rhomboideus inferior und den M. cucullaris, oder den M. latissimus dorsi), ohne denselben Zweige zu geben, kommen in ziemlich regelmäßigen Abständen zur Haut des Rückens und gehen den hinteren Ästen der äußeren Hautnerven der Brust und des Bauches entgegen. Bisweilen vereinigen sich einige dieser benachbarten Zweige unter einander.

Die inneren Zweige der hinteren Äste der Rückennerven vom 8ten an sind kleiner, und gehen zum Multifidus spinae, ohne trächtliche Hautzweige zu geben.

Besondere Beschreibung einzelner Rückennerven.

Der erste und der letzte Rückennerv sind die beiden größten Rückennerven.

Der vordere Ast des 1sten und 2ten Rückennerven unterscheidet sich dadurch von dem der übrigen Rückennerven, daß er keinen äußern Hautnerven der Brust abgibt, sondern statt dessen einen Nerven zum Arme schickt, der erste Rückennerv nämlich einem sehr dicken Ast zum Plexus brachialis, der sich mit dem 8ten Halsnerven alsbald verbindet, der 2te Rückennerv einen viel dünneren Hautast zum hinteren und inneren Theile des Oberarms.

Der vordere Ast des 1sten Rückennerven giebt zwar keinen Hautnerven für den Arm, sondern einen sehr großen äußeren Hautnerven für die Brust, indessen verbindet derselbe sich doch mit dem von dem vorgehenden gegebenen Hautnerven für den Arm durch einen Zweig.

Der 12te Rückennerv zeichnet sich dadurch aus, daß sein vorderer Ast meistens sogleich anfangs mit dem des 1sten Lendennerven durch einen dicken Communicationszweig verbunden wird. Nicht selten hebt er einen langen Zweig, welcher zugleich mit der Fortsetzung des Nerven zwischen der letzten Backe und dem äußeren Schenkel des Zwerchfells an die Wand der Bauchhöhle tritt, vor der hintern Sehne des Transversus abdominis herabsteigt, und zum M. transversus und obliquus internus gelangt, auch sich mit Ästen der Lendennerven vereinigt.

Die Fortsetzung des vorderen Astes durchbohrt die Sehne des Transversus, und giebt zwischen ihm und dem Obliquus internus (zuweilen auch früher) den Ast, welcher dem äußeren Hautaste der andern Brustnerven entspricht, und der den Obliquus externus (welchem er Zweige giebt) durchbohrt und zum Gesäße herabsteigt. Hierauf endigt sich der vordere Ast mit dem nach vorn und abwärts gehenden Muskelzweige. Dieser liegt zwischen dem M. transversus und dem Obliquus internus, und gelangt zu dem untersten Theile dieser Muskeln und zu dem Pyramidalis, verbindet sich mit Ästen des 11ten Rückenerven und des 1sten Lendennerven, und ist sehr lang, wenn der oben erwähnte lange Zweig fehlt, denn er ersetzt ihn dann. Er verbindet sich auch mit Zweigen der 1sten Lendennerven, welche sich am Leistenringe verbreiten.

Zuweilen giebt er auch einige Hautzweige, die vorzüglich dann sehr groß sind, wenn jener lange Ast fehlt.

Uebersicht über die Hautzweige der Brustnerven im Allgemeinen.

Faßt man das Gesagte zusammen, so sieht man, daß die Hautnerven der Brust und des Bauchs auf jeder Seite in 4 Reihen zwischen den Muskeln hervorkommen, 2 Reihen von den vorderen, 2 Reihen von den hinteren Ästen. Die 2 vorderen Reihen stehen weiter von einander ab, und bestehen aus größeren Nerven. Die 2 hinteren Reihen liegen dicht neben einander.

Die vorderste Reihe der Hautnerven oder die vorderen Hautnerven kommen neben dem Brustbeine, und tiefer auch an einzelnen Stellen des Rectus abdominis neben der Linea alba zum Vorschein, und schlagen sich vorzüglich nach hinten zu herum.

Die 2te Reihe der Hautnerven, die mittleren oder äußeren Hautnerven kommen oben durch den Serratus anticus, unten durch den Obliquus externus hindurch, und liegen also genau an der Seite des Rumpfs. Von ihnen aus geht eine Reihe Zweige nach vorn zu, und eine 2te Reihe Zweige nach hinten zu.

Die von den hinteren Ästen entspringenden Hautnerven der 3ten Hauptreihe durchbohren an den Spizen der Querfortsätze die oberflächliche Lage der Rückenmuskeln und nehmen vorzüglich ihre Richtung nach vorn zu.

Die gleichfalls von den hinteren Ästen entspringenden Hautnerven der 4ten Reihe sind sehr klein, gelangen neben den Processibus spinosis zur Haut, und wenden sich vorzüglich nach vorn herum.

Bei den 2 obersten Rückenerven werden die Äste, die den Ästen

der 2ten Reihe, d. h. den äußeren Hautnerven, entsprechen, in Armnerven verwandelt.

Uebersicht über die Muskeln, welche von den Rückennerven Zweige erhalten.

Was die Muskeln anlangt, welche von den Rückennerven Zweige erhalten, so ist es bemerkenswerth, daß es nur die Musculi intercostales, der Triangularis sterni, alle Serrati und die Bauchmuskeln, namentlich der Obliquus externus, internus, transversus, rectus und pyramidalis sind, welche von ihnen Zweige erhalten. Dagegen die zum Arme und zur Schulter gehenden oberflächlichen Rückenmuskeln keine Zweige von ihnen erhalten. Wohl aber werden alle am Rücken liegenden tiefen Muskeln von ihnen mit Zweigen versehen.

Es verdient ferner mit *Baur* und *Bock* bemerkt zu werden, daß die Bauchmuskelnerven nicht von den Lendennerven, sondern von den Rumpfnerven, welche oben wie die Stücke eines Ringes den Rumpf umgeben, nach unten mehr und mehr eine schiefe Lage annehmen, und endlich bei den Lendennerven sehr gerade herabsteigen, kommen, und daß daher die untersten Intercostalnerven Aeste hergeben, welche das für den Bauch sind, was die vorderen Aeste der höheren Intercostalnerven für die Brust sind.

Nervi lumbales, Lendennerven.

Ihre von der unteren Anschwellung des Rückenmarkes entspringenden Wurzeln liegen dicht an einander, aber es findet innerhalb des Rüdgratcanales kein Uebergang von Fäden aus der Wurzel des einen in die des andern Nerven Statt.

Der erste tritt durch das Intervertebralloch zwischen dem 1sten und 2ten Lendenwirbel, der letzte durch das zwischen dem letzten Lendenwirbel und dem Kreuzbeine befindliche Loch hervor.

Die vorderen Aeste.

Die vorderen Aeste sind desto größer, je weiter unten sie von einem Lendennerven entspringen. Sie verbinden sich mit den Knoten oder mit dem Grenzstrange des sympathischen Nerven meistens durch doppelte Verbindungsfäden. Ein dünnerer Verbindungsfaden durchbohrt nämlich meistens den *M. psoas*, und kommt entfernter von der Wirbelsäule ver-

laufend zu dem sympathetischen Nerven, ein dickerer geht dicht an den Lendenwirbelkörpern vorwärts und ist von Sehnenfasern bedeckt.

Die vorderen Aeste dringen selbst in den Psoas ein, geben ihm und dem Quadratus lumborum Zweige, und verbinden sich vor den Querfortsätzen unter einander durch Communicationszweige. Hierdurch entsteht das Lendengeflecht, plexus lumbalis. Aus diesem gehen, wie Schmidt, Baur und Bock gezeigt haben, kleinere Aeste zur Inguinalgegend und zur Haut der Hüfte und des Schenkels hin. Diese letzteren Aeste können vielleicht mit der vorderen Fortsetzung der Intercostalnerven verglichen werden.

Viel dickerere Aeste vereinigen sich zu dem N. cruralis und obturatorius, und indem sich die von den 2 untersten Lendennerven kommenden Aeste mit den Kreuznerven verbinden, entsteht der Nervus ischiadicus. Sie können vielleicht mit den Seitenästen der Intercostalnerven verglichen werden.

Die hinteren Aeste.

Die hinteren Aeste der Lendennerven verhalten sich im wesentlichen wie die der Rückennerven. Jeder theilt sich in einen inneren und in einen äußeren Zweig. Die inneren Zweige gehen zwischen den Querfortsätzen dicht am Bogen der Wirbel nach hinten, sind von Sehnenfasern bedeckt und gehören dem M. multifidus spinae und den Musculis interspinalibus an. Der des letzten Lendennerven verbindet sich mit einem ähnlichen Aeste des 1sten Kreuznerven. Die äußeren Zweige gehören den Musculis intertransversalibus und dem gemeinschaftlichen Bauche des M. longissimus dorsi und sacrolumbalis an. Dünne Zweige derselben verbinden sich unter einander, und endlich geben sie Hautzweige, welche jenen großen Muskelbauch und den Latissimus dorsi dicht über den Crista ilei durchbohren, zu der die Glutaeos bedeckenden Haut des Gesäßes herabgehen, und verbinden sich auch durch Nebenzweige unter einander.

Einige kleinere Zweige der vorderen Aeste der Lendennerven im Einzelnen.

1) Des ersten Lendennerven.

Vom 1sten Lendennerven entspringen 2 Aeste, welche mit der vorderen Fortsetzung der Intercostalnerven verglichen werden können, der eine, N. ileo-hypogastricus nach Schmidt, liegt erst hinter dem Psoas, giebt ihm und dem Quadratus lumborum Zweige, durchbohrt dann den Psoas, geht über dem Quadratus lumborum nach außen gegen den Hüftkamm, dringt durch den M. transversus, und giebt zuweilen einen den M.

transversus durchbohrenden kleinen Hautast zur Haut des Schenkels, welche den Tensor fasciae bedeckt, hierauf läuft er zwischen dem Transversus und Obliquus internus nach vorn und verbindet sich einerseits mit dem vorderen Aste des letzten Intercoftalnerven, anderer Seite mit dem N. ileo-inguinalis. Bisweilen ist er so lang, daß er durch den Inguinalcanal geht, durch den Bauchring hervordringt, und sich dafelbst wie der N. ileo-inguinalis verbreitet.

Der andere Ast, der N. ileo-inguinalis nach Schmidt, ist hinsichtlich seines Ursprungs veränderlich. Meistens entspringt er vom 1sten Lendennerven, durchbohrt den M. psoas, geht über den M. quadratus lumborum und iliacus internus hinweg, durchbohrt dann nicht weit von der Spina anterior superior ossis ilei den M. transversus und obliquus internus, geht durch den Canalis inguinalis und den Bauchring herab, und giebt dem Schaamberge, dem vorderen Theile des Hodensackes, oder bei dem weiblichen Geschlechte der äußeren Schaamlippe Aeste. Dieser Nerv ist nicht selten, und zwar öfterer auf der linken als auf der rechten Seite, ein Ast des N. obturatorius.

2) Des ersten und zweiten Lendennerven.

Der Nervus spermaticus externus entspringt zuweilen auch nur vom Communicationszweige zwischen beiden Lendennerven oder vom 2ten allein. Er geht durch den M. psoas hindurch und spaltet sich vor ihm. Der äußere Ast gelangt in 2 Aeste gespalten mit der Arteria cruralis und vor dem M. iliacus zur Haut des Schenkels. Zuweilen entspringt dieser Ast als ein besonderer Nerv aus dem 2ten Lendennerve und verbindet sich mit dem Nervus ileo-inguinalis. Der dickere innere Ast giebt kleine Zweige zur Gegend des Annulus cruralis und zur A. epigastrica, dringt beim Manne durch die hintere Oeffnung oder neben derselben in den Canalis inguinalis, begleitet den Funiculus spermaticus und schieft zum Cremaster, zum Kopfe des Nebenhoden und bisweilen auch zum Hodensacke Zweige. Beim Weibe begleitet er das Ligamentum uteri rotandum zum Schaamberge.

Der Nervus cutaneus anterior externus, der vordere äußere Hautnerv des Schenkels entspringt aus dem Communicationsstrange des 2ten und 3ten Lendennerven oder noch mit einer 2ten Wurzel vom 2ten Lendennerve, d. h. von dem Verbindungsstrange, durch den der 2te Lendennerve mit dem 1sten zusammenhängt. Er geht auf dem M. iliacus vorwärts und tritt unter der Spina anterior superior, d. h. unter dem äußersten Theile des Poupartischen Bandes, zum Schenkel. Ein kleiner nach innen gehender Zweig vereinigt ihn nun hinter der Schenkelbinde mit dem mittleren vorderen Hautnerven. Er theilt sich außerdem in mehrere Aeste, von denen sich einige äußerlich nach der hinteren Seite des Schenkels hinkrümmen, der längste reicht vorn bis zur Haut in geringer Entfernung über der Kniescheibe.

Uebersicht über die Muskeln am Bauche, welche von den vorderen Ästen der Lendennerven Zweige erhalten.

Von den vorderen Ästen der Lendennerven erhalten unter den Seitenmuskeln der Psoas und Quadratus lumborum, unter den vorderen Muskeln nur der Cremaster und vielleicht der Obliquus internus und der Transversus in der Nähe ihres Zusammenhangs mit dem Cremaster Zweige.

K r e u z n e r v e n .

Ihrer sind, wo 5 Kreuzwirbel vorhanden sind, 5 bis 6. Nach Boß findet man in der Regel 6 Kreuznerven auch da, wo nur 5 Kreuzwirbel vorhanden sind.

Sie entstehen, mit Ausnahme der 2 letztern Kreuznerven, welche durch den Hiatus canalis sacralis hervortreten, dicht neben einander von der unteren Anschwellung des Rückenmarks. Die 2 letzten Nerven aber entspringen von der Seite und von der Spitze des kegelförmigen Endes des Rückenmarkes. Der Spinalknoten liegt bei den Kreuznerven noch innerhalb des Kanals des Kreuzbeins. Der Theil der Wurzeln derselben, welcher zwischen der Oberfläche des Rückenmarks und den Spinalknoten liegt, ist bei ihnen länger als bei andern Rückenmarksnerven. Die vorderen Äste der 4 oberen Kreuznerven treten durch die vorderen, die hinteren durch die hinteren Oeffnungen des Kreuzbeins heraus, die 2 letzten Kreuznerven treten nicht durch die Foramina sacralia, sondern durch die Lücke, welche zwischen den Hörnern des Schwanz- und Kreuzbeins hinten übrig bleibt, hervor, und haben keine Knoten.

Die vorderen Äste.

Die vorderen Äste nehmen vom 1sten, noch mehr aber vom 2ten Kreuznerven an sehr an Dicke ab, und nachdem sie durch die vorderen Sacrallöcher hervorgetreten sind, verbinden sie sich gewöhnlich durch 2 kurze Zweige mit den Kreuzknoten des sympathischen Nerven.

Kleine Äste der 3 oberen Kreuznerven gehen zu dem M. piriformis, andere (2 bis 4) kleine Zweige kommen vom 3ten und 4ten Kreuznerven zu dem Mastdarme, zu dem Halse der Harnblase und zu dem Plexus hypogastricus des N. sympathicus, und beim Weibe außerdem noch zur Scheide. Sie bilden namentlich die mittleren Mastdarmnerven und die unteren Harnblasennerven. Manche Fäden gelangen zu diesen Theilen, ohne durch Ganglien des

mpathischen Nerven hindurchgegangen zu sein. Die vorderen Aeste des 3ten und 4ten Lendennerven und alle Kreuznerven sind untereinander durch Verbindungsstränge vereinigt; aus den sich verflechtenden Bündeln dieser Stränge und aus der Fortsetzung der vorderen Aeste selbst entsteht der Plexus ischiadicus oder sacralis. Er geht durch die Incisura ischiadica major hinten hervor.

Aus dem 4ten Kreuznerven und aus dem in den Plexus ischiadicus eingetretenen 3ten Kreuznerven entspringt der Nervus pudendus, der große Schaamernerv. Er liegt unter dem M. piriformis im hinteren Theile der Incisura ischiadica major, geht durch diese Incisura aus der Höhle des kleinen Beckens hervor und durch die Incisura ischiadica minor, zwischen dem Ligamentum tuberoso-sacrum und Spinoso-sacrum, zur Mittelfleischgegend (regio perinaei), d. h. zu der vorderen Seite der fleischigen Wand, welche den Boden des kleinen Beckens bilden hilft.

Der untere Ast gehört den Muskeln und der Haut des Perinaeum, der Haut des Hodensackes und dem After an. Denn er giebt einen Zweig zum M. ischio-cavernosus, vereinigt sich mit dem von dem 3ten und 4ten Kreuznerven gegebenen unteren Mastdarmnerven. Einer von den von ihm entspringenden Hautnerven der Regio perinaei vereinigt sich mit dem vom N. ischiadicus gegebenen gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels.

Mehrere tiefere Zweige geben Aeste zum M. sphincter ani externus, M. transversus perinaei superficialis und profundus, beim Manne zum M. bulbosavernosus, zur Harnröhre und zum hinteren Theile des Hodensackes, beim Weibe dem Constrictor cunni, zu dem vordersten Theile der Scheide; zur äußeren Seite der inneren Schaamlippe und sogar bis an den Schaamberg, und vereinigen sich auch mit den gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels.

Der obere Ast ist der Nervus dorsalis penis oder clitoridis. Er geht in einem Bogen dicht am M. obturator internus und tritt an der inneren Seite des Sitz- und Schaambeins zur Schaambeinvereinigung, und neben dem Aufhängebande des Penis oder der Clitoris zum Rücken des Gliedes. Die größten und längsten Zweige desselben gehen auf beiden Seiten neben der V. dorsalis penis auf der sehnigen Haut des Corpus cavernosum bis zur Eichel und endigen sich in der Haut derselben.

Andere kleinere Zweige umgeben die Vena dorsalis penis, noch mehrere gehen zur Haut. Viele dringen auch durch die fibröse Haut in die Corpora cavernosa penis ein ¹⁾.

Der Nervus dorsalis clitoridis verhält sich ziemlich ebenso, wie der des Penis. Aber er ist viel kleiner.

¹⁾ Vorzüglich gut abgebildet sind diese Nerven von Langenbeck, icones anat. Neurolog. Tab. IX — XII. An einigen Stellen dieser Abbildungen scheinen sich die Aeste des N. dorsalis penis der rechten und der linken Seite unter einander zu vereinigen. Nach den Untersuchungen von Boetjard findet eine solche Vereinigung bei Nervenfäden, die noch deutlich sichtbar sind, nicht Statt.

Hintere Aeste.

Die hinteren Aeste der Kreuznerven sind bei weitem kleiner als die vorderen. Sie vereinigen sich meistens unter einander und mit den unteren Lendenerven durch Verbindungszweige. Aus diesen Verbindungen entspringen Aeste für die Haut des Gesäßes.

Nerven des Schenkels.

Aus dem Lenden- und Kreuzgeflechte entspringen 3 Nerven für den Schenkel. Der unter dem Ligamentum Poupartii weggehende Schenkelnerb, N. cruralis, liegt vorn, der durch das Foramen obturatorium hindurchgehende Hüftloch-nerb, N. obturatorius, verzweigt sich in der Mitte zwischen dem oberen Theile der Schenkelmuskeln, der durch den Hüftauschnitt, incisura ischiadica major, hindurchgehende Hüft-nerb, N. ischiadicus, liegt am Schenkel hinten.

Der N. cruralis und obturatorius gehen nicht zu Muskeln, die am Unterschenkel, sondern nur zu denen, die am Oberschenkel liegen. Der N. cruralis nämlich geht zu den Muskeln, welche den Unterschenkel und den Oberschenkel nach vorn ziehen und heben, (Psoas, Iliacus, Pectinaeus, Sartorius, Rectus, Cruralis, Vastus externus und internus), der N. obturatorius zu den Muskeln, die den Schenkel nach innen ziehen und erheben (Adductores und Gracilis) außerdem aber zu dem M. obturator externus.

Der N. ischiadicus nebst den kleinen aus dem Plexus ischiadicus entspringenden Nerven geht sowohl zu Muskeln des Oberschenkels als zu denen des Unterschenkels, und zwar zu denjenigen Muskeln des Oberschenkels, welche ihn nach hinten ziehen und erheben, und zu denen, welche ihn rollen (um die Längsaxe drehen). Diese Angabe der Vertheilung trifft völlig zu, mit der einzigen Ausnahme, daß der M. obturator externus von dem N. obturatorius und der hintere Theil des Adductor magnus vom N. ischiadicus Zweige erhält.

Der Schenkelnerb.

Der Schenkelnerb, Nervus cruralis, wird von Bündeln zusammengefaßt, die vom 1sten bis zum 4ten Lendennerven ihren Ursprung

nen. Die Verbindungsstränge zwischen den Lendennerven werden allmählich bis zum 4ten Lendennerven immer dicker, an diesem entspringt N. cruralis, und nimmt einen großen Theil der Bündel auf, aus welchen der Verbindungsstrang zwischen dem 3ten und 4ten Lendennerven besteht. Daher ist der Verbindungsstrang, der den 5ten und 4ten Lendennerven verbindet, viel dünner, als der zwischen dem 4ten und 3ten Lendennerven. Gewöhnlich gehen seine Bündel in einen Nervenzweig zwischen dem M. psoas und dem Iliacus internus hervor, welchen er jedoch in 2 Fascicel gespalten, welche sich unter dem Ligamentum Poupartii wieder vereinigen.

Er geht in einer Rinne des M. iliacus und von der Aponeurose desselben bedeckt, und durch diese von der A. cruralis geschieden unter dem Poupartischen Bande durch den Schenkelring herab, und liegt hier unter der Arterie nach außen. Auf diesem Wege giebt er etwa 2 innere Hautnerven, von welchen sich der eine bis an die innere Seite des Knies, erstreckt und sich bisweilen daselbst mit dem N. saphenus mit dem langen Hautzweige des N. ischiadicus verbindet. Auch giebt er einen oder einige Nerven zur A. cruralis.

Die auf diesem Wege vom N. cruralis entspringenden Muskelzweige innerviren dem M. psoas, iliacus und dem pectinaeus. Hierauf theilt sich der N. cruralis in einen vorderen und in einen hinteren Zweig. Der hintere Zweig gehört allen den Muskeln an, deren gemeinsame Sehne über die Kniescheibe weggeht, dem M. rectus, cruralis, vastus externus, vastus internus und subcruraeus. Zugleich giebt er ein, zwischen diesen Muskeln hingehender, Nervenfaden zur Kapselfuge des Knies, und ein wichtiger, nachher zu beschreibender Hautnerv, Nervus saphenus, geht an der inneren Seite des Knies vorbei. Der vordere Zweig des Schenkelnerven giebt dem vorderen mittleren Hautnerven des Oberschenkels und dem Sartorius Aeste. Dieser Hautnerv geht in 2 Zweige gespalten durch den Sartorius hin zur Haut, von der Mitte des Schenkels an bis zur inneren Seite des Knies. Er verbindet sich oben oft mit einem Aste des N. spermaticus externus.

Der Nervus saphenus, der große innere Hautnerv des Schenkels, ist meistens die Fortsetzung des hinteren Zweiges des Schenkelnerven, tritt an der äußeren Seite der A. cruralis herab. Wo diese durch den Ligamentum adductor magnus in die Kniekehle tritt, verläßt er sie, und giebt einen Hautast, der sich zuweilen mit einem Aste des N. obturatoris vereinigt und um den Sartorius herum zur inneren Seite des Knies biegt. Der Sartorius erhält hier oft selbst einen Zweig. Die Fortsetzung desselben geht hinter dem Sartorius, zuweilen durch ihn

516 N. obturatorius. Kleine Äste des Plexus ischiadicus.

hindurch, an der inneren Seite des Unterschenkels und an der Versaphena herab, und verbreitet sich in der vor dem Schienbeine und der an der inneren Seite der Wade gelegenen Haut, und reicht bis zur Haut am inneren Knöchel und bis zur inneren Seite des Fußrückens herab.

Der Hüftlochnerv.

Der Hüftlochnerv, *nervus obturatorius*, geht auch vom 4ten oder vom 4ten und 3ten Lendennerven ab, nimmt aber auch aus den die Lendennerven verbindenden Verbindungssträngen Fäden auf, so da man annehmen kann, er entspringe vom 2ten, 3ten und 4ten Lendennerven. Er geht hinter dem *M. psoas* und mit der *A. und V. obturatoria* unter der *Linea arcuata* des Beckens zum Hüftloche hin. Durch die oben befindliche Lücke des *Ligamentum obturatorium*.

Er giebt einen Ast zum *M. obturator externus*, und theilt sich in einen vorderen, für den *M. adductor brevis und longus*, und für den *M. gracilis* bestimmten Ast, der auch noch einen zwischen den beiden Anziehern hervortretenden Hautzweig für die Haut des Oberschenkels, und, wenn er sehr lang ist, auch für die innere Seite des Unterschenkels abgiebt, und in einen hinteren Zweig. Dieser bringt durch die obere Portion des *M. obturator externus*, giebt ihr Zweige, und gehört ganz dem *Adductor magnus* an.

Kleinere Nerven des Hüftgeflechtes.

Aus diesem Geflechte, welches durch die Vereinigung des vorderen Astes des 4ten und 5ten Lendennerven, sowie auch aus dem der 3 oberen Kreuznerven gebildet wird, entspringen folgende kleinere Nerven:

Der obere Gesäßnerv, *N. glutaeus superior*, geht über dem *M. piriformis* zur *Incisura ischiadica major* aus dem Becken hervor, scheidet dem *Piriformis*, den 3 *Musculis glutaeis* und dem *M. tensor fasciae* Äste, giebt ferner den unteren Gesäßnerven, *Nervus glutaeus inferior*, der meistens unter dem *Piriformis* (zuweilen über ihm) aus der *Incisura ischiadica major* hervorgeht und dem *M. glutaeus magnus* angehört. Zuweilen verbindet er sich mittelst eines tieferen Zweigs mit dem *N. ischiadicus*, oder mit dem gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels, oder mit beiden zugleich.

Endlich entspringt aus dem Plexus ischiadicus der große hintere Hautnerv des Oberschenkels, welcher mit 2 bis 3 Wurzeln aus dem Plexus ischiadicus anfängt, mit der A. ischiadica an der inneren Fläche des Glutaeus maximus zur Gegend des Tuber ischii und des Trochanter major herabsteigt, und Hautäste zum Gesäße giebt, welche sich um den unteren Rand des M. glutaeus maximus aufwärts herum schlagen. Ein oder 2 Hautzweige desselben kommen unter dem M. glutaeus hervor, und schlagen sich unter dem Sitzhöcker auf der Schenkelbinde nach innen zur Haut des Damms des Hodensackes, ein Weibe bis zur äußeren Schaamlippe und bis an den Mons Veneris. Ein Ästchen derselben verbindet sich mit dem N. pudendus. Zwei bis drei kürzere und 1 langer Zweig kommen unter dem M. glutaeus maximus hervor, und gehen am Oberschenkel herab. Der längste Zweig (die Fortsetzung des Stammes) steigt auf der Mitte der hinteren Oberfläche des Schenkels, auf der Schenkelbinde meistens bis zur Kniekehle und weiter, zuweilen bis unter die Wade, herab, und giebt rechts und links Zweige zur Haut. Wenn dieser Nerv sehr lang ist, so ersetzt er oft den mittleren Hautnerven des Unterschenkels.

Nervus ischiadicus, der Hüftnerv.

Der Hüftnerv, der größte Nerv des ganzen Körpers, ist die Fortsetzung des Plexus ischiadicus. Seine Nervenfäden rühren vorzüglich in den 2 letzten Lendenerven und von den 3 ersten Kreuznerven her.

Er kommt unter dem M. piriformis hervor, geht dann zwischen den Musculis gemellis, dem Quadratus femoris und dem M. glutaeus maximus in dem Zwischenraume zwischen dem Tuber ischii und Trochanter major herab, wird dann vom langen Kopfe des M. biceps von hinten her bedeckt, und gelangt endlich zwischen dem M. biceps und dem M. semitendinosus und semimembranosus in den obersten Theil der Kniekehle, und theilt sich daselbst bald höher oben, bald tiefer unten in den kleineren Ast, den Wadenbeinnerven, N. peroneus, und in den größeren Ast, den Schienbeinnerven, N. tibialis. Genau genommen ist er immer schon hoch oben nahe an der Incisura ischiadica gespalten, aber die beiden genannten Äste liegen nahe nicht unbeträchtliche Strecke hindurch durch lockeres Zellgewebe mit einander verbunden.

Der Wadenbeinnerv ist für die Haut an der vorderen Seite des Unterschenkels und am Fußrücken, und für die Muskeln, welche vorn in

dem Zwischenraume zwischen der Tibia und der Fibula und am Fußrücken liegen, bestimmt. Er geht aber nicht wie die *A. tibialis antica*, die die nämliche Bestimmung hat, zwischen der Tibia und der Fibula durch das Ligamentum interosseum von der hinteren Seite auf die vordere Seite des Unterschenkels über, sondern äußerlich um das Wadenbein herum.

Der Schienbeinerve ist dem hinteren Theile des Unterschenkels und der Fußsohle bestimmt, zu der er unter dem Malleolus internus übergeht.

Auf dem oben beschriebenen Wege des *N. ischiadicus* erhält der *M. obturator internus* einen Keineren, die *Musculi gemini*, der *Quadratus femoris* einen größeren gemeinschaftlichen Zweig. Diese Nette nehmen jedoch zuweilen nicht vom Stamme des Nerven, sondern von dem *Plexus ischiadicus* ihren Anfang. Der *N. ischiadicus* ist auf diese oder auf jene Weise mit dem *N. gluteus inferior*, oder mit dem hinteren Hautnerven verbunden, scheidet hierauf kurze Zweige zum langen Kopfe des *M. biceps*, und einen langen Zweig zum *M. semimembranosus*, *semitendinosus* und *adductor magnus*, einen gleichfalls langen Zweig zum langen Kopfe des *Biceps*, und endlich einen Zweig zum kurzen Kopfe desselben.

Der Wadenbeinerv.

Der Wadenbeinerv, *Nervus peronaeus s. popliteus externus*, ist der äußere Ast des *N. ischiadicus*, lenkt sich im Hinabgehen auswärts gegen den *Condylus externus* des Schenkelbeins, giebt einen Ast zum kurzen Kopfe des *M. biceps*, und einen Hautnerven, den sogenannten *Ramus communicans*.

Dieser *Ramus communicans* geht hinter dem kurzen Kopfe des *M. biceps*, dann hinter dem *Condylus externus* des Schenkels, und hinter dem äußern Kopfe des *M. gastrocnemius* hinab, und verbindet sich meistens tiefer unten oder höher oben, oder an beiden Stellen mit dem *Ramus communicans* des *N. tibialis*; giebt Nette der Haut, welche die Achillessehne deckt, lenkt sich dann auf den äußern Theil des Rückens des Fußes und vertheilt sich in der Haut. Ein zur Mitte der hinteren Seite des Unterschenkels gehender Hautzweig, der von ihm zuweilen entspringt, kommt auch oft vom *N. peronaeus* selbst, oder vom *N. tibialis*. Er giebt dicht über dem Kopfe des Wadenbeins einen Ast zum *M. peronaeus longus* und zur Kapfel des Wadenbeins.

Der Stamm des *Nervus peronaeus* lenkt sich um das Wadenbein äußerlich herum, bringt nun in den *M. peronaeus longus* ein, und theilt sich zugleich in einen *Ramus profundus* und *superficialis*.

Der oberflächliche Ast oder der Hautast, *ramus superficialis*, durchbohrt den *M. peronaeus longus* vollends, geht an der äußern Seite

des Kniegelenks und des Unterschenkels, von der flechtigen Scheide eingeschlossen, hinab, durchbohrt dieselbe hierauf, geht in der Haut vor den Flechten des Extensor pollicis longus und des Extensor digitorum communis longus auf den Rücken des Fußes und theilt sich über dem Fußgelenke in 2 Äste, in den mittleren und in den inneren Fuhrückenerven. Durch eine abermalige Theilung jener 2 Äste entstehen in der Regel 4 Zweige, welche zu den Zwischenräumen der Behen hingehen. Jeder theilt sich für die einander zugekehrten Ränder je zweier Behen in 2 Nerven, welche an den Rändern der Behen hingehen und Nervi digitales dorsales heißen. Außer diesen werden mehrere Äste zur Haut des Fuhrückens abgegeben. Sehr oft verbindet sich der äußere Ast (ober der mittlere Fuhrückenerv) mit dem N. communicans tibialis et fibularis (dem äußeren Fuhrückenerven).

Der tiefe Ast, ramus profundus, giebt erst Äste zum M. tibialis anticus u., geht dann zwischen diesem Muskel und dem Extensor digitorum communis, hierauf zwischen ihm und dem Extensor hallucis longus mit der A. tibialis antica vor dem Ligamentum interosseum hinab, giebt Äste dem M. tibialis anticus, Extensor digitorum longus und Extensor pollicis longus; kommt unter der Flechte dieses letzteren hervor auf den Rücken des Fußes, giebt Äste den Extensoribus brevibus, den Musculis interosseis dorsalibus, geht unter dem Extensor pollicis brevis durch, zwischen den Mittelfußknochen der großen und zweiten Zehe vorwärts, und verbindet sich so mit dem inneren Aste des Ramus superficialis, so daß der Ramus dorsalis externus pollicis der großen, und der dorsalis internus digiti secundi mehr ihm, als dem Aste des Ramus superficialis gehören. Seltener werden die Behenerven bis zur inneren Seite der 3ten Zehe vom Ramus profundus des N. peronaeus gegeben. Der äußere Nerv für die kleine Zehe entsteht aus dem Ramus communicans des N. tibialis und N. peronaeus. Bisweilen giebt auch dieser Zweig mehrere Behenerven, die in der Regel vom Peronaeus entspringen.

Der Schienbeinnerv:

Der Schienbeinnerv ist der innere stärkere Ast des Hüftnerven, welcher in der geraden Richtung des Stammes an der hinteren Seite der Kniekehle durch das Fett der Kniekehle herabgeht.

• Bisweilen giebt er noch über der Kniekehle den mittlern Hautnerven des Unterschenkels, welcher gewöhnlich ein Ast des N. peronaeus ist, oder auch ganz fehlt, wenn er nämlich durch den Endzweig des gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels ersetzt wird.

Hierauf entspringt aus dem N. tibialis gewöhnlich der lange Hautnerv des Unterschenkels und Fußes, den man auch Ramus communicans tibialis nennt, weil er sich mit einem ähnlichen, vom N. peronaeus entspringenden Hautnerven zu verbinden pflegt. Dieser lenkt sich in der Kniekehle vor die MM. gastrocnemios, geht unter der Fascia bis zur Achillessehne herab, durchbohrt die Fascia hier oder zuweilen auch schon höher oben, und vereinigt sich in der Regel hier, oder auch schon höher oben, oder an beiden Stellen mit dem Ramus communicans des N. peronaeus, und hilft dadurch den äußeren Fußrückennerven, N. extensus dorsi pedis, mit bilden. Bisweilen bildet er allein den äußeren Fußrückennerven und ist nur durch einen kleinen Zweig mit dem N. peronaeus verbunden. Der äußere Fußrückennerv geht am äußeren Rande der Achillessehne und unter dem äußeren Knöchel neben der V. saphena parva nach vorn, giebt verschiedene Zweige, welche sich unter dem äußeren Knöchel zur Haut des Fußrückens und der Ferse begeben. Dann theilt er sich in einen inneren Ast, welcher sich mit dem mittleren Fußrückennerven (aus dem N. peronaeus) vereinigt. Aus dem hierdurch entstehenden Nerven kommen die Äste, die zu den einander zugekehrten Rändern der 3ten und 4ten, und der 4ten und 5ten Zehe gelangen. Zuweilen ist er sehr dick, und vertritt allein die Stelle des mittleren Fußrückennerven, zuweilen fehlt dagegen der innere Ast des äußeren Fußrückennerven, und jene Behenerven kommen vom N. peronaeus. Der äußere Ast des äußeren Fußrückennerven, welcher gewöhnlich etwas stärker ist, geht am äußeren Rande des Fußrückens vorwärts, giebt kleine Hautzweige und endigt sich an der kleinen Zehe als äußerer Rückennerv derselben. Zuweilen aber kommen aus der Verbindung des äußeren und des mittleren Fußrückennerven nur die Nerven für die einander zugekehrten Ränder der 3ten und der 4ten Zehe.

Der Schienbeinnerv giebt in der Kniekehle 2 oder mehrere dicke Äste für die 2 MM. gastrocnemios, einen für den M. soleus, einen für den M. plantaris, und für den M. popliteus, von welchem letzteren ein Faden zur Tibialarterie überzugehen pflegt. Zarre Zweige, welche aus einigen von diesen Ästen, oder vom Stamme unmittelbar entspringen, kommen unter andern mit der mittleren und mit der oberen inneren Gelenkarterie zur Kapsel des Knies. Der Stamm des N. tibialis liegt nun zwischen dem unteren Rande des M. popliteus und dem Soleus, geht dann dicht an der hinteren Tibialarterie zwischen dem M. soleus, dem Flexor longus hallucis und dem Tibialis posterior, denen er meistens schon höher oben Nervenzweige gegeben hat, zur inneren Kapsel herab zwischen dem Knöchel und dem M. soleus wird er nur von der Fascia bedeckt. Noch ehe er zum Knöchel kommt, gehen Hautzweige zur inneren Seite der Ferse und zum Hohlfuße, die der Zahl und Größe nach verschieden sind. Je weniger es sind, desto größer

sind sie. Zuweilen ist es ein ziemlich großer Sohlennerv, welcher hier entspringt; von welchem auch zuweilen der Abductor hallucis einen Ast bekommt.

Indem der Tibialnerv über dem Abductor hallucis in die Fußsohle zu treten im Begriffe ist, theilt er sich in einen dünneren Ast, den äußeren, und in einen dickeren Ast, den inneren Sohlennerven.

Der innere Sohlennerv, *N. plantaris internus*, geht über dem *M. abductor hallucis*, und dann zwischen ihm und dem *M. flexor digitorum brevis* vorwärts, giebt ihnen Zweige und theilt sich in einen inneren Ast, der am inneren Rande der Fußsohle und der großen Zehe fortgeht, und dem Abductor und Flexor brevis hallucis Nette, zum Sehengelenke ein Fädchen, vorzüglich aber der Haut Zweige giebt. Der äußere Ast des inneren Sohlennerven spaltet sich auch wiederholt in Zweige und schiebt den Lumbricalmuskeln und den einander zugewendeten Rändern der großen und der 2ten, der 2ten und der 3ten, der 3ten und der 4ten Zehe Nervenzweige, die zwischen den Sehnen der Aponeurosis plantaris und den Sehnen der Beugemuskeln zur Haut übergehen.

Der äußere Sohlennerv, *N. plantaris externus*, wendet sich gegen den äußeren Fußrand, giebt der *Caro quadrata*, dem Abductor digiti minimi und dem Flexor digitorum brevis Zweige, geht zwischen den 2 letzteren Muskeln nach vorn und spaltet sich in 2 Nette. Der oberflächliche Ast desselben giebt der Fußsohle und den einander zugekehrten Rändern der 4ten und der 5ten Zehe, sowie auch dem äußeren Rande der 5ten Zehe Zweige. Der tiefe Ast begleitet den Arcus plantaris in die Tiefe und gehört dem *M. flexor digiti minimi*, dem Transversus und Adductor hallucis und den *MM. interossei* an.

Zuweilen verbindet sich der oberflächliche Zweig mit dem inneren Sohlennerven, wo dann die Nerven für die einander zugekehrten Ränder der 3ten und 4ten Zehe aus dem Aste, der durch diese Vereinigung entsteht, hervorkommen.

Jede Zehe hat an ihren 2 Rändern einen dünnen Rücken-, und einen dicken Sohlennerven, der Sohlennerv derselben giebt Zweige zur Rückenseite hinüber, durch die er sich mit den Rückenerven vereinigt. Aber an der Mittellinie der Zehen hängen weder die Sohlennerven, noch die Rückenerven der beiden Ränder der Zehen durch deutlich sichtbare Anasomosen zusammen.

Uebersicht über die Hautnerven des Schenkels.

Die vorderen Hautnerven des Schenkels, welche unter dem Ligamentum Poupartii hervorkommen und über der Fascia zur Haut gehen, sind der *N. cutaneus anterior externus*, der größte unter ihnen, welcher dicht unter der Spina anterior superior ossis ilei zum Vorschein kommt, und außersich bis zum Knie oder gar bis unter das Knie herabreicht. Außer ihm kommen etwa noch 3 andere kleinere Hautzweige unter dem Ligamentum Poupartii zur Haut, welche vom *N. cutaneus externus* entspringen. Derjenige von ihnen, welcher dem *Cutaneus*

anterior am nächsten ist, ist oft ein Ast von diesem. Tiefer unten in einiger Entfernung vom Ligamentum Poupartii, in der Gegend des M. sartorius, liegt der mittlere Hautnerv, N. cutaneus anterior medius, ein Zweig des N. cruralis, und ein innerer Hautnerv des Oberschenkels oder 2 vom N. cruralis.

Zur Haut des Gefäßes gehen von oben aus über die Crista ilei Zweige der vorderen Aeste der Lendennerven herab, von hinten her Zweige der hinteren Aeste der Kreuznerven, und von unten um den Glutaeus maximus herum, Aeste des Plexus ischiadicus und des großen hinteren Hautnerven hinauf.

Hinten steigt an der Haut, welche den M. biceps und semitendinosus bedeckt, der große hintere Hautnerv bis zur Kniekehle herab, die Haut des Perinaei und der Geschlechtsorgane erhält vom N. spermaticus externus (des 2ten Lendennerven) vom N. ileo-inguinalis und ileo-hypogastricus des 1sten Lendennerven, Zweige, welche durch den Bauchring, oder zum Theil bisweilen durch die Sehnenhaut in der Nähe des Bauchrings zu der Haut der Geschlechtstheile gehen. Hauptfächlich wird sie aber vom N. pudendus mit Zweigen versehen. Endlich bekommt sie auch einige Zweige vom gemeinschaftlichen hinteren Hautnerven des Schenkels aus dem Plexus ischiadicus.

An der äußeren Seite des Knies und nach hinten kommt in der Kniekehle neben dem M. biceps der N. communicans peronaei, an der inneren Seite derselben nach innen an dem M. semitendinosus der N. communicans tibialis zum Vorschein. Beide laufen an der die M. gastrocnemios bedeckenden Haut herab. Zwischen ihnen liegt oft ein mittlerer Hautnerv für die hintere Seite des Unterschenkels, der von dem N. peronaeus oder tibialis entspringt.

Vorn an der inneren Seite des Knies dringt unter oder durch den Sartorius der N. saphenus, ein Ast des N. cruralis, hervor, und läuft neben der V. saphena an der inneren Seite des Unterschenkels herab.

Ungefähr in der Mitte des Unterschenkels nach außen kommt der Ramus superficialis des N. peronaeus zum Vorschein, und geht in 2 Zweige getheilt auf der Mitte der Beugeseite des Fußgelenks zum Rücken des Fußes über.

Der Fußrücken erhält an seiner inneren Seite und in seiner Mitte Zweige von diesen beiden Aesten, an seinem äußeren Rande aber endigt sich die Fortsetzung des N. communicans tibialis und peronaei.

Der hintere Theil der Fußsohle wird von kleinen Zweigen des Nervus tibialis, der übrige Theil derselben vom N. plantaris externus und internus mit Zweigen versehen.

Der sympathische Nerv, Nervus sympathicus, oder das Gangliensystem, Systema gangliosum.

An allen Rückenmarksnerven, mit Ausnahme des untersten oder der 2 untersten befinden sich an der Stelle, wo sie durch die Intervertebrallöcher hindurch bringen oder hindurch zu bringen im Begriffe stehen, und kurz vor der Stelle, wo sich die vorderen und hinteren Wurzeln unter einander vereinigen, Nervenknoten, Ganglia spinalia.

Ein ähnlicher Knoten, Ganglion Gasseri, liegt an dem 5ten Gehirnnervenpaare, N. trigeminus, da, wo er im Begriffe ist, aus dem Schädel herauszugehen, und seine kleine Wurzel an den 3ten Ast der großen sich anzuschließen anfängt; ein ähnliches, nur sehr selten fehlendes Knötchen, Ganglion petrosum, sieht man an dem 9ten Hirn-

nervenpaare, N. glossopharyngeus, da, wo es durch das Foramen jugulare hervortritt, einen ähnlichen, ziemlich beständigen Knoten am 10ten Hirnnervenpaare, N. vagus, da, wo es noch im Foramen jugulare liegt, und ein wenig tiefer ein 2tes, da, wo der Nerv schon aus dem Foramen jugulare ausgetreten ist. Hierher gehört auch vielleicht die Anschwellung des N. facialis an seiner knieförmigen Beugung, da, wo er den Ramus superficialis des N. Vidianus aufnimmt.

Auch an einigen Nerven des Gehirns kommen Knoten vor. Das beständige unter ihnen, der Augenknoten, ganglion ophthalmicum, oder ciliare, nahe am unteren Aste des 3ten Nervenpaars, N. oculi motorius, an der äußeren Seite des Sehnerven in der Augenhöhle, ferner das weniger beständige Ganglion sphenopalatinum am Ramus sphenopalatinus des 2ten Astes des Trigemini in der Nähe der unteren Augenhöhlsenspalte, und das noch von Manchem in Zweifel gezogene Ganglion nasopalatinum im Foramen incisivum, endlich das häufig fehlende Ganglion submaxillare an den aus dem Zungenaste des N. trigeminus in die Submaxillardrüse eindringenden Fäden.

Die Nervenstämme, oder die Nervenzweige, an welchen sich diese Knoten befinden, und viele von den übrigen Nervenstämmen, an welchen keine solche Knoten sind, stehen durch Nervenfasern mit einer mittleren Reihe von Nervenknoten in Verbindung, welche zu beiden Seiten des Grundtheiles des Schädels und der Körper aller Wirbel der Wirbelsäule liegt, und hängen auf jeder Seite unter einander durch Nervenstränge zusammen, welche von einem Ganglion dieser mittleren Reihe immer zu dem nächsten gehen, und bald dick, bald dünn, bald einfach, bald doppelt oder mehrfach sind. Diese der Länge des Rumpfs nach und neben seinen Grundtheilen verlaufenden 2 Knotenstränge nannte man ehemals, und zum Theil thut man es noch, den Stamm des Nervus sympathicus, oder den Hauptstrang oder den Grenzstrang des sympathischen Nerven.

Die von den Gehirn- und Rückenmarksnerven zu diesem Knotenstrange hinzutretenden Nervenfasern kommen, wie Scarpa, Wutzer und Andere gelehrt haben, theils von derjenigen Portion dieser Nerven, die in ein Ganglion anschwillt, theils aber auch von der, die an der Bildung der Knoten der 1sten Reihe keinen Antheil nimmt, und folglich kommen sowohl von den hinteren als von den vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven Fasern zu dem Stamme des sympathischen Nerven, und diese Fasern vereinigen sich gewöhnlich an einer solchen Stelle mit diesem Knotenstrange, an welcher ein Knoten liegt. Bisweilen geht indessen auch ein oder der andere dieser Fasern in den zwischen 2 Knoten der mittleren Reihe gelegenen Verbindungsstrang über, wo dann aber der hinzukommende Faden sich vielleicht doch nur an jenen Strang anlegt, mit ihm zum nächsten Knoten geht, und sich erst da mit dem Hauptstrange des sympathischen Nerven innig verbindet.

Von diesem Hauptstrange des sympathischen Nerven gehen nun auch anderntheils Nervenfasern zu den am Halse, vorzüglich aber an der Brust und Bauchhöhle, zum Theil auch zu den neben der Bauchhöhle im Hodensacke gelegenen Absonderungs-, und der Willkühr entzogenen Bewegungsorganen, welche sich vielfach unter einander vereinigen, häufig den Arterien dieser Theile folgen und oft in eine 3te Classe von Nervenknoten eintreten, die ihrer Form, Zahl, Lage und Größe nach noch unbestimmter und veränderlicher sind als die 2te Reihe von Knoten, oder vollends als die 1ste Reihe derselben, und die sich dadurch auszeichnen, daß die größten und beständigsten nahe an oder in der mittleren Ebene liegen, durch welche man sich den Körper in eine rechte und linke Hälfte getheilt denken kann, und welche also oft selbst unpaar sind, oder wenigstens mit den Knoten und Geflechten des sympathischen Nerven der entgegengesetzten Seite in einer sehr nahen Verbindung stehen.

Auch diese Fasern gehen am häufigsten aus den Knoten des Hauptstranges. Seltener aus den die Knoten desselben verbindenden Strängen ab, und auch in diesem letzteren Falle stehen sie mit den Strängen, von welchen sie abgehen, in keiner so innigen Verbindung, als mit einem der nächsten Knoten; denn sie lassen sich deutlich in diesem Strange weiter bis zu einem benachbarten Knoten verfolgen, mit welchem sie aber dann inniger vereinigt sind.

Man darf daher nicht glauben, daß der Hauptstrang des sympathischen Nerven nur aus Fasern bestehe, die den Zweck hätten, die Verbindung der auf jeder Seite in einer Reihe liegenden Knoten der 2ten Classe zu bewirken, sondern er schließt auch an vielen Stellen Fasern ein, welche schon von diesen Knoten abgegeben worden sind, und zu gewissen absondernden, oder ohne Zuthun der Seele sich bewegenden Organen gehen, welche aber noch eine Zeit lang mit den die Verbindung der Knoten bewirkenden Fasern verbunden bleiben. Daher kommt es denn, daß der die Knoten verbindende Strang, wenn lange kein beträchtlicher Nerv zu jenen Organen abgegeben worden ist, von Knoten zu Knoten an Dicke zunimmt, weil nämlich nur scheinbar von den Knoten keine Fasern abgehen, indem die wirklich von ihnen abgehenden Fasern nur nicht sogleich sichtbar werden, weil sie eine Strecke hindurch mit dem Knotenstrange in Verbindung bleiben, und daher erklärt es sich auch, warum, wenn an einer Stelle von einem Knoten oder von einem Stücke des die Knoten verbindenden Stranges ein sehr dicker Nerv zu den oben näher bezeichneten Organen abgeht, immer der zu dem nächst tieferen Knoten gehende Verbindungsstrang plötzlich viel dünner wird.

Daß der Knotenstrang des sympathischen Nerven längs der Wirbelsäule liegt, scheint mit dem Zwecke zusammen zu hängen, daß alle Fä-

den der Rückenmarksnerven, welche zu den großen, in der mittleren Ebene des Körpers liegenden großen Blutgefäßen herüber gehen, auf ihn treffen und sich mit ihm durchkreuzen sollen.

Am Halse geht der Grenzstrang des sympathischen Nerven hinter der A. carotis vor dem Seitentheile der Körper der Halswirbel herab, in der Brusthöhle geht er von einem Rippenköpfchen zum andern herunter, im Bauche nähert er sich mehr der Mittellinie und dem der andern Seite und liegt vor den Körpern der Lendenwirbel; im kleinen Becken liegt er nach innen neben den vorderen Sacralhöhlen, und zuweilen dicht an den daselbst hervortretenden Nervenstämmen. Nach unten nähert er sich dann der andern Seite sehr, und vereinigt sich endlich mit ihm auf dem Kreuz- und Steißbeine.

Die in diesem Strange liegenden Knoten, und die die Knoten unter einander verbindenden Fäden der rechten und der linken Seite hängen nur an dieser letzteren Stelle durch bogenförmige, quer über die Mittellinie des Körpers weggehende Fäden unter einander zusammen. An andern Stellen wird dieser Zusammenhang durch Nerven bewirkt, welche abwärts zu den Organen abgehen und sich in der Mittellinie in Geflechten oder Knoten vereinigen. Auf der vorderen Seite des Schwanzbeins kommen die Knotenstränge beider Seiten in einem sehr kleinen, zuweilen kaum bemerklichen Knoten, dem Steißbeinknoten, Ganglion coccygeum, zusammen. Eine solche Vereinigung der beiden Knotenstränge ist am andern Ende derselben in der Nähe des Gehirns noch nicht nachgewiesen. Man hat von dieser Vereinigung des rechten und des linken Knotenstranges des sympathischen Nerven auf dem Schwanzbeine durch das Ganglion coccygeum häufig eine zu große Wirkung hinsichtlich der Vereinigung beider Seitentheile des sympathischen Nerven erwartet. Beide Knotenstränge vereinigen sich, wie gesagt, schon vorher auf dem Kreuzbeine so innig durch Quersäden, und hängen auch höher oben durch die der mittleren Ebene des Körpers zunächstliegenden Knoten und Geflechte so genau zusammen, daß derselbe Zusammenhang beider Seitentheile des sympathischen Nerven weit vollkommener höher oben als da unten geschieht.

Die Knoten des Knotenstranges entsprechen im Allgemeinen der Größe und Zahl der Gehirn- und Rückenmarksnervenfäden, mit welchen sie in Verbindung stehen. Am Halse, wo auf 8 Halsnerven und mehrere Gehirnnerven nur 2 bis 3 Halsknoten, Ganglia cervicalia kommen, sind 2 Knoten, die mit vielen Nerven in Verbindung stehen, das Ganglion cervicale supremum und bisweilen das Infimum vorzüglich groß. Dasselbe ist auch bei dem Ganglion thoracicum primum der Fall, welches auch meistens von mehreren Halsnerven mit Fäden ver-

sehen wird. Die übrigen Knoten des Knotenstranges in der Brust ganglia thoracica, von welchen immer eines auf einen Rückenmarksnerven kommt, sind kleiner. Die Lendennerven, ganglia lumbalia, sind dann sehr groß, wenn nicht ihrer 5, sondern weniger sind, wenn nämlich hier und da 2 Knoten zu einem vereinigt sind. Die Größe der Nervenknoten des Knotenstrangs stimmt aber nicht mit der Größe der Rückenmarksnerven überein. Mehrere Kreuzknoten, ganglia sacralia, sind ziemlich klein, ungeachtet die Nerven groß sind, von welchen die zu den Knoten gehenden Fäden ausgehen.

Die Größe der Knoten stimmt aber im Allgemeinen ungefähr mit der Größe der Fäden überein, welche von ihnen zu den Organen abgegeben werden, wenn man nämlich auch die Fäden berücksichtigt, welche den Knotenstrang noch ein Stück begleiten.

Die ganze Abtheilung des Nervensystems, welcher man den Namen des sympathischen Nerven oder der organischen, der vegetativen Abtheilung des Nervensystems beilegt, hat unter Andern offenbar den Zweck, viele aus dem Gehirne und Rückenmarke gekommene, zum Theile in die Knoten der Gehirn- und Rückenmarksnerven nicht eingetretene, zum Theil aber auch durch diese Knoten getretene Nervenfäden unter einander zu verbinden, und sie in die Knoten der 2ten Klasse (in die Knoten des Knotenstranges des sympathischen Nerven) aufzunehmen, und von diesen Knoten aus, Nervengeflechte abzuleiten, welche sich in der mittleren Ebene, durch welche man sich den Körper in eine rechte und linke Hälfte getheilt denken kann, auf das innigste vereinigen, und gewisse, dem Einflusse der Seele entzogene Organe mit Nervenfäden zu versehen. Alle Nervenknoten, sowohl die an den Stämmen der Gehirn- und Rückenmarksnerven befindlichen, als auch die übrigen scheinen durch die Fäden des sympathischen Nerven unter einander zusammen zu hängen, und es scheint kein Ganglion zu existiren, zu welchem nicht auf eine entweder mehr offenbare oder auch mehr verborgene Weise Nervenfäden des sympathischen Nerven gelangen.

Der Nervus sympathicus, und ganz vorzüglich seine Knoten sind bei dem Embryo verhältnißmäßig sehr groß. Schon J. F. Meckel ¹⁾ beobachtete bei einem vom Scheitel bis zum Steißbeine $3\frac{1}{2}$ Zoll langen menschlichen Embryo, daß unter den Nerven der N. vagus und die Ganglien des N. sympathicus vorzüglich durch ihre Größe auffielen. Das erste Ganglion war fast 2 Linien lang, eine breit, und über $\frac{1}{4}$ Linie dick. In demselben Verhältnisse waren die durch die Verbindung des Intercostalnerven mit den Rückenerven entstehenden Ganglien gleichfalls sehr groß, so daß mehrere einander unmittelbar berührten. Der Zwerchfellnerve und die Nerven der Extremitäten waren dagegen nicht auf-

¹⁾ J. F. Meckel, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie der Physiologie. Halle 1806.

stend groß. Diefelbe Bemerkung machte neuerlich Joh. Fr. Lobstein ¹⁾. Auch er fand, daß die Ganglien sehr groß waren und in der Brusthöhle einander sehr nahe standen. Bei einem 3 Zoll langen Embryo war das Ganglion cervicale supremum $2\frac{1}{2}$ Lin. lang. Bei einem 5monatlichen, 6 Zoll langen Embryo war das Ganglion cervicale supremum weniger platt als bei Erwachsenen, und 2 Linien lang und 1 Linie dick. Das Ganglion coeliacum werde von ihm bei einem andern, 3 Pfund schweren Embryo von 7 Monaten, 1 und 1 Linie im Durchmesser gefunden.

Man kann den Knotenstrang des sympathischen Nerven in den am Kopfe (pars cephalica), am Halse (pars cervicalis), in der Brusthöhle (pars thoracica), in der Bauchhöhle (pars lumbalis), und in der Beckenhöhle (pars sacralis) gelegenen Theil eintheilen, und an allen diesen Stellen die die Knoten unter einander verbindenden Verbindungsfasern, die von dem Gehirn und Rückenmark zu ihnen hinzutretenden äußeren Nervenfasern, und endlich die von ihnen zu den dem Einflusse der Seele entzogenen Organen abgegebenen, der mittleren Ebene des Körpers sich nähernden inneren Nervenfasern unterscheiden.

Der am Kopfe gelegene Theil des sympathischen Nerven, Pars cephalica nervi sympathici ²⁾.

So nennt man diejenige Fortsetzung des Nervus sympathicus, welche sich vom obersten Halsknoten, ganglion cervicale supremum aus, durch den Canalis caroticus, oder auf anderen Wegen in die Schädelhöhle begiebt, und sich daselbst mit noch mehreren Gehirnnerven vereinigt und auch daselbst zu gewissen Organen Fasern schickt. Der zum Kopfe aufsteigende Strang des sympathischen Nerven vereinigt sich nämlich mit mehreren Gehirnnerven auf eine sehr offenbare und sich sehr gleichbleibende Weise.

1) Namentlich vereinigt er sich durch einen von dem oberen Ende des ganglion cervicale supremum ausgehenden, in dem Canalis caroticus emporsteigenden Strang, welcher sich in 2, theils vor, theils hinter der Carotis gelegene Fasern spaltet, mit dem Ganglion sphenopalatinum des 5ten Nervenpaares, und an der Seite des Türkensattels mit dem 6ten Nervenpaare. (Diese Verbindung betrachtete man ehemals als den Ursprung des Knotenstranges des sympathischen Nerven,

¹⁾ Joh. Frid. Lobstein, de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis, commentatio anatomico-pathologica, Tabulis aen. et lithogr. illustrata, Parisiis 1823. 4. p. 47 cap. III. De nervi sympathetici in foetu evolutione.

²⁾ Hard. Wilh. Taube, Diss. inaug. de vera nervi intercostalis origine, praes. Hallero. Goettingae 1743, enthält die Geschichte der Entdeckungen über den obersten Theil des sympathischen Nerven bis auf Haller.

Leonhard Hirtel, Untersuchungen über die Verbindungen des sympathischen Nerven mit den Hörnerven; in Liebemann und Treviranus's Zeitschrift für Physiologie B. I. 1824. p. 197—236. und F. Arnold, der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, Heidelberg 1831. 4. haben die Geschichte dieses Nerven bis auf die neueste Zeit fortgesetzt.

und sah den Theil des Vißischen Nerven, Ramus profundus N. Vidiani, welcher hier vom Ganglion cervicale supremum als zum Ganglion sphenopalatinum gehend, beschrieben worden ist, als von diesem letzteren abgehend und zum Ganglion cervicale supremum kommend an). Obgleich diese Verbindung des Ganglion cervicale supremum nicht leicht fehlt, so ist doch die Zahl der Nervenfasern, welche zum 6ten Paare gehen, und die Ordnung, in welcher sie mit dem Vißischen Nerven zusammenstoßen, nicht immer dieselbe.

Nimmt man hypothetisch an, daß der vom Ganglion sphenopalatinum oder in dessen Nähe ausgehende, im Foramen incisivum sich von beiden Seiten her vereinigende N. nasopalatinus Scarpa's Fasern enthalte, welche zum Theil eine Fortsetzung jenes Ramus profundus Nervi Vidiani sind, so kann auch dieser Nerv als eine weitere Fortsetzung des Grenzstranges des Nervus sympathicus angesehen werden, und man hat dann den N. nasopalatinus als eine Anstalt zu betrachten, durch welche der Knotenstrang der rechten und der linken Seite sich auch im Kopfe unter einander verbinden; denn bekanntlich vereinigen sich beide Nervi nasopalatini im Foramen incisivum, und also in der Mittellinie des Körpers unter einander. Diese Ansicht, den Ramus profundus N. Vidiani und den N. nasopalatinus als eine Fortsetzung des Knotenstrangs des N. sympathicus anzusehen, hat unter Andern aus dem Grunde viel für sich, weil, wie neuerlich Sock gezeigt hat, die Gehirn- und Rückenmarksnerven (den N. vagus abgerechnet) sich nicht in der mittleren Ebene des Körpers von beiden Seiten her durch deutlich sichtbare Zweige vereinigen, selbst da nicht, wo große Nerven einander an dieser Ebene sehr nachkommen, wie an der Zunge und am Penis. Der N. nasopalatinus würde demnach eine auffallende Ausnahme bilden, wäre er nicht als ein Theil des N. sympathicus anzusehen, dessen Eigenthümlichkeit unter Andern gerade darin besteht, daß sich seine Aeste an vielen Stellen in der mittleren Ebene auf eine sehr offenbare Weise unter einander vereinigen, woher es denn auch zu rühren scheint, daß bei der halbseitigen Lähmung wohl zuweilen der halbe Mund und die halbe Zunge ihre Bewegung oder Empfindung verliert, nicht aber das halbe Herz oder der halbe Darmcanal. Uebrigens unterscheidet sich auch der Ramus profundus des N. Vidianus vom Ramus superficialis desselben durch die röthliche Farbe, welche an vielen Fasern des sympathischen Nerven so auffallend ist, daher man auch aus diesem Grunde geneigt sein kann, ihn für einen vom N. sympathicus zu dem Ganglion sphenopalatinum hinzukommenden Nerven zu halten.

Mehrere Anatomen ¹⁾, unter ihnen neuerlich auch H. Cloquet ²⁾, glauben an der Stelle der Vereinigung des rechten und linken N. nasopalatinus einen unpaaren, in der mittleren Ebene des Körpers liegenden Nervenknoten gefunden zu haben. Ein solcher unpaarer Knoten kommt sonst an keinem andern Gehirn- oder Rückenmarksnerven, wohl aber an vielen Stellen des sympathischen Nerven vor. Auch die Existenz eines solchen Knotens würde es wahrscheinlich machen, daß der N. nasopalatinus zum sympathischen Nerven zu rechnen sei, wäre sie nicht neuerlich von Arnold in Zweifel gezogen worden, und noch nicht gehörig erwiesen.

2) Ferner vereinigt sich der oberste Halsknoten durch einen in der Regel zum Ganglion petrosum des Nervus glossopharyngeus aufsteigenden, von da durch die Paukenhöhle zur Anschwellung des knieförmig gebogenen Nervus facialis übergehenden Fasern, mit dem 9ten und 7ten Gehirnnervenpaare. Da diese knieförmige Beugung des N. vagus durch den Ramus superficialis des N. Vidianus mit dem Ganglion sphenopalatinum

¹⁾ Siehe die Ausgabe dieses Handbuchs vom Jahre 1802 bei der Beschreibung des N. nasopalatinus.

²⁾ Hippol. Cloquet, Traité d'anat. descr. rédigé d'après l'ordre adopté à la faculté de méd. de Paris; 2me éd. Tome II. à Paris 1822. 8. p. 201 und des Diss. sur les odeurs, sur le sens et les organes de l'olfaction etc. Paris 1815. 4

nd von da durch den N. nasopalatinus mit dem Ganglion nasopalatinum zusammenhängt, so könnte man vielleicht auch auf den Gedanken kommen, auch diesen 2ten Strang für eine Fortsetzung des Knotenstranges des N. sympathicus zu halten, ungefähr so wie es bei den Fröschen offenbar der Fall ist, wo ein doppelter Strang das obere Ende des Knotenstranges des sympathischen Nerven mit dem 5ten Nervenpaare in Verbindung bringt.

3) Endlich vereinigt sich das Ganglion cervicale supremum durch einen oft zur oberen, oft auch zur unteren Anschwellung des Nervus vagus übergehenden Faden mit dem 10ten Gehirnnervenpaare, welche Verbindung aber zuweilen zu fehlen scheint, und daher von einigen, wie von *Wuher*, geläugnet worden ist.

Außer diesen offenbaren Verbindungsfäden, welche das Ganglion cervicale supremum mit Gehirnnerven vereinigen, giebt es noch mehrere weniger offenbare, weniger beständige und gewisse Verbindungen.

Nach *Haller*, *Huber*, *Zwanoff*, *H. Cloquet* und *Arnold* verbindet sich oben der sympathische Nerv auch mit dem N. hypoglossus oder mit dem 2ten Paare. *Arnold* sah diese Verbindung nie fehlen; nach *Sömmering* und *Hirzel* ist sie nur selten vorhanden, nach *J. F. Lobstein* immer nicht vorhanden. Nach *Gerold*, *Faunonier*, *Munnick*, *Bock*, *H. Cloquet*, *Hirzel*, *Arnold* und *Langenbeck* verbindet sich der sympathische Nerv auch zuweilen mit dem N. oculi motorius, oder mit dem 3ten Paare.

Mit dem N. accessorius *Villissii* kann er vielleicht auf eine verborgener Weise an der Stelle verbunden sein, wo dieser mit der hinteren Wurzel des ersten Rückenmarksnerven oder mit der knotenartigen Anschwellung des N. vagus verbunden ist. Denn durch diese letztere Anschwellung hängt nach *Bock* auch zuweilen der N. hypoglossus mit dem Ganglion cervicale supremum zusammen.

Man sieht hieraus, daß sich das Ganglion cervicale supremum mit der Hälfte aller Gehirnnerven verbindet, und daß zuweilen nur die 3 durch ihre Structur so sehr ausgezeichneten Sinnesnerven, der N. olfactorius, opticus und acusticus, so wie das 4te Paar von dieser Verbindung ausgenommen zu sein scheinen.

Mit mehreren dieser Hirnnerven ist das Ganglion cervicale supremum nicht bloß durch einen einfachen Faden, sondern durch mehrere Fäden verbunden.

Aus dem die Carotis interna umgebenden Geflechte geht zuweilen nur ein einziger Faden, oft aber kommen 2 oder 3 Fäden zum N. abducens an der Stelle, wo er durch den Sinus cavernosus und an der äußeren Seite der A. carotis cerebialis vorbeigeht.

Die an der Carotis cerebialis im Canalis caroticus emporsteigenden Fäden des ersten Halsknotens des sympathischen Nerven bilden daselbst oft ein Geflecht. Von diesem Geflechte gehen nach *Schmidel* Fädchen zum ersten und zum 3ten Paare des 5ten Nervenpaares, nach *Faunonier* zu dem in der Schädelhöhle befindlichen Theile des 1sten und 2ten Astes desselben, nach *Bock* zum ersten Aste *Arnold* zum Gasser'schen Knoten, nach *Arnold* zum 1sten Aste und zum Gasser'schen Knoten, nach *Langenbeck* zu dem 1sten und 2ten Aste des 5ten Nervenpaares in der Schädelhöhle.

Außerdem (sah *Fontana* ¹⁾, *H. Cloquet*, *Hirzel* und *Arnold* Fäden von diesem Geflechte zum Hirnanhange, und *H. Cloquet*, zum Trichter gehen. *Bock* ²⁾ hatte sich auch ungefähr wie jene Anatomen ausgedrückt.

¹⁾ Siehe *Girardi de nervo intercostali*. Florentiae 1791; in *Ludwig script. neurol.* min. Tom. III. p. 78.

²⁾ *Bock* Beschreibung des fünften Nervenpaares p. 66. *Hildebrandt, Anatomie*. III.

Mit Recht bestimmt er aber das, was er gesehen hat, in einer neueren Schrift ¹⁾ genauer, indem er sagt, »ein kleiner Zweig geht an einer Arterie zur Seelenbrüse des Gehirns, und dann verliert er sich früher oder später in den Häuten derselben.« Ich meines Theils habe früher mit möglichster Sorgfalt Untersuchungen über eine solche Verbindung des N. sympathicus mit der Glandula pituitaria bei Säugethieren und Vögeln angestellt, und mich völlig überzeugt, daß keine solche Verbindung der Substanz der Glandula pituitaria und des N. sympathicus bei diesen Thieren existirt.

Knoten, welche der Pars cephalica des sympathischen Nerven, und Nervenzweige desselben, die den in der Nähe gelegenen Organen angehören.

Der beständigste unter diesen Knoten ist das in der Augenhöhle an der äußeren Seite des Sehnerven gelegene Ganglion ciliare oder ophthalmicum, der Augenknoten, ein 2ter auch häufig, aber doch nicht immer vorhandener Knoten ist der an der 3ten Biegung der A. carotis neben dem Würfelsattel hinter dem 6ten Hirnnerven gelegene Knoten, ganglion caroticum, oder cavernosum, der Zellknoten.

Das Ganglion caroticum, welches schon von Petit und von Schmidt ²⁾ oberflächlich bemerkt und von letzterem auch abgebildet, dann von Laumonier, Boë, H. Cloquet, J. F. Lobstein und Hirzel beschrieben, und von Arnold neuerlich gänzlich geläugnet worden ist, ist wenigstens nicht beständig vorhanden. Es liegt in dem Nervengeflechte, welches die Carotis interna umgiebt an der äußeren Seite der Carotis, ist meistens kleiner als das Ganglion ophthalmicum, und hat also etwa 1 Linie im längeren Durchmesser. Von ihm gehen mehrere dünne Fäden aus, von welchen einige schon erwähnt worden sind, nämlich die zum 3ten Hirnnerven zum 1sten Ast und zum Ganglion des 5ten Paares und zu dem Ciliarknoten, oder zu den Wurzeln desselben. Darüber, ob die Gehirnarterien von Ästen des sympathischen Nerven bis zum Gehirne begleitet werden, ist noch Streit. Lancisi, Keil, Ribes, Boë, Arnold und Langenbeck sind theils dieses anzunehmen geneigt, theils glauben sie dergleichen Zweige wirklich wahrgenommen zu haben.

Das Ganglion ophthalmicum, welches schon oben beschrieben worden ist, steht mit dem Nervus nasociliaris des 1sten Astes des N. trigeminus durch die lange dünne, und mit dem unteren Aste des N. oculorum motorius durch die kurze und dicke Wurzel in Verbindung. Außerdem gehen zu ihm nach Ribes, Boë, H. Cloquet, Hirzel, Arnold und Langenbeck ein oder einige sehr kleine Fäden von dem an der Carotis interna gelegenen Geflechte des sympathischen Nerven hin. Zuweilen gelangen diese Fädchen nicht unmittelbar bis zu dem Knoten, sondern sollen nach Boë, H. Cloquet in den N. oculi motorius, oder in den 1sten Ast des 5ten Nervenpaars eindringen, und sich unter der Scheide dieser Nerven bis zu den Wurzeln des Augenknoten verfolgen lassen. Ziebart fand einmal, daß ein ziemlich starker Faden vom Ganglion sphenopalatinum abging, durch die untere Augenhöhlenfalte in die Augenhöhle drang und mit der von N. oculi motorius hervührenden Wurzel in das Ganglion ophthalmicum eindrang.

¹⁾ Boë, Handbuch der practischen Anatomie. Weizen 1820. 3. B. 1. S. 202.

²⁾ C. G. Schmidt, epistola anatomica, qua de controversa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur ad. Joh. Wilh. Wernerum. Erlangae 1747.

³⁾ Siehe Arnold a. a. D. 2. II. S. 157.

Chaussier und Riebes ¹⁾ Kufel ²⁾ Langenbeck fanden ein dünnes Nervenfädchen, welches aus dem an der Carotis int. gelegenen Geflechte, oder nach Tiedemann, Kufel und Langenbeck aus dem Ganglion ciliare selbst mit der A. centralis retinae in den Sehnerven einbrang. Chaussier und Riebes sahen unter Wasser, daß ein Bündel des Nervengeflechts an der Carotis interna zur A. ophthalmica überging, und sich für alle ihre Aeste verzweigte und auch die Netzhautpulsader versah. Arnold verfolgte auch dergleichen Aeste eine Strecke an der A. ophthalmica.

Tiedemann ³⁾ sah an den Augen größerer Thiere, deren Arterien sehr vollkommen angefüllt worden waren, feine, aus dem Ganglion ophthalmicum entsprungene Nervenfäden, die die in den Sehnerven eindringenden Arterienzweige und die Ciliararterien begleiteten, und theils in die fibröse Scheide des Sehnerven, theils in die Häute des Augapfels eindrangen und zur Retina gelangten, und glaubte sie bis an die Zonula ciliaris verfolgen zu können. Diesen Eintritt von Nervenfäden mit der A. centralis und auf anderen kleinen Arterienzweigen in den Sehnerven und mit den AA. ciliaribus in den Augapfel nahm er auch an menschlichen Augen wahr.

Langenbeck bildet den in den Sehnerven eindringenden Nervenfaden so ab, als ob er in der Aere desselben bis zur Retina verfolgt worden, und sich auf der Retina in Zweige getheilt habe. Bell und Langenbeck sahen auch, daß die Aeste der A. ophthalmica von kleinen, vom 1sten Aste des 5ten Paares hergegebenen Fäden begleitet werden.

Der am Halse gelegene Theil des sympathischen Nerven.

Der oberste Halsknoten, ganglion cervicale supremum, ist länglich, und läuft nach oben und nach unten schmal zu. Er steht von vielen Blutgefäßen röhlich aus, übrigens ist er von unbeständiger Gestalt ⁶⁾ und Länge ⁷⁾, liegt vor den obersten Halswirbeln, und erstreckt sich, je nachdem er kürzer oder länger ist, vom ersten bis zum 3ten Halswirbel hinab.

Er enthält einen Faden oder mehrere Fäden vom Vereinigungsaeste des ersten und zweiten Halsnerven ⁸⁾; einen Faden oder mehrere

¹⁾ Tiedemanns etc. Zeitschr. für Physiol. B. II. p. 167.

²⁾ Tiedemanns etc. Zeitschr. für Physiol. B. II. p. 227.

Ribes, Mémoires de la société méd. d'émulation. Paris 1811. Vol. VII. p. 97 sq. und Meckels Archiv B. IV. S. 620.

³⁾ Langenbeck, Icones anatomicae; Neurologia; Fasc. 3. Tab. XVIII und XX.

⁴⁾ Zeitschrift für Physiologie. Heidelberg 1824. 4. B. 1. 254 — 457.

⁵⁾ Bisweilen ist er in der Mitte einmal oder zweimal schmaler, so daß er ein zweifacher oder dreifacher Knoten ist, bisweilen ist er mehr platt, in andern mehr rund. Langenbeck sah ihn völlig in 2 Knoten getheilt. Icones anat. Neurologia; Fasc. III. Tab. XVIII.

⁶⁾ In einigen ist er nur einige Linien, in andern über 2 Zoll lang. Neubauer fand einen von 3 Zoll 9 Linien lang. (De nerv. intercost. §. 9.) Wenn er aber sehr lang ist, vertritt er oft zugleich die Stelle des Ganglion cervicale medium. Dieser Knoten und der sympathische Nerv überhaupt verhält sich oft auf der einen Seite nicht eben so wie auf der andern. Der obere Halsnerv i. B. kann auf der einen Seite sehr lang, auf der andern sehr kurz sein, auf der einen Seite kann das Ganglion cervicale medium da sein, auf der andern kann es ganz fehlen. (Siehe hierüber Lobstein de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis. Parisiis 1823. 4. p. 5.)

⁷⁾ Diese Verbindungsfäden sind nicht da, wenn der Stamm über dem Knoten einen Saften vom ersten Halsnerven erhält. (Neubauer §. 11.)

Fäden von dem des 2ten und 3ten Halsnerven, oder auch vom 2ten und vom 3ten Halsnerven einzeln. Der letztere Faden geht jedoch nicht selten unterhalb des Knotens zum Stamme des Nerven.

Vom untern Ende dieses obersten Halsknotens geht der Stamm des Nerven vor den Halswirbeln, und zwar zunächst vor dem *M. rectus anticus major*, dann vor dem *M. longus colli*, hinter der *Carotis* hinab, an welchem er jedoch so wenig anhängt, daß, wenn man die *Carotis*, den *N. vagus* und die *V. jugularis* in die Höhe hebt, der Stamm des *N. sympathicus* nicht an ihnen, sondern an jenen Muskeln hängen bleibt.

Auf diesem Wege erhält er, wie schon bemerkt worden, bisweilen Fäden vom Vereinigungsfasse des 3ten, 4ten ¹⁾ und 5ten Halsnerven, die bisweilen aber zum untern Knoten gehen.

Häufig, nach *S. F. Meckel d. j.*, im Verhältnisse wie 3:1 befindet sich zwischen dem obern und untern ²⁾ Halsknoten, noch ein mittlerer Halsknoten, *ganglion cervicale medium*, in der Gegend des 5ten oder des 6ten und des 7ten Halswirbels, meistens aber über der *A. thyreoidea inferior* ³⁾. Dieser ist immer kleiner, als der obere, meist auch kleiner als der untere Knoten, selten größer als er.

Er erhält einen oder mehrere Fäden vom 3ten bis 5ten, seltener vom 6ten Halsnerven ⁴⁾.

Endlich endigt sich das Halsstück des Nerven im untern Halsknoten, *ganglion cervicale infimum* ⁵⁾. Dieser liegt gewöhnlich vor der Wurzel des Querfortsatzes des 7ten Halswirbels, hinter, über oder vor der *A. thyreoidea inferior*. Bisweilen hängt er mit dem obersten Brustknoten zusammen. Meistens liegen der mittlere und der untere Halsknoten nahe bei einander, zuweilen so nahe, daß sie in einen Knoten sich zu vereinigen anfangen.

Der untere Halsknoten ist immer kleiner als der obere, und von verschiedener Gestalt, platt, länglich, rundlich, eckig, oval, *z.* bisweilen doppelt.

Er erhält einen oder 2 Fäden vom 4ten, 5ten und 6ten, seltner

¹⁾ Selten, wenn der untere Knoten sehr tief liegt, erhält er noch einen Faden vom 5ten, noch seltner einen vom 6ten Halsnerven.

²⁾ Bisweilen spaltet sich der Nerv, so daß ein Ast desselben das *Ganglion medium*, der andere das *infimum* bilden hilft. (*Haller el. phys. IV. p. 158.*)

³⁾ Selten unter derselben, oder vor ihr (*Sömmering Nervenlehre §. 320. Zweite Ausg. §. 272.*)

⁴⁾ *Neubauer §. 26.* glaubte auch eine Verbindung mit dem *N. phrenicus* gefunden zu haben.

⁵⁾ Oft spaltet sich der Nerv über dem untern *Ganglion*, und vereinigt sich wieder, so daß er die *A. thyreoidea inferior* umschlingt. *Neubauer tab. n. 31. 32.*

vom 7ten oder vom 8ten Halsnerven, je nachdem er größer oder kleiner ist. Manche von diesen Fäden gehen nach Bock im Canalis vertebralis der Querfortsätze der Halswirbel zu ihm herab ¹⁾).

Aus dem untern Halsknoten geht der Stamm des Nervus sympathicus in den sehr nahe bei ihm gelegenen obersten Brustknoten über. Dies geschieht auf verschiedene Weise, doch meistens so, daß er mit ihm durch einige kurze Fäden verbunden ist, und daß durch längere Fäden eine oder 2 Schlingen, ansae, entstehen, welche die A. subclavia umgeben. Wenn diese Schlingen hier fehlen, so befinden sie sich meistens zwischen dem Ganglion cervicale medium und infimum. Zuweilen theilt sich der Hauptstrang des N. sympathicus da, wo er aus dem Ganglion cervicale medium in das Ganglion cervicale infimum übergeht, so, daß ein Theil desselben unmittelbar vom Ganglion cervicale medium in das Ganglion thoracicum primum tritt ²⁾).

Zweige der Halsknoten und des Stranges zu benachbarten Organen.

An der vorderen Seite des obersten Halsknotens kommen erst über der Stelle, wo sich die A. carotis communis spaltet, die röhrlischen sogenannten weichen Nerven, nervi molles ³⁾, oder Gefäßnerven ⁴⁾ von unbeständiger Anzahl, (2, 3 bis 6) hervor. — Sie schlingen sich um die Carotis cerebralis und facialis, und verbinden sich unter einander, auch mit Fäden von den Ramis pharyngeis des Glossopharyngeus und des Vagus, und machen so ein zartes Geflecht aus. Zuweilen bilden sie auch ein kleines, zwischen der Carotis cerebralis und facialis gelegenes Knötchen. Sie begleiten die Aeste der Carotis facialis, und stoßen am Eschlunde, an der Submaxillardrüse und an den Stellen mit den beschriebenen Aesten der Gehirnerven zusammen.

Einer dieser Aeste des obersten Halsknotens oder 2 verbinden sich mit einem Aste des N. laryngeus superior. Vorzüglich stark sind die

¹⁾ Bock, die Rückenmarksnerven nebst Abbildungen auf 7 Kupfertafeln in Fol. Leipz. 1827. 8. (Text in 8. 543. J. F. Lobstein, (De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis. Parisiis 1823. 4. p. 10) behauptet, daß dieses Ganglion bei den meisten Leichnamen, welche er untersuchte, keine Gemeinschaft mit den Halsnerven gehabt habe.

²⁾ Nach J. F. Lobstein a. a. O. S. 11 hängt das Ganglion cervicale infimum mit dem Ganglion thoracicum primum, das von ihm nur etwa 2 Linien weit entfernt ist, gewöhnlich auf eine dreifache Weise zusammen, durch die Fortsetzung des Stammes, durch 2 bunte Zweige, welche um die A. vertebralis eine Schlinge bilden, und endlich durch einen einfachen oder auch nicht selten doppelten Zweig, welcher um die A. subclavia eine Schlinge bildet.

³⁾ Zuerst erwähnt in Lancisi de gangliis p. 109. Nachher bestimmt und mit jenem Namen benannt in Haller (el. phys. IV. p. 236.) Neuester genau und umständlich nach mehreren Präparaten beschrieben in Neubauer descr. nerv. card. §. 12 — 18.

⁴⁾ So nennt sie Sommering (Nervenlehre §. 518. 2te Ausg. §. 270.), weil sie vorzüglich den Schilddrüsen angehört.

Nervenfäden, welche sich, wie gesagt, dem Plexus pharyngeus, welcher vom N. vagus, accessorius und glossopharyngeus gebildet wird, beigesellen. Einige Fäden begleiten auch die A. thyreoidea superior zur Schilddrüse. Einige steigen an der Carotis cerebralis empor, und bilden daselbst mit Ästen des N. glossopharyngeus ein Netz, in welchem zuweilen ein kleiner platter Knoten befindlich ist.

Ein langer Faden, nervus cardiacus longus, der bald aus dem unteren Ende des Ganglion cervicale supremum, bald aus dem Strange des N. sympathicus entspringt, zuweilen fehlt, nicht selten aber mit einem Faden vom N. laryngeus superior, oder weiter unten mit einem Aste vom N. vagus in Verbindung steht, geht zum Plexus cardiacus hinab. Er liegt mehr nach innen als der Hauptstrang des N. sympathicus, und ist dünner als er.

Aus dem mittlern Halsknoten, wenn er da ist, oder wenn er fehlt, aus dem Stamme des N. sympathicus in der Gegend desselben, gehen oft einer oder 2 Fäden zu dem an der Aorta liegenden Plexus cardiacus hinab, die sich auch mit dem Nervus cardiacus longus und mit dem Recurrens verbinden, und Fäden zu den Kranzadern des Herzens und zuweilen auch zum Schlunde schicken.

Andere Zweige umgeben die A. thyreoidea inferior, die A. vertebralis und die A. subclavia mit einem Netze. Aus dem Stamme des N. sympathicus über dem untern Halsknoten kommen einer oder 2 Fäden, die sich mit den ebengenannten Fäden, auch mit Fäden des N. cardiacus longus und des N. vagus u. zum Plexus cardiacus verbinden.

Aus dem untern Halsknoten gehen einer, 2 oder mehrere Fäden hinab, die zum Plexus cardiacus kommen, sich mit Fäden des Stammes des N. vagus und des von ihm entspringenden N. recurrens, ferner mit Fäden des Nervus cardiacus longus, mit den des mittlern Halsknotens oder des Stammes des sympathischen Nerven verbinden. Zuweilen entspringt der dickste von den Fäden, die zu dem Herzgeflechte gehen, von dem untern Halsknoten oder von dem Ganglion thoracicum primum, zuweilen aber auch von dem mittleren Halsknoten.

In dem Plexus cardiacus kommt bisweilen ein kleines Knötchen vor, und unter den Herznerven, die durch die Vereinigung mehrerer Fäden in diesem Geflechte zusammengesetzt werden, zeichnet sich einer durch seine Größe vorzüglich aus. Wrisberg ¹⁾ gab ihm den Namen nervus cardiacus maximus. Er und noch ein 2ter ziemlich dicker

¹⁾ Wrisberg, de nervis arterias venasque comitantibus comment. §. 25. und Sylloge comment. anat. Goetting. 1766. 4. p. 59.

ist liegen zwischen der Luftröhre und der Aorta, und gehen dann zwischen der Aorta und der A. pulmonalis zum Herzen, und stehen daselbst, von der rechten und linken Seite kommend, in wechselseitiger Verbindung. Nach den Untersuchungen von Ribes ¹⁾, so wie auch nach denen von Baur ²⁾ gehen von den Geflechten, welche die A. subclavia umgeben, Fäden auch an der Arterie hin. Nach Scarpa ³⁾ begleiten einige Fäden, die aus diesem Geflechte kommen, die A. mammaria interna und die A. thymica in die Cavitas mediastini antica. G. Coopmann glaubte sogar Aeste vom N. vagus und vom N. sympathicus zum Herzbeutel und zur V. cava superior verfolgt zu haben ⁴⁾.

Der in der Brusthöhle gelegene Theil des sympathischen Nerven. Pars thoracica nervi sympathici.

Der Anfang dieses Theiles des Nervus sympathicus ist der obere oder große Brustknoten, ganglion thoracicum primum s. supremum s. magnum. Dieser Knoten ist nächst dem obersten Halsknoten der größte des Knotenstrangs. Immer ist er größer als die folgenden Brustknoten und als der untere Halsknoten. Er liegt vor dem Köpfchen der ersten Rippe, hinter der A. subclavia, und reicht mehr oder weniger hinauf oder hinab, und verschmilzt bisweilen mit dem 2ten Brustknoten oder mit dem untersten Halsknoten. Seine Gestalt ist unbekändig, plattrundlich, oval, eckig, cylindrisch u.

Er empfängt die Fortsetzung des Stammes des Nervus sympathicus, ferner einen ansehnlichen Faden vom 1sten Rückenerven, auch Fäden vom 8ten, 7ten, 6ten Halsnerven u. Mehrere aus dem Canalis vertebralis der Querfortsätze der Halswirbel hervortretende Fäden stehen mit ihm in Verbindung. Einige von ihnen sind Aeste der unteren Halsnerven, die auf diesem Wege zu ihm gelangen, andere scheinen die A. vertebralis als Gefäßnerven zu begleiten. Diese letztere verfolgte Boer bis zum 2ten Halswirbel hinauf ⁵⁾.

Das Ganglion thoracicum primum giebt Fäden zum Plexus

¹⁾ Ribes, Mém. de la soc. d'émulat. VIII. 1817, und in Meckels Archiv V. p. 442.

²⁾ Chr. Jac. Baur, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani etc. Tubingae 1818. 4. p. 15.

³⁾ A. Scarpa, Tabulae neurologicae ad illustrandam historiam cardiacorum nervorum. Ticini 1794. p. 28.

⁴⁾ G. Coopmann, Neurologia Franecq 1781. p. 106 und 342.

⁵⁾ S. F. Lobstein sah vom Ganglion cervicale medium Zweige zwischen dem 6ten und 8ten Halswirbel in den Vertebralcanal treten, zur A. vertebralis gehen, und in ihr endigen.

cardiacus, von welcher bisweilen einer oder einige den großen Herznerven bilden helfen.

Vom obersten Brustknoten geht der Nervus sympathicus an der vordern Fläche der Köpfehen der Rippen, neben den Rückenwirbeln hinab, und hat noch elf ¹⁾ Brustknoten, ganglia thoracica, welche kleiner als der obere, platt, übrigens von verschiedener Gestalt, meist dreieckig, auch von verschiedener Größe sind. Der Stamm des Nerven geht von jedem dieser Knoten zum nächst untern hinab. Die Dicke des Stamms ist nicht in allen Zwischenräumen gleich, auch ist er bisweilen in einem oder dem andern Zwischenraume doppelt so groß.

In jedem Spatium intercostale liegt ein solcher Knoten. Jeder Knoten empfängt einen, 2 oder 3 Fäden vom Ramus intercostalis des nächsten Rückenervens. Wo nur ein Faden zu ihm kommt, da ist dieser dicker, 2c.

Aus den Knoten gehen Aeste zur absteigenden Aorta, auch Aeste zum Plexus oesophageus des N. vagus.

Die Knoten, ungefähr vom 6ten bis zum 11ten geben stärkere Fäden schräg einwärts hinab, welche an den Körpern der Wirbelsäule den Nervus splanchnicus major zusammensetzen und zuweilen, wenn ein vom 9ten oder 10ten und 11ten Ganglion kommender Faden sich nicht mit den großen Eingeweidenerven vereinigt, noch einen 2ten kleineren Eingeweidenerven den Nervus splanchnicus minor bilden ²⁾. Der N. splanchnicus major läuft hinter der Brusthaut gewöhnlich zwischen dem mittleren und inneren Schenkel des Zwerchfells, selten durch den Hiatus aorticus in die Unterleibshöhle. Der N. splanchnicus minor, wenn er vorhanden ist, durchbohrt meistens die Fasern des Zwerchfells am mittlern Zwerchfellschenkel.

Bisweilen kommt von den letzten Brustnerven ein Nervus renalis posterior superior, der hinter dem Schenkel des Zwerchfelles herab, und über den Nierenadern zur Niere geht.

Diesen Nerven führt *Wrisberg* unter dem Namen N. splanchnicus minor auf, weil er den Nerven, welchen *Waller* N. splanchnicus minor nennt, nicht fand.

¹⁾ Von welchem Theile des Knotenstranges die den N. splanchnicus zusammensetzenden Nerven auf eine sichtbare Weise abgehen, ist sehr unbestimmt. In der That kommt auch darauf nicht viel an, ob die von einem Knoten zu ihm gegebenen Fäden sogleich den Knotenstrang verlassen, oder sie noch eine Strecke hindurch mit dem Knotenstrange verbunden bleiben. Je länger keine Fäden von ihm abgehen, desto dicker wird der Knotenstrang. Nach *Wrisberg* wird der N. splanchnicus major mindestens aus 3, höchstens aber aus 8 Fäden zusammengesetzt.

²⁾ Also insgesammt elf oder zwölf Ganglia thoracica.

Der an den Lendenwirbeln gelegene Theil des sympathischen Nerven, Pars lumbaris nervi sympathici.

Vom untersten Brustknoten tritt die Fortsetzung des Nervus sympathicus magnus zwischen dem Crus externum und medium, oder durch das Crus externum der Pars lumbaris des Zwerchfells aus der Brust in den Unterleib, geht dann an der Seite der Lendenwirbel weiter nach der Mitte zu liegend, als in der Brust,) hinab, und bildet die Lendenknoten (ganglia lumbaria). Meist sind ihrer fünf, einer bei jedem Lendennerve, doch bisweilen auf einer Seite oder auf beiden nur 4, seltner nur 3. Bisweilen sind 2 Knoten in einen länglichen Knoten vereinigt. Die 4 oberen liegen wie gesagt weiter von ihren Nerven nach innen entfernt, als die Brustknoten und Kreuzbeinknoten. Sie sind meistens länglich und nehmen im Allgemeinen vom 1sten bis zum 5ten an Größe zu, doch ist bisweilen das 2te größer, als das 3te, u. die Dicke des Stamms ist nicht in allen Zwischenräumen gleich; auch ist er bei einigen in einem oder dem andern Zwischenraume doppelt, dreifach u.

Jeder Knoten empfängt Fäden von dem nächstobern Lendennerve, bis 5, die je mehr, desto dünner sind. Bisweilen geht auch einer oder der andere Faden zum Nerven zwischen 2 Knoten, oder auch, es kommen Fäden, welche von 2 benachbarten Lendennerven abgegeben worden sind, zu einem Knoten.

Aus den Lendenknoten, theils auch aus dem Strange zwischen denselben, kommen Fäden, die zur Aorta, zu den A. A. iliacis lumbaribus u. gehen.

Einige Fäden vereinigen sich vor den Lendenwirbeln mit einander in Nebenknoten, die weiter nach der Mitte liegen, andere kommen bisweilen vor den Lendenwirbeln mit Fäden der andern Seite zusammen.

Aus dem obersten Theile des Stranges, oder aus dem obersten Ganglion lumbari, oder noch höher, kommt der Nervus renalis posterior inferior, der hinter den Schenkeln des Zwerchfells zur Niere geht.

Pars sacralis.

Von der vorderen Fläche des letzten Lendenwirbels gelangt der Nervus sympathicus auf die vordere Fläche des Kreuzbeins, geht auf denselben, weiter nach der Mitte liegend, als die vorderen Kreuzbeinlöcher, hinab, lenkt sich, wie der Kreuzbeinknochen allmählig schmaler wird, auch allmählig mehr nach der Mitte, so daß er sich dem nämlichen Nerven auf der andern Seite nähert, und endlich auf der vorderen Fläche des

Steißbeins beide Nervi sympathici mit einander unter einem spitzen Winkel oder in einer Schlinge ¹⁾, vereinigt werden ²⁾.

Auf diesem Wege bildet er die Kreuzbeinknoten, ganglia sacralia, deren gemeiniglich fünf, selten einer mehr oder weniger sind. Die 4 oberen liegen neben den 4 vorderen Kreuzbeinlöchern, der 5te liegt neben dem Ausgange des 5ten Kreuzbeinnerven zwischen dem Kreuzbeine und dem Steißbeine. Sie sind platt, übrigens von verschiedener Gestalt, meist eckig, und nehmen vom ersten bis zum letzten an Größe ab. Der Stamm ist zwischen diesen Knoten von verschiedener Dicke, und viel dünner, als in der Pars lumbaris; auch ist er bei einigen in einem und dem andern Zwischenraume doppelt, dreifach ic.

Jeder Knoten empfängt einen, 2, 3 Fäden vom nächsten höheren, zuweilen auch von tieferen Kreuzbeinnerven, die, je mehrere ihrer sind, desto dünner gefunden werden. Auch gehen theils Fäden zu dem zwischen den Knoten gelegenen Strange des Nerven. Diese zu den Kreuznerven gehenden Fäden sind an manchen Stellen sehr kurz, so daß die Knoten den Kreuznerven sehr nahe sind.

Aus den Kreuzbeinknoten, theils auch aus den Theilen des Nerven zwischen denselben, gehen Fäden zu dem Beckengeflechte, plexus hypogastricus des N. sympathicus, zum Mastdarne und zu den Arteriis sacralibus, ic.

Einige Vereinigungsfäden kommen an der vorderen Fläche des Kreuzbeins schräg oder auch quer zum Nervus sympathicus der andern Seite hinüber, so daß sie beide Nerven mit einander verbinden.

Indem endlich beide Nervi sympathici vor dem Steißbeine sich vereinigen, entsteht daraus das unpaare von oben nach unten längliche Steißbeinknödtchen, ganglion coccygeum, aus welchem einige Fädchen in das benachbarte Zellgewebe gehen. Nicht selten fehlt das Knödtchen ganz, und es ist dann nur eine Schlinge vorhanden, aus welcher jene kleinen Nervenzweige austreten.

Geflechte des sympathischen Nerven in der Brust- und Unterleibshöhle.

Geflechte in der Brusthöhle, das Geflecht für das Herz, für die Lungen und für die Speiseröhre.

Theils vor dem Aortenbogen, noch mehr aber zwischen der aufsteigenden Aorta und dem rechten Hufe der Lungenarterie, und auch endlich

¹⁾ Diese Verbindung und Vereinigung beider großer sympathischer Nerven hat zuerst J. J. Walter entdeckt und abgebildet auf i. Tab. I. Fig. 1. nervor. thoracis et abdominis.

²⁾ Jo. Frid. Lobstein, de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis p. 39.

eben ihr, daß heißt vor und hinter dem Stamme der Lungenarterie, liegt das Herzgeflecht, *plexus cardiacus*, welches meistens von den schon erwähnten Zweigen der 3 Halsknoten und des ersten Brustknotens, ferner von einigen kleineren Ästen des *N. vagus* und seines Astes, des *N. recurrens*, zusammengesetzt wird. In einigen von den Anatomien aufgezeichneten Fällen soll auch der *Ramus descendens* des *N. hypoglossus* damit im Zusammenhange gestanden haben.

Immer kommen in diesem Geflechte die Nerven von beiden Seiten, von der rechten und von der linken Seite her in der mittleren Ebene, die den Körper in 2 Hälften theilt, zusammen.

Die Zahl und die Größe der vom obersten, mittleren und unteren Halsknoten, und vom ersten Brustknoten kommenden in dieses Geflecht tretenden Nerven, ist unbestimmt. Meistentheils ist die Zahl, die Größe und die Anordnung dieser Fäden, nicht einmal auf der rechten Seite den so beschaffen wie auf der linken.

Die Nervenzweige des *N. sympathicus*, welche auf der rechten Seite vor der *A. anonyma* und auf der linken Seite vor dem Aortenbogen herabgehen, nennen manche Anatomen *plexus cardiacus superficialis*, die viel dickeren und zahlreicheren Nervenzweige dagegen, welche vom sympathischen Nerven und vom *N. vagus* hinter dem Aortenbogen zwischen ihm und der Luftröhre herabgehen, nennen dieselben *plexus cardiacus magnus* oder *profundus*. Beide Geflechte hängen untereinander zusammen, und können nicht einzeln zum Herzen verfolgt werden, auch gehört der *N. cardiacus longus*, wenn er vorhanden ist, beiden Geflechten an.

Einige von den Nerven, welche hinter der Aorta weggehen und sich durch ihre Dicke vorzüglich auszeichnen, entspringen zwar hauptsächlich aus Fäden des *Ganglion cervicale medium*, *insimum* und *thoracicum primum*. Indessen stehen sie auch mit den Fäden, die der *N. vagus*, und namentlich auch sein Ast der *N. recurrens* giebt, und mit dem *N. cardiacus longus*, wenn er vorhanden ist, in Verbindung. Die von der rechten und von der linken Seite gekommenen Nervenfäden öffnen zwischen der *A. aorta* und dem rechten Aste der *A. pulmonalis* zusammen. An dieser Stelle zuweilen aber auch schon höher oben, und hier und da an den Vereinigungsstellen der Nerven kleine, sich aber nicht bei verschiedenen Menschen gleich bleibende Verdickungen, die man für kleine Nervenknoten halten könnte, sichtbar.

Von der Stelle aus an dem Anfange der hinteren Wand der Aorta, wo sich die von der rechten und linken Seite gekommenen Nervenfäden zum Theil vereinigt haben, gehen Nervenfäden zum *Atrium dextrum*. Einige laufen nämlich zur *A. coronaria dextra* und gehen mit derselben

zur Quersfurche des Herzens und zum rechten Ventrikel, andere gehen unmittelbar zu dem in der Quersfurche herumgebogenen Aste der *A. coronaria dextra*, und verstärken das aus jenen Nervenfäden entspringende Geflecht, das man *plexus coronarius dexter* nennt. Die Zahl und Größe der diesen Plexus bildenden Nervenfäden, steht mit der viel geringeren Menge der Fleischfasern im Verhältnisse, welche in der rechten Herzhälfte enthalten sind; der *Plexus coronarius dexter* ist daher kleiner als der *Sinister*. Uebrigens bekommen sowohl das rechte Atrium als der rechte Ventrikel von jenem Plexus seine Nerven. Andere hinter dem Anfange der Aorta und der Lungenarterie gelegene Nervenzweige begeben sich zur linken Herzhälfte, indem sie zum Theil zwischen der Aorta und der *A. pulmonalis* vorn zum Vorschein kommen und die *A. coronaria sinistra* begleiten, theils hinter dem Anfange der *A. pulmonalis* und dem *Atrio sinistro* hin zu dieser Herzhälfte gehen.

Zwar begleiten die Herznerven größtentheils Aeste der Herzarterien, indessen trifft man auch, wie *Scarpa* und *Lobstein* gezeigt haben, bei einer genauen Verfolgung der Aeste derselben Nervenfäden an, welche ihren eigenen von dem Laufe der Arterien verschiedenen Weg verfolgen.

So sah *Lobstein* ¹⁾ einige Fäden der Art, die nicht von Arterien begleitet wurden, zu dem Fleische des rechten und des linken Atrii geben. Einen an der Basis des linken Ventrikels liegenden Nerven sah er in die Tiefe dringen und sich in einem Papillarmuskel und auch einige andere Zweige sich im Fierde des linken Ventrikels endigen.

Was die Frage anlangt, ob die auf der rechten und die auf der linken Seite des Körpers entsprungenen Herznerven sich gleichmäßig zu allen 4 Abtheilungen des Herzens verbreiten, so hat schon *Scarpa* ²⁾ den Satz ausgesprochen, daß sie von beiden Seiten her an der Grundfläche des Herzens so zusammenkommen und sich so durchkreuzen, daß sowohl die vordere als auch die hintere Seite beider Herzhälften aus den auf der rechten und auf der linken Seite des Körpers entsprungenen Herznerven Fäden erhalten.

Uebersieht man nun den Ursprung der Herznerven und der mit der Lungenarterie in die Lungen eindringenden Nerven, so findet man, wie auch *Lobstein* verüchert, daß zwar kein einziger Zweig des *N. vagus* unmittelbar in die Substanz des Herzens eindringe, daß aber wohl mehrere Aeste desselben sich dem Herzgeflecht beimischen. Indessen entstehen immer die meisten Herznerven aus dem *N. sympathicus*. Bei den Nerven der Lungen verhält sich's umgekehrt. Sie sind ihrem größ-

¹⁾ *Joh. Fr. Lobstein*, *De nervi sympathetici humani fabrica. usu et morbis etc.* Parisii 1823. 4. p. 15. 14.

²⁾ *Scarpa* a. a. O. §. 7.

ten Theile nach fortgesetzte Aeste des N. vagus. Nach Lobstein stoßen der Plexus pulmonalis und der Plexus cardiacus an der A. pulmonalis unter einander zusammen. Auch am Lungengeflechte befinden sich bisweilen kleine Nervenknoten eingestreuet, welche kürzlich Langenbeck abgebildet hat. Nach Sabathier sollen auch kleine Nervenzweige zu den Lungenvenen gehen, welche aber Behrends und Lobstein nicht finden konnten ¹⁾.

Der Oesophagus erhält seine Nerven fast ganz allein vom N. vagus.

Geflechte in der Bauchhöhle, Plexus coeliacus.

Beide Nervi splanchnici kommen unter dem Zwerchfelle in dem Bauchgeflechte (plexus coeliacus s. semilunaris oder solaris) zusammen, in welchem sich 2 unter einander verbundene, sehr große Knoten, einer auf der rechten der andere auf der linken Seite neben der A. coeliaca befinden. Man nennt diese Knoten ganglia coeliaca, oder ganglia semilunaria, oder ganglia solaris abdominalia, oder splanchnica ²⁾. Sie sind die größten Nervenknoten des ganzen Körpers. Ihre Gestalt aber bleibt sich nicht gleich. Dieses vor der Aorta liegende und längs den Aesten der von ihm umgebenen A. coeliaca sich hinziehende Geflecht nimmt auch Fäden vom Par vagum auf, und steht mit den Nervis phrenicis in Verbindung. Auch vom untersten Ganglion thoracicum erhält es einen Zweig. Die Gestalt dieses Geflechtes ist in verschiedenen Körpern sehr verschieden. Im Allgemeinen besteht es aus vielen Nervenfäden und Nervenknoten, in welchen diese Fäden mit einander verbunden sind. Diese Knoten sind platt, eckig, röthlich, bisweilen durchlöchert.

Plexus gastrici, hepatici, splenici etc.

So heißen nach den Arterien, welche sie mit Nerven umgeben, die Fortsetzungen des Plexus coeliacus.

Aus diesem Geflechte kommen:

- 1) Rami phrenici zur unteren Fläche des Zwerchfells.
- 2) Rami suprarenales zur Nebenniere.

¹⁾ Lobs. ein a. a. O. p. 17.

²⁾ Zuerst beschrieb dieses Geflecht mit einer unvollkommenen Abbildung Vieussens (neurograph. p. 188. sqq. Tab. XXIII.) Die erste richtige und schöne Abbildung, auf welcher aber die Nerven zum Theil etwas zu dünn vorgezeichnet sind, ist die von Vater auf seiner Tab. II, III. nervor. thor. et abd. — Sehr genau beschreibt die Verschiedenheit dieses Geflechtes: Wrisberg in f. obs. de nerv. visc. abd. Sect. IV. Neuerlich ist es von Manec, (Anatomie analytique. Paris 1823. Fol.) und auf vielen Tafeln von Langenbeck abgebildet worden, und Wüger ist noch jetzt damit beschäftigt, über die Verschiedenheit der Gestalt des Ganglion coeliacum Untersuchungen zu machen.

3) Plexus gastricus superior s. coronarius ventriculi, der die A. A. coronarias am concaven Bogen des Magens begleitet, an dessen Bildung aber die Aeste des N. vagus den größten Antheil nehmen.

4) Plexus hepaticus sinister s. anterior, der mit der A. hepatica zur Leber geht.

5) Plexus hepaticus dexter s. posterior, der mit der Vena portarum zur Leber geht, dem gemeinen Gallengange, dem Blasen- gange, der Gallenblase, dem Lebergange, dem Magen, dem Zwölffinger- darme, dem Pankreas und auch dem Netze auf der rechten Seite Aeste giebt, die am convexen Bogen des Magens hingehen und zum Magen und zum großen Netze Zweige geben.

6) Plexus splenicus ist ein Netz, das etwa aus 2 Fäden entsteht, von welchen der eine nach Lobstein eine Fortsetzung des N. vagus zu sein scheint. Er geht mit der A. splenica hinter dem Pankreas fort. Die Nerven der Milz sind sehr klein. In das Pankreas bringen einzelne Nerven aus dem Ganglion coeliacum und Fäden von dem Milz- geflechte ein.

Die zum großen Netze gehenden Aeste bleiben in der Substanz der Schlagadern desselben, ohne sich in der häutigen Substanz des Netzes selbst auf eine sichtbare Weise zu verbreiten ¹⁾.

Plexus mesentericus superior.

Dieser ist eine Fortsetzung des Plexus coeliacus, so daß aus den Gangliis coeliacis Fäden kommen, die ihn zusammensetzen. Er geht an der A. mesenterica superior, dieselbe umgebend, hin, und zertheilt sich in eine Menge Aeste, welche im Mesenterium und Mesocolon zum ganzen dünnen Darne, zum rechten Grimmdarme und zum que- ren Grimmdarme gehen.

Plexus renales.

Zu den beiden Nieren gehen die beiden Plexus renales, welche vom Plexus coeliacus und mesentericus superior entspringen, deren jeder die A. renalis begleitet, und Knoten (ganglia renalia) in unbeständiger Anzahl hat, zu denen noch der Nervus renalis poste- rior und posterior inferior kommen.

Plexus spermatici.

Zu den beiden Saamensträngen kommen die beiden Plexus sper- matici, deren jeder von dem Plexus renalis seiner Seite entspringt.

¹⁾ Walter tabb. nerv. thor. et abd. p. 17.

aus 3 bis 4 dünne Fäden besteht und an den Vasis spermaticis, im männlichen Körper zum Hoden, im weiblichen zur Mutter und den Eierschäden hinabgeht.

Unterwegs geben diese Plexus Fäden zum Harn gange ab.

Zu ihnen kommen noch Fäden von den Gangliis spermaticis, welche am unteren Theile der Nerte liegen, und vom Plexus mesentericus superior und inferior, sowie auch von den Renalibus, Fäden erhalten.

Plexus mesentericus inferior.

Dieser wird aus Fäden des Plexus mesentericus superior, der Plexuum renalium, die an der Nerte hinabgehen, und von hinzukommenden Fäden der Lendenknoten und des Stranges des Nervus sympathicus selbst u. zusammengesetzt, und vertheilt sich im Mesocolon zum linken Grimmdarme und zum Mastdarme.

Einige allgemeine Bemerkungen über den Zusammenhang dieser Plexus unter einander und mit dem N. vagus.

Nach Lobsteins Untersuchung der Verbreitung des N. Vagus und des N. sympathicus im Unterleibe, hing die Fortsetzung des rechten N. vagus, welche an die vordere Seite des Magens trat, nicht mit dem Plexus solaris zusammen, sondern schickt eine Anzahl Fäden, die an der kleinen Curvatur des Magens hinklaufend, nach links dünner wurden und bis in das zwischen der Muskelhaut und Schleimhaut liegende Zellgewebe verfolgt werden konnten. Eine solche Verbreitung dieser Nerven in der Muskelhaut, aus welcher geschlossen werden könnte, daß gewisse Fäden den Fleischfasern angehörten, konnte er nicht finden. Nur an der Einsenkungsstelle des Oesophagus schien ein Fädchen sich so zu verhalten.

Die Leber erhält nach ihm sowohl vom Ganglion semilunare dextrum als auch von dem sinistrum Nervenfäden, mit welchem sich die des linken N. vagus verbinden. Die vom linken Ganglion semilunare zu ihr gehenden Nervenfäden laufen auch nach ihm mehr an der vorderen Seite der A. hepatica, die vom rechten mehr an der V. portae hin. Nach Lobstein gehen von jenem Geflechte mehrere Fäden mit der A. gastro-duodenalis zum Duodenum und zum Pancreas ab. Er glaubt ferner einige Nerven zweige verfolgt zu haben, welche sich in den Häuten des Ductus choledochus endigten. Obgleich die von dem Ganglion semilunare dextrum entspringenden, zur Leber gehenden Nervenfäden locker an die V. portae angeheftet sind, so ist es doch schwer, Nervenfäden zu beobachten, die der V. portae selbst angehören und sie fortwährend begleiten. Indessen glaubt Lobstein, daß es ihm doch endlich gelungen sei, einige solche Fäden zu beobachten.

Die Nerven, welche die Milzarterie zur Milz begleiten, bestehen nach Lobstein aus 2 Strängen, von welchen der eine vom rechten N. vagus, der andere vom linken Ganglion semilunare abgeht. Vom rechten Ganglion semilunare geht die Milz nach Lobstein keine Nervenfäden. Diese Nerven bilden ein die Milzarterie umgebendes Netz. Am Hilus lienalis begleiten immer je 2 Nerven einen Arterienast. Aber schon bei der 2ten Theilung dieser Arterie verlassen sie dieselben nach Lobstein und setzen ihren Weg allein durch das Parenchyma der Milz fort.

Der Kopf des Pancreas erhält nach Lobstein seine Nerven vorzüglich von dem rechten Ganglion semilunare, der linke Theil desselben vorzüglich aus dem linken.

Zu dem Plexus mesentericus superior, der mit beiden Gangliis semilunari-

bus zusammenhängt, setzt sich nach Lobstein ein Zweig des rechten *N. vagus* fort. Ein kleiner Zweig desselben konnte von demselben Anatomen sogar bis zur *A. colica media* verfolgt werden.

Da nun von dem *Plexus mesentericus superior* eine unmittelbare Fortsetzung zur *A. mesenterica inferior* geht, so ist dieser selbst als eine unmittelbare Verlängerung des *Plexus coeliacus* anzusehen. Die *Plexus renales* stehen nicht in einer so unmittelbaren Verbindung mit dem *Plexus coeliacus*.

Plexus hypogastricus superior bei Frauen 1).

Er ist unpaar, entsteht aus Fäden welche vom *Plexus mesentericus inferior*, von dem unteren Theile des Lendenstücks des sympathischen Nerven hinter der *A. iliaca* und von dem Knoten im Nierengeflechte zu ihm übergehen. Er liegt auf der Mitte des Körpers des letzten Lendenwirbels und auf dem Promontorio zwischen den Arterien *iliacis* und theilt sich unten in 2 um den Mastdarm seitwärts herumgehende Plexus, welche einigen zum Uterus, zur Harnblase und zum Mastdarme gehenden Ästen der *A. hypogastrica* folgen. Von ihm entspringen wie *W. Hunter*, und vorzüglich *Tiedemann* und *Sangerbeck* gezeigt haben, wichtige Nerven für den Uterus.

Plexus hypogastricus inferior.

Dieser ist nicht unpaar, sondern doppelt, einer gehört der rechten, der andere der linken Seite an. Er liegt theils neben, theils vor dem Mastdarme, vor den Lendenwirbeln und dem heiligen Beine, entsiekt aus Fäden des *Plexus hypogastricus superior*, des *Nervus sympathicus* und aus Fäden, welche von dem Kreuzknoten desselben kommen. In ihn gehen aber auch vom 3ten und 4ten Kreuznerven sehr bedeutende Zweige über. In ihm liegen einige Knoten, *ganglia hypogastrica*, eingestreuet. Seine Zweige vertheilen sich zu den Schlagadern des Beckens, zum Mastdarme, zur Harnblase, und zu dem untersten Theile der Harngänge, in Männern zu den Saamenbläschen, in Weibern zu dem unteren Theile der Gebärmutter und zur Scheide.

Ueber die Nerven des Uterus stimmen die Untersuchungen verschiedener Anatomen nicht überein. Darüber sind zwar alle Anatomen derselben Meinung, daß sie bei alten Frauen und unreifen Mädchen sehr dünn sind. Aber nach *W. Hunter* 2) sollen sie bei den Frauen während der Schwangerschaft an Dicke zunehmen, und so fand sie auch *Tiedemann* bei 3 nach der Geburt gestorbenen Frauen und behauptet

1) Siehe *Tiedemanns* unten angeführte Schrift.

2) *W. Hunter*, anatomische Beschreibung des menschlichen schwangeren Uterus, a. d. Engl. übers. von *F. Tiedemann*. Weimar 1802. und *F. Tiedemann*, Tabulae nervorum uteri. Heidelbergae 1822. Fol. 5. 10. *Ehrmann* in *Lobstein de nervi sympathici humani fabrica, usu et morbis*. Parisiis 1823. 4. p. 16°.

tete, sie auch bis in die Substanz des Uterus verfolgt zu haben. Lobstein ¹⁾ dagegen, ob er gleich auch den Uterus kurze Zeit nach der Geburt untersuchte, konnte doch keine deutliche, im Uterus sich verbreitende Nerven finden.

Die Verschiedenheit des Plexus spermaticus und hypogastricus beim männlichen und weiblichen Geschlechte ist noch nicht gehörig auseinandergesetzt worden.

Seb. Göthe hat neuerlich den Plexus spermaticus des männlichen Geschlechts (wie es scheint auf der rechten Seite) mit vieler Mühe untersucht. Aus seiner Beschreibung geht hervor, daß die die A. spermatica begleitenden Nerven, geflechte viel zahlreicher sind als man glauben sollte. Sie entspringen von Ganglien, welche an der Aorta liegen, vom Plexus mesentericus superior und inferior, vom Plexus renalis und vom hypogastricus. In diesen die Arteria spermatica begleitenden Geflechten befanden sich im Unterleibe vorzüglich 2 sich durch ihre Größe auszeichnende Ganglien, und außer ihnen kamen noch 2 Ganglien in diesem Geflechte vor, nachdem es die Unterleibshöhle verlassen hatte. Das obere lag auf der Vena cava unter der A. spermatica, stand mit den Ganglien an der Aorta, mit dem Plexus renalis und mit dem Plexus spermaticus in Verbindung, und war rundlich und von einem großen Umfange.

Das untere Ganglion, das sich durch seine Größe so sehr auszeichnete, lag auf der A. iliaca ungefähr 2 Zoll vom Annulus abdominalis entfernt, war dreieckig, und stand nicht nur mit dem Plexus spermaticus, sondern auch mit dem hypogastricus in Verbindung. Am Annulus abdominalis kamen ungefähr 6 größere und viele kleinere Nervenfasern an.

Von den Knoten, welche dem Geflechte eingestreuet waren, nachdem es die Unterleibshöhle verlassen hat, lag einer an der Stelle, wo der Funiculus spermaticus über das Ligamentum Poupartii weggeht. Er war dreieckig, der andere lag tiefer. Uebrigens wurde auch der Ureter von sehr dünnen Nerven begleitet, die ihren Ursprung theils aus dem Plexus renalis, theils aus dem Plexus spermaticus hatten, auch sahe Götz, daß das Vas deferens von einem sehr reichen und eleganten, aus dem Plexus hypogastricus stammenden Nerven nahe umgeben sei ²⁾.

¹⁾ Joh. Fr. Lobstein, De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis Commentatio 1823. 4. p. 31. »Rarissime in uteri substantiam, tum vacui tum gravidi, sese immittitur videntur nervorum surculi. In utero puerperae, duodecim horas post partum mortuae, accurato examine instituto, nullos reperi nervos, neque a plexu spermatico neque ab hypogastrico emissos, quamvis vasa sanguinea et lymphatica admodum fuerint distensa. Hac occasione inquirere volui ope microscopii, an tunicis istorum vasorum aliquis adhaeserit surculus nervus; sed omni cura adhibita detegere potui nullum.

²⁾ Sebastianus Götz, Prodromus neurologiae partium genitalium masculinarum Erlangae 1823. 4.



